N
L75

GEOLOGICAL SURVEY
OTTAWA
OCT 27 1906
CANADA
DEPARTMENT.
$7.47
1069

CAROLI LINNÆI

R:GIÆ M:TIS SVECIÆ ARCHIATRI; MEDIC. & BOTAN. PROFESS. UPSAL; EQUITIS AUR. DE STELLA POLARI, nec non ACAD. IMPER. MONSPEL. BEROL. TOLOS. UPSAL. STOCKH. SOC. & PARIS. CORESP.

SPECIES PLANTARUM.

EXHIBENTES

PLANTAS RITE COGNITAS,

AD

GENERA RELATAS,

CUM

DIFFERENTIIS SPECIFICIS,
NOMINIBUS TRIVIALIBUS,
SYNONYMIS SELECTIS,
LOCIS NATALIBUS,

SECUNDUM

SYSTEMA SEXUALE

DIGESTAS.

TOMUS I.

Cum Privilegio S. R. M:tis Sueciæ & S. R. M:tis Polonicæ ac Electoris Saxon.

HOLMIÆ,
IMPENSIS LAURENTII SALVII.
1753.

LIBRARY
NATIONAL MUSEUM
OF CANADA
00345

Ignoto Genere proprio
nulla deſcriptio, *quis accurata tradita,*
certam demonſtrat,
ſed plerumque fallit.
CÆSALP. *præfat.*

STORMAGTIGSTE ALLERNÅDIGSTE

KONUNG OCH DROTTNING
ADOLPH FRIDERIC,
LOVISA ULRICA,

SVERIGES GÖTHES OCH VENDES

KONUNG OCH DROTTNING!

EDRA MAJESTETER år jag allerunderdånigſt ſkyldig detta verk, frukten af min måſta och båſta leſnad, det jag nu under EDRA MAJESTETERS milda regering ſått med nögdt och roligt ſinne fullborda.

5184

EDRE MAJESTETER hafva, ifrån förſta lyckeliga ankomſten til riket, ſtådſe anſett mig med blida ſtrålar, kallat mig ſom oftaſt til Sit Hof, och betygat emot mig all Kongelig nåd.

EDRE MAJESTETER hafva ock gifvit den Vetenſkapen, ſom jag idkat ljus och anſeende i Sit Rike, då EDRE MAJESTETER ej allenaſt allernådigſt låtit Skaparens underverk för ſig beſkrifvas, utan ock hopkallat allehanda jordenes inbyggare af alla tre Naturens riken, ſamt befalt dem inlogeras uti ſina pråktiga luſt-ſlott Ulriksdahl och Drottningholm, der deſſe, likſom deputerade från hela vida verlden, få dageligt företråde för MAJESTETENS ögon.

Tror mig altſå ej ſäga för mycket, då jag rent ut bekånner, at ifrån den viſa Konung Salomons tid och Drotningens af rika Arabien, inga Potentater gjordt på den Alsmågtiga Skaparens underverk ſtörre aktning.

Ty bör och ſkal denna Vetenſkapen tåfla med alla andra minnesmårken, at göra EDRA MAJESTETERS namn odödeliga, då den

in-

inpræglar dem i Naturens egen bok, ſom årligen å nyo uplågges, at bliſva med Jordklotet lika beſtändig.

Himmelen göre EDRA MAJESTETERS dagar och regering lång och lyckelig, ſå viſt jag leſver och dör

EDRA KONG. MAJESTETERS

allerunderdänigſte och tropliktigſte
tjänare och underſåte
CARL LINNÆUS.

LECTORI ÆQUO.

Homo ſui conſcius obſervat MUNDUM eſſe omnipotentis theatrum, undique adornatum ſummis Omniſciæ ſapientiæ miraculis, ſe vero in hunc, tamquam Hoſpitem introductum, ut hiſce deliciis ſeſe delectando magnificentiam Domini agnoſcat. Indignus profecto is cenſendus hoſpes, qui, pecoris inſtar, tantum gulæ inſervit, nec magnalia poſſeſſoris intueri atque æſtimare novit.

HOSPITES ut digni evadamus orbis, opera hæc Creatoris ſcrutari nobis neceſſe eſt, quæ ita cum noſtris commodis combinavit ſummum Ens, ut eis, unde omnia noſtra bona deſumimus, carere nulla ratione quæamus; & quo magis hæc intelligimus, eo etjam plura in uſum generis humani cedunt.

COGNITIONEM horum ut rite acquiramus, ſingula diſtincta *Idea* & diſtincto *Nomine* complecti oportet, quibus ſepoſitis copia rerum nos obruat neceſſe eſt, & commercium omne, deficiente communi lingua, ceſſabit.

SCIENTIA NATURÆ inde inter Homines nata eſt, quæ comprehendit ſub *Phyſica* & *Chemia* Elementa, ſub *Zoologia*, *Botanica*, *Lithologia* tria Naturæ regna.

REM HERBARIAM heic libare lubet, quæ quondam paucarum plantarum erat Scientia; hodie vero copia delectorum evaſit omnium ampliſſima.

INVENTORUM recentioris ævi indefeſſis laboribus notitiam debemus plurium Plantarum, quam omnibus priſcorum temporum eruditis, inter quos imprimis nominandi *Cluſius*, *Columna*, *Bauhini*, *Hermannus*, *Rheede*, *Sherardus*, *Rajus*, *Plukenetius*, *Tournefortius*, *Plumierus*, *Vaillantius*, *Dillenius*, *Gmelinus*. *&c.*

NOTI-

LECTORI.

NOTITIA plantarum conſtabat quondam Nominibus arbitrariis, *memoriæ* tabulæ infixis, quam vacillantem *Icones* ſublevabant.

SYSTEMATICORUM ſapientia indagavit ordinem qui memoriæ ſuccurreret, & ſcientiam ſolidis fundamentis inædificaret, quem debemus Principibus Viris *Geſnero*, *Cæſalpino*, *Bauhino*, *Moriſono*, *Hermanno*, *Tournefortio*, *Vaillantio*, *Dillenio*, aliisque.

ARIADNEUM hoc filum Syſtematicorum terminabatur *Generibus*, quod tentavi ad *Species* usque extendere, confectis legitimis harum differentiis, ut etjam in hiſce ſua ſibi conſtaret certitudo, quum *omnis vera cognitio cognitione ſpecierum innitatur*; hac enim dificiente vacillat & hiſtoria, ut in plerisque *Peregrinatorum* diariis.

SPECIES plantarum ut mihi familiares redderem, peragravi Alpes *Lapponicas:* totam *Sueciam:* partem *Norvegiæ*, *Daniæ*, *Germaniæ*, *Belgii*, *Angliæ*, *Galliæ*: perquiſivi deinde HORTOS Botanicos: *Pariſinum*, *Oxonienſem*, *Chelſejanum*, *Hartecampenſem*, *Leidenſem*, *Ultrajectinum*, *Amſtelædamenſem*, *Upſalienſem* aliosque: evolvi etjam HERBARIA *Burſeri*, *Hermanni*, *Cliffortii*, *Burmanni*, *Gronovii*, *Royeni*, *Sloanei*, *Sherardi*, *Bobarti*, *Milleri*, *Suriani*, *Tournefortii*, *Vaillantii*, *Juſſiæi*, *Bæckii* &c. Meo ſuaſu DISCIPULI quondam dilectiſſimi: *P. Kalmius* Canadam, *F. Haſſelquiſt* Ægyptum, *P. Osbeck* Chinam, *P. Læfling* Hiſpaniam, *Montin* Lapponiam adire, plantasque lectas mecum communicarunt. E variis terris demum miſere Amici BOTANICI ſemina plantasque ſiccas non paucas, uti *B. Juſſieu*, *Royenus*, *J. Geſnerus*, *Wachendorfius*, *Sibtorpius*, *Montius*, *Gleditſchius*, *Kraſcheninnikoffius*, *Minuartius*, *Velezius*, nec non *O. Munchhauſen* L. B, *S. C. Bielke* L. B, *J. Rathgeb* Equ. *Demidoff*

dorff Nob. *Collinſon*, *Torèn*, *Braad*, aliisque *Clifford* omnes quas in duplo habuit: *Lagerſtröm* indiæ orientalis plurimas: *Gronovius* pleraſque Virginicas & *Gmelinus* Sibericas facile omnes, at *Sauvageſius* integrum ſuum theſaurum plantarum dedit, exemplo raro & inaudito, unde factum, ut copiam plantarum obtinuerim non mediocrem.

DIFFERENTIAS Specificas antehac Plantis non paucis impoſui in Flora *Lapponica*, *Suecica*, *Zeylanica*, in Horto *Cliffortiano*, *Upſalienſi*. Iisdem principiis inſtitere præſtantiſſimi Botanici *Gronovius*, *Royenus*, *Wachendorff*, *Gorter*, *B. Juſſiæus*, *Le Monier*, *Guettard*, *Dalibard*, *Sauvages*, *Colden*, *Hill*, inque non paucis *Hallerus*, *Gmelinus* aliique, quorum opera plurimæ Species evaſere ratæ & evidentes.

NOMINA hæc paſſim diſperſa in gratiam ſtudioſorum conſultum duxi colligere, acquiſitas dein plantas addere, inque unum Syſtema reducere; at vero pluribus *Speciebus* obſervatis, præſtantioribus *notis* detectis, aptioribus *Terminis* cuſis, debui interdum differentias emendare, antea quamvis optimas.

Characteres eſſentiales pro NOMINE SPECIFICO conſtituere non levidenſe opus eſt; requirit enim *Specierum* plurium accuratam cognitionem, harum attentisſimam *partium* indagationem, *differentium* ſelectionem, *Terminorum* denique artis propriam applicationem, ut evadant compendioſiſſimi tutiſſimique.

NON VISAS plantas heic omiſi, toties eluſus ab auctoribus, ne dubia certiſſimis miſcerem, ſi vero aliquando contigerit non ſufficienter inſpexiſſe plantam, vel ſpecimen imperfectum obtinuiſſe, ſigno † hoc notavi, ut alii eandem accuratius examinent.

Non

LECTORI.

Non nominatas in hoc Libello plantas, ſi quis ad me mittere velit, eas in proxima editione V. D. recenſebo cum honorifica recenſione datoris.

NUMERUM plantarum totius orbis longe parciorem eſſe, quam vulgo creditur, ſatis certo calculo intellexi, utpote qui vix ac ne vix 10000 attingat.

TRIVIALIA nomina in margine appoſui, ut miſſis ambagibus, uno quamlibet Herbam nomine complecti queamus; hæc vero abſque ſelectu polui, quippe quem alius dies poſcit. Caveant autem quam ſanctiſſime omnes ſani Botanici, umquam proponere nomen triviale ſine ſufficienti differentia ſpecifica, ne ruat in priſtinam barbariem ſcientia.

SYNONYNA pauciſſima in EUROPÆIS plantis adhibui, contentus C. *Bauhino* & *Iconographo* præſtantiore; in EXOTICIS vero plura, quum difficiliora minusque trita ſint.

DESCRIPTIONES tantum in obſcuris adhibere neceſſum fuit, easque ſine ambagibus, ut obtinerem compendium tironibus gratum.

LOCA natalia more meo adjeci, inque notiſſimis *Fruticantes* ♄, *Perennes* ♃, *Biennes* ♂, *Annuas* ☉ notavi.

GENERA nonnulla *nova*, nonnulla *immutata* adhibui, quæ in nova editione Generum plantarum propediem ſiſtere animus eſt.

ADVERSARIORUM tela nunquam retorſi: acerrima convitia, inſimulationes, cavillationes, buccinationes, (præſtantiorum longe Virorum, omni ævo, laboris præmia) tranquillo animo ſuſtinui, nec ſuis auctoribus hæc invideo, ſi inde ipſis apud vulgus gloria major.

jor. Fero hæc, quæ in me ne capillum quidem mutant, & cur non ferrem iniquos, qui a veris Botanicis & quidem conſummatiſſimis, quibus aſſurgere debent illi, ſummis cumulatus ſum encomiis. Parem deinde adverſariis referre gratiam, nec anni ingraveſcentes, nec munus, quo fungor, nec mei mores patiuntur. Quod mihi ſupereſt brevioris ævi, tranquillus utilioribus obſervationibus impendam. Res naturales enim proprio privilegio munitæ perſiſtunt, ut quemadmodum errores in his commiſſi a nullo defendi, ita nec veritates obſervationibus innixæ a toto eruditorum orbe conculcari poſſint; judices itaque provoco ſeros Nepotes:

Paſcitur in vivis livor, poſt fata quieſcit,
Tum ſuus ex merito quemque tuetur honos.

Dabam 1753 d. 2 Maji. Upſaliæ.

AU-

AUCTORES

REFORMATORES.

PROPRIA Genera plantarum. *Lugdb.* 1752. *oct.*
Philoſophia Botanica. *Holmiæ.* 1751. *oct.*
Hortus Cliffortianus. *Amſtel.* 1737. *fol.*
Hortus Upſalienſis. *Holmiæ* 1748. *oct*
Flora Suecica. *Holmiæ* 1745. *oct.*
Flora Lapponica. *Amſtel.* 1737. *oct.*
Flora Zeylanica. *Holmiæ* 1747. *oct.*
Viridarium Cliffortian. *Amſtel.* 1737. *oct.*
Materia Medica. *Holmiæ* 1749. *oct.*
Amœnitat. Academ. 1. *Lipſiæ.* 1749. *oct.*
Amœnitat. Academ. 2. *Holmiæ* 1751. *oct.*
Iter Oelandicum. *Holmiæ* 1745. *oct. ſuec.*
Iter Gotlandicum. *Holmiæ* 1745. *oct. ſuec.*
Iter Weſtrogothicum. *Holmiæ* 1747. *oct. ſuec.*
Iter Scanicum *Holmiæ.* 1751. *oct. ſuec.*
Acta Upſalienſ. R ſoc. *Holmiæ* 1740. *&c. quart.*
Acta Stockh. R. ſoc. *Holmiæ* 1739. *&c. oct ſuec.*

* *

KALM PETR. Plantæ canadenſes *propediem edendæ.*
HASSELQUIST FR. Pl. ægypti *in act. upſ. & epiſtolis.*
OSBECK PETR. Pl. chinenſes *in literis, Mſc.*
LOEFLING PETR. Pl. hiſpanicæ *in epiſtolis, Mſc.*

* * *

GRONOVIUS J. F. Flora virginica 1 2. *Leidæ* 1739. *oct.*
ROYEN ADR. Flora leidenſis. *Leidæ* 1740. *oct.*
GORTER DAV. Floræ gelro-zulphan. *Harderv.* 1745. *oct.*
JUSSIEU B. Pl. rariores variæ *in lit. & act. pariſ.*
GUETTARD M. Obſervations ſur les plantes. *Pariſ.* 1747. *oct.*
DALIBARD M. Flora pariſienſis. *Pariſ.* 1749. *duod.*
SAUVAGES FR. Flora monſpelienſis. *Hagæ* 1751 *oct.*
COLDEN CONR. Plantæ coldinghamiæ. *act. upſ.* 1743. *quart.*
WACHENDORFF E. J. Hortus Ultrajectinus. *Traiect.* 1747. *oct.*
HALLER ALB. Stirpes helveticæ. *Götting.* 1742. *Fol.*
LUDVIG. C. G. Genera Aphoriſmi, *Lipſ.* 173 *oct.*
GMELIN J. G. Flora Sibirica 1. 2. *Petrop.* 1750 *&c. quart.*
MONIER. LUD. GUIL.. cat. des pl. en Auvergne &c. *Par.* 1745. *p.*
BÜTTNER D. G. Plantæ cunonis. *Amſtel.* 1750. *oct*
HILL JOH. Hiſtoris of plants. *Lond.* 1751. *fol.*
MITCHEL JOH. Genera pl. virginic. *E. N. C.*
MONTI CAJET Genus Aldrovandæ &c. *Inſt. Bonon. Vol.* 2.
SESLERUS LEONH. Epiſtola de vitaliana. *Venet.* 1750 *fol.*

USI-

USITATIORES.

*

Bauhini *pinax.*
Bauhini *Hiſtoria pl.*
Camerarii *epitome.*
Columnæ *ecphraſis.*
Cluſii *hiſtoria.*
Dodonæi *pemptades.*
Fuchſii *hiſtoria.*
Dalechampii *hiſtoria.*
Marcgravii *braſilia.*
Alpinus *exotica.*
Lœſelii *pruſſica.*

Lobelii *Icones.*
Brunsfelſii *Hiſtoria.*
Tabernæmontani *Hiſtoria.*

Cornuti *Canadenſes*
Renealmi *Specimen.*

* *

Moriſoni *hiſtoria.* 2. 3.
Raji *hiſtoria.* 1. 2. *Supplementum* 3. *Synopſis* 3:tia
Plukenetii *Almageſtum*, *Phytographia.*
Petiveri *gazaphylacium.*
Sloani *Jamaica.*
Hermanni *Hort. lugdbat.* *Paradiſus.*
Rheede *Hort. malab.*
Commelini *Hort. amſtel.* 1. 2 *Præludia.*
Breynii *Centuria.* *Prodromus* a filio.
Dodarti *memoires.* Rivini *Ordines.*
Tournefortii *inſtitutiones.*
Plumierii. *Genera*, *Species*, *Americana*, *Filices.*
Fewillæi *peruviana.*
Iſnard *acta pariſina.*
Bocconis *Muſeum*, *Siculæ plantæ.*
Barrelieri *Icones.*

* * *

Boerhavii *Hortus lugd-batavus.*
Kæmpferi *Amœnitates* exoticæ.
Scheuchzeri *Gramina*; *Itinera alpina.*
Michelii *Genera* nova.
Vaillantii *Acta pariſina. Flora pariſina.*
Monti *Gramina.* Tilli *Hortus piſanus.*
Buxbaum *Centuriæ.*
Catesby *Carolina* 1. 2. 3. Martyni *Centuria.*
Burmanni *Zeylanica*, *africanarum decades.*
Amanni *Ruthenica*, *Herbarium.*
Dillenii *Elthamenſes*, *Muſci.*
Seguieri *Verona.*

*** *** ***

Clas-

MONANDRIA

MONOGYNIA.

CANNA.

1 CANNA foliis ovatis utrinque acuminatis nervoſis. *Indica.*
Roy. lugdb. 11. *Fl. zeyl.* 1. *Hort. upſ.* 1.
Canna ſpatulis bifloris. *Hort. cliff.* 1.
Arundo indica latifolia. *Bauh. pin.* 19.
Habitat inter tropicos Aſiæ, Africæ, Americæ. ♃

2. CANNA foliis lanceolatis petiolatis nervoſis. *anguſtifol.*
Canna foliis lanceolatis petiolatis. *Hort. cliff.* 1.
Arundo indica florida anguſtifolia. *Moris hiſt.* 3. *p.* 250. *ſ.* 8. *t.* 14. *f.* 6.
Habitat inter tropicos Americæ: *Umbroſis ſpongioſis.* ♃

3. CANNA foliis lanceolatis petiolatis enervibus. *Roy. lugdb.* 11. *glauca.*
Canna foliis enervibus. *Virid. cliff.* 104.
Cannoides. *Hort. cliff.* 488.
CannaAcorus glaucophyllus, ampliore flore, iridis paluſtris facie. *Dill. elth.* 69. *t.* 59. *f.* 69.
Habitat in Carolina? ♃

AMOMUM.

AMOMUM ſcapo nudo, ſpica ovata. *Hort. cliff.* 3. *Hort upſ.* 1. *Flor. zeyl.* 3. *Mat. med.* 1. *Roy. lugdb.* 12. *Zingiber.*
Zingiber. *Bauh. pin.* 35.
Habitat in Indiis *inter tropicos* ♃.

2. AMOMUM ſcapo nudo, ſpica oblonga obtuſa. *Hort. cliff.* 3. *Hort. upſ.* 1. *Fl. zeyl.* 2. *Roy. lugdb.* 12. *Zerumbet*
Zingiber latifolium ſylveſtre. *Herm. lugdb.* 636. *t.* 637.
Habitat in India. ♃

3 AMOMUM ſcapo bracteis alternis laxis caule breviore. *Fl. zey.* 4. *Mat. med.* 2. *Cardamom.*
Elettari 2. *Rheed. mal.* 11. *p.* 9. *t.* 6.
Habitat in India. ♃

Gran.parad. 4. AMOMUM ſcapo veſtito racemoſo. ✠
Amomum caule racemoſo. *Mat. med.* 3.
Grana paradiſi officinarum. *Bauh. pin.* 413.
Habitat in Madagaſcar, Guinea.

COSTUS.

rabicus 1. COSTUS. *Hort. cliff.* 2. *Hort. upſ.* 2. *Fl. zeyl.* 5. *Mat. med.* 4. *Roy. lugdb.* 11.
Coſtus arabicus. *Bauh. pin.* 36. *Mer. ſurin.* 36. *t.* 36.
Habitat in India *utraque.* ♃

ALPINIA.

cemoſa. 1. ALPINIA *Roy. lugdb.* 12.
Alpina racemoſa alba, cannacori foliis. *Plum. Gen.* 26
Paco ſeroca *Marcgr. braſ.* 48.
Habitat in America *calidiore.* ♃

MARANTA.

rundinacea 1. MARANTA. *Hort. cliff.* 2 * *Roy. lugdb.* 11.
Maranta arundinacea, cannacori folio. *Plum. gen.* 16 *Mart. cent.* 39. ⊙
Habitat in America *calidiore.* ♃

CURCUMA.

rotunda, 1. CURCUMA foliis lanceolato-ovatis; nervis lateralibus rariſſimis.
Curcuma foliis ovatis utrinque acuminatis: nervis lateralibus pauciſſimis. *Roy. lugdb.* 12. *Fl. zeyl.* 6.
Manja-kua. *Rheed. mal.* 11. *p.* 19. *t.* 10. *
Habitat in India. ♃

longa. 2. CURCUMA foliis lanceolatis: nervis lateralibus numeroſiſſimis.
Curcuma foliis lanceolatis utrinque acuminatis: nervis lateralibus numeroſiſſimis. *Roy. lugdb.* 12. *Fl. zeyl.* 7. *Mat. med.* 5.
Curcuma radice longa. *Herm. lugdb.* 208. *t.* 209.
Habitat in India. ♃

KAEMPFERIA.

Galanga, 1. KAEMPFERIA foliis ovatis ſeſſilibus. *Fl. zeyl.* 8. *Mat. med.* 3.
Kaempferia. *Hort. cliff.* 2. *t.* 3. *Roy. lugdb.* 12.

Wan-

Wanhom. *Kaempf. amoen.* 901. *t.* 902.
Habitat in India. ♃

2. KAEMPFERIA foliis lanceolatis petiolatis. *Fl. zeyl.* 9. *Mat. med.* 9. *rotunda.*
Zedoaria rotunda. *Bauh. pin.* 31
Habitat in India. ♃

BOERHAVIA.

BOERHAVIA caule erecto. *erecta.*
Boerhavia, ſolani folio, erecta glabra. *Amm. herb.* 241.
Habitat in Vera Cruce. ♃

2. BOERHAVIA caule diffuſo. *diffuſa.*
Boerhavia diffuſa. *Fl. zeyl.* 10. *Hort. upſ.* 4.
Boerhavia foliis ovatis. *Hort. cliff.* 17. *Roy. lugdb.* 234.
Talu-dama. *Rheed. mal.* 7. *p.* 105. *t.* 56.
Habitat in India. ♃

3. BOERHAVIA caule ſcandente. *ſcandens.*
Solanum bacciferum americanum, fructu corymboſo. *Pluk. alm.* 349. *t.* 226. *f.* 7.
Valerianella, alſines folio, ſcandens. *Sloan. flor* 91. *hiſt.* 1. *p.* 210. *Raj. ſuppl.* 244.
Antaniſophyllum ſcandens, alſines majoris folio. *Vaill. act.* 1722. *p.* 258.
Habitat in Jamaica *ad urbem jago de la vega.* ♃

4. BOERHAVIA caule repente. *repens.*
Boerhavia nubica minor. *Vaill. ſex.* 53.
β Boerhavia nubica minima. *Vaill. ſex.* 55.
Habitat in Nubia *inter Mocho & Tangos.* ♃

SALICORNIA.

1. SALICORNIA articulis apice craſſioribus obtuſis. *Mat. med.* 8. *europaea.* herbacea.
Salicornia herbacea. *Fl. ſvec.* 1.
Salicornia annua. *Sauv. monſp.* 7.
Salicornia. *Hort. cliff.* 490. *Roy. lugdb.* 205
β Salicornia ſempervivens. *Sauv. monſp.* 7. fruticoſa.
Kali geniculatum majus. *Bauh. pin.* 289.
Habitat in Europæ litoribus maritimis. ♄ ☉
Conferantur annua & ſempervirens *utrum ſpecie diſtinctæ?*

2. SALICORNIA articulis obtuſis baſi incraſſatis, ſpicis ovatis. *arabica.*

A 2 Kali

Kali geniculatum majus. *Bauh. pin.* 289. *Moriſ. hiſt. p.* 610. *ſ.* 5. *t.* 33. *f.* 7. *Raj. hiſt.* 211.
Habitat in Arabia.

virginica. 3. SALICORNIA articulis apice compreſſis emarginatis bifidis.
Salicornia caulium ramorumque articulis apice bicornibus *Gron. virg.* 129.
Habitat in Virginia, & *ad* Salinas Saxoniæ. ☉

caſpica. 4. SALICORNIA articulis cylindricis, ſpicis filiformibus.
Kali arboreſcens, tamariſci facie. *Buxb. cent.* 1. *t.* 11. *f.* 1
Habitat in ſqualidis maris Caſpii & Mediæ ♄.

HIPPURIS.

vulgaris 1. HIPPURIS. *Fl. lapp.* 1. *Fl. ſuec.* 2. *Hort. cliff.* 3. *Roy. lugdb.* 205. *Dalib. pariſ.* 1.
Equiſetum paluſtre, brevioribus foliis, polyſpermum. *Bauh. pin.* 35.
Habitat in Europæ *fontibus.* ♃

DIGYNIA.

CORISPERMUM.

hyſſopifol. 1. CORISPERMUM floribus lateralibus. *Hort. upſ.* 2.
Coriſpermum floribus alternis. *Hort cliff.* 3. *It. gotl.* 316. *Roy. lugdb.* 205. *Sauv. monſp.* 52.
Coriſpermum hyſſopifolium. *Juſſ. act.* 1712. *p.* 244.
Habitat ad Volgam Tartariæ, *Gillau* Boruſſiæ, Monſpelii *arenoſis* ☉

ſquarroſum. 2. CORISPERMUM ſpicis ſquarroſis. *Hort. upſ.* 3. *
Rhagroſtis foliis arundinaceis. *Buxb. cent.* 3. *p.* 30. *t* 55.
Habitat ad Wolgam Tartariæ, *inque deſertis* Coſſacorum. ☉.

BLITUM.

capitatum. 1. BLITUM capitellis ſpicatis terminalibus. *Hort. upſ.* 3.
Blitum foliis triangularibus dentatis, calycibus baccatis, capitulis ſummis nudis. *Virid. cliff.* 1. *Roy. lugdb.* 206.
Blitum foliis triangularibus dentatis. *Hort. cliff.* 28.
Atriplex baccifera. *Ray. hiſt.* 197.
Habitat in Europa: *præſertim in comit.* Tyrolenſi. ☉

virgatum. 2. BLITUM capitellis ſparſis lateralibus. *Hort. upſ.* 3.
Blitum foliis triangularibus dentatis, calycibus baccatis,

tis, capſulis ſummis folioſis. *Hort. cliff.* 495. *Roy. lugdb.* 206.
Atriplex ſylveſtris, mori fructu. *Bauh. pin.* 119.
Habitat in Tataria, Hiſpania. ⊙

CINNA.

1. CINNA. *arundinacea.*
Habitat in Canada, *unde ſemina per D. Kalm.* ♃
Gramen magnitudine Avenæ ſativæ. Folia *fere arundinacea, læviuſcula.* Panicula *denſa, flaccida.* Flores *conferti, ſecundi, lateribus calycis & petalo majore ſcabri.* Ariſta *infra apicem Glumæ majoris petali breviſſima.* Gramen *inamœnum* ſtamine unico *ſpectabile.*

Claſſis II.

DIANDRIA

MONOGYNIA.

NYCTANTHES.

arbor triſtis. 1. NYCTANTHES caule tetragono, foliis ovatis acuminatis, pericarpiis membranaceis compreſſis. *Fl. zeyl* 11.
Arbor triſtis myrto ſimilis. *Bauh pin* 469.
Manja-pumeram. *Rheed mal.* 1. *p.* 35. *t.* 21.
Habitat in India. ♄

Sambac. 2. NYCTANTHES foliis inferioribus cordatis obtuſis, ſuperioribus ovatis acutis. *Hort. upſ.* 4.
Nyctanthes caule volubili, foliis ſubovatis acutis. *Hort. cliff.* 5. *Hort. upſ.* 4.* *Flor. zeyl.* 12. *Roy. lugdb.* 398.
Jaſminum arabicum. *Cluſ. cur.* 3. *t.* 3. *Angl. hort. t.* 27.
Habitat in India. ♄

undulata 3. NYCTANTHES foliis ovatis acuminatis undulatis, ramis teretibus.
Jaſminum indicum, flore polypetalo exalbido, fructu minori. *Ray. hiſt.* 1601.
Tſieregam-mulla. *Rheed. mal.* 6. *p.* 97. *t.* 55.
Habitat in Malabaria. ♄

hirſuta. 4. NYCTANTHES petiolis pedunculiſque villoſis. ⊙
Rava-pou. *Rheed. mal.* 4. *p.* 99. *t.* 48.
Habitat in India. ♄.

anguſtifolia. 5. NYCTANTHES foliis obtuſis lanceolatis ovatiſque.
Jaſminum indicum anguſtifolium, fructu gemino. *Tourneſ. inſt.* 598.
Katu-pitſiegam mulla. *Rheed. mal.* 6. *p.* 93. *t.* 53. *Raj. hiſt.* 1602.
Habitat in Malabariæ *arenoſis.* ♄

JAS-

JASMINUM.

1. JASMINUM foliis oppoſitis pinnatis. *Hort. cliff.* 5. *Hort. upſ.* 5. *Mat. med.* 9. *Roy. lugdb.* 397. *officinale.*
Jaſminum vulgatius, flore albo. *Bauh. pin.* 397.
Habitat in India. ♄

2. JASMINUM foliis oppoſitis ternatis. *Hort. cliff.* 5. *Fl. zeyl.* 13. *Roy. lugdb.* 397. *azoricum.*
Jaſminum azoricum trifoliatum. *Comm. hort.* 1. *p.* 159. *t.* 82.
Habitat in India.

3. JASMINUM foliis alternis ternatis ſimplicibusque, ramis angulatis. *Hort. cliff.* 5. *Hort. upſ.* 5. *Roy. lugdb.* 397. *Sauv. monſp.* 174. *fruticans.*
Jaſminum luteum vulgo dictum bacciferum. *Bauh. pin.* 398.
Habitat in Europa *auſtrali.* ♄

4. JASMINUM. foliis alternis ternatis pinnatisque, ramis angulatis. *Hort. upſ.* 5. *humile.*
Jaſminum foliis alternis ternatis acuminatis. *Hort. cliff.* 6. *Roy. lugdb.* 398.
Jasminum humile luteum. *Bauh. pin.* 397.
Habitat - - - - - ♄

5. JASMINUM foliis alternis ternatis pinnatisque, ramis teretibus. *Hort. upſ.* 5. *odoratiſſim.*
Jaſminum foliis alternis ternatis obtuſis. *Hort. cliff.* 5. *Roy. lugdb.* 397.
Jaſminum indicum flavum odoratiſſimum. *Ferr. cult.* 93.
Habitat in India? ♄

LIGUSTRUM.

1. LIGUSTRUM. *Hort. cliff.* 6. *Fl. ſvec.* 4. *Roy. lugdb.* 398. *Dalib. pariſ.* 2. *vulgare.*
Liguſtrum germanicum. *Bauh. pin.* 475
Habitat in Europæ *collibus glareoſis.* ♄

PHILLYREA.

1. PHILLYREA foliis lanceolatis ſubintegerrimis. *Hort. upſ.* 5. *anguſtifol.*

Phillyrea foliis ovato-lanceolatis vix crenatis. *Hort. cliff.* 4. *Roy. lugdb.* 398.
Phillyrea liguſtri folio. *Bauh. pin.* 476.
β. Phillyrea foliis lanceolatis integerrimis. *Hort. cliff.* 4. *Roy. lugdb.* 398.
Phillyrea anguſtifolia 1. 2. *Bauh. pin.* 476.
Habitat in Europæ *auſtralioris collibus.* ♄

latifolia. 2. PHILLYREA foliis cordato-ovatis ſerratis. *Hort. cliff.* 4. *Hort. upſ.* 6. *Roy. lugdb.* 398.
Phillyrea latifolia ſpinoſa. *Bauh. pin.* 476.
Phillyrea folio leviter ſerrato. *Bauh. pin.* 476
Habitat in Europa *auſtrali.* ♄

OLEA.

europæa. 1. OLEA foliis lanceolatis.
Olea foliis lanceolatis, ramis teretiuſculis. *Hort. cliff.* 4. *Mat. med.* 10. *Roy. lugdb.* 398.
Olea ſativa. *Bauh. pin.* 472.
β. Olea foliis lanceolatis, ramis tetragonis. *Hort. cliff.* 4. *Roy. lugdb.* 399.
Olea ſylveſtris, folio duro ſubtus incano. *Bauh. pin.* 472.
Habitat in Europa *auſtrali.* ♄

capenſis. 2. OLEA foliis ovatis. *Hort. cliff.* 4. *Roy. lugdb.* 399.
Liguſtrum capenſe ſempervirens, folio craſſo ſubrotundo. *Dill. elth.* 193. *t.* 170. *f.* 194.
Habitat ad Cap. b. Spei. ♄

CHIONANTHUS.

virginica. 1. CHIONANTHUS pedunculis trifidis trifloris.
Chionanthus. *Hort. cliff.* 17. *Gron. virg.* 10. *Roy. lugdb.* 17.
Amelanchier virginiana, laurocéraſi folio. *Pet. ſicc.* 241. *Cateſb. carol.* 1. *p.* 68. *t.* 68.
Habitat in America *ſeptentrionali.* ♄

zeylanica. 2. CHIONANTHUS pedunculis paniculatis multifloris. *Fl. zeyl.* 14.
Arbor zeylanica, cotini foliis ſubtus lanugine villoſis. *Burm. zeyl.* 31.
Habitat in Zeylona. ♄

SY

SYRINGA.

1. SYRINGA foliis ovato cordatis. *Hort. cliff.* 6. *Hort. upſ.* 6. *Roy. lugdb.* 397. *Dalib. pariſ.* 2. *vulgaris.*
Syringa cærulea. *Bauh. pin.* 398.
Habitat verſus Perſiam. ♄

2. SYRINGA foliis lanceolatis. *perſica.*
α. Syringa foliis lanceolatis integris. *Hort cliff.* 6. *Hort. upſ.* 6. *Roy. lugdb.* 397.
β. Syringa foliis lanceolatis integris diſſectisque laciniata. *Hort. cliff.* 6. *Hort. upſ.* 6. *Roy. lugdb* 397.
Liguſtrum foliis laciniatis. *Bauh. pin.* 476.
Habitat in Perſia? ♄

ERANTHEMUM.

1. ERANTHEMUM. *Fl. zeyl.* 15.* *Aman. acad.* 385.* *capenſe.*
Ephemerum lychnidis flore africanum. *Herm. parad.* 153. *Amm. herb.* 232.
Habitat in Æthiopia.

CIRCÆA.

1. CIRCÆA caule erecto, racemis pluribus. *lutetiana.*
Circæa. *Fl. ſuec.* 5. *Hort. cliff.* 7. *Roy. lugdb.* 303. *Dalib. pariſ.* 3.
Solanifolia Circæa dicta major. *Bauh. pin.* 168. *It. wgoth.* 213.
β. Circæa canadenſis latifolia, flore albo. *Tournef. inſt.* 301. *canadenſis.*
Habitat in Europæ & Americæ *borealis nemoribus.* ♃
Hæc ſeſquipedalis caule erecto, Racemis terminali & lateralibus; Perianthium conſiſtentia calycina, ſ. corolla longe craſſius, rudiusque, nec corollæ concolor.

2. CIRCÆA caule adſcendente, racemo unico. *alpina.*
Circæa calyce colorato. *Fl. lapp.* 3.
Solanifolia Circæa alpina. *Bauh. pin.* 168.
Habitat ad radices montium in frigidis Europæ. ♃
Planta vix digiti longitudine, magis procumbens, calyce colorato, uti corolla; differt quidem a priori, attamen nimis affinis.

VERONICA.

* *Spicatæ.*

1. VERONICA ſpicis terminalibus, foliis quaternis quinisve. *virginica.*

Veronica foliis quaternis quiniſve. *Hort. cliff.* 7 * *Gron. virg.* 4. *Roy. lugdb.* 301. *Cold. noveb.* 3.
Veronica virginiana procerior, foliis ternis, quaternis & etiam quinis caulem amplexantibus, ſpicis florum candidiſſimis. *Pluk. alm.* 383. *t.* 70. *f.* 2.
Habitat in Virginia. ♃.

ſpuria. 2. VERONICA ſpicis terminalibus, foliis ternis æqualiter ſerratis. *Hort. upſ.* 7. *
Veronica ſpicata anguſtifolia. *Bauh. pin* 246.
Veronica mas ſurrecta elatior. *Barr. rar.* 155 *t.* 891.
Habitat in Europa *auſtraliore*, Sibiria. ♃

maritima. 3. VERONICA ſpicis terminalibus, foliis ternis inæqualiter ſerratis.
Veronica floribus ſpicatis, foliis ternis. *Fl. ſuec.* 6.
Veronica foliis ſæpius ternis. *Virid. cliff.* 2. *Hort. cliff.* 7. *Roy. lugdb.* 301.
Veronica caule erecto, ſpicis pluribus, foliis lanceolatis ſerratis. *Fl. lapp.* 4.
Habitat in maritimis Europæ *macris apricis.* ♃

longifolia. 4. VERONICA ſpicis terminalibus, foliis oppoſitis lanceolatis ſerratis acuminatis. *Hort. upſ.* 7. *
Veronica ſpicata latifolia. *Bauh. pin* 246.
Veronica 1 erectior latifolia. *Cluſ. hiſt.* 1. *p.* 346.
β. Veronica ſpicata longifolia altera. *Amm. ruth.* 26.
γ. Veronica ſpicata, urticæ folio. *Amm. ruth.* 26.
Habitat in Tataria, Auſtria, Suecia. ♃

incana. 5. VERONICA ſpicis terminalibus, foliis oppoſitis crenatis obtuſis, caule erecto tomentoſo. *Hort. upſ.* 7. *
Veronica caule fruticoſo, foliis oblongis: inferioribus crenatis petiolatis; ſuperioribus ſeſſilibus integerrimis. *Roy. lugdb.* 530.
Veronica ſpicata lanuginoſa & incana, floribus cæruleis. *Amm. ruth.* 30.
Habitat in Ucrania, Samara. ♃

ſpicata. 6. VERONICA ſpica terminali, foliis oppoſitis crenatis obtuſis, caule adſcendente ſimpliciſſimo.
Veronica floribus ſpicatis, foliis oppoſitis, caule erecto. *Fl. ſuec.* 7. *Dalib. pariſ.* 3.
Veronica foliis oppoſitis, caule ſpica terminato. *Hort. cliff.* 8. *Roy. lugdb.* 302.
Veronica ſpicata minor. *Bauh. pin.* 247.
Habitat in Europæ *borealis campis.* ♃

7. VE-

7. VERONICA ſpicis terminalibus, foliis oppoſitis obtuſe ſerratis ſcabris, caule erecto. *hybrida*
Veronica ſpicata cambrobritannica, bugulæ ſubhirſuto folio. *Raj. ſyn.* 3. *p.* 278. *t.* 11. *f.* 1.
Habitat in Europa *rarius.*
Obſ. *Folia veronicæ ſequentis, Caulis præcedentis, ſed ſpicæ majores pallidiores.* ♃

8. VERONICA ſpicis lateralibus pedunculatis, foliis oppoſitis, caule procumbente. *Mat. med.* 11. *officinalis.*
Veronica floribus ſpicatis, foliis oppoſitis, caule procumbente. *Fl. ſuec.* 8. *Dalib. pariſ.* 3.
Veronica caule repente, ſcapis ſpicatis, foliis oppoſitis ovatis ſtrigoſis. *Fl. lapp.* 5. *Hort. cliff.* 8. *Roy. lugdb.* 302.
Veronica mas ſupina & vulgatiſſima. *Bauh. pin.* 246.
Habitat in Europæ *ſylveſtribus ſterilibus.* ♃

** *Corymboſo-racemoſæ.*

9. VERONICA corymbo terminali, ſcapo nudo. *aphylla.*
Veronica foliis ovatis radicalibus, caule nudo. *Roy. lugdb.* 302.
Veronica alpina pumila, caule aphyllo. *Bocc. muſ.* 2. *p.* 17. *t.* 1.
Veronica parua ſaxatilis, cauliculis nudis. *Pluk. alm.* 384. *t.* 114. *f.* 3. *Segu. ver.* 241. *t.* 31. *f.* 2.
Chamædrys alpina minima hirſuta. *Bauh. pin.* 247.
Habitat in alpibus Europæ *auſtralioris.* ♃

10. VERONICA corymbo terminali, caule adſcendente diphyllo. *bellidioides.*
Veronica caule non ramoſo, foliis obtuſis crenatis, floribus congeſtis terminato, foliis ovatis ſubaſperis. *Hall. helv.* 531. *t.* 12. *f.* 1.
Veronica alpina, bellidis folio. *Bauh. pin.* 247. *prod.* 116 *Burſ. XIV:* 27.
Habitat in Helvetia, Pyrenæis. ♃

11. VERONICA corymbo terminali, foliis oppoſitis ſerrato dentatis, calycibus linearibus. *Bonarota.*
Bonarota. *Mich. gen.* 19. *t.* 15. *f.* 12.
Pæderota *Gen. pl.* 11.
Chamædrys alpina ſaxatilis. *Bauh. pin.* 248.
Habitat in alpibus Italicis. ♃

12. VERONICA corymbo terminali, foliis oppoſitis, calycibus hiſpidis. *alpina*

Ve-

Veronica floribus corymboſis terminalibus, calycibus hiſpidis. *Fl. ſuec.* 13.

Veronica caule floribus terminato, foliis ovatis crenatis. *Fl. lapp.* 7. *t.* 9. *f.* 4.

Veronica caule inferne procumbente fruticoſo, foliis ovatis oppoſitis, racemo terminali. *Roy. lugdb.* 302.

Veronica alpina fruteſcens. *Bauh. pin.* 247.

Habitat in alpibus Europæ. ♃

ſerpyllifolia. 13. VERONICA racemo terminali ſubſpicato, foliis ovatis glabris crenatis.

Veronica floribus ſolitariis ſubcorymboſis, foliis ovatis glabris crenatis. *Fl. ſuec.* 14. *Dalib. pariſ.* 4.

Veronica foliis inferioribus oppoſitis ovatis, ſuperioribus alternis lanceolatis, floribus ſolitariis. *Hort. cliff.* 9. *Gron. virg.* 4. *Roy. lugdb.* 302. *Cold. noveb.* 1.

Veronica floribus ſparſis, foliis ovatis crenatis glabris. *Fl. lapp.* 6.

Veronica pratenſis ſerpyllifolia. *Bauh. pin.* 247.

Habitat in Europa *&* America *ſeptentrionali ad vias, agros.* ♃

Beccabunga. 14. VERONICA racemis lateralibus, foliis ovatis planis, caule repente. *Fl. ſuec.* 11. *Dalib. pariſ.* 7.

Veronica foliis oppoſitis lævibus crenatis, floribus racemoſis lateralibus. *Roy. lugdb.* 302.

Veronica foliis oppoſitis lævibus crenatis, floribus laxe ſpicatis ex alis. *Hort. cliff.* 8. *Gron. virg.* 4.

Anagallis aquatica major (minorque), folio ſubrotundo. *Bauh. pin.* 252.

Habitat in Europa *ad rivulos.* ♃

Anagall. ▽ 15. VERONICA racemis lateralibus, foliis lanceolatis ſerratis, caule erecto. *Fl. ſuec.* 10. *Dalib. pariſ.* 7.

Veronica foliis oppoſitis lævibus crenatis, floribus laxe ſpicatis ex alis. *Gron. virg.* 4.

Veronica aquatica major, folio oblongo. *Bauh. pin.* 252.

Habitat in Europa *ad foſſas.* ☉

ſcutellata. 16. VERONICA racemis lateralibus pedicellis pendulis, foliis linearibus integerrimis. *Fl. ſuec.* 9. *Dalib. pariſ.* 7.

Veronica foliis lineari-lanceolatis integris, racemis laxe floriferis. *Fl. lapp.* 9. *Hort. cliff.* 10. *Roy. lugdb.* 302.

Veronica aquatica anguſtifolia ſcutellata. *Bauh. pin.* 252.

Habitat in Europæ *inundatis.* ♃

17. VE-

17. VERONICA racemis lateralibus, foliis multifidis. *multifida.*
Veronica montana, folio vario. *Buxb. cent.* 1. *p.* 24. *t.* 38.
Habitat in Armeniæ, Iberiæ *graminoſis*. ♃

18. VERONICA racemis lateralibus, foliis ovatis rugoſis dentatis, caule debili. *Fl. ſuec.* 12. *Dalib. pariſ.* 4. *Chamædrys.*
Veronica foliis oppoſitis plicatis dentatis, ſcapis ex alis inferioribus laxe ſpicatis. *Hort. cliff.* 8. *Roy. lugdb.* 303.
Veronica foliis cordatis ſeſſilibus oppoſitis, racemis laxe floriferis. *Fl. lapp.* 8.
Chamædrys ſpuria minor rotundifolia. *Bauh. pin.* 249.
Habitat in Europæ *pratis*. ♃

19. VERONICA racemis lateralibus, foliis cordatis rugoſis dentatis, caule ſtricto. *latifolia.*
Veronica foliis oppoſitis plicatis dentatis, ſcapis ex alis ſuperioribus laxe ſpicatis. *Hort. cliff.* 9. *Roy. lugdb.* 303.
Veronica pratenſis omnium maxima. *Buxb. cent.* 1. *p.* 23. *t.* 34.
Chamædrys ſpuria major latifolia *Bauh. pin.* 248.
Habitat in Helvetia, Bithynia. ♃.

*** *Pedunculis unifloris.*

20. VERONICA floribus ſolitariis, foliis cordatis inciſis pedunculo brevioribus. *Fl. ſuec.* 17. *Dalib. pariſ.* 6. *agreſtis.*
Veronica foliis cordatis crenatis, floribus ſolitariis pedunculatis. *Roy. lugdb.* 303.
Veronica foliis alternis cordatis crenatis, floribus ſolitariis. *Hort. cliff.* 9.
Alſine chamædryfolia, floſculis pediculis oblongis inſidentibus. *Bauh. pin.* 250.
Habitat in Europæ *cultis, arvis*. ⊙

21. VERONICA floribus ſolitariis, foliis cordatis inciſis pedunculo longioribus. *Fl. ſuec.* 16. *Dalib. pariſ.* 5. *arvenſis*
Veronica foliis oppoſitis cordatis crenatis, floribus ſolitariis ſeſſilibus. *Hort. cliff.* 9. *Gron. virg.* 4. *Roy. lugdb.* 303.
Alſine veronicæ foliis, floſculis cauliculis adhærentibus. *Bauh. pin.* 250.
Habitat in Europæ *arvis, cultis*. ⊙

22. VERONICA floribus ſolitariis, foliis cordatis planis quinquelobis. *Fl. ſuec.* 18. *Dalib. pariſ.* 6. *hederæfolia.*

Vero-

Veronica foliis alternis cordatis quinquelobis, floribus ſolitariis. *Hort. cliff.* 9. *Roy. lugdb.* 303.
Alſine hederulæ folio. *Bauh. pin.* 250.
β. Veronica chia, cymbalariæ folio, verna, flore albo: umbilico vireſcente. *Tournef. cor.* 7. *Buxb. cent.* 1. *p.* 25. *t.* 39. *f.* 1.
Habitat in Europæ *ruderatis.* ☉
* Obſ. *Semina umbilicata ſunt huic propria.*

triphyllos. 23. VERONICA floribus ſolitariis, foliis digitato-partitis pedunculo brevioribus. *Fl. ſuec.* 19. *Dalib. pariſ.* 6.
Veronica foliis alternis: inferioribus quinquepartitis; ſuperioribus tripartitis, floribus ſolitariis. *Hort. cliff.* 9. *Roy. lugdb.* 302.
Veronica triphyllos cærulea. *Bauh. pin.* 250.
Habitat in Europæ *agris.* ☉

verna. 24. VERONICA floribus ſolitariis, foliis digitato-partitis pedunculo longioribus. *Fl. ſuec.* 20.
Veronica humilis erecta montana, flore parvo cæruleo. *Dill. app.* 38.
Habitat in Sueciæ, Gemaniæ, Hiſpaniæ *aridis apricis.* ☉

romana. 25. VERONICA floribus ſolitariis ſubſeſſilibus, foliis oblongis ſubdentatis, caule erecto.
Veronica minima, clinopodii minoris folio glabro, romana. *Bocc. muſ.* 2. *p.* 29. *t.* 102. *Vaill. pariſ.* 201. *t.* 23. *f.* 3. *Raj. ſuppl.* 423.
Veronica erecta, acini folio glabro, floribus cæruleis. *Dill. app.* 39.
Habitat in Europæ *auſtralioris agris.* ☉
Planta noſtra gerit folia magis oblonga, quam illa a Valantio picta.

peregrina. 26. VERONICA floribus ſolitariis ſeſſilibus, foliis lanceolato-linearibus glabris obtuſis integerrimis, caule erecto. *Fl. ſvec.* 15. *
Veronica terreſtris annua, folio polygoni, flore albo. *Moriſ. hiſt.* 2. *p.* 322. *ſ.* 3. *t.* 24. *f.* 19.
Habitat in Europæ *hortis, arvisque.* ☉

marilandica. 27. VERONICA floribus ſolitariis ſeſſilibus, foliis linearibus, caulibus diffuſis.
Veronica caulibus procumbentibus, foliis linearibus, floribus ſeſſilibus lateralibus. *Gron. virg.* 4.
Habitat in Virginia.

JU-

JUSTICIA.

1. JUSTICIA arborea, foliis lanceolato-ovatis, bracteis ovatis perſiſtentibus, corollarum galea concava. *Fl zeyl.* 16. *Hort upſ.* 7. *Adhatoda.*
Juſticia foliis ovato-lanceolatis, ſpicis folioſis, florum galea concava. *Hort cliff.* 9. *Roy. lugdb.* 291.
Adhatoda zeylanenſium. *Herm. lugdb.* 642. *t.* 643. *Pluk. alm.* 9. *t.* 173. *f.* 3.
Habitat in Zeylona. ♄

2. JUSTICIA arborea, foliis lanceolato-ovatis, bracteis ovatis deciduis mucronatis, corollarum galea reflexa. *Fl. zeyl.* 17. *Ecbolium.*
Adhatoda, ſpica longiſſima, flore reflexo. *Burm. zeyl.* 7. *t.* 4. *f.* 1.
Carim-curini. *Rheed. mal.* 2. *p.* 31. *t.* 20. *Pluk. alm.* 126. *t.* 171 *f.* 4.
Habitat in Malabaria, Zeylona. ♄

3. JUSTICIA fruticoſa, foliis lanceolato-ovatis, bracteis ovatis acuminatis venoſo-reticulatis coloratis. *Fl. zeyl.* 18. * *Betonica.*
Betonica fruteſcens. *Bont. jav.* 146.
Bem-curini. *Rheed. mal.* 2. *p.* 126. *t.* 21.
Habitat in India. ♄

4. JUSTICIA fruticoſa, foliis lanceolatis integerrimis, pedunculis trifloris ancipitibus, bracteis calyce brevioribus. *hyſſopifolia.*
Juſticia foliis lineari-lanceolatis, floribus ſæpius ſolitariis. *Hort. cliff.* 10. *Roy. lugdb.* 291.
Ecbolii indici ſ. Adhatodæ cucullatis floribus aemula, hyſſopifolia planta ex inſulis fortunatis. *Pluk. alm.* 132. *t.* 280. *f.* 1.
Habitat in inſulis Fortunatis. ♄

5. JUSTICIA procumbens, foliis lanceolatis integerrimis, ſpicis terminalibus lateralibusque alternis, bracteis ſetaceis. *Fl. zeyl.* 19. * *procumbens.*
Euphraſia, alſines anguſtiore folio, rubiæ modo ſpicata, golcondea. *Pluk. alm.* 142. *t.* 56. *f.* 3.
Habitat in Zeylona. ♃

6. JUSTICIA repens, foliis ovatis ſubcrenatis, ſpicis terminalibus, bracteis lanceolatis. *Fl. zeyl.* 20. * *repens.*
Adhatoda ſpicata, floſculos ex foliolis membranaceis. *Burm. zeyl.* 7. *t.* 3. *f.* 2.
Habitat in Zeylona. ♃

7. JU-

chinenſis. 7. JUSTICIA herbacea, foliis ovatis, floribus lateralibus, pedunculis trifloris, bracteis ovalibus.

Habitat in China.

Caules angulati, pedales, inferne ramoſi. folia *oppoſita, petiolata, ovata, acuminata, obtuſiuſcula, vix crenata. Ex alis* pedunculi *duo* ſ. *tres, ſinguli breves apice triflori, involucro diphyllo, ſetaceo, nudo, bracteis ovatis, obtuſis, longitudine floris, minimis.*

echioides. 8. JUSTICIA foliis lanceolato-linearibus obtuſis ſeſſilibus, racemis adſcendenti-ſecundis, bracteis ſetaceis. *Fl. zeyl.* 21. *

Euphraſiæ affinis indica echioides. *Herm. lugdb.* 668. *t.* 669.

Peetumba. *Rheed. mal.* 9. *p.* 87. *t.* 46.

Habitat in India.

ſexangular. 9. JUSTICIA foliis ovatis integerrimis, bracteis cuneiformibus, ramis ſexangularibus.

Juſticia annua, hexangulari caule, foliis circææ conjugatis, flore miniato. *Amm. herb.* 274. *Hort. cliff.* 10.

Euphraſia, alſines majori folio, flore galeato pallide luteo, jamaicenſis. *Pluk. alm.* 142. *t.* 279. *f.* 6.

Habitat in Vera cruce, Jamaica. ☉

naſuta 10. JUSTICIA foliis lanceolato-ovatis integerrimis, pedunculis dichotomis.

Pulcolli. *Rheed. mal.* 9. *p.* 135. *t.* 69.

Habitat in India *Toren.*

Rami obſolete angulati. Folia lato-lanceolata ſ. lanceolato-ovata, obtuſe acuminata, integerrima, minus glabra. Pedunculi dichotomi, longitudine foliorum. Flores ſeſſiles, bracteis minimis, lineatis. Calyces minimi. Corollæ tubus filiformis, longus. Limbi labium ſuperius lineare, anguſtum, brevius, reflexum; L. inferius æquale, trifidum. Stamina extra fauces prominentia. Stylus capillaris, perſiſtens.

purpurea 11. JUSTICIA foliis ovatis utrinque mucronatis integerrimis glabris, caule geniculato, ſpicis ſecundis.

Habitat in China. *Osbeck.*

Caulis herbaceus, brachiatus. Folia lato-ovata, apice & baſi mucronata, glabra, petiolata, integerrima. Articuli caulis & rami ſupra baſin Geniculo tumido, quod ſupra anguſtius evadit, notantur. Spicæ ad latera & apices ramorum, ſecundæ. Bracteæ anguſtæ, lanceolatæ, longitudine capſularum. Corollæ purpureæ: labiis erectis; altero lineari anguſtiſſimo; altero lato trilobo. Stamina duo, purpurea, longitudine corollæ.

GRA-

GRATIOLA.

1 GRATIOLA floribus pedunculatis, foliis lanceolatis *officinalis.*
ſerratis. *Mat. med.* 18.
Gratiola. *Riv. mon.* 157. *Hort. cliff.* 9. *Roy. lugdb.* 292.
Dalib. pariſ. 8. *Sauv. monſp.* 137.
Gratiola centauroides. *Bauh. pin.* 279.
Habitat in Luſatia, Gallia & *auſtralioribus* Europæ
humidiuſculis. ♃

2. GRATIOLA floribus pedunculatis, foliis ovatis cre- *dubia*
natis. *Gron. virg.* 129.
Ruellia pedunculis ſolitariis unifloris longitudine folio-
rum. *Gron. virg.* 73. *.
Habitat in Virginiæ *aquoſis.*
*Foliola duo iſta floralia, quæ in præcedente & ſequente,
in hac deſunt.*

3. GRATIOLA foliis lanceolatis obtuſis ſubdentatis. *virginian.*
Gron. virg. 6. *.
Habitat in Virginia.

4. GRATIOLA floribus ſubſeſſilibus.
Gratiola latiore folio, flore albo. *Fewill. peruv.* 3. *t.* 47. *peruviana*
Habitat in Peru.

PINGVICULA.

1. PINGVICULA nectarii apice incraſſato. *luſitanica.*
Viola paluſtris, Pinguicula dicta, luſitanica. *Griſ. luſit.*
Habitat in Luſitania. ♃.

2. PINGVICULA nectario cylindraceo longitudine pe- *vulgaris.*
tali. *Fl. lapp.* 11. *Fl. ſuec.* 21. *Roy. lugdb.* 304.
Sanicula montana, flore calcari donato. *Bauh. pin.* 243.
Habitat in Europæ *uliginoſis* ♃.

3. PINGUICULA nectario conico petalo breviore. *Fl.* *alpina.*
lapp. 12. *t.* 12. *f.* 3. *. *Fl. ſvec.* 22.
Pingvicula flore albo minore, calcari breviſſimo. *Raj.
hiſt.* 752.
Habitat in Alpibus Lapponicis. ♃

4. PINGVICULA ſcapo villoſo. *Fl. lapp.* 13. *t.* 12. *f.* 2. *villoſa.*
Fl. ſuec. 23.
Habitat in Lapponia, Sibiria. ♃

UTRICULARIA.

vulgaris. 1. UTRICULARIA nectario conico. *Fl. lapp.* 14. *Fl. ſuec.* 24. *Fl. zeyl.* 22. *Roy. lugdb.* 304.
Lentibularia. *Riv. mon.* 78. *
Millefolium aquaticum lenticulatum. *Bauh. pin.* 141.
Habitat in Europæ *foſſis paludibus profundioribus.* ♃
Nectarium ſubulatum, longitudine labii inferioris; cui approximatum; faux clauſa palato gibbo. Planta nobis duplex: altera MAJOR a Rivino delineata, calyce poſtice rotundato. Altera MINOR calyce poſtice transverſo, & quaſi truncato; creſcunt conjunctim

minor. 2. UTRICULARIA nectario carinato. *Fl. ſuec.* 25. *
Millefolium paluſtre galericulatum minus. *Pluk. alm.* 251. *t.* 99. *f.* 6.
Aparine aquis innatans treviſana, foliis perchepier capreolis donata. *Bocc. muſ.* 1. *p.* 23. *t.* 4.
Habitat in Europæ *foſſis rarius.*
Nectarium obſoletum, deorſum ſpectans; faux absque gibbo palato, pervia & hians.

ſubulata. 3. UTRICULARIA nectario ſubulato. *Gron. virg.* 6.
Habitat in Virginia.

gibba. 4. UTRICULARIA nectario gibboſo.
Utricularia florum nectario gibboſo, ſcapo nunc unifloro nunc bifloro. *Gron. virg.* 129.
Habitat in Virginia.

bifida. 5. UTRICULARIA ſcapo nudo bifido.
Habitat in China. *Osbeck.*
Caulis *filiformis, digiti longitudine, bifidus ſ. duplici racemo, nudus.* Flores *alterni, lutei: labio ſuperiore lateribus acuto.*

cærulea. 6. UTRICULARIA ſcapo nudo, ſquamis alternis vagis ſubulatis. *Fl. zeyl.* 23. *
Nelipu. *Rheed. mal.* 9. *p.* 137. *t.* 70.
Habitat in Zeylona.

folioſa. 7. UTRICULARIA caule folioſo. †
Linaria paluſtris, fœniculi folio. *Plum. ſpec.* 6.
Habitat in Americes *Gallia æquinoctiali.*

VERBENA.

* *Diandræ diſpermæ.*

orubica. 1. VERBENA diandra, ſpicis longiſſimis folioſis.

Ver-

Verbena foliis ovatis acuminatis, ſpica folioſa. *Hort. cliff.* 10. *

Verbena orubica, teucrii folio, primulæ veris flore, filiquis & ſeminibus longiſſimis. *Pluk. alm.* 383. *t.* 228. *f.* 4. & *t.* 327. *f.* 7.

Sherardia urticæ folio ſubtus incano, floribus violaceis. *Ehret. pict. t.* 5. *f.* 1.

Habitat in Oruba *inſula americes ſeptentrionalis.*

2. VERBENA diandra, ſpicis longiſſimis carnoſis ſubnudis. *jamaicenſis.*

Verbena foliis obtuſe ovalibus, ſpica carnoſa nuda. *Hort. cliff.* 10. *Roy. lugdb.* 327.

Verbena folio ſubrotundo ſerrato, flore cæruleo. *Sloan. hiſt.* 171. *t.* 107. *f.* 1.

Habitat in Jamaica & Caribæis. ♃ ⊙

3. VERBENA diandra, ſpicis ovatis, foliis lanceolatis ſerrato-plicatis, caule fruticoſo. *Roy. lugdb.* 327. *ſtœchadifol.*

Sherardia nodiflora, ſtœchadis ſerratifolii folio. *Vaill. ſex.* 49.

Lavandula, foliis crenatis latioribus, americana fruteſcens. *Plum. ſpec.* 6.

Habitat in America *Galliæ æquinoctialis.*

4. VERBENA diandra, ſpicis laxis, calycibus alternis priſmaticis truncatis ariſtatis, foliis ovatis obtuſis. *priſmatica.*

Verbena minima, chamædryos folio, *Sloan. jam.* 64.

Habitat in Jamaica.

5. Verbena diandra, ſpicis laxis, calycibus fructus reflexo-pendulis ſubgloboſis hiſpidis. *mexicana.*

Verbena mexicana, trachelii folio, fructu aparines: *Dill. elth.* 407. *t.* 302. *f.* 389.

Habitat in Mexico.

6. VERBENA diandra, calycibus ſubrotundis erectiuſculis, ſeminibus echinatis. *lappulacea.*

Scorodinia floribus ſpicatis purpuraſcentibus pentapetaloidibus. *Sloan. jam.* 66.

Blairia *Houſt. Amm. herb.* 277.

Habitat in Jamaica.

7. VERBENA diandra, ſpicis longis, calycibus ariſtatis, foliis ovatis argute ſerratis. *curaſſavica.*

Veronicæ ſimilis fruticoſa curaſſavica. *Herm. parad.* 240.

Kempfera. *Houſt. m. ſſ.*

Habitat in Curaſſao *Americes.*

* *Tetrandræ, Tetraſpermæ.*

nodiflora. 8. VERBENA tetrandra, ſpicis capitato-conicis, foliis ſerratis, caule repente. *Fl. zeyl.* 399.
Verbena foliis verticaliter ovatis, ſpicis globoſis. *Hort. cliff.* 11.
Verbena foliis verticaliter ovatis, ſpicis ſolitariis ovatis. *Roy. lugdb.* 327.
Verbena caule repente, foliis oblongis ſuperne crenatis, pedunculis ſolitariis capitatis. *Gron. virg.* 7.
Verbena nodiflora. *Bauh. pin.* 269. *prodr.* 125
Habitat in Virginia. ☉

bonarienſis, 9. VERBENA tetrandra, ſpicis faſciculatis, foliis lanceolatis amplexicaulibus. *Hort. upſ.* 8.
Verbena foliis lanceolatis, floribus congeſtis faſtigiatis. *Hort. cliff.* 11. *Roy. lugdb.* 326..
Verbena bonarienſis altiſſima, lavendulæ canarienſis folio, ſpica lavendulæ. *Dill. elth.* 406. *t.* 300. *f.* 387.
Habitat in agro Bonarienſi. ♃

haſtata. 10. VERBENA tetrandra, ſpicis longis acuminatis, foliis haſtatis. *Hort. upſ.* 8.
Verbena foliis lanceolatis ſerratis, ſpicis filiformibus paniculatis. *Roy. lugdb.* 327.
Verbena americana altiſſima, ſpica multiplici, urticæ foliis anguſtis, floribus cæruleis. *Herm. parad.* 242. *t.* 242.
Habitat in Canadæ *humidis.* ♃

urticifolia, 11. VERBENA tetrandra, ſpicis filiformibus paniculatis, foliis indiviſis ſerratis petiolatis. *Hort. upſ.* 9.
Verbena foliis ovatis, caule erecto, ſpicis filiformibus paniculatis. *Hort. cliff.* 11. *Gron. virg.* 7. *Roy. iudb.* 327.
Verbena recta canadenſis, urticæ foliis. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 418. *ſ.* 11. *t.* 25. *f.* 3.
Habitat in Virginiæ, Canadæ *aridis.* ♃

ſpuria. 12. VERBENA tetrandra, ſpicis filiformibus, foliis multifido-laciniatis, caulibus numeroſis. *Hort. upſ.* 8.
Veronica humilior, foliis inciſis. *Clayt. virg.* 8.
Habitat in Canada, Virginia. ♃

officinalis. 13. VERBENA tetrandra, ſpicis filiformibus paniculatis, foliis multifido-laciniatis, caule ſolitario.
Verbena foliis multifido-laciniatis, ſpicis filiformibus *Hort*

Hort. cliff. 11. *Fl. ſvec.* 26. *Roy. lugdb.* 327. *Dalib. pariſ.* 9. *Sauv. monſp.* 279.
Verbena communis, flore cæruleo. *Bauh. pin.* 269.
Habitat in Europæ *mediterraneæ ruderatis.* ⊙

4. VERBENA tetrandra, ſpicis filiformibus ſolitariis, foliis bipinnatifidis. *ſupina.*
Verbena tenuifolia. *Bauh. pin.* 269.
Verbena ſupina. *Cluſ. hiſt.* 2. *p.* 46.
Habitat in Hiſpania.

LYCOPUS

1. LYCOPUS foliis ſinuato-ſerratis. *europæus.*
Lycopus foliis indiviſis. *Fl. ſvec.* 27. *Dalib. pariſ.* 9.
Lycopus. *Hort. cliff.* 11. *Roy. lugdb.* 326.
Marrubium paluſtre glabrum. *Bauh. pin.* 230.
Habitat in Europæ *ripis humentibus.* ♃

2. LYCOPUS foliis æqualiter ſerratis. *virginicus.*
Lycopus foliis lanceolatis tenuiſſime ſerratis. *Gron. virg.* 8.
Habitat in Virginia. ♃

AMETHYSTEA.

1. AMETHYSTEA. *Hort. upſ.* 9. *Amœn. acad.* 386. * *cærulea.*
Amethyſtina montana erecta, foliis exiguis digitatis trifidis ſerratis, floſculis cum coma e cæruleo-janthinis. *Amm. ruth.* 4. *Hall. act. upſ.* 1742, *p.* 51. *f.* 1.
Habitat in Sibiriæ *montoſis.* ⊙

ZIZIPHORA.

1. ZIZIPHORA capitulis terminalibus, foliis ovatis. *capitata.*
Ziziphora foliis lanceolatis, floribus terminatricibus. *Hort. cliff.* 305. *Roy. lugdb.* 313.
Clinopodium fiſtuloſum pumilum Indiæ occidentalis, ſummo caule floridum. *Pluk. alm.* 111. *t.* 164. *f.* 4. ⊙
Habitat in Syria.

2. ZIZIPHORA floribus lateralibus, foliis lanceolatis. *tenuior.*
Ziziphora foliis lanceolatis, floribus ex alis. *Hort. cliff.* 305.
Ziziphora foliis lanceolatis, floribus lateralibus. *Roy. lugdb.* 313. *Hort. upſ.* 9.
Acinos ſyriaca, folio mucronato, capſulis hirſutis. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 404. *ſ.* 11. *t.* 19. *f.* 3. 4.
Habitat in Syria? ⊙

acinoides. 3. ZIZIPHORA floribus lateralibus, foliis ovatis.
Clinopodium ſupinum incanum. *Amm. ruth.* 66?
Habitat in Sibiria. ☉
Habitus Thymi Acinos, ſed majora quintuplo omnia. Folia Z. capitatæ; Flores laterales ut in Z. tenuiore 2, ſed copioſiores. Calyces ſimiliter hiſpidi; ſtamina *extra corollæ tubum protruſa.*

MONARDA.

fiſtuloſa. 1. MONARDA capitulis terminalibus, caule obtuſangulo. *Hort. upſ.* 12.
Monarda floribus capitatis, caule obtuſo. *Vir. cliff.* 3. *Roy. lugdb.* 313.
Monarda. *Hort. cliff.* 11.
Origanum fiſtuloſum canadenſe. *Corn. canad.* 13. *t.* 14.
Habitat in Canada. ♃

didyma. 2. MONARDA floribus capitatis ſub-didynamis, caule acutangulo.
Monarda caule acute angulato, capitulis terminalibus. *Hort. cliff.* 495. *Cold. noveb.* 7.
Monarda floribus capitatis verticillatisque, caule acute angulato, foliis lanceolato ſerratis glabris. *Büttn. cun.* 226.
Habitat in Penſilvania, Noveboraco.

clinopodia. 3. MONARDA floribus capitatis, foliis lævibus ſerratis.
Monarda foliis ovato-lanceolatis, verticillis lateralibus dichotomis corymboſis, foliis inæqualiter ſerratis. *Gron. virg.* 9.
Habitat in Virginia. ♃
Radix repens. Facies plantæ præcedentis quoad ſtaturam, at folia gerit Clinopodii incani omnino; neque huic ſpica rubra, nec flores tetrandri; foliisque glaberrimis diſtincta a prima; Folia ovato-oblonga, acuminata, profunde ſerrata, petiolata, utrinque lævia. Caulis quadrangularis, magis quam in prima, minus argute quam in ſecunda. Flores in capitulum bracteis radiatum, pallidi.

punctata. 4. MONARDA floribus verticillatis, corollis punctatis. *Hort. upſ.* 12.
Monarda floribus verticillatis. *Hort. cliff.* 495. *Gron. virg.* 9. *Roy. lugdb.* 313.
Clinopodium virginianum anguſtifolium, quovis verticillo

cillo duodecim foliolis rubentibus cincto. *Pluk. alm.* 111. *t.* 24. *f.* 1.
Habitat in Virginia. ⊙

5. MONARDA floribus verticillatis, corollis involucro longioribus. *ciliata.*
Monarda ſpica interrupta, involucris longitudine verticillorum lanceolatis. *Gron. virg.* 9. *
Clinopodium anguſtifolium non ramoſum, flore cæruleo: labio trifidis atropurpureis maculis ornato. *Pluk. alm.* 10. *t.* 164. *f.* 3. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 374. *ſ.* 11. *t.* 8. *f.* 6.
Habitat in Virginia.

ROSMARINUS.

1. ROSMARINUS. *Hort. cliff.* 14. *Hort. upſ.* 11. *Mat. med.* 16. *Roy. lugdb.* 310. *officinalis,*
Roſmarinus ſpontaneus, latiore folio. *Bauh. pin.* 217.
β. Roſmarinus hortenſis, anguſtiore folio. *Bauh. pin.* 217.
Habitat in Hiſpania, G. narbonenſi, Galilæa. ♄

SALVIA.

1. SALVIA foliis lineari-lanceolatis denticulatis, floribus petiolatis. *Hort. cliff.* 13. * *Roy. lugdb.* 309. *ægyptiaca.*
Horminum ægyptium minimum ramoſiſſimum. *Lippi. Boerh. lugdb.* 1. *p.* 66.
Habitat in Ægypto.

2. SALVIA foliis lanceolatis, calycibus diphyllis. *cretica.*
Habitat in Creta.

3. SALVIA foliis radicalibus lyratis dentatis, corollarum galea breviſſima. *lyrata.*
Salvia corollarum labio ſuperiore breviore; fauce patente. *Gron. virg.* 8.
Horminum virginianum erectum, urticæ foliis, flore minore; *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 395. *ſ.* 11. *t.* 13. *f.* 31.
Habitat in Virginia.

4. SALVIA foliis lanceolato-ovatis integris crenulatis, floribus ſpicatis, calycibus acutis. *Hort. cliff.* 12. *Hort. upſ.* 10. *Mat. med.* 13. *Roy. lugdb.* 307. *Sauv. monſ.* 143. *officinalis.*
Salvia major. *Bauh. pin.* 237.
β. Salvia minor aurita & non aurita. *Bauh. pin.* 237.
Habitat in Europa *auſtrali.* ♄

pomifera. 5. SALVIA foliis lanceolato-ovatis integris crenulatis, floribus ſpicatis, calycibus obtuſis. *Hort. cliff.* 12. *Roy. lugdb.* 307.
Salvia cretica fruteſcens pomifera, foliis longioribus incanis & criſpis. *Tournef. cor.* 10. *itin.* 1. *p.* 92. *t.* 92.
Salvia baccifera. *Bauh. pin.* 237.
Habitat in Creta.

urticifolia. 6. SALVIA foliis ovato-oblongis duplicato-ſerratis, calycibus tridentatis: lacinia ſumma tridentata. *Gron. virg.* 8.
Horminum virginianum erectum, urticæ foliis, flore minore. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 395. *ſ.* 11. *t.* 13. *f.* 31.
Habitat in Virginia.

viridis. 7. SALVIA foliis oblongis crenatis, corollarum galea ſemi-orbiculata, calycibus fructiferis reflexis.
Salvia foliis ovato-oblongis obtuſis æqualiter crenatis, corollarum galea ſemi-orbiculata. *Hort. upſ.* 11. *
Horminum coma viridi. *Tournef. inſt.* 178.
Habitat - - - - ⊙

Horminum. 8. SALVIA foliis obtuſis crenatis, bracteis ſummis ſterilibus majoribus coloratis. *Vir. cliff.* 4. *Hort. cliff.* 12. *Mat. med.* 14. *Roy. lugdb.* 310.
Horminum ſativum. *Bauh. pin.* 238.
Habitat in Græcia, Apulia. ⊙

ſylveſtris. 9. SALVIA foliis cordato-lanceolatis acutis, bracteis coloratis flore brevioribus.
Horminum ſylveſtre ſalvifolium majus maculatum. *Bauh. pin.* 239.
Horminum ſylveſtre v. *Cluſ. hiſt.* 2. *p.* 31.
Horminum ſylveſtre ſalvifolium minus. *Bauh. pin.* 239.
Habitat in Auſtriæ *inferioris*, Bohemiæ *agrorum marginibus*, *vineis*. ♃

hæmatodes. 10. SALIVA foliis cordato-ovatis rugoſis tomentoſis, calycibus hiſpidis, radice tuberoſa. †
Horminum ſanguineum, aſphodeli radice. *Triumf. obſ.* 69. *t.* 69.
Horminum ſylveſtre maculatum tuberoſum. *Honuphr.*
Horminum ſylveſtre majus hæmatodes glabrum, flore cæruleo, italicum. *Barr. rar.* 234. *t.* 185.
Habitat in Italia.
Habitus Phlomidis & teneritudo Salviæ; Calyces pilis rectis, exſtantibus undique hiſpidi ſunt.

11. SAL-

11 SALVIA foliis cordato-oblongis crenatis: ſummis amplexicaulibus, verticillis ſubnudis, corollis galea glutinoſis. *pratenſis.*

Salvia foliis ovatis inciſo-crenatis, verticillis ſubnudis. *Hort. cliff.* 12. *Flor. ſuec.* 28. *Hort. upſ.* 10. *Roy. lugdb.* 310. *Dalib. pariſ.* 10.

Horminum pratenſe, foliis ſerratis. *Bauh. Pin.* 238.

β. Gallitrichum ſylveſtre, flore majore albo. *Bauh. hiſt.* 3. *p.* 312.

Varietas β *differt foliis latioribus, obtuſioribus, magis caneſcentibus*; floribus *albis galea dimidio minore, ſerius florentibus.*

12. SALVIA foliis cordatis obtuſis crenatis ſubtomentoſis, corollis calyce anguſtioribus. *dominica.*

Habitat in Domingo.

13. SALVIA foliis ſerratis ſinuatis, corollis calyce anguſtioribus. *Virid. cliff.* 17. *Gron. virg.* 8. *Roy. lugdb.* 309. *Dalib. pariſ.* 9. *Sauv. monſp.* 278. *verbenaca.*

Salvia foliis pinnatim inciſis glabris. *Hort. cliff.* 12.

Horminum ſylveſtre, lavendulæ flore. *Bauh. pin.* 239?

Horminum ſylveſtre, inciſo folio, parvo flore, italicum. *Barr. ic.* 220. 208.

Horminum verbenacæ laciniis anguſtifolium. *Triumf. obſ.* 66. *t.* 66.

Habitat in Europæ *paſcuis.* ♃

14. SALVIA foliis obtuſis eroſis, ſtaminibus corolla duplo longioribus. *Roy. lugdb.* 309. *pyrenaica.*

Horminum pyrenaicum glutinoſum anguriæ folio. *Herm. parad.* 187. *t.* 187.

Habitat in Pyrenæis.

15. SALVIA foliis ovatis utrinque acuminatis ſerratis. *Hort. cliff.* 13. *Roy. lugdb.* 308. *mexicana.*

Sclarea mexicana altiſſima facie heliotropii, *Dill. elth.* 339. *t.* 254. f. 330.

Habitat in Mexicæ *humentibus.* ♄

16 SALVIA foliis ovatis baſibus mucronato-tuberoſis, ſpicis imbricatis, calycibus trifidis. *hiſpanica.*

Horminum ſylveſtre, lavendulæ flore. *Bauh. pin.* 239?

Sclarea hiſpanica. *Tabern. hiſt.* 764. *ic.* 374.

Habitat in Italia. *D. Rathgeb*; in Hiſpania. *Lœfling.* ☉

Caulis ſeſquipedalis, tetragonus, obtuſus, quadriſulcatus,

 ſuper-

ſuperne pilis reflexis albis veſtitus. Folia ovata, acuta, rugoſa, ſerrata, baſi acuta; petiolis baſi utrinque obtuſo mucrone prominentibus. Spica tetragona, imbricata Bracteis ovatis, longitudine calycum, ciliatis. Calyces ſub ſingula ſquama ſæpe 5, ore tridentati, acuti, dente ſuperiore ſolitario; inferioribus duobus. Corolla cærulea: limbo longitudine calycis: galea breviore ſubvilloſa; labio inferiore trifido, obtuſo, integerrimo, baſi maculis 2. pallidis.

indica. 17. SALVIA foliis cordatis acute crenatis: ſummis ſeſſilibus, verticillis ſubnudis remotiſſimis. *Roy. lugdb.* 15.
Sclarea indica, floribus variegatis. *Tournef. inſt.* 179.
Habitat in India.

verticillata. 18. SALVIA foliis cordatis crenato-dentatis, verticillis ſubnudis, ſtylo corollarum labio inferiore incumbentibus. *Hort. upſ.* 11. *
Salvia foliis cordato-ſagittatis dentatis. *Hort. cliff.* 495. *Roy. lugdb.* 309
Horminum ſylveſtre latifolium verticillatum. *Bauh. pin.* 238.
Habitat in Auſtriæ, Miſniæ *cultis & ruderatis.* ⊙

glutinoſa. 19. SALVIA foliis cordato-ſagittatis ſerratis acutis. *Hort. cliff.* 13. *Hort. upſ.* 11. *Roy. lugdb.* 308. *Sauv. monſp.* 146.
Horminum luteum glutinoſum. *Bauh. pin.* 238.
Habitat in Europæ *lutoſis.* ♃

canarienſis. 20. SALVIA foliis haſtato-triangularibus oblongis crenatis obtuſis. *Hort. cliff.* 13. *Hort. upſ.* 10. *Roy. lugdb.* 308.
Horminum canarienſe tomentoſum, haſtato folio. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 394. *ſ.* 11. *t.* 13. *f.* 17.
Habitat in Canariis. ♄

afr. cærulea. 21. SALVIA foliis ſubrotundis ſerratis: baſi truncatis dentatis. *Hort. cliff.* 13. *Roy. lugdb.* 308.
Salvia africana fruteſcens, folio ſcorodoniæ, flore violaceo. *Comm. hort.* 2. *p.* 181. *t.* 91.
Habitat ad Cap. b. ſpei, *locis argilloſis.* ♄

afr. lutea. 22. SALVIA foliis ſubrotundis integerrimis: baſi truncatis dentatis. *Hort. cliff.* 13. *Roy. lugdb.* 308.
Salvia africana fruteſcens, folio ſubrotundo glauco, flore magno aureo. *Comm. hort.* 2. *p.* 183. *t.* 92.
Habitat ad Cap. b. ſpei *juxta rivulos* ♄

23. SAL-

23. SALVIA foliis rugoſis oblongo-cordatis ſerratis, flo- *Sclarea.*
ralibus calyce longioribus concavis acuminatis. *Hort. cliff.* 12. *Hort. upſ.* 10. *Mat. med.* 15. *Roy. lugdb.* 309. *Dalib. pariſ.* 9.
Salvia foliis cordato-ovatis obſcure undulatis, foliolis floralibus lanceolato-concavis. *Guett. ſtamp.* 263.
Horminum Sclarea dictum. *Bauh. pin.* 238.
Habitat in Syria, Italia. ♂

24. SALVIA foliis rugoſis pinnatifidis lanatis. *ceratophylla.*
Salvia foliis ſimplicibus dentato-pinnatis aſperis. *Hort. cliff.* 13. *Roy. lugdb.* 308.
Salvia foliis ſimplicibus dentato-pinnatis rugoſis verrucoſis. *Hort. upſ.* 10.
Horminum rugoſo verrucoſoque folio cornu cervi exprimente. *Pluk. alm.* 186. *t.* 194. *f.* 5. *Herm. parad.* 186. *t.* 186.
Habitat in Perſia. ☉

25. SALVIA foliis oblongis dentato-angulatis hirſutis, *Æthiopis.*
verticillis lanatis, corollarum labio ſaccato.
Salvia foliis lanceolatis ſinuato-dentatis: floralibus verticillos comprimentibus. *Hort. cliff.* 13. *Roy. lugdb.* 308.
Æthiopis foliis ſinuoſis. *Bauh. pin.* 241.
β. Æthiopis laciniatis foliis. *Barr. rar.* 24. *t.* 188.
γ. Marum ægypticum. *Veſl. alp.* 212. *t.* 212.
Habitat in Illyria, Græcia, Africa. ☉
Labium inferius antice cohæret & ſaccum format.

26. SALVIA foliis compoſitis pinnatis. *Hort. cliff.* 13. *pinnata.*
Roy. lugdb. 309.
Salvia orientalis latifolia hirſutiſſima viſcoſa pinnata, flore & calyce purpureis, inodora. *Bœrh. lugdb.* 1. *p.* 167. *t.* 167.
Horminum arabicum, alatis foliis, flore rubello. *Pluk. alm.* 186. *t.* 194. *f.* 6.
Habitat in Oriente & Arabia.

27. SALVIA foliis cordatis inæqualiter baſi excifis, caule *nutans.*
ſubnudo, ſpicis ante floreſcentiam cernuis.
Habitat in Imperio Rutheno. ♃

DIANTHERA

1. DIANTHERA. *Gron. virg.* 6. * *americana.*
Habitat in Virginia.

COL-

COLLINSONIA.

canadenſis. 1. COLLINSONIA. *Hort. cliff.* 14. *t.* 5. *Cold. noveb.* 8.
Habitat in Virginiæ, Canadæ *ſylvis.* ♃

MORINA.

Perſica. 1. MORINA *Hort. cliff.* 14. *Roy. lugdb.* 236.
Morina orientalis, carlinæ folio. *Tournef. cor.* 48. *itin* 3. *p.* 132. *t.* 132.
Habitat in Perſia *ad Hiſpaham.* ♃

DIGYNIA.

ANTHOXANTHUM.

odoratum. 1. ANTHOXANTHUM ſpica ovato-oblonga, floſculis ſubpedunculatis ariſta longioribus.
Anthoxanthum floſculis diandris. *Hort cliff.* 25. *Roy. lugdb.* 58.
Anthoxanthum *Fl. ſuec.* 29. *Dalib. pariſ.* 10.
Gramen pratenſe, ſpica flaveſcente. *Bauh. pin.* 3. *Scheuchz. gram.* 88.
Habitat in Europæ *pratis.* ♃

indicum 2 Anthoxanthum ſpica lineari, floſculis ſeſſilibus ariſta brevioribus. *Fl. zeyl.* 25. *
Habitat in India.

paniculatum 3 ANTHOXANTHUM floribus paniculatis. *Amoen. acad.* 145.
Gramen ſparteum, panicula flaveſcente. *Rudb. elyſ.* 1. *f.* 14.
Habitat in Europa *auſtraliore.*

TRIGYNIA.

PIPER.

nigrum. 1 PIPER foliis ovatis ſubſeptemnerviis glabris, petiolis ſimpliciſſimis. *Fl. zeyl.* 26. * *Mat. med.* 26.
Piper rotundum nigrum. *Bauh. pin.* 411. *Pluk. alm.* 297. *t.* 437. *f.* 1.
Malago-codi. *Rheed. mal.* 7. *p.* 23. *t.* 12.
Habitat in India. ♄

Betle. 2. PIPER foliis ovatis oblongiuſculis acuminatis ſeptinerviis, petiolis bidentatis. *Fl. zeyl.* 27. *

Piper

Piper qui Saururus foliis ſeptinerviis oblongo-acuminatis. *Burm. zeyl.* 193. *t.* 82. *f.* 2.
Beetla-codi. *Rheed. mal.* 7. *p.* 29. *t.* 15.
Habitat in India. ♄

3. PIPER foliis ovatis acutiuſculis ſubtus ſcabris: nervis quinque ſubtus elevatis. *Fl. zeyl.* 26. * *Malamiris.*
Frutex americanus, ſpica longa gracili. *Pluk. alm.* 297. *t.* 215. *f.* 2.
Amalago. *Rheed. mal.* 7. *p.* - - - *t.* 16
Habitat in India *utraque.*

4. PIPER foliis cordatis ſubſeptinerviis venoſis. *Fl. zeyl.* 29. * *Siriboa*
Betela quem Sirii-boa vocant: *Bont. jav.* 91. *t.* 91.
Habitat in India.

5. PIPER foliis cordatis petiolatis ſeſſilibusque. *Fl. zeyl.* 30. * *Mat. med.* 20. *longum*
Piper longum orientale. *Bauh. pin.* 412
Piper longum, piſtolochiæ foliis absque pediculis, maderaſpatanum. *Pluk. alm.* 297. *t.* 104. *f.* 4.
Cattu-tirpali. *Rheed. mal.* 7. *p.* 27. *t.* 14.
Habitat in India.

6. PIPER foliis lanceolato-ovatis quinquenerviis rugoſis. *Amalago.*
Piper longum arboreum altius, folio nervoſo minore, ſpica gracili & breviore. *Sloan. hiſt.* 1. *p.* 134. *t.* 87. *f.* 1.
Piper frutex, ſpica longa gracili. *Pluk. alm.* 297. *t.* 215. *f.* 2.
Saururus foliis lanceolato-ovatis quinquenerviis rugoſis. *Hort. cliff.* 140.
Habitat in Jamaica.

7. PIPER foliis cordatis quinquenerviis reticulatis. *reticulatum.*
Saururus botryoides major arboreſcens, foliis plantaginеis. *Plum. amer.* 57. *t.* 75.
Jaborandi. *Marcgr. braſ.* 37. *Piſ. braſ.* 97.
Habitat in Martinica, Braſilia.

8. PIPER foliis ovato-lanceolatis: nervis alternis, ſpicis uncinatis. *aduncum*
Piper longum, folio nervoſo pallide viridi, humilius. *Sloan. hiſt.* 1. *p.* 135. *t.* 87. *f.* 2.
Saururus foliis ovato-lanceolatis: nervis alternis. *Hort. cliff.* 140. *Roy. lugdb.* 8.
Saururus arboreſcens, fructu adunco. *Plum. amer.* 58. *t.* 77.
Habitat in Jamaica.

9. PI-

pellucidum. 9. PIPER foliis cordatis petiolatis, caule herbaceo.
Piper foliis cordatis, caule procumbente. *Hort. cliff.* 6. *t.* 4. * *Roy. lugdb.* 8.
Saururus minor procumbens botryitis, folio craſſo cordato. *Plum. amer.* 54. *t.* 72.
Habitat in America *calidiore.* ⊙

acuminatum 10. PIPER foliis lanceolato-ovatis nervoſis carnoſis.
Saururus alius humilis, folio carnoſo & acuminato. *Plum. amer.* 54. *t.* 71.
Habitat in America *calidiore.*

obtuſifolium. 11. PIPER foliis obverſe ovatis enerviis.
Saururus humilis, folio carnoſo ſubrotundo. *Plum. amer.* 53. *t.* 70.
Habitat in America *calidiore.*

rotundifol. 12. PIPER foliis orbiculatis ſolitariis carnoſis.
Saururus repens, folio orbiculari nummulariæ facie. *Plum. amer.* 52. *t.* 69.
Habitat in America *calidiore.*

maculoſum. 13. PIPER foliis peltatis ovatis.
Saururus hederaceus, caulibus maculoſis, major. *Plum. amer.* 60. *t.* 66.
Habitat in Domingo.

peltatum. 14. PIPER foliis peltatis orbiculato-cordatis obtuſis repandis, ſpicis umbellatis.
Saururus arboreſcens, foliis amplis rotundis & umbilicatis. *Plum. amer.* 56. *t.* 74.
Habitat in America *calidiore.*

diſtachyon. 15. PIPER foliis ovatis, ſpicis conjugatis.
Saururus hederaceus, caulibus maculoſis, minor. *Plum. amer.* 51. *t.* 67.
Habitat in Americes *Gallia* æquinoctiali.

umbellatum. 16. PIPER foliis cordatis ſubrotundis acutis venoſis, ſpicis umbellatis.
Saururus arboreſcens, foliis amplis cordatis non umbilicacatis. *Plum. amer.* 53. *t.* 73.
Habitat in Domingo.

trifolium. 17. PIPER foliis ternis ſubrotundis.
Saururus hederaceus triphyllus, folio rotundo. *Plum. amer.* 52. *t.* 68.
Habitat in Americes *Gallia æquinoctiali.*

Claſ-

Claſſis III.

TRIANDRIA

MONOGYNIA.

VALERIANA.

1. VALERIANA floribus monandris caudatis, foliis lanceolatis integerrimis. *Hort. cliff.* 15. *Hort. upſ.* 14. *Roy. lugdb.* 235. *Dalib. pariſ.* 12. *rubra.*
Valeriana rubra. *Bauh. pin.* 165.
Habitat in Galliæ, Helvetiæ, Italiæ *ruderatis.* ♃

2. VALERIANA floribus monandris, foliis pinnatifidis. *Hort. upſ.* 14. *calcitrapa.*
Valeriana foliis pinnato-laciniatis, floribus monandris. *Virid. cliff.* 4. *Hort. cliff.* 16. *Roy. lugdb.* 235. *Sauv. monſp.* 275.
Valeriana foliis calcitrapæ. *Bauh. pin.* 164.
Valeriana ſylveſtris, foliis tenuiſſime diviſis. *Bauh. pin.* 165.
Habitat in Luſitania. ☉

3. VALERIANA floribus diandris ringentibus, foliis ovatis ſeſſilibus. *Hort. cliff.* 15. *Hort. upſ.* 13. *Roy. lugdb.* 235. *cornucopiæ.*
Valeriana peregrina purpurea albave. *Bauh. pin.* 164. *prodr.* 87.
Habitat in Americæ, Mauritaniæ, Siciliæ, Hiſpaniæ *arvis.* ☉

4. VALERIANA floribus triandris dioicis, foliis pinnatis. *dioica.*
Valeriana dioica. *It. œl.* 46. *Fl. ſuec.* 31. *Dalib. pariſ.* 11.
Valeriana, foliis caulinis pinnatis, ſexu diſtincta. *Hort. cliff.* 16.
Valeriana, foliis caulinis pinnatis, polygama. *Vir. cliff.* 5. *Roy. lugdb.* 235.
Valeriana paluſtris minor & Valeriana paluſtris inodora parum laciniata, *Bauh. pin.* 86.
Valeriana alpina minor. *Bauh. pin.* 165. *prodr.* 87.
Habitat in Europæ campis *uliginoſis.* ♃

5. VALERIANA floribus triandris, foliis omnibus pinnatis. *Mat. med.* 21. *Hort. cliff.* 15. *Fl. ſuec.* 30. *Roy. lugdb.* 234. *Dalib. pariſ.* 11. *officinalis.*

Vale-

Valeriana ſylveſtris major. *Bauh. pin.* 164. *Fl. lapp.* 14.
Habitat in Europæ *nemoribus paludoſis.* ♃

Phu. 6. VALERIANA floribus triandris, foliis caulinis pinnatis; radicalibus indiviſis. *Hort. upſ.* 13. *Mat. med.* 22.
Valeriana foliis infimis integris; proximis laciniatis; caulinis pinnatis. *Hort cliff.* 15. *Roy. lugdb.* 234.
Valeriana hortenſis. *Bauh. pin.* 164.
Habitat in Alſatia. ♃
Caule non ſulcato & foliolis extersoribus majoribus a. V. officinali etjam differt.

tripteris. 7. VALERIANA floribus triandris, foliis radicalibus cordatis; caulinis ternatis lanceolatis ſerratis.
Valeriana floribus triandris, foliis radicalibus cordatis, aliis laciniatis. *Sauv. monſp.* 276.
Valeriana alpina prima. *Bauh pin.* 165. *prodr.* 86. *t.* 86
Valeriana alpina altera. *Bauh. pin.* 165.
Valeriana alpina minor, planta palmaris. *Pluk. alm.* 380. *t.* 231. *f.* 7.
Valeriana minima, planta uncialis. *Pluk. alm.* 380. *t.* 231. *f.* 8.
Habitat in alpibus Helvetiæ.
Involucra propria ſunt diphylla, ſetacea. ♃

montana. 8. VALERIANA floribus triandris, foliis ovato-oblongis ſubdentatis, caule ſimplici.
Valeriana foliis omnibus integris ex ovato-acuminatis leviter dentatis. *Hall. helv.* 664. *it.* 8.
Valeriana montana, ſubrotundo folio. *Bauh. pin* 165.
Valeriana alpina, ſcrophulariæ folio. *Bauh. pin.* 164. *prodr.* 87. *
Valeriana alpina, nardo celticæ ſimilis, inodora. *Pluk. alm.* 380. *t.* 232. *f.* 2.
Nardo celticæ ſimilis inodora. *Bauh. pin.* 165.
Habitat in alpibus Helveticis, Rhæticis, Pyrenæis. ♃

celtica. 9. VALERIANA floribus triandris, foliis ovato-oblongis obtuſis integerrimis. *Mat. med.* 23.
Valeriana foliis ovatis obtuſis minime dentatis. *Hall. helv.* 664.
Nardus ex apulia. *Bauh. pin.* 165.
Nardus celtica dioſcoridis. *Bauh. pin.* 165.
Nardus celtica altera. *Bauh. pin.* 166.
Nardus celtica. *Bauh. hiſt.* 3. *p.* 205.
Spica celtica faſtigio floſculorum ordine differens. *Cam. epit.* 14.
Habitat in alpibus Helvetiæ, Valeſiæ. ♃

10. VALERIANA floribus triandris, foliis lanceolatis integerrimis: caulinis baſi pinnatis. *tuberoſa.*
Nardus montana, radice olivari. *Bauh. pin.* 165.
β. Nardus montana, radice oblonga. *Bauh. pin.* 165.
Nardus montana, longius radicata. *Cam. epit.* 16.
Habitat in Dalmatia, Sicilia, Galloprovincia. ♃

11. VALERIANA floribus triandris, foliis ſubdentatis; radicalibus ovatis, pedunculis communibus elongatis. *ſaxatilis.*
Valeriana alpina nardo celticæ ſimilis. *Bauh. pin.* 165.
Valeriana ſylveſtris alpina 2 ſaxatilis. *Cluſ. hiſt.* 1. *p.* 56. *bona.*
Nardo Celticæ ſimilis inodora. *Bauh. pin.* 165. *prodr.* 88. *Burſ. VIII:* 122.
Habitat in alpibus Styriæ, Auſtriæ. ♃

12. VALERIANA floribus triandris, foliis cordatis ſerratis petiolatis: ſummis ternatis. *Hort. cliff.* 15. *Roy. lugdb.* 235. *pyrenaica.*
Valeriana maxima pyrenaica, cacaliæ folio. *Tournef. inſt.* 131.
Valeriana canadenſis. *Riv. mon.* 6.
Valeriana orientalis, alliariæ folio, flore albo. *Buxb. cent.* 2. *p.* 19. *t.* 11.
Habitat in Pyrenæis? ♃

13. VALERIANA floribus triandris, foliis omnibus cordatis repando-lobatis. *Chinenſis.*
Habitat in China. *Oſbeck.*
Caules herbacei, erecti, plus quam pedales, ramis floriferis oppoſitis; Folia oppoſita, petiolata, glabra, cordata, acuta, lobis lateralibus utrinque binis obtuſis. Rami et caules terminati umbellulis involucello cinctis. Semina nuda.

14. VALERIANA floribus triandris, caule dichotomo, foliis linearibus. *Fl. ſuec.* 32. *Hort. upſ.* 14. *Dalib. pariſ.* 12. *Locuſta.*
Valeriana caule dichotomo, foliis lanceolatis integris. *Vir. cliff.* 5.
α. Valeriana caule dichotomo, foliis lanceolatis integris, fructu ſimplici. *Hort. cliff.* 16. *Roy. lugdb.* 235. *olitoria.*
Valeriana campeſtris inodora major. *Bauh. pin.* 165.
β. Valeriana caule dichotomo, foliis lanceolatis ſerratis, calycibus inflatis. *Hort. cliff.* 16. *Roy. lugdb.* 235. *veſicaria.*
Valeriana cretica, fructu veſicario. *Tournef. cor.* 6. *Boerh. lugdb.* 1. *p.* 75. *t.* 75.

coronata. γ. Valeriana caule dichotomo, foliis lanceolatis dentat..., fructu ſexdentato. *Hort. cliff.* 16. *Roy. lugdb.* 235.
Valeriana ſemine ſtellato. *Bauh. pin.* 165.

dentata. δ. Valeriana caule dichotomo, foliis oblongis ſubſerratis, ſeminis corona tridentata. *Hall. helv.* 666. *Dalib. pariſ.* 12.
Locuſta major. *Riv. mon.* 6.

radiata. ε. Valeriana caule dichotomo, capitulis terminalibus involucro cinctis. *Gron. virg.* 10.
Valeriana marilandica, foliis oblongis obtuſis. *Raj. ſuppl* 3. *p.* 244.
Habitat α. *in* Europæ, β. Cretæ, γ. Luſitaniæ, δ Europæ auſtralioris, ε. Marilandiæ *arvis.* ☉

mixta. 15 VALERIANA floribus triandris, caule quadrifido, foliis imis bipinnatifidis, ſeminis pappo plumoſo. *Sauv. monſp.* 275. †
Valerianella ſemine umbilicato hirſuto minore. *Moriſ. umb.*
Habitat Monſpelii.

Sibirica. 16. VALERIANA floribus tetrandris æqualibus, foliis pinnatifidis, ſeminibus palea ovali adnatis. *Hort. upſ.* 13.
Valeriana lutea humilis, *Amm. ruth.* 18. *n.* 25, *t.* 3.
Habitat in Sibiriæ *campis.* ☉.

HIRTELLA.

americana. 1. HIRTELLA, *Hort. cliff.* 17. *
Habitat in America *meridionali.* ♄.

OLAX.

zeylanica. 1. OLAX. *Fl. zeyl.* 34. * *Amœn. acad.* 1. *p.* 387.
Arbor ſtercoraria zeylanica glandifera. *Burm. zeyl.* 26.
Habitat in Zeylona. ♄

TAMARINDUS.

indica. 1. TAMARINDUS. *Hort. cliff.* 18. *Mat. med.* 26 *Hort. upſ.* 15. *Fl. zeyl.* 14. *Roy. lugdb.* 465.
Siliqua arabica, quæ Tamarindus. *Bauh. pin.* 403.
Balam-pulli. *Rheed. mal.* 1. *p.* 39. *t.* 23.
Habitat in India, America, Ægypto, Arabia. ♄

CNEORUM.

tricoccon. 1. CNEORUM. *Hort. cliff.* 18. *Roy. lugdb.* 119.

Che-

Chamælea tricoccos. *Bauh. pin.* 462.
Chamælea. *Cam. epit.* 973.
Habitat in Hiſpaniæ, Narbonæ *glareoſis.* ♄.

MELOTHRIA.

1. MELOTHRIA. *Hort. cliff.* 490. * *Hort. upſ.* 15. *Gron. virg.* 10. *Roy. lugdb.* 528. *pendula.*
Cucumis parva repens virginiana, fructu minimo. *Pluk. alm.* 123. *t.* 85. *f.* 5.
Cucumis minima, fructu ovali nigro lævi. *Sloan. hiſt.* 1. *p.* 227. *t.* 142. *f.* 1.
Habitat in Canada, Virginia, Jamaica. ⊙

LOEFLINGIA.

1. LOEFLINGIA.
Illecebrum procumbens ramoſum, floribus lateralibus imbricatis. *Lœfl. deſcr. VI.* 34. *hiſpanica.*
Habitat in Hiſpaniæ *collibus apricis.* ⊙
Caules *profuſi Scleranthi ſ. Herniariæ, viſcidi.* Folia *ſubulata, breviſſima, utrinque dente notata.* Spicæ *breves, ſquarroſæ, axillares, Bracteis imbricatis, ſubulatis, dentatis.*

POLYCNEMUM.

1. POLYCNEMUM *Sauv. monſp.* 45.
Salſola caule repente, foliis & ſtipulis ſeſſilibus ſubulatis cartilagineis. *Dalib. pariſ.* 80. *arvenſe.*
Chenopodium foliis ſubulatis priſmaticis, floribus ſolitariis ſeſſilibus axillaribus. *Guett. ſtamp.* 14.
Chenopodium annuum humifuſum, folio breviori & capillaceo. *Tournef. inſt.* 506.
Camphorata vaginis ſpinoſis. *Hall. helv.* 183.
Camphorata congener. *Bauh. pin.* 486.
Herniaria foliis longis anguſtis acuminatis & glabris. *Magn. char.* 51.
Habitat in Galliæ, Italiæ, Germaniæ *arvis.*

CASSYTHA.

1. CASSYTHA *Osbeck.*
Cuſcuta altera ſ. major. *Camel. luz.* 1. *p.* 1. *n.* 1. *Pet. gaz.* 77. *t.* 49. *f.* 12. *filiformis.*
Cuſcuta baccifera barbadenſium a maritimis. *Pluk. alm.* 126. *t.* 172. *f.* 2.
Acatſia-valli. *Rheed mal.* 7. *p.* 83. *t.* 44. *Raj. ſuppl.* 551.

LIBRARY
NATIONAL MUSEUM
OF CANADA

Habitat in India.
Habitus & omnia Cuſcutæ, at fructificatio diverſiſſima.

CROCUS.

ſativus. 1. CROCUS ſpatha univalvi radicali, corollæ tubo longiſſimo.
Crocus floribus fructui impoſitis: tubo longiſſimo. *Roy. lugb.* 41. *Hort. upſ.* 15. *Mat. med.* 27.
Crocus flore fructui impoſito. *Hort. cliff.* 18.
officinalis. α. Crocus autumnalis ſativus. *Moriſ. hiſt.* 2. *p.* 335. *ſ.* 4 *t.* 2. *f.* 1.
Crocus ſativus. *Bauh. pin.* 65.
vernus. β. Crocus vernus latifolius. I-XI. & I-VI. *Bauh. pin.* 65. 66.
Habitat in Alpibus Helveticis, Pyrenæis, Luſitanicis, Tracicis. ♃

Bulbocodium. 2. CROCUS ſpatha diphylla flori approximata, tubo corollæ brevi.
Crocus flore fructui impoſito: tubo brevi. *Roy. lugdb.* 41
Siſyrinchium minus anguſtifolium, flore majore variegato. *Bauh. pin.* 41.
Siſyrinchium aſprenſium, anguſto folio, alterum. *Col ecphr.* 2. *p.* 5. *t.* 7. *f.* 1.
Bulbocodium crocifolium, flore magno albo fundo luteo. *Tourneſ. cor.* 50.
Habitat in alpibus Italicis. ♃

IXIA.

africana. 1. IXIA floribus capitatis, ſpathis laceris.
Ixia. *Hort. cliff.* 490. * *Roy. lugdb.* 20.
Ixia foliis ad radicem nervoſis gramineis, floribus ac fructu convolutis. *Burm. afric.* 191. *t.* 70. *f.* 2.
Bermudiana capenſis, capitulis lanuginoſis. *Pet. ſicc.* 242.
Gramen eriophorum africanum, flore lanato. *Pluk. mant.* 98.
Habitat ad Cap. b. Spei. ♃

chinenſis. 2. IXIA foliis enſiformibus, floribus remotis. *Hort. upſ.* 16
Bermudiana, iridis folio majori, flore croceo eleganter punctato. *Krauſ. hort.* 25. *t.* 25.
Balemcanda-Schularmandi. *Rheed. mal.* 11. *p.* 73. *t.* 37.
Habitat in India. ♃

GLADIOLUS.

communis. 1. GLADIOLUS foliis enſiformibus, floribus diſtantibus.
Gladio-

Gladiolus foliis enſiformibus. *Hort. cliff.* 20. *Hort. upſ.* 16.

Gladiolus caule ſimpliciſſimo, foliis enſiformibus. *Roy. lugdb.* 19.

Gladiolus floribus uno verſu diſpoſitis. *Bauh. pin.* 41.

Habitat in Europa *auſtrali.* ♃

2. GLADIOLUS foliis enſiformibus, floribus imbricatis. *imbricatus.*

Habitat in Ruſſia *citeriore.* ♃

Flores parvi verſus unum latus imbricati.

3. GLADIOLUS foliis linearibus, caule ſimpliciſſimo, floribus ſpicatis. *Roy. lugdb.* 19. *ſpicatus.*

Habitat in Africa. ♃

4. GLADIOLUS foliis linearibus, floribus diſtantibus, corollarum tubo limbis longiore. *anguſtus.*

Gladiolus caule ſimpliciſſimo, foliis linearibus, floribus alternis. *Roy. lugdb.* 19.

Gladiolus foliis linearibus. *Hort. cliff.* 20. * *t.* 6.

Habitat in Africa. ♃

5. GLADIOLUS caule ramoſo, foliis linearibus. *Roy.* lugdb. 19. *ramoſus.*

Habitat in Africa. ♃

6 GLADIOLUS caule ramoſo, capitulis pedunculatis, radice tuberoſa. *capitatus.*

Habitat in Africa. ♃

Planta eſt maxima; floribus cæruleis.

ANTHOLYZA.

1. ANTHOLYZA ſtamine unico declinato. *ringens.*

Gladiolo æthiopico ſimilis planta anguſtifolia. *Comm. hort.* 1. *t.* 41. *Rudb. elyſ.* 2. *p.* 237.

Gladiolus floridus rictum referens coccineus: ſuprema lacinia erecta & fiſtuloſa. *Breyn. ic.* 21. *t.* 8. *f.* 1.

Habitat in Æthiopia. ♃

2. ANTHOLYZA ſtaminibus omnibus adſcendentibus. *Cunonis.*

Cunonia floribus ſeſſilibus, ſpathis maximis. *Büttn. cun.* 211. *t.* 1.

Gladiolus æthiopicus, flore coccineo. *Corn. canad.* 78. *t.* 79. *Moriſ. hiſt.* 2. *p.* 421. *ſ.* 4. *t.* 23. *f.* 1.

Habitat ad Cap. b. Spei. ♃

Utrum hæc ſit diſtincti generis planta, tum primum eluceſcat, cum præcedentis flores examinentur ulterius.

IRIS

* *Barbatæ nectariis petalorum reflexorum.*

Suſiana. 1. IRIS corollis barbatis, caule foliis longiore unifloro. *Hort. cliff.* 18. *Roy. lugdb.* 17.
Iris ſuſiana, flore maximo ex albo nigricante. *Bauh. pin.* 31. *theatr.* 579.
Habitat in Oriente; *venit conſtantinopoli in Belgium* 1573. ♃
Caulis teres; Germen trigono-teretiuſculum; Petala 3 *interiora majora reflexa,*

germanica. 2. IRIS corollis barbatis, caule foliis longiore multifloro. *Hort. cliff.* 18. *Hort. upſ.* 16. *Mat. med.* 24. *Roy. lugdb.* 17.
Iris vulgaris germanica ſ. ſylveſtris. *Bauh. pin.* 30.
Iris hortenſis latifolia. *Bauh. pin.* 31.
Habitat in Germaniæ *editis.* ♃

aphylla. 3. IRIS corollis barbatis, ſcapo nudo longitudine foliorum multifloro. *Roy. lugdb.* 17.
Iris latifolia, caule aphyllo. *Bauh. pin.* 32.
Habitat - - - - ♃

variegata. 4. IRIS corollis barbatis, caule ſubfolioſo longitudine foliorum multifloro. *Roy. lugdb.* 17. *Hort. upſ.* 16.
Iris corollis barbatis, caule altitudine caulis multiflori. *Hort. cliff.* 19.
Iris latifolia pannonica, colore multiplici. *Bauh. pin.* 31.
Habitat in Hungaria. ♃

biflora. 5. IRIS corollis barbatis, caule foliis breviore multifloro. *Hortus. upſ.* 17.
Iris corollis barbatis, foliis caulem multiflorum ſuperantibus. *Hort. cliff.* 19. *Roy. lugdb* 17.
Chamæiris major ſaturate purpurea biflora. *Bauh. pin.* 33.
Habitat in Luſitaniæ *rupibus.* ♃

pumila 6. IRIS corollis barbatis, caule foliis breviore unifloro.
Iris corollis barbatis, foliis caulem uniflorum ſuperantibus. *Hort. cliff.* 19. *Roy. lugdb.* 17.
Chamæiris minor, flore purpureo. *Bauh. pin.* 33.
Habitat in Auſtriæ, Pannoniæ, *collibus apricis.* ♃

* * *Imberbes: petalis deflexis levibus*

Pſeudacorus. 7. IRIS corollis imberbibus, petalis interioribus ſtigmate minoribus, foliis enſiformibus. *Hort. cliff.* 19. *Fl. ſuec.* 33. *mat. med.* 25.
Aco-

Acorus adulterinus. *Bauh. pin.* 34. *theatr.* 634.
Habitat in Europa *ad ripas paludum foſſarum.* ♃

8. IRIS corollis imberbibus, petalis internis longitudine *fœtidiſſima*
ſtigmatis, foliis enſiformibus. *Hort. cliff.* 19. *Roy. lugdb.* 18. *Dalib. pariſ.* 13. *Sauv. monſp.* 41.
Gladiolus fœtidus. *Bauh. pin.* 30.
Spathula fœtida Xyris. *Bauh. hiſt.* 2. *p.* 731. *Dod. pempt.* 247.
Habitat in Gallia, Anglia, Hetruria. ♃

9. IRIS corollis imberbibus, germinibus trigonis, caule *ſibirica.*
tereti, foliis linearibus. *Hort. cliff.* 19. *Hort. upſ.* 17. *Roy. lugdb.* 78. *Hall belv.* 280. *Gmel. ſibir.* 1. *p.* 28.
Iris pratenſis anguſtifolia non fœtida altior. *Bauh. pin.* 32, *theatr.* 597.
Habitat in Auſtriæ, Helvetiæ, Sibiriæ *pratis.* ♃

10. IRIS corollis imberbibus, germinibus ſubtrigonis, cau- *verſicolor.*
le tereti, foliis enſiformibus.
Iris americana verſicolor, ſtylo crenato. *Dill. elth.* 188. *t.* 155. *f.* 188.
Iris americana verſicolor, ſtylo non crenato. *Dill. elth.* 187. *t.* 155. *f.* 187.
Iris latifolia virginiana, florum petalis repandis purpureis. *Ehret. pict. t.* 6. *f.* 2.
Habitat in Virginia, Marilandia, Penſylvia. ♃

11. IRIS corollis imberbibus, germinibus trigonis, caule *virginica.*
ancipiti. *Gron. virg.* 11.
Habitat in Virginia. ♃

12. IRIS corollis imberbibus, germinibus ſexangularibus, *ſpuria.*
caule tereti, foliis ſublinearibus. *Hort. cliff.* 19. *Hort. upſ.* 17. *Roy. lugdb.* 16.
Iris pratenſis anguſtifolia, folio fœtido, *Bauh. pin.* 32.
Habitat in Germaniæ *pratis.* ♃

13. IRIS corollis imberbibus, germinibus ſexangularibus, *graminea.*
caule ancipiti, foliis linearibus. *Hort. cliff.* 19. *Hort. upſ.* 17. *Roy. lugdb.* 18.
Iris anguſtifolia prunum redolens minior. *Bauh. pin.* 33.
Habitat in Auſtria *ad radices montium.* ♃

14. IRIS corollis imberbibus, caule unifloro foliis breviore, *verna.*
radice fibroſa. *Gron. virg.* 10.
Iris virginiana pumila ſ. Chamæiris verna anguſtifolia,

 flore

flore purpuro cæruleo odorato. *Pluk. alm.* 198. *t.* 196, *f.* 6.
Habitat in Virginia. ♃

tuberoſa. 15. IRIS corollis imberbibus, foliis tetragonis. *Vir. cliff.* 6. *Hort cliff.* 20. *Mat. med.* 26. *Roy. lugdb.* 18.
Iris tuberoſa, folio anguloſo. *Bauh. pin.* 40.
Hermodactylus folio quadrangulo. *Tournef. cor.* 50.
Habitat in Arabia & Oriente. ♃

Xiphium. 16. IRIS corollis imberbibus, foliis ſubulato-canaliculatis caule brevioribus. *Hort. upſ.* 17.
Iris foliis margine conniventibus, corollis imberbibus. *Hort.* cliff. 20.
Iris caulefcens, foliis margine conniventibus, corollis imberbibus. *Roy. lugdb.* 18.
Iris bulboſa latifolia, caule donata. *Bauh. pin.* 38.
β. Iris bulboſa cæruleo-violacea. *Bauh. pin.* 40.
Habitat in Hiſpania. ♃

perſica. 17. IRIS corollis imberbibus, foliis ſubulato-canaliculatis caule longioribus.
Iris acaulis, foliis margine conniventibus, corollis imberbibus. *Roy. lugdb.* 18.
Xiphion perſicum præcox, flore variegato. *Tournef. inſt.* 363.
Habitat in Perſia. ♃

Siſyrinchium 18. IRIS corollis imberbibus, foliis canaliculatis, bulbis germinis ſuperimpoſitis.
Siſyrinchium majus. *Bauh. pin.* 40 *Cluſ. hiſt.* 1. *p.* 216.
β. Siſyrinchium medium. *Bauh. pin.* 41.
Siſyrinchium minus. *Cluſ. hiſt.* 216.
Habitat in Hiſpania, Luſitania. ♃
Color eſt petalorum purpureo macula lutea loco barbæ; bulbis (non *tunicatis ſimplicibus ut in bulboſis Xiphiis* 16. 17, *ſed*) *ex gemino bulbo altero alteri impoſito, ut in Gladiolo, Croco.*

COMMELINA.

* *Dipetalæ dictæ.*

communis. 1. COMMELINA corollis inæqualibus, foliis ovato-lanceolatis acutis, caule procumbente glabro, *Hort. upſ.* 18.
Commelina foliis ovato-lanceolatis, caule procumbente glabro, petalis duobus majoribus. *Virid. cliff.* 6. *Hort. cliff.* 21. *Roy. lugdb.* 17. *Gron. virg.* 130.

Com-

Commelina procumbens annua, ſaponariæ folio. *Dill. elth.* 93. *t.* 78. *f.* 89.
Habitat in America. ☉

2. COMMELINA corollis inæqualibus, foliis lanceolatis glabris obtuſis, caule repente. *africana.*
Commelina radice perenni, foliis lanceolatis, caule repente glabro, petalis duobus majoribus. *Wach. ultr.* 323.
Commelina procumbens, flore luteo. *Roy. lugdb.* 538.
Habitat in Æthiopia. ♃
Differt a prima petalis iſtis majoribus reniformibus luteis, tertio ovato filamentis longioribus æquali, vaginis foliorum ciliatis, involucro non reticulato.

3. COMMELINA corollis inæqualibus, foliis ovatis obtuſis, caule repente. *benghalenſis.*
Ephemerum benghalenſe ſerpens, folio ſubrotundo brevi, phalangoides. *Pluk. alm.* 130. *t.* 27. *f.* 3.
Habitat in Benghala.

4. COMMELINA corollis inæqualibus, foliis ovato-lanceolatis, caule erecto ſcabro ſimpliciſſimo. *Hort. upſ.* 18. *erecta.*
Commelina foliis ovato-lanceolatis, caule erectiuſculo ſcabro, petalis duobus majoribus. *Virid. cliff.* 16. *Hort. cliff.* 495. *Gron. virg.* 11. *Roy. lugdb.* 38.
Commelina erecta, ampliore ſubcæruleo flore. *Dill. elth.* 94. *p.* 77. *t.* 88.
Habitat in Virginia. ♃

* * *Tripetalæ Zanoniæ Pl.*

5. COMMELINA corollis æqualibus, foliis ovato-lanceolatis ſubciliatis. *Hort. upſ.* 18. *tuberoſa.*
Commelina foliis ovato-lanceolatis, petalis tribus majoribus æqualibus. *Hort. cliff.* 21. *Roy. lugdb.* 38.
Commelina radice anacampſerotidis. *Dill. elth.* 94. *t.* 79. *f.* 90.
Habitat in Mexico. ♃

6. COMMELINA corollis æqualibus, pedunculis incraſſatis, foliis lineari-lanceolatis. † *Zanonia.*
Zanonia graminea perfoliata. *Plum. gen.* 38.
Habitat in America Galliæ *æquinoctialis.*

7. COMMELINA corollis æqualibus, pedunculis capillaribus, foliis lineari-lanceolatis, involucro nullo. *Fl. zeyl.* 31. *nudiflora.*

Ephe-

Ephemerum phalangoides maderaſpatenſe minimum, foliis peranguſtis, perfoliatum. *Pluk. alm.* 135. *t.* 27. *f.* 4.
Habitat in India.

axillaris. 8. COMMELINA corollis æqualibus, floribus ſeſſilibus, foliis linearibus.
Ephemerum phalangoides maderaſpatanum minimum, ſecundum caulem quaſi ex utriculis floridum. *Pluk. alm.* 135. *t.* 174. *f.* 3.
Ephemerum malabaricum, flore tripetalo in foliorum alis ſeſſili. *Raj. ſuppl.* 567.
Nir-pulli. *Rheed. mal.* 10. *p.* 28. *t.* 13.
Habitat in India.

criſtata. 9. COMMELINA corollis æqualibus, involucris ſpicatim imbricatis, *Fl. zeyl.* 32.
Ephemerum zeylanicum procumbens inflatum. *Herm. parad.* 143. *Raj. hiſt.* 566.
Habitat in Zeylona.

XYRIS.

indica. 1. XYRIS.
Xyris foliis gladiatis. *Gron. virg.* 11. *Fl. zeyl.* 35.
Gladiolo lacuſtri accedens malabarica, e capitulo botryoideo florifera. *Pluk. alm.* 170. *t.* 416. *f.* 4.
Katſjiletti-pullu. *Rheed. mal.* 9. *p.* 139. *t.* 7.
Habitat in Indiis.

SCHOENUS.

Mariſcus. 1. SCHOENUS culmo tereti, foliis margine dorſoque aculeatis. *Fl. ſvec.* 35. *It. gotl.* 170. * *Dalib. pariſ.* 14.
Pſeudo-cyperus paluſtris, foliis & carina ſerratis. *Scheuchz. gram.* 375.
Cyperus longus inodorus germanicus. *Bauh. pin.* 14.
Habitat in Europæ *paludibus.* ♃

aculeatus. 2. SCHOENUS culmo tereti ramoſo, capitulis terminalibus, involucro triphyllo breviſſimo rigido patente.
Gramen album, capitulis aculeatis, italicum. *Bauh. pin.* 7. *theatr.* 108. *Scheuch. gram.* 85. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 195. *ſ.* 8. *t.* 5. *f.* 3.
Gramen ſpicatum, ſpicis in capitulum foliatum congeſtis. *Tournef. inſt.* 517.
Gramen aculeatum. *Cam. epit.* 745.
Habitat in Italia, Narbona, Luſitania, Archipelagi *inſulis.* ♃

mucronatus. 3. SCHOENUS culmo tereti nudo, ſpicis-faſciculatis divaricatis, involucro triphyllo ſubulato, Scir-

Scirpus culmo tereti, foliis tribus patulis floſculisque aggeſtis terminato. *Sauv. monſp.* 9.
Scirpus maritimus, capite glomerato. *Tourneſ. inſt.* 46. *Scheuchz. gram.* 367.
Gramen Cyperoides maritimum. *Bauh. pin.* 6. *theatr.* 91.
Gramen junceum maritimum, capite ſquamoſo foliaceo. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 227. *ſ.* 8. *t.* 9. *f.* 6.
Habitat in Galliæ, Narbonæ, Tyrrheni, Smyrnæ *maritimis.* ♃
Folia etiam involucri apice pungunt. Spicæ oblongæ, ſeſſiles, apicibus diſtantes; Involucrum triphyllum, interdum diphyllum.

4. SCHOENUS culmo tereti nudo, capitulo ovato: involucri diphylli valvula altera ſubulata longa. *Fl. ſuec.* 36. *it. gotl.* 234. *Dalib. pariſ.* 113. *nigricans.*
Scirpus floſculis ſpicatis. *Act. ſtockh.* 1741. *p.* 182.
Juncus lævis minor, panicula glomerata nigricante. *Moriſ hiſt.* 3. *p.* 233. *ſ.* 8. *t.* 10. *f.* 28.
Junco affinis capitulo glomerato nigricante. Scheuch. gram. 349.
Habitat in Europæ *paludibus æſtate, exſiccatis.* ♃

5. SCHOENUS culmo tereti nudo, ſpica duplici, involucri valvula majore ſpicam æquante. *ferrugineus.*
Gramen Cyperoides minimum, caryophylli proliferi capitulo ſimplici ſquamato. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 245. *ſ.* 8. *t.* 12. *f.* 40.
Habitat in Gotlandiæ, Angliæ *paludibus.* ♃

** * Culmo triquetro.*

6. SCHOENUS culmo triquetro, capitulo ſubrotundo, involucro longiſſimo plano variegato. *coloratus.*
Schœnus florum capitulis involucro longiſſimo radiatis. *Hort. cliff.* 495.
Gramen Cyperodes ſpica compacta alba, foliis ad ſpicam, partim albis partim viridibus. *Sloan. hiſt.* 1. *p.* 119. *t.* 78. *f.* 1.
Habitat in Jamaica, Bahama.

7. SCHOENUS culmo ſubtriquetro nudo, ſpica diſticha, involucro monophyllo. *compreſſus.*
Cyperella montana ſpicata, radice repente, caule totundo triquetro, ſpica fuſca compreſſa diſticha, ſemine cinereo. *Mich. gen.* 53.
Gramen Cyperoides ſpica ſimplici compreſſa diſticha. *Pluk. alm.* 173. *t.* 34. *f.* 9. *Scheuch. gram.* 490. *Raj. hiſt.* 1910. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 245.
Habitat in Anglia, Helvetia, Italia.

8.

glomeratus. 8. SCHOENUS culmo triquetro folioſo, floribus faſciculatis, foliis planis, pedunculis lateralibus geminis.
Schœnus culmo triquetro, pedunculis geminis lateralibus, floribus conglomeratis. *Gron. virg.* 131.
Habitat in Virginia.

albus. 9. SCHOENUS culmo ſubtriquetro folioſo, floribus faſciculatis, foliis ſetaceis. *Fl. ſvec.* 34. *Dalib. pariſ.* 14
Schœnus floſculis faſciculatis. *Hort. cliff.* 22. *Roy. lugdb.* 48.
Cyperus paluſtris hirſutus minor, paniculis albis. *Moriſ hiſt.* 3. *ſ.* 8. *t.* 9. *f.* 39. *Fl. lapp.* 17.
Gramen Cyperoides paluſtre leucanthemum. *Scheuchz. Gram.* 503.
Habitat in Europæ *borealis paludibus ſiccatis.* 2

CYPERUS.

* *Culmo tereti.*

articulatus. 1. CYPERUS culmo tereti nudo articulato.
Cyperus culmo nudo articuloſo. *Roy. lugdb.* 51.
Juncus Cyperoides creberrime geniculatus medulla farctus aquaticus, radice rubra tuberoſa odorata. *Sloan. jam.* 36. *hiſt.* 1. *p.* 121. *t.* 81. *f.* 1.
Habitat in Jamaicæ *rivulis* ♃.

minimus. 2. CYPERUS culmo tereti nudo, ſpicis ſub apice.
Cyperus culmo tereti, ſpicas ſub apice ferente. *Hort. cliff.* 21. *Roy. lugdb.* 49.
Gramen junceum perpuſillum, capillaceis foliis, æthiopicum. *Pluk. alm.* 179. *t.* 300. *f.* 5.
Gramen Cyperoides minimum, ſpicis pluribus compactis ex oblongo-rotundis. *Sloan. jam.* 36. *hiſt.* 1. *p.* 120. *t.* 79. *f.* 3. *Raj. hiſt.* 3. *p.* 625.
Habitat in Jamaica, Africa.

arundinacea. 3. CYPERUS culmo tereti folioſo articulato, racemis lateralibus, ſpicis alternis patentibus.
Cyperus racemis ſimplicibus lateralibus ſolitariis diſtichis, ſpicis alternis patentibus. *Gron virg.* 131.
Gramen junceum elatius, caule articulato, virginianum, cyperi paniculis inter folia prope ſummitatem prodeuntibus. *Pluk. alm.* 179. *t.* 301. *f.* 1.
Gramen fluviatile geniculatum, panicula foliacea: locuſtis tenuibus oblongis, virginianum. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 183. *ſ.* 8. *t.* 3.
Habitat in Virginia.

* *Cul*

** Culmo triquetro.*

4. CYPERUS culmo triquetro folioſo, umbella ſupra-decompoſita, ſpiculis umbellato-ſeſſilibus. *Fl. zeyl.* 37. * *haſpan.*

Gramen Cyperoides maderaſpatanum, panicula magis ſparſa & ſpecioſa. *Pluk. alm* 179. *t.* 192. *f.* 2.
Habitat in India, Æthiopia. ♃

5. CYPERUS culmo triquetro folioſo, umbella foljoſa ſupradecompoſita, pedunculis nudis ſpicis alternis. *Roy. lugdb.* 50. *Mat. med.* 29 *Dalib. pariſ.* 14. *longus.*
Cyperus odoratus radice longa ſ. Cyperus officinarum. *Bauh. pin.* 14. *Scheuch. gram.* 378. *Moriſ. hiſt.* 3. *pag.* 237. *ſ.* 8. *t.* 11. *f.* 13.
Habitat in Italiæ, Galliæ *paludibus.* ♃

6. CYPERUS culmo triquetro ſubnudo, umbella de-compoſita: ſpicis alternis linearibus. *Fl. zeyl.* 36. *Mat. med.* 30. *rotundus.*
Cyperus orientalis, radice olivarii, ſpicis longis e ſpadiceo purpuraſcentibus. *Scheuch. gram.* 391.
Habitat in India.

7. CYPERUS culmo triquetro nudo, umbella folioſa, radicum tuberibus ovatis: zonis imbricatis. *Roy. lugdb.* 51. *eſculentus.*
Cyperus rotundus eſculentus anguſtifolius. *Bauh. pin.* 14. *theatr.* 222. *Scheuch. gram.* 382. *Moriſ. hiſt* 3. *p.* 236. *ſ.* 8. *t.* 11. *f.* 10.
Thraſi. *Bauh. hiſt.* 2. *p.* 504.
Habitat Monſpelii, *inque* Italia, Oriente. ♃.

8. CYPERUS culmo triquetro ſeminudo, umbella folioſa decompoſita, ſpiculis alternis granis diſtinctis. *Iria.*
Gramen Cyperoides Indiæ orientalis elatius; panicula ſparſa palleſcente. *Pluk. alm.* 179. *t.* 191. *f.* 7.
Iria ſ. Balari. *Rheed. mal.* 12. *p.* 105. *t.* 56.
Habitat in India. *Osbeck.*
Pedunculi in umbella plurimi, apice umbelluliferi; umbella ex tribus quatuorve radiis, qui alternatim ſpiculas gerunt ex granis triquetris, obtuſiſſimis, vix manifeſta palea veſtitis, parum diſtantibus.

9. CYPERUS culmo triquetro nudo, umbella folioſa, pedunculis nudis proliferis, ſpicis confertis. *Roy. lugdb.* 51. *elegans.*
Cyperus panicula maxime ſparſa ferruginea compreſſa elegan-

elegantiſſima. *Sloan. jam.* 35. *hiſt.* 1. *p.* 117. *t.* 75. *f.* 1. *Raj. ſuppl.* 623.
Habitat in Jamaicæ *paludoſis maritimis.*

loratus. 10. CYPERUS culmo triquetro nudo, umbella decompoſita ſimpliciter folioſa, pedicellis diſtiche ſpicatis.
Cyperus culmo triquetro nudo, umbella duplicata folioſa, pedunculis propriis diſtiche ſpicatis. *Roy. lugdb.* 50. *Gron. virg.* 131.
Cyperus longus odoratus, panicula ſparſa, ſpicis ſtrigoſioribus viridibus. *Sloan. jam.* 35. *hiſt.* 1. *p.* 116. *t.* 74. *f.* 1.
Habitat in America *ad fluviorum ripas.*

compreſſus. 11. CYPERUS culmo triquetro nudo, umbella triphylla, pedunculis ſimplicibus, ſpicis alterno-digitatis lanceolatis diſtichis.
Cyperus culmo triquetro nudo, panicula folioſa, pedunculis ſimplicibus, ſpicis alternis ſubulatis diſtichis. *Roy. lugdb.* 51. *Gron. virg.* 131.
Cyperus rotundus gramineus fere inodorus, panicula ſparſa compreſſa viridi. *Sloan. jam.* 35. *hiſt.* 1. *p.* 117. *t.* 76. *f.* 1. *Raj. ſuppl.* 623.
Habitat in Americæ *ſeptentrionalis pratis arenoſis.*

flaveſcens. 12. CYPERUS culmo triquetro nudo, umbella triphylla, pedunculis ſimplicibus inæqualibus, ſpicis confertis lanceolatis.
Cyperus culmo triquetro nudo, panicula folioſa ſupradecompoſita, ſpicis confertis diſtiche compreſſis. *Dalib. pariſ.* 14.
Cyperus minimus, panicula ſparſa flaveſcente. *T. Scheuch. gram.* 385. *Hall. helv.* 246.
Cyperus minor pulcher, panicula lata compreſſa ſubflaveſcente. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 239. *ſ.* 8. *t.* 11. *f.* 37.
Gramen Cyperoides minus, panicula ſparſa ſubflava. *Bauh. pin.* 6. *theatr.* 88. *t.* 88.
Habitat in Germaniæ, Helvetiæ, Galliæ *paludoſis.*

fuſcus. 13. CYPERUS culmo triquetro nudo, umbella trifida, pedunculis ſimplicibus inæqualibus, ſpicis confertis linearibus.
Cyperus culmo triquetro nudo, panicula diphylla ſupradecompoſita, ſpicis ſtrigoſioribus confertis diſtiche compreſſis. *Dalib. pariſ.* 15.
Cyperus minimus, panicula ſparſa nigricante. *T. Scheuchz. gram.* 384.

Cy-

Cyperus minor pulcher, panicula compreſſa nigricante. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 239. *ſ.* 8. *t.* 9. *f.* 38.
Gramen Cyperoides minus, panicula ſparſa nigricante. *Bauh. pin.* 6.
Habitat in Galliæ, Germaniæ, Helvetiæ *pratis humidis.*
Differt a C. flaveſcente vix manifeſte, ſpiculis anguſtioribus fuſcis & foliis magis ſcabris.

14. CYPERUS culmo triquetro nudo, umbella ſimplici, ſpiculis linearibus confertiſſimis horizontalibus. *ſtrigoſus.*
Cyperus rotundus, panicula ſparſa, ſpicis ſtrigoſis ferrugineis. *Sloan. jam.* 35. *hiſt.* 1. *p.* 116. *t.* 74. *f.* 23.
Habitat in paludibus Jamaicæ, Virginiæ.
Radix ſubrotunda. Umbellæ radii ſimplices, erectiuſculi, inſtructi ſpiculis linearibus, longiuſculis, ferrugineis, confertiſſimis, numeroſisſimis, horizontaliter a pedunculo communi patentibus vel etjam deorſum flexis.

15. CYPERUS culmo triquetro nudo, umbella ſimplici foliosa, pedunculis ſimpliciſſimis diſtiche ſpicatis. *Roy. lugdb.* 50. *Papyrus.*
Cyperus omnium maximus Papyrus dictus. (*Mont. gram.* 14.), locuſtis minimis. *Mich. gen.* 44. *t.* 19.
Cyperus enodis nudus, culmis e vaginis brevibus prodeuntibus, ſpicis tenuioribus. *Scheuch. gram.* 387.
Cyperus niloticus vel ſyriacus maximus papyraceus. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 239. *ſ.* 8. *t.* 11. *f.* 41.
Papyrus ſyriaca & ſiciliana. *Bauh pin.* 12. *theatr.* 333.
Habitat in Calabria, Sicilia, Syria, Ægypto.

SCIRPUS.

* * *Spica unica.*

1. Scirpus culmo tereti nudiuſculo ſemigeniculato, capitulo glomerato laterali. *articulatus.*
Tſieli. *Rheed. mal.* 12. *p.* 135. *t.* 71.
Habitat in Malabariæ *aquoſis arenoſis.*
Culmus cavus, geniculis cinctus, at non undique. Spicæ laterales in capitulum ſemiverticillatum collectæ.

2. SCIRPUS culmo tereti nudo, ſpica ſubovata imbricata. *Fl. ſuec.* 41. *Dalib. pariſ.* 16. *paluſtris.*
Scirpus culmo nudo, ſpica terminali ſubovata. *Roy. lugdb.* 48.
Scirpus equiſeti capitulo majore. *T. Scheuchz gram.* 360. *Fl. lapp.* 10.
Juncus paluſtris, capitulo equiſeti, major. *Bauh. pin.* 12.
Habitat in Europæ *uliginoſis & inundatis.*

3. SCIR-

geniculatus. 3. SCIRPUS culmo tereti nudo, ſpica ſubgloboſa terminali.
Scirpus culmo nudo, ſpica terminali ſubrotunda. *Hort. cliff.* 21. * *Roy. lugdb.* 48.
Juncus aquaticus geniculatus, capitulis equiſeto major & minor. *Sloan. jam.* 37. *hiſt.* 1. *p.* 122. *t.* 75. *f.* 2. & *t.* 81. *f.* 3. *Raj. ſuppl.* 628.
Habitat in Jamaica.

cæſpitoſus. 4. SCIRPUS culmo ſtriato nudo, ſpica bivalvi terminali longitudine calycis, radicibus ſquamula interſtinctis. *Fl. ſuec.* 42. *Dalib. pariſ.* 17.
Scirpus folio culmi unico. *Fl. lapp.* 20. *Roy. lugdb.* 49.
Scirpus montanus, capitulo breviore. *Scheuch. gram.* 363. *t.* 7. *f.* 18.
Habitat in Europæ *paludibus cæſpitoſis ſylvaticis.* ♃

capitatus. 5. SCIRPUS culmo tereti nudo ſetiformi, ſpica ſubgloboſa.
Scirpus culmo ſetaceo nudo, ſpica ſubgloboſa. *Gron. virg.* 12.
Habitat in Virginia.

acicularis. 6. SCIRPUS culmo tereti nudo ſetiformi, ſpica ovata bivalvi, ſeminibus nudis. *Fl. ſuec.* 42. *Dalib. pariſ.* 17.
Scirpus magnitudine aciculæ. *Fl. lapp.* 21. *Roy. lugdb.* 49.
Juncellus minimus, capitulis equiſeti. *Pluk. alm.* 201. *t.* 40. *f.* 7. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 234. *ſ.* 8. *t.* 10. *f.* 37.
Habitat in Europa *ſub aquis purioribus.*

fluitans. 7. SCIRPUS culmis teretibus nudis alternis, caule folioſo flaccido.
Scirpus foliis linearibus planis alternatim faſciculatis, ſpica terminali. *Guett. ſtamp.* 141.
Scirpus caule folioſo flaccido, ſcapis alternis capitatis. *Roy. lugdb.* 49. *Sauv. monſp.* 9.
Scirpus equiſeti capitulo minori. *T. Scheuch. gram.* 365. *t.* 7. *f.* 20.
Juncellus, capitulis equiſeti, minor fluitans. *Bauh. pin.* 12. *prodr.* 23. *theatr.* 187.
Gramen junceum clavatum minimum. *Raj. hiſt.* 1310. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 230. *ſ.* 8. *t.* 10. *f.* 31. *Pluk. alm.* 180. *t.* 35. *f.* 1.
Habitat in Angliæ, Galliæ *udis.*

* * *Culmo tereti polyſtachio.*

lacuſtris. 8. SCIRPUS culmo tereti nudo, ſpicis ovatis pluribus, pedunculatis terminalibus. *Fl. ſuec.* 40. *Dalib. pariſ.* 16.
Scir-

Scirpus ſpicis copioſis. *Roy. lugdb.* 48.
Juncus maximus ſ. ſcirpus major. *Bauh. pin.* 12. *theatr.* 178.
Habitat in Europæ *aquis puris ſtagnantibus & fluviatilibus.*

9. SCIRPUS culmo tereti nudo, ſpicis ſubgloboſis glomeratis pedunculatis, involucro diphyllo inaequali mucronato. *Holoſchœnus*
Scirpus panicula ſolum folioſa, ſpicis globoſis pedunculatis lateralibus. *Sauv. monſp.* 8.
Juncus acutus maritimus, capitulis rotundis. *Bauh pin.* 11. *theatr.* 17.
Scirpoides maritimum, capitulis ſparſis glomeratis. *Scheuch. gram.* 371.
Holoſchœnus *Dalech. hiſt.* 987.
Habitat in Europa *auſtrali*

10. SCIRPUS culmo tereti nudo, capitulo laterali conglobato, bractea reflexa. *romanus.*
Scirpus capitulo ſingulari, radice tomentoſa *Barr. rar.* 1249. *t.* 255. *f.* 3.
Scirpoides acutum maritimum, capitulo glomerato ſolitario. *Scheuch. gram.* 373. *Mich. gen.* 52.
Habitat in Galloprovincia & Romæ. ♃

11. SCIRPUS culmo nudo ſetaceo, ſpicis lateralibus ſubſolitariis ſeſſilibus. *it. ſcan.* 227. * *ſetaceus.*
Scirpus culmo nudo ſetaceo, ſpicis pedunculatis. *Roy. lugdb.* 49.
Scirpus omnium minimus, capitulo breviore.. *T. Scheuch. gram.* 358.
Juncellus omnium minimus. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 232. *ſ.* 8. *t.* 10. *f.* 23.
Habitat in Europæ *litoribus maritimis.*

12. SCIRPUS culmo tereti nudo, ſpicis ſeſſilibus in medio culmo glomeratis. *Dalib. pariſ.* 16. † *ſupinus.*
Scirpus ſupinus minimus, capitulis conglobatis, foliis rotundo-teretibus. *Tournef. inſt.* 528.
Habitat Pariſiis.

13. SCIRPUS culmo nudo capillari, ſpicis pedunculatis ſeſſilibusque lateralibus. *capillaris.*
Scirpus culmo teretiuſculo ſeminudo, ſpicis capitatis ſeſſilibus, involucro diphyllo ſetaceo. *Fl. zeyl.* 39.
Cyperus culmo tereti ſpicas infra apicem ferente. *Hort. cliff.* 21.

Gramen junceum perpuſillum, capillaceis foliis, æthiopicum. *Pluk. alm.* 179. *t.* 300. *f.* 5.
Gramen puſillum, junci capitulis minimis, ad baſin foliolis binis acutis. *Burm. zeyl.* 108. *t.* 47. *f.* 2.
Habitat in Virginia, Æthiopia, Zeylona.

* * * *Culmo triquetro, panicula nuda.*

mucronatus. 14. SCIRPUS culmo triquetro nudo acuminato, panicula conglomerata nuda.
Scirpo-Cyperus maritimus. *Mich. gen.* 47. *ord. c.* 2. 3.
Juncus acutus maritimus, caule triangulo. *Bauh. pin.* 11. *prodr.* 22. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 232. *ſ.* 8. *t.* 10. *f.* 20.
Juncus acutus maritimus, caule triquetro rigido & molli. *Pluk. alm.* 200. *t.* 40. *f.* 1. 3.
Habitat in Angliæ, Italiæ, Helvetiæ, Virginiæ *ſtagnis maritimis.*

dichotomus. 15. SCIRPUS culmo triquetro nudo, umbella decompoſita, ſpicis dichotomiæ ſeſſilibus. *Fl. zeyl.* 40. *
Gramen Cyperoides maderaſpatanum, juncelli geſneri capitulis ſparſis. *Pluk. alm.* 179. *t.* 119. *f.* 3.
Habitat in India.

echinatus. 16. SCIRPUS culmo triquetro nudo, umbella ſimplici, ſpicis ovatis. *Fl zeyl.* 38. *
Cyperus floribus capitatis erectis pedunculatis. *Gron. virg.* 12.
Gramen Cyperoides americanum, ſpicis grandioribus oblongo-rotundis, ſparganii in modum echinatis, ad ſummum caulem pediculis longis innitentibus. *Pluk. alm* 179. *t.* 91. *f.* 4.
Habitat in India *utraque.*

retrofractus. 17. SCIRPUS culmo triquetro, umbella ſimplici, ſpicarum floſculis retrofractis.
Cyperi genus indianum, panicula ſpecioſa, ſpiculis propendentibus atris. *Pluk. phyt.* 415. *f.* 4.
Habitat in Virginia. ♃

ferrugineus. 18. SCIRPUS culmo triquetro ſubnudo, pedunculis nudis numeroſis, ſpicis ovatis ſolitariis.
Cyperus culmo triquetro nudo, panicula diphylla, pedunculis quibusdam ſubdiviſis, ſpicis ovatis ſolitariis. *Roy. lugdb.* 50.
Gramen Cyperoides majus ſpicis ex oblongo-rotundis compactis ferrugineis. *Sloan. jam.* 36. *hiſt.* 1. *p.* 36. *t.* 77. *f.* 2.
Habitat in Jamaicæ *paludibus maritimis.*

19.

19. SCIRPUS culmo triquetro nudo, umbella ſubnuda, *ſpadiceus.* ſpicis oblongis ſeſſilibus terminalibusque.
Scirpus culmo triquetro nudo, panicula laxa, ſpicis alternis ſubſeſſilibus, pedunculis longis terminalibus, *Gron. virg.* 132.
Gramen Cyperoides majus aquaticum, paniculis plurimis junceis ſparſis, ſpicis ex oblongo-rotundis ſpadiceis. *Sloan. jam.* 36. *hiſt.* 1. *p.* 118. *t.* 76. *f.* 2.
Habitat in Jamaicæ *fluviis.*

* * * * *Culmo triquetro panicula foliacea.*

20. SCIRPUS culmo triquetro, panicula conglobata foliacea, ſpicularum ſquamis trifidis: intermedia ſubulata. *maritimus.*
Fl. ſuec. 39. *Dalib. pariſ.* 15.
Cyperus culmo triquetro, panicula foliacea, pedunculis ſimpliſſimis, ſpicis confertis. *Roy. lugdb.* 50
Cyperus panicula ſubſeſſili, capitulis ſubovatis. *Guett. ſtamp.* 2. *p.* 414.
Cyperus rotundus inodorus germanicus. *Bauh. pin.* 14. *theatr.* 215.
β. Cyperus rotundus inodorus anglicus. *Bauh. pin.* 14.
γ. Cyperus panicula compacta e ſpicis teretibus craſſioribus compoſita. *Scheuch. hiſt.* 400.
δ. Gramen Cyperoides panicula ſparſa majus. *Bauh. pin.* 6.
ε. Scirpo-Cyperus paluſtris, radice repente nodoſa inodora, panicula ſparſa, capitulis majoribus. *Mich. gen.* 48.
Habitat in Europæ *litoribus maritimis.* ♃
Anatome partium fructificationis conjunctionem β. γ. δ. ε. juſſit.

21. SCIRPUS culmo triquetro folioſo, panicula foliacea, ſeminibus oſſeis. *lithoſpermus*
Kaden-pullu. *Rheed. mal.* 12. *p.* 89. *t.* 48.
Habitat in India.
Culmus nudus, triqueter, craſſitie fili. Panicula *ſimplex; ramulis alternis. Folium ſub panicula ejusdem longitudinis. Spicæ parvæ, ovatæ, ſubjecto Folio ſetaceo vix ſpica longiore. Semina magna, nivea; ſubovata nitida, nuda, prominentia, diverſiſſima a Cypero maximo americano, lithoſpermi ſemine. Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 237. *ſ.* 8. *t.* 11. *f.* 16.

22. SCIRPUS culmo triquetro folioſo, umbella foliacea, *ſylvaticus.* pedunculis nudis ſupra-decompoſitis, ſpicis confertis.
Fl. ſuec. 38 *Dalib. pariſ.* 15.
Cyperus culmo triquetro, panicula folioſa, pedunculis

lis nudis ſupra-decompoſitis, ſpicis confertis. *Roy. lugdb.* 49.
Gramen cyperoides miliaceum. *Baub. pin.* 6.
Gramen arundinaceum, foliis acutiſſimis, panicula multiplici, cyperi facie. *Loeſ. pruſſ.* 119. *t.* 33.
Habitat in Europæ *ſylvis.* ♃

glomeratus. 23. SCIRPUS culmo triquetro folioſo, capitulo glomerato, involucro folioſo.
Cyperus culmo triquetro folioſo, capitulo glomerato triphyllo, ſpicis teretibus. *Gron. virg.* 131.
Pee-mottenga. *Rheed. mal.* 2. *p.* 99. *t.* 53.
Habitat in Virginia, India.
Culmus ſubnudus, triqueter, ſemipedalis. Involucrum nutans foliis 3. *ſ.* 4, *longitudine culmi. Spiculæ plurimæ, ovato-oblongæ, ſeſſiles, in capitulum ſubrotundum congeſtæ.*

michelianus. 24. SCIRPUS culmo triquetro, capitulo globoſo, involucro polyphyllo longo.
Cyperus italicus omnium minimus. *Till. piſ.* 51. *t.* 20. *f.* 5.
Habitat in Italia *rarius.*

ERIOPHORUM.

vaginatum. 1. ERIOPHORUM culmis vaginatis teretibus, ſpica paleacea. *Fl. ſvec.* 45. *Dalib. pariſ.* 18.
Eriophorum ſpica erecta, caule tereti. *Fl. lapp.* 23. *Roy. lugdb.* 51.
Gramen tomentoſum alpinum & minus. *Baub. pin.* 5. *prodr.* 10. *Burſ.* 1: 43.
Juncus alpinus capitulo lanuginoſo ſ. Schœnolagurus. *Baub. pin.* 12. *prodr.* 23. *theatr.* 188. *Scheuch. gram.* 302. *t.* 7. *f.* 1.
Habitat in Europæ *frigidis ſterilibus.* ♃

polyſtachion. 2. ERIOPHORUM culmis teretibus, foliis planis ſpicatis pedunculatis. *Fl. ſuec.* 44. *Dalib. pariſ.* 18.
Eriophorum ſpicis pendulis. *Fl. lapp.* 28. *Hort. cliff.* 22. *Roy. lugdb.* 51.
Gramen pratenſe tomentoſum, panicula ſparſa. *Baub. pin.* 4.
Habitat in Europæ *uliginoſis, turfoſis.* ♃

virginicum. 3. ERIOPHORUM culmis folioſis teretibus, foliis planis, ſpica erecta.
Eriophorum ſpica compacta erecta foliacea, caule compreſſo. *Gron. virg.* 132. Gra-

Gramen tomentoſum virginianum, panicula magis compacta aureo colore perfuſa. *Pluk. alm.* 179. *t.* 299. *f.* 4.
Gramen tomentoſum, capitulo ampliore fuſco & foliaceo. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 224. *ſ.* 8. *t.* 9. *f.* 2.
Habitat in Virginia. ♃

4. ERIOPHORUM culmis nudis triquetris, ſpica pappo breviore. *Fl. ſuec.* 46. *alpinum.*
Eriophorum ſpica erecta, caule triquetro. *Fl. lapp.* 24.
Linagroſtis juncea alpina, capitulo parvo: tomento rariore. *Scheuch. gram.* 305. *t.* 7. *f.* 4.
Juncus alpinus bombycinus. *Bauh. pin.* 12. *prodr.* 6.
Habitat in Europæ *alpibus, locisque affinibus.* ♃

NARDUS

1. NARDUS ſpica ſetacea recta. *Fl. ſuec.* 47. *Dalib. pariſ.* 18. *ſtricta.*
Nardus ſpica lineari. *Fl. lapp.* 40. *Hort. cliff.* 42.
Gramen ſparteum juncifolium. *Bauh. pin.* 5. *Scheuch. gram.* 90.
Gramen ſparteum hollandicum, capillaceo folio, & minus. *Bauh. pin.* 5. *prodr.* 11. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 217 *ſ.* 8. *t.* 7. *f.* 8.
Habitat in Europæ *aſperis, ſterilibus, duris.* ♃

2. NARDUS ſpica recurva. † *gangitis.*
Nardus ſpuria narbonenſis. *Bauh. pin.* 13.
Nardus gangitis ſpuria narbonenſis. *Lob. ic.* 84. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 257. *ſ.* 8. *t.* 13. *f. ult. Raj. hiſt.* 1911.
Habitat in G. Narbonenſi.

3. NARDUS ſpica incurva ciliata. *ciliaris.*
Habitat in India.
Folia graminea, plana. Culmus *ſpitamæus. Spica dimidiata ſ. altero latere tantum Floſculis alternis, erectis,* 12 *a* 15*: valvula exteriore ovato-oblonga, mutica, margine ciliata pilis ſcabris, numeroſis.* Calyx *proprie nullus, ſed ad alterum latus floſculorum ſeta, brevior ipſa gluma.*

4. NARDUS ſpica cylindrica articulata. *articulata.*
Nardus ſpica ſubulata diſticha. *Roy. lugdb.* 58.
Gramen loliaceum, ſpicis articuloſis erectis. T. *Scheuch. gram.* 43.
Gramen loliaceum maritimum, ſpicis articulatis. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 182. *ſ.* 8. *t.* 5. *f.*
Gra-

Gramen myuros erectum minimum arundinaceum. *Bocc. muſ.* 70. *t.* 59.
Habitat in Italia, Hiſpania, G. Narbonenſi.

DIGYNIA.

BOBARTIA.

indica. 1. BOBARTIA.
Bobartia ſpicis capitatis, involucro folioſo. *Fl. zeyl.* 41.* *Amœn. acad.* 1. *p.* 388. *
Scirpus maderaſpatanus, capitulo ſquamoſo ſubrotundo. *Scheuch. gram.* 369.
Habitat in India.
Refert ita Schœnum mucronatum, ut ejus figura pro hujus ubique venditari poſſit.

CORNUCOPIÆ.

cucullatum. 1. CORNUCOPIÆ. *Hort. cliff.* 490. *Roy. lugdb.* 52.
Juncus clavatus vaginatus polycephalus. *Pet. gaz. t.* 73. *f.* 5.
Gramen orientale vernum in udis proveniens, capitulo inflexo. *Scheuch. gram.* 117.
Habitat Smyrnæ. *D. Haſſelquiſt.*

SACCHARUM.

officinarum. 1. SACCHARUM floribus paniculatis. *Hort. cliff.* 26. *Mat. med.* 33. *Roy. lugdb.* 52.
Arundo ſaccharifera. *Bauh. pin.* 18. *Sloan. jam.* 31. *hiſt.* 1. *p.* 108. *t.* 66.
Habitat in Indiæ *utriusque locis inundatis.*

ſpicatum 2. SACCHARUM floribus ſpicatis.
Gramen indicum alopecuroides holoſericeum majus, ſpica longa pappeſcente. *Pluk. alm.* 177. *t.* 92. *f.* 5.
Tjeria-kuren-pullu. *Rheed. mal.* 12. *p.* 117. *t.* 62.
Habitat in Indiæ *petroſis.*

PHALARIS

canarienſis. 1. PHALARIS panicula ſubovata ſpiciformi, glumis carinatis. *Hort. upſ.* 19.
Phalaris radice annua. *Hort. cliff.* 23. *Roy. lugdb.* 63 *Dalib. pariſ.* 20.
Phalaris major, ſemine albo. *Bauh. pin.* 28. *Moriſ. hiſt* 3. *p.* 186. *f.* 8. *t.* 3. *f.* 1.

β. Pha-

β. Phalaris major, ſemine nigro. *Bauh. pin.* 28.
γ. Phalaris radice perenni. *Roy. lugdb.* 63.
Phalaris bulboſa, ſemine albo. *Raj. hiſt.* 1249. *Scheuch. gram.* 53.
Habitat in Europa *auſtrali*, Canariis.

2. PHALARIS panicula cylindrica ſpiciformi. *phleoides.*
Phalaris ſpica cylindrica *Fl. ſuec.* 49. *Dalib. pariſ.* 19.
Gramen typhoides aſperum primum. *Bauh. pin.* 4. *Scheuch. gram.* 61. *Hall. helv.* 232.
Habitat in Europæ *verſuris.*

3. PHALARIS panicula oblonga ventricoſa. *arundinacea.*
Phalaris panicula oblonga. *Fl. ſvec.* 48. *Dalib. pariſ.* 19.
Arundo foliis planis, panicula ſpicata, ſpiculis confertis. *Hort. cliff.* 26. *Roy. lugdb.* 66.
Gramen aquaticum paniculatum, phalaridis ſemine. *T. Scheuch. gram.* 126.
Gramen arundinaceum ſpicatum. *Bauh. pin.* 6. *theatr.* 94.
Gramen aquaticum paniculatum latifolium. *Bauh. pin.* 6.
Gramen arundinaceum, aceroſa gluma, jerſerianum. *Raj. angl.* 3. *p.* 400.
β. Gramen paniculatum, folio variegato. *Bauh. pin.* 3. *picta.*
Habitat in Europæ *ſubhumidis ad ripas lacuum.*

4. PHALARIS panicula lineari ſecunda, calycibus bifloris. *erucæformis.*
Dactylis ſpicis numeroſis alternis culmo adpreſſis longitudine internodiorum, calycibus bifloris. *Roy. lugdb.* 57. *Gmel. ſibir.* 1 *p.* 130. *t.* 29.
Gramen paluſtre, locuſtis erucæformibus. *Barr. rar.* 1158. *t.* 2.
Habitat in Sibiria, Ruſſia, Europa *auſtrali.*

5. PHALARIS panicula effuſa, glumarum carinis ciliatis. *oryzoides.*
Oryza glumis carina hiſpidis. *Gron. virg.* 153.
Habitat in Virginiæ *paludibus nemoroſis.*

PANICUM.

* *Spicata.*

1. PANICUM ſpica tereti, involucris ſetaceis faſciculatis unifloris, floſculo quadruplo longioribus. *alopecuroides.*
Gramen geniculatum brevifolium criſpum, ſpica purpuro-ſericea. *Pluk. alm.* 177. *t.* 119. *f.* 1.
Habitat in China.
Spica longa, ferruginea, Floſculi ſparſi, pedunculis bre-

vibus, cincti ſetis longis, erectis; Scapus *infra ſpicam parum villoſus*; pedicelli *omnes uniflori*.

glaucum. 2. PANICUM ſpica tereti, involucellis bifloris faſciculato-piloſis. *Fl. zeyl.* 44.
Gramen alopecuroides maderaſpatanum, ſpica quaſi geniculata molli. *Pluk. alm.* 177. *t.* 190. *f.* 6.
β. Gramen paniceum ſ. Panicum ſylveſtre, ſimplici ſpica *Scheuch. gram.* 46.
γ. Panicum ſpica ſimplici, ariſtis aggregatis floſculo ſubjectis. *Gron. virg.* 134.
Panicum indicum altiſſimum, ſpicis ſimplicibus mollibus in foliorum alis, pediculis longiſſimis inſidentibus. *Tourneſ. inſt.* 515.
Habitat in Indiis. ⊙
Setæ in ſpica longitudine floſculorum. Foliorum *vaginæ oris piloſæ. Dum ſpica recens prodiit* Floſculi *in ſeries diſpoſiti obſervantur.*

americanum 3. PANICUM ſpica ſimplici æquali, pedunculis bifloris. *Roy. lugdb.* 54.
Panicum indicum, ſpica obtuſa cærulea. *Bauh. pin.* 7. *theatr.* 522.
Panicum americanum. *Cluſ. hiſt.* 2. *p.* 215.
Habitat in America.

italicum. 4. PANICUM ſpica compoſita, ſpiculis glomeratis ſetis immixtis, pedunculo hirſuto.
Panicum ſpica compoſita, ariſtis floſculo brevioribus. *Vir cliff.* 7. *Hort. upſ.* 19. *Roy. lugdb.* 54. *Gron. virg.* 134.
Panicum italicum ſ. panicula majore. *Bauh. pin.* 27. *theatr.* 519.
Habitat in Indiis. ⊙

Crusgalli. 5. PANICUM ſpicis alternis conjugatisque, ſpiculis ſubdiviſis, glumis ariſtatis hiſpidis.
Panicum ſpicis alternis remotis declinatis compoſitis. *Vir. cliff.* 7. *Roy. lugdb.* 55. *Dalib. pariſ.* 22.
Panicum ſpicis alternis remotis laxis. *Hort. cliff.* 27.
Gramen paniceum, ſpica diviſa. *Bauh. pin.* 8.
β. Gramen paniceum, ſpica diviſa, ariſtis longis armata. *Bauh. pin.* 8.
Habitat in Europæ, Virginiæ *cultis.* ⊙
Variat ariſtis, in aliis longitudine glumarum, in aliis decies longioribus.

6. PA-

6. PANICUM ſpiculis alternis; rachi lineari membra- *diſſectum.*
nacea extrorſum imbricato-florifera.
Dactylis ſpicis alternis numeroſis patulis, calycibus uni-
floris. *Roy. lugdb.* 56.
Gramen paniceum, ſpica ſimplici ad caulem intervallata
binis granorum ordinibus uno verſu conſtante, ameri-
canum. *Pluk. mant.* 94. *t.* 350. *f.* 2.
Gramen dactylon majus, panicula longa, ſpicis plurimis
nudis craſſis. *Sloan. jam.* 34. *hiſt.* 1. *p.* 112. *t.* 69. *f.* 2.
Habitat in Indiis.

7. PANICUM ſpica dimidiato-ſecunda, rachi lineari *dimidiatum.*
membranacea extrorſum floſculis aggregatis.
Gramen bermudenſe frumentaceum, foliis brevibus ob-
tuſis, ſpica craſſiuſcula compreſſa antrorſum gemino
verſu granifera. *Pluk. phyt.* 244. *f.* 9.
Habitat in India.
Folia *latiſſima vaginis latis.* Spica *ex ſcapi apice mem-
branaceo, plano, cui ad alterum tantum latus* Flores
alternatim conferti divergentes.

8. PANICUM ſpicis aggregatis, baſi interiore nodoſis, *ſanguinale*
floſculis geminis muticis, vaginis foliorum punctatis.
Panicum ſpicis alternis oppoſitisque linearibus paten-
tiſſimis muticis, floſculis alternatim binis: altero pe-
dunculato. *Roy. lugdb.* 55. *Gron. virg.* 154. *Dalib.
pariſ.* 22.
Gramen dactylon, folio latiore. *Bauh. pin.* 8. *theatr.*
114. *Scheuch. gram.* 101.
Gramen dactylon majus, panicula longa e ſpicis pluri-
mis gracilioribus purpureis & viridibus mollibus con-
ſtante. *Sloan. jam.* 3. *hiſt.* 1. *p.* 113. *t.* 70. *f.* 2. *
Habitat in America, Europa *auſtrali.* ⊙

9. PANICUM ſpicis ſubdigitatis approximatis erectis fi- *filiforme.*
liformibus: rachi flexuoſa, dentibus bifloris: altero ſeſſili.
Habitat in America *ſeptentrionali. Kalm.*
Folia *lanceolata.* Culmi *pedales filiformes, ſuperne nudi, e-
recti;* ſpica *filiformis, rara, flexuoſa rachi, alterna-
tim utrinque ad dentes Floſculi 2: altero ſeſſili, alte-
ro pedicellato; Spicæ tenues, primum valde approxi-
matæ quaſi in unum, quamvis alternæ.*

10. PANICUM ſpica compoſita, ſpiculis linearibus ſe- *compoſitum.*
cundis floſculis geminis remotis, calycibus ariſtatis. *Fl.
zeyl.* 42. *
Habitat in Zeylona.

* *Paniculata.*

dichotomum. 11. PANICUM paniculis ſimplicibus, culmo ramoſo dichotomo. *Gron. virg.* 133. *
Habitat in Virginia.
Statura refert arbuſculam inferne ſimplicem, ſuperne faſciculatam.

clandeſtinum. 12. PANICUM racemis occultatis intra foliorum vaginas.
Gramen cyperoides polyſtachyon, ſpicis ad nodos ex foliorum alis prodeuntibus. *Sloan. jam.* 36. *hiſt.* 1. *p.* 120. *t.* 80.
Habitat in Jamaica, Penſylvania. *Kalm.*
Culmi *dichotomi, ramoſi*; Folia *ovato-lanceolata, vaginis punctatis, piloſis, intra quas* Racemi *fructificationum omnino occultantur, ut extus ne veſtigium eorum appareat.*

capillare. 13. PANICUM panicula capillari erecta, foliis piloſis. *Gron. virg.* 13.
Panicum miliaceum viride, foliis latis brevibus, panicula capillacea. *Sloan. jam.* 35. *hiſt.* 1. *p.* 115. *t.* 72. *f.* 3.
Habitat in Virginia, Jamaica.

patens. 14. PANICUM panicula oblonga patente, calycibus bifloris, foliis lineari-lanceolatis.
Tſiama-pullu. *Rheed. mal.* 12. *p.* 75. *t.* 41.
Habitat in India; *ſimilis e* Luſitania.

dactylon. 15. PANICUM ſpicis digitatis patentibus: baſi interiore villoſis, floribus ſolitariis, ſarmentis repentibus.
Gramen dactylon, folio arundinaceo, majus aculeatum. *Bauh. pin.* 7.
Gramen dactylon, radice repente. ſ. officinarum. *Scheuch. gram.* 104.
Gramen legitimum *Cluſ. hiſt.* 2. *p.* 217.
Habitat in Europa *auſtrali.* ♃

miliaceum. 16. PANICUM panicula laxa flaccida, foliorum vaginis pubeſcentibus. *Hort. cliff.* 27. *Hort. upſ.* 20. *Mat med.* 34. *Roy. lugdb.* 55. *Dalib. pariſ.* 22.
Milium ſemine luteo & albo. *Bauh. pin.* 26. *theatr.* 502.
Habitat in India.

latifolium. 17. PANICUM panicula racemis lateralibus ſimplicibus foliis ovato-lanceolatis collo piloſis.

Gra-

Gramen virginianum, lato brevique folio, panicula ratiore. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 196. *ſ.* 8. *t.* 5. *f.* 4.
Gramen miliaceum ſylvaticum maximum, ſemine albo. *Sloan. jam.* 34. *hiſt.* 1. *p.* 114. *t.* 71. *f.* 3.
Habitat in America.
Folia *latitudine Commelinæ, ad fauces amplexicaulia; extus collo circum fauces villoſo, etiam baſi foliorum margine piloſa. Panicula valde mediocris ex racemis lateralibus, non ſubdiviſis, ſed pedicellos proprios, nec ſubdiviſos proferentes.* Flores *mutici, majuſculi.*

18 PANICUM paniculatum, foliorum vaginis longitudinaliter ciliatis. *brevifolium.*
Panicum miliaceum, latiore folio, maderaſpatanum. *Pluk. alm.* 176. *t.* 189. f. 4.
Habitat in India.
Gramen pedale vel bipedale. Folia *ovata, amplexicaulia;* Panicula *tenuiſſima, folio ſupremo & majore compreſſo. Variat foliis anguſtis & lanceolatis.*

19. PANICUM paniculatum ramoſiſſimum, foliis ovato-oblongis acuminatis. *Fl. zeyl.* 43. *arboreſcens.*
Panicum panicula laxa ſparſa, foliorum vaginis glabris. *Hort. cliff.* 27.
Habitat in India.
Altitudine certat cum altiſſimis arboribus; Culmus *vix penna anſerina latior.*

20. PANICUM panicula virgata, glumis acuminatis lævibus extima dehiſcente. *virgatum.*
PANICUM paniculatum, glumis acutis *Gron. virg.* 133.
Habitat in Virginia.

PHLEUM.

1. PHLEUM ſpica cylindrica longiſſima. *Fl. lapp.* 26. *Fl. ſuec.* 50. *Hort. cliff.* 22. *Roy. lugdb.* 53. *Dalib. pariſ.* 20. *pratenſe.*
Gramen typhoides maximum, ſpica longiſſima. *Bauh. pin.* 4. *Scheuch. gram.* 60.
Habitat in Europæ *verſuris & pratis.* ♃

2. PHLEUM ſpica ovato-cylindracea. *Fl. lapp.* 25. *Fl. ſuec.* 51. *Dalib. pariſ.* 20. *alpinum.*
Gramen typhoides alpinum, ſpica brevi denſa & velut villoſa. *Scheuch. gram.* 64.
Habitat in Alpibus ♃

3. PHLE-

arenarium. 3. PHLEUM ſpica ovata ciliata, caule ramoſo. *Hort. cliff.* 23. *it. ſcan.* 109. *Roy. lugdb.* 54.
Gramen typhinum maritimum minus. *R. Pluk. alm.* 177. *t.* 33. *f.* 8.
Habitat in Europæ *locis arenoſis.* ☉
Spica vix abſolute e vagina folii exit.

Schœnoides. 4. PHLEUM ſpicis ovatis obvolutis foliis brevisſimis mucronatis amplexicaulibus.
Gramen maritimum typhinum, brevi & craſſiori ſpica ad ſingula genicula prodeunte ſ. ſecundum. *Scheuch. gram.* 86.
Habitat in Italia, Smyrna, *inque* Hiſpania. *Lœfling.*
Habitus Schœni aculeati foliis floralibus amplexicaulibus, brevibus mucronatis.

ALOPECURUS.

pratenſis. 1. ALOPECURUS culmo ſpicato erecto. *Roy. lugdb* 54. *Fl. ſuec.* 52. *Dalib. pariſ.* 21.
Gramen phalaroides majus ſ. italicum. *Bauh. pin.* 4. *theatr.* 55.
Gramen alopecuro ſimile glabrum cum pilis longiuſculis in ſpica Onocordon. *Bauh. hiſt.* 2. *p.* 475.
β. Gramen typhoides ſpica anguſtiore. *Bauh pin.* 4.
Habitat in Europæ *pratis.* ♃

geniculatus. 2. ALOPECURUS culmo ſpicato infracto. *Fl. ſuec.* 53. *Dalib. pariſ.* 20.
Alopecurus culmo infracto, ariſtis gluma longioribus. *Roy. lugdb.* 54.
Alopecurus ariſtis gluma longioribus. *Fl. lapp.* 37.
Gramen aquaticum geniculatum ſpicatum. *Bauh. pin.* 3. *Scheuch. gram.* 72.
β. Alopecurus ariſtis gluma æqualibus. *Fl. lapp.* 38.
Habitat in Europæ *uliginoſis.* ♃

hordeiformis 3. ALOPECURUS racemo ſimplici, floſculis ariſtis circumvallatis.
Habitat in India.
Habitus omnino Hordei murini. Culmus *pedalis.* Folia *plano-canaliculata, nervoſa, culmo ſæpius longiora.* Spica *racemoſa, longa.* Flores *numeroſi; pedicelli Florum breviſſimi, ſimpliciſſimi.* Calyces *obvallati ſetis ariſtiformibus, numeroſis, floribus triplo longioribus, gluma bivalvi, altera minore.* Corolla *bivalvis glumis oblongis, acuminatis.* Piſtillum *flore longius.* Stamina *tria.*

4. ALO-

4. ALOPECURUS panicula villoſa oblonga folio involuta. *Sauv. monſp.* 37. † *monſpelienſ.*
Gramen alopecurum minus, ſpica longiore. *Bauh. pin.* 4. *theatr.* 57. *Scheuch. gram.* 154.
Gramen alopecurum minus, ſpica vireſcens divulſa. *Barr. ic.* 115. *f.* 1.
Cauda vulpis monſpelienſium, Alopecurus theophraſti. *Lob. ic.* 45.
Habitat Monſpelii.

MILIUM.

1. MILIUM foliis diſperſis. *Flor. ſuec.* 55. *Dalib. pariſ.* 23. *effuſum.*
Milium glumis diphyllis. *Hort. cliff.* 27.
Gramen ſylvaticum, panicula miliacea ſparſa. *Bauh. Pin.* 8. *theatr.* 141. *Scheuch. gram.* 133. *Moriſ. hiſt.* 3. *ſ.* 8. *t.* 5. *f.* 10.
Habitat in Europæ *nemoribus umbroſis.* ♃

2. MILIUM floribus confertis. *Roy. lugdb.* 57. *confertum.*
Gramen paniculatum alpinum latifolium, panicula miliacea ſparſa. *Scheuch. gram.* 134. *Hall. helv.* 220.
Habitat in Helvetiæ *ſylvis.*

AGROSTIS.

* *Ariſtatæ.*

1. AGROSTIS petalo exteriore exſerente ariſtam rectam ſtrictam longiſſimam. *Roy. lugdb.* 59. *Fl. ſuec.* 58. *ſpica venti.*
Gramen ſegetum altiſſimum, panicula ſparſa. C. B. *Scheuch. gram.* 144.
Gramen capillatum. *Bauh. hiſt.* 3. *p.* 462.
Habitat in Europa *inter ſegetes.* ☉

2. AGROSTIS calycum ſquama exteriore ariſtata longiore; interiore acuminata mutica. *Roy. lugdb.* 59. *miliacea.*
Habitat in Europa.

3. AGROSTIS panicula oblonga, petalo exteriore baſi villoſo, ariſta torta calyce longiore. *Fl. ſuec.* 59. * *arundinacea.*
Agroſtis culmo enodi, panicula contracta. *Fl. lapp.* 44.
Gramen avenaceum montanum, panicula anguſta e dilutiſſimo fuſco albicante & papposa. *Scheuch. gram.* 57
Habitat in Europæ *monticulis ſylvoſis glareoſis juniperetis.* ♃

4. AGRO-

rubra. 4. AGROSTIS paniculæ parte florente patentiſſima, petalo exteriore glabro terminato ariſta tortili recurva. *Fl. ſuec.* 60. *Dalib. pariſ.* 24.
Agroſtis panicula inferiore verticillatim laxa; ſuperiore contracta. *Fl. lapp.* 46.
Gramen ſerotinum arvenſe, panicula contracta pyramidali. *Scheuch. gram.* 148.
Habitat in Europæ *arenoſis ſubhumidis.*

canina. 5. AGROSTIS calycibus coloratis, petalorum ariſta dorſali recurva. *Fl. ſuec.* 1138.
Gramen ſupinum caninum paniculatum, folio varians. *Bauh. pin.* 1. *theatr.* 12.
Gramen paniculatum ſupinum ad infima culmorum genicula foliorum capillarium geniculis faſciculatis donatum. *Scheuch. gramen.* 141.
Habitat in Europæ *paſcuis humidiuſculis.* ♃

paradoxa. 6. AGROSTIS floſculis ariſtatis gemellis: altero ſterili, terminalibus ternis. *Sauv. monſp.* 35. †
Gramen avenaceum paniculatum galloprovinciale, aquilegiæ ſemine. *T. Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 214. *n.* 29. *Pluk. alm.* 174. *t.* 32. *f.* 2.
Gramen paniculatum latifolium, locuſtis craſſioribus, ſemine nigro aquilegiæ ſimili. *Tournef. inſt.* 522.
Habitat in Galloprovincia, G. Narbonenſi.

* * *Muticæ.*

ſtolonifera. 7. AGROSTIS paniculæ ramulis divaricatis muticis, culmo repente, calycibus æqualibus.
Agroſtis culmo repente foliis radicalibus breviore, folii ſuprema vagina ventricoſa, floſculis muticis. *Roy. lugdb.* 59. *Fl. ſuec.* 62.
Agroſtis culmo repente, vagina ſupremi folii ventricoſa. *Roy. lugdb.* 59. *Dalib. pariſ.* 23.
Gramen caninum ſupinum minus. *Sheuch. gram.* 128.
Habitat in Europa. ♃

capillaris. 8. AGROSTIS panicula capillari patente, calycibus ſubulatis æqualibus hiſpidiuſculis coloratis, floſculis muticis. *Roy. lugdb.* 59. *Dalib. pariſ.* 23.
Agroſtis panicula tenuiſſima. *Fl. lapp.* 45.
Gramen montanum, panicula ſpadicea delicatiore. *Bauh. pin.* 3. *prodr.* 12. *Scheuch. gram.* 129.
Habitat in Europae *pratis.*
Panicula vere capillaris, tenuiſſimisque pedicellis ſingularis.

9. AGRO-

9. AGROSTIS panicula laxa, calycibus muticis æqua- *alba.*
libus. *Roy. lugdb.* 59.
Habitat in Europae *nemoribus.*

10. AGROSTIS panicula mutica filiformi. *minima.*
Nardus panicula ſpicata, floribus ſolitariis alternis. *Guett. ſtamp,* 155. *Dalib. pariſ.* 155.
Gramen minimum paniculis elegantiſſimis. *Bauh. pin.* 2. *Scheuch. gram.* 40. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 200. *ſ.* 8. *t.* 2. *f.* 10.
Gramen minimum. *Bauh. hiſt.* 2. *p.* 465. *Dalech. hiſt.* 425.
Habitat in Gallia.

11. AGROSTIS panicula contracta mutica, foliis invo- *virginica.*
luto-ſubulatis rigidis exſtantibus. *Clayt. virg.* 507.
Habitat in Virginia.

12. AGROSTIS panicula contracta mutica, racemis la- *indica.*
teralibus erectis alternis.
Gramen pratenſe panicula & foliis anguſtiſſimis, ſpicis brevibus muticis, locuſtis minimis. *Sloan. jam.* 35. *hiſt.* 1. *p.* 115. *t.* 73. *f.* 1.
Habitat in India.
Culmus *erectus.* Folia *plana, anguſta.* Panicula *oblonga e racemis lateralibus, alternis, rachi approximatis; glumis breviſſimis, acutis.*

AIRA.

* *Muticæ.*

1. AIRA ſpica ſubovata ſecunda, floſculis obtuſis muti- *ſpicata.*
cis, foliis planis.
Habitat in India.
Gramen procumbens, digiti longitudine. Folia *plana.* Spica *ſecunda, conglomerata, ovato-oblonga.* Glumæ *obtuſæ, muticæ.*

2. AIRA panicula ſpicata, floribus muticis pedunculo *criſtata.*
longioribus, glumis acuminatis inæqualibus. *Roy. lugdb.* 61. *Dalib. pariſ.* 27.
Gramen, ſpica criſtata ſubhirſutum. *Bauh. pin.* 2. *prodr.* 8. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 194. *ſ.* 8. *t.* 4. *f.* 7. *Scheuch. gram.* 166.
Habitat in Angliæ, Galliæ, Helvetiæ *ſiccioribus.*

3. AIRA foliis planis, panicula coarctata, floribus pedun- *cærulea.*
culatis muticis convoluto ſubulatis. *Fl. ſuec.* 71. *Dalib. pariſ.* 26.

Poa

Poa ſpiculis ſubulatis, panicula rara contracta. *Fl. lapp.* 29. *Roy. lugdb.* 61.

Gramen arundinaceum enode minus ſylvaticum. *Bauh. pin.* 7. *theatr.* 97. *Scheuch. gram.* 209.

Gramen pratenſe ſerotinum, panicula rara purpuraſcente. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 201. *ſ.* 8. *t.* 5. *f.* 22.

Habitat in Europæ *paſcuis aquoſis.* ♃

arundinacea. 4. AIRA panicula oblonga ſecunda mutica imbricata, foliis planis.

Gramen orientale paniculatum, portulacae ſemine. *Tournef. cor.* 39.

Habitat in Oriente.

minuta. 5. AIRA panicula laxa ſubfaſtigiata ramoſiſſima; floſculis muticis. *Læfl.*

Gramen paniculatum arvenſe minimum. *Buxb. cent.* 5. *p.* 35. *t.* 67?

Habitat in Hiſpania *Læfling.* ☉

Differt tantum a Buxbaumiano, quod longe minus, vix pollicem tranſverſum altum.

aquatica. 6. AIRA foliis planis, panicula patente, floribus muticis lævibus calyce longioribus. *Fl. ſuec.* 66. *Dalib. pariſ.* 26.

Aira culmo inferiore repente, floſculis muticis calyce longioribus: altero pedunculato. *Roy. lugdb.* 60.

Gramen aquaticum miliaceum. *Scheuch. gram.* 218. *Vaill. pariſ.* 89. *t.* 17. *f.* 7.

Gramen caninum ſupinum paniculatum dulce. *Bauh. pin.* 2.

Habitat in Europæ *paſcuis aquoſis.* ♃

* * *Ariſtatæ.*

ſpicata 7. AIRA foliis planis, panicula ſpicata, floſculis medio ariſtatis: ariſta reflexa laxiore. *Fl. ſuec.* 65. *

Aira panicula ſpicata, pedicellis floſculo brevioribus. *Fl. lapp.* 47.

Gramen avenaceum paniculatum alpinum humile, locuſtis in ſpicam collectis varicoloribus ariſtatis. *Scheuch. gram.* 221. *prodr.* 24. *t.* 6.

Habitat in Lapponiæ *alpibus.* ♃

cæſpitoſa. 8. AIRA foliis planis, panicula patente, petalis baſi villoſis ariſtatisque: ariſta recta brevi. *Fl. ſuec.* 63.

Aira panicula patentiſſima, floſculis ſubariſtatis ſeſſilibus baſi villoſis, foliis planis. *Act. act. Stockh.* 1742. *p.* 30.

Aira

Aira panicula longiſſima tenui. *Fl. lapp.* 50.
Gramen ſegetum, panicula arundinacea. *Bauh. pin.* 3. *theatr.* 35. *Scheuch. gram.* 244.
Habitat in Europæ *partis cultis & fertilibus.* ♃

9. AIRA foliis ſetaceis, culmis ſubnudis, panicula divaricata, pedunculis flexuoſis. *Fl.ſuec.* 64. *Dalib. pariſ.* 26. *flexuoſa.*
Aira panicula rara, calycibus albis. *Fl. lapp.* 45.
Gramen alpinum nemoroſum paniculatum, foliis anguſtiſſimis, locuſtis ſplendentibus ariſtatis. *Scheuch. gram.* 218. *t.* 6. *f.* 1.
Gramen nemoroſum, paniculis albis, capillaceo folio. *Bauh. pin.* 7. *prodr.* 14. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 200. *ſ.* 8. *t.* 7. *f.* 9.
Habitat in Europæ *petris, rupibus.* ♃

10. AIRA foliis ſetaceis, panicula anguſtata, floſculis baſi piloſis ariſtatis: ariſta tortili longiore. *Fl. ſuec.* 68. *montana.*
Aira panicula rara, calycibus fuſcis. *Fl. lapp.* 49.
Gramen avenaceum paniculatum alpinum, foliis capillaceis brevibus, locuſtis purpuro-argenteis & ariſtatis. *Scheuch. gram.* 216. *t.* 4. *f.* 4.
Gramen avenaceum capillaceum, minoribus glumis. *Bauh. pin.* 10.
Habitat in Europæ *alpinis.* ♃

11. AIRA foliis ſubulatis, panicula denſa, floſculis baſi piloſis ariſtatis: ariſta brevi. *alpina.*
Gramen avenaceum capillaceum, minoribus glumis argenteis vix ariſtatis, foliis anguſtioribus. *Scheuch. gram.* 222.
Habitat in alpibus Lapponicis, Germania.

12. AIRA foliis ſetaceis: ſummo paniculam inferne obvolvente. *Roy. lugdb.* 60. *Fl. ſuec.* 72. *Dalib. pariſ.* 25. *caneſcens.*
Aira foliis ſetaceis, ariſtis e baſi glumarum calycem æquantibus. *Hort. cliff.* 495.
Gramen foliis junceis, radice jubata. *Bauh. pin.* 5. *Scheuch. gram.* 243.
Habitat in Scania *& auſtralioris* Europæ *arvis* ⊙
Ariſta in medio cincta denticulis, infra craſſior fuſca, ſupra tenuior ſubclavata albida. Panicula ante floreſcentiam ſpicata.

13. AIRA foliis ſetaceis: vaginis angulatis, floribus paniculato-ſpicatis, floſculis baſi ariſtatis. *It. ſcan.* 226. * *præcox.*

Gramen minimum, ſpica brevi habitiore, noſtrum. *Scheuch. gram.* 219.

Gramen parvum præcox, panicula laxa caneſcente. *Raj. angl.* 3. *p.* 407. *t.* 22. *f.* 2. *Pluk. alm.* 177. *t.* 33. *f.* 9.

Habitat in Europæ *auſtralioris campis arenoſis innundatis.* ☉

caryophyllea. 14. AIRA foliis ſetaceis, panicula divaricata, floribus ariſtatis diſtantibus.

Aira foliis ſubulatis, ariſtis a baſi floſculorum tortilibus, floſculo altero pedunculato. *Roy. lugdb.* 60. *Dalib. pariſ.* 26.

Gramen phalaroides ſparſa panicula minimum anguſtifolium. *Barr. rar.* 1218. *t.* 44. *f.* 1.

Gramen paniculatum, locuſtis purpuro-argenteis, annuum. *Raj. angl.* 3. *p.* 407. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 200. *ſ.* 8. *t.* 5. *f.* 11.

Gramen paniculatum minimum molle *Magn. monſp.* 296. *Scheuch. gram.* 215.

Caryophyllus arvenſis glaber minimus. *Bauh. prodr.* 105.

Habitat in Angliæ, Germaniæ, Galliæ *glareoſis.* ☉

MELICA.

ciliata. 1. MELICA petalis exterioribus ciliatis. *It. gotl.* 297. *Fl. ſuec.* 56.

Melica floribus horizontaliter patentibus. *Roy. lugdb.* 57.

Gramen avenaceum montanum lanuginoſum. *Bauh. pin.* 10.

Gramen avenaceum, ſpica ſimplici, locuſtis denſiſſimis candicantibus & lanuginoſis. *Scheuch. gram.* 174.

Habitat in Europæ *collibus ſterilibus ſaxoſis.* ♃

nutans. 2. MELICA petalis imberbibus, panicula nutante ſimplici.

Melica petalis imberbibus. *Fl. ſuec.* 57. *Dalib. pariſ.* 23.

Melica floribus ſub culmo pendulis. *Fl. lapp.* 36. *Roy. lugdb.* 57.

Gramen montanum avenaceum, locuſtis, rubris. *Bauh. pin.* 10. *prodr.* 20.

Gramen montanum avenaceum ſpicatum *Bauh. pin.* 10.

Gramen avenaceum, locuſtis rarioribus. *Bauh. pin.* 10

Habitat in Europæ *frigidioris rupibus.*

altiſſima. 3. MELICA petalis imberbibus, panicula ramoſiſſima. *Hort upſ.* 20.

Me-

Melica floſculis glabris; ſummo urceolari. *Gmel. ſib.* 1. *p.* 98. *t.* 20.

Gramen avenaceum, locuſtis rarioribus muticis, virginianum majus. *Moriſ hiſt.* 3. *p.* 216. *ſ.* 8. *t.* 7. *f.* 51.

Habitat in Sibiria, Canada. ♃

POA.

1\. POA panicula diffuſa, ſpiculis ſexfloris linearibus. *Fl. ſuec.* 73. *Dalib. pariſ.* 29. *aquatica.*

PAO panicula diffuſa, ſpiculis ſexfloris linearibus muticis compreſſis. *Act. ſtockh.* 1741. *p.* 185.

Poa panicula contracta, ſpicis ovatis tereriuſculis. *Hort. cliff.* 494. *Roy. lugdb.* 61.

Gramen paluſtre paniculatum altiſſimum. *Bauh. pin.* 2. *theatr.* 38. *Scheuch. gram.* 191.

Gramen aquaticum paniculatum latifolium. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 201. *ſ.* 8. *t.* 6. *f.* 25.

Habitat in Europa *ad ripas piſcinarum, fluviorum.* ♃

2\. POA panicula diffuſa ramoſiſſima, ſpiculis ſexfloris cordatis. *Fl. ſuec.* 79. *Dalib. pariſ.* 28. *alpina.*

Gramen alpinum paniculatum majus, panicula ſpecioſa variegata. *Scheuch. gram.* 186. *Hall. helv.* 214.

β. Gramen alpinum latifolium, panicula laxa foliacea, foliolis in panicula paucioribus & magis criſpis. *Scheuch. gram.* 212. *vivipara.*

Habitat in alpibus Lapponicis, Helveticis. ♃

An hæc α. β. ſequentis tantum varietas.

3\. POA panicula diffuſa, ſpiculis quinquefloris baſi pubeſcentibus, culmo erecto tereti. *Fl. ſuec.* 78. *Dalib. pariſ.* 28. *trivialis.*

Gramen pratenſe paniculatum medium. *Bauh. pin.* 2. *Scheuch. gram.* 180.

Habitat in Europae *paſcuis.*

4\. POA panicula diffuſa, ſpiculis quadrifloris pubeſcentibus, culmo erecto tereti. *Fl. ſuec.* 77. *Dalib. pariſ.* 28. *anguſtifolia.*

Poa ſpiculis ovato-oblongis, foliis ſubulatis. *Fl. lapp.* 52.

Gramen pratenſe paniculatum majus, anguſtiore folio. *Bauh. pin.* 2. *prodr.* 5. *Scheuch. gram.* 178.

Habitat in Europa *ad agrorum verſuras.* ♃

5\. POA panicula diffuſa, ſpiculis trifloris glabris, culmo erecto tereti. *Fl. ſuec.* 76. *Dalib. pariſ.* 27. *pratenſis.*

Poa ſpiculis ovatis compreſſis muticis. *Fl. lapp.* 51. *Hort. cliff.* 27. *Roy. lugdb.* 61.

Gramen pratenſe paniculatum majus (latiore folio. *Bauh. pin.* 2.) *Scheuch. gram.* 177.

Habitat in Europae *pratis fertiliſſimis.*

Limites pro ſpeciebus 2. 3. 4. 5. *rite diſcernendis vix dum perſpicue evicti ſunt.*

annua. 6. POA panicula diffuſa angulis rectis, ſpiculis obtuſis, culmo obliquo compreſſo. *Fl. ſuec.* 75. *Dalib. pariſ.* 28.

Gramen pratenſe paniculatum minus. *Bauh. pin.* 2. *theatr.* 31.

β. Gramen pratenſe paniculatum minus rubrum. *Tournef inſt.* 522.

Habitat in Europa *ad vias.* ☉

flava. 7. POA panicula diffuſa, ſpiculis ovato-oblongis nitidis *Gron. virg.* 13.

Gramen pratenſe majus virginianum. *Pet muſ.* 239.

Habitat in Virginia.

piloſa. 8. POA panicula patente ſtricta; ramificationibus primariis piloſis.

Gramen, paniculis elegantiſſimis, majus, locuſtis purpuro-ſpadiceis minoribus. *Scheuch. gram.* 193.

Habitat in Italia.

amabilis. 9. POA panicula patente, ſpiculis octifloris linearibus. *Fl. zeyl.* 46. *

Gramen paniculatum ex oris malabaricis, panicula delicatiore. *Pluk. alm.* 176. *t.* 300. *f.* 3.

Habitat in India.

Eragroſtis. 10. POA panicula patente, pedicellis flexuoſis, ſpiculis ſerratis decemfloris.

Gramen, paniculis elegantiſſimis, minimum. *Scheuch. gram.* 192.

Gramen Phalaroides, ſparſa brizæ panicula, minus. *Barr. ic. t.* 44. *f.* 2.

Habitat in Italia *ſupra muros. D. Baeck.*

capillaris. 11. POA panicula laxa patentiſſima capillari, foliis piloſis, culmo ramoſiſſimo.

Poa panicula laxa erecta ſtricta, ſpiculis erectis oblongis. *Gron. virg.* 136.

Gramen paniculatum virginianum, locuſtis minimis. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 202. *ſ.* 8. *t.* 6. *f.* 33.

Ha-

Habitat in Virginia, Canada. *D. Kalm.*
Panicula capillacea, ſtrictiſſima, patentiſſima, ramoſiſſima. Spiculæ ex floſculis 4, 5 ſ. 6, minimæ. Folia ad baſin pilis longis raris. Culmus ramoſus.

12. POA paniculæ ramis ſimpliciſſimis, floribus ſeſſilibus, *malabarica.* ſeminibus diſtantibus, culmo repente.
Tſiama-pullu. *Rheed. mal.* 12. *p.* 83. *t.* 45.
Habitat in Indiæ *arenoſis.*

13. POA paniculæ ramis ſimpliciſſimis, floribus ſeſſilibus *chinenſis.* ſeminibus imbricatis, culmo erecto.
Habitat in India. *Osbeck.*
Rami paniculæ ſimpliciſſimi, ut in antecedente, magis conferti, Flores minores; Floſculi 4 nec ſeptem.

14. POA panicula oblonga ſubverticillata, floſculis ſex- *tenella.* floris.
Habitat in India.
Gramen bipedale, Foliis longis. Panicula anguſtata, ramulis confertiſſimis, ſubramoſis & fere verticillata apparent; Flores tam parvi, ut nudis oculis vix floſculi numerentur.

15. POA panicula coarctata ſecunda, culmo obliquo com- *compreſſa.* preſſo. *Fl. ſuec.* 74. *It. gotl.* 178. *Dalib. pariſ.* 28.
Poa ſpiculis ovatis compresſis muticis, panicula ſecunda coarctata. *Act. ſtockh.* 1741. *p.* 184.
Gramen murorum, radice repente. *Bauh. pin.* 2. *prodr.* 2.
Gramen paniculatum, radice repente, culmo compreſſo, locuſtis diſtichis pulchellis. *Scheuchz. gram.* 198.
Habitat in Europae & Americae *ſeptentrionalis ſiccis, muris, tectis.* ♃.
Americana floſculis ſæpius ternis, Europæa vero ſenis, habitus tamen idem & ſtructura.

16. POA panicula attenuata, ſpiculis ſub-bifloris mucrona- *nemoralis.* tis ſcabris, culmo incurvo.
Gramen ſylvaticum, panicula tenui e raris locuſtis compoſita. *Dill. ſpec.* 57.
Gramen paniculatum anguſtifolium alpinum, locuſtis rarioribus & anguſtioribus non ariſtatis. *Scheuch. gram.* 164. *t.* 2.
Gramen loliaceum alpinum, paniculis ex rarioribus & exiguis locuſtis compoſitum. *Mont. gram.* 39.
β. Gramen cirrhoſa & villoſa ſpongia ad ſingula genicula

la donatum, paniculatum minimum alpinum. *Bocc. muſ.* 2. *p.* 70. *t.* 59.
Habitat in Europa *ad radices montium umbroſas*

bulboſa. 17. POA panicula ſecunda patentiuſcula, ſpiculis quadrifloris.
Poa culmorum baſi tuberoſa. *Guet. ſtamp.* 1 *p.* 168. *Dalib. pariſ.* 29.
α. Gramen xerampelinum, miliacea prætenui ramoſaque ſparſa panicula ſ. Xerampelino congener arvenſe æſtivum, Gramen minutiſſimo ſemine *Lob. illuſtr.* 14. *Scheuch. gram.* 185.
β. Gramen arvenſe, panicula criſpa. *Bauh. pin.* 3 *Barr. ic.* 703.
Gramen arvenſe anguſtifolium, panicula denſa foliacea: foliolis in panicula anguſtiſſimis. *Scheuch. gram.* 211.
γ. Gramen vernum, radice aſcalonica. *Vail. pariſ.* 91. *t.* 17. *f.* 8.
Habitat in Gallia.
In α. *culmi ſemper inclinati; in* γ. *Glumæ inæquales; aliæ latæ planæ, aliæ contractæ longiores. Læfl.*

BRIZA.

minor. 1. BRIZA ſpiculis triangulis, calyce floſculis (7) longiore. *Hort. cliff.* 23. *Roy. lugdb.* 63.
Gramen tremulum minus, panicula parva. *Bauh. pin.* 2. *prodr.* 4.
Habitat in Helvetia, Italia.

media. 2. BRIZA ſpiculis ovatis, calyce floſculis (7) breviore. *Hort. cliff.* 23. *Fl. ſuec.* 80. *Roy. lugdb.* 63.
Gramen tremulum majus. *Bauh. pin.* 2. *Scheuch. gram.* 204.
Habitat in Europæ *partis ſiciccoribus.*

maxima. 3. BRIZA ſpiculis cordatis, floſculis ſeptendecim. *Hort. cliff.* 23. *Hort. upſ.* 20. *Roy. lugdb.* 63.
Gramen tremulum maximum *Bauh. pin.* 2. *Scheuch. gram.* 204.
Habitat in Italia, Luſitania.

Eragroſtis. 4. BRIZA ſpiculis lanceolatis, floſculis viginti.
Briza panicula ſpicata, ſpiculis lanceolatis. *Guett. ſtamp.* 1. *p.* 163.
Uniola calycibus diphyllis, ſpiculis ovato-lanceolatis. *Gron. virg.* 136.

Gra-

Gramen paniculis elegatiſſimis. *Bauh. pin.* 2. *Scheuch. gram.* 194. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 204. *ſ.* 8. *t.* 6. *f.* 52.
Gramen Eranthemum ſ. Eragroſtis. *Barr. rar. t.* 43.
Habitat in Europa *auſtrali ad agrorum verſuras.*

UNIOLA.

1. UNIOLA paniculata. *paniculata.*
Uniola calycibus polyphyllis. *Gron. virg.* 136
Uniola. *Hort. cliff.* 23. *Roy. lugdb.* 63.
Gramen myloicophorum oxyphyllon carolinianum. *Pluk. alm.* 173. *t.* 32. *f.* 6. *Cateſb. car* 1. *p.* 32. *t.* 32.
Habitat in Carolina.

2. UNIOLA ſubſpicata, foliis involutis rigidis. *ſpicata.*
Gramen parvum maritimum ſpicatum, foliis anguſtis rigidis. *Clayt.* 507.
Habitat in Americæ *borealis maritimis.*
Culmus ſpithameus, Foliis alternis rigidis involuto-mucronatis. Panicula minima, coarctata ut vix ſignum pedicellorum, ſecunda; calyx & glumæ carinatae floſculis quatuor.

DACTYLIS.

1. DACTYLIS ſpicis ſparſis ſecundis ſcabris numeroſis. *cynoſureides.*
Gramen maritimum, ſpica craſſa dactyloide terminali, odore rancido, culmo albo. *Gron. virg.* 135.
β. Dactylis ſpicis alternis ſecundis incifis erectis approximatis, calycibus unifloris ſubulatis. *Gron. virg.* 134.
Habitat in Virginia, Canada, Luſitania. ♃
Culmus bipedalis, arundinaceus. Folia in culmo ſex, lata, culmo longiora, læviſſima margine ſcabra, incurva, pagina interiore glauciore. Spicæ ſex ſ. plurimæ, ſecundæ, divergentes, paleaceæ; floſculis imbricatis latere poſtico ſcabris. Calycibus unifloris carina ſcabris, mucronatis, floſculo longioribus, ſeſſilibus, ſecundis. Piſtillis villoſis longioribus.

2. DACTYLIS panicula ſecunda glomerata. *glomeratus.*
Cynoſurus panicula ſecunda glomerata. *Fl. ſuec.* 85.
Poa floſculis confertis uno verſu diſpoſitis. *Hort. cliff.* 78. *Roy. lugdb.* 62.
Gramen ſpicatum, folio aſpero. *Bauh. pin.* 3. *prodr.* 9. *Scheuch. gram.* 299.
Habitat in Europæ *cultis ruderatis.*

CYNOSURUS.

criſtatus. 1. CYNOSURUS bracteis pinnatifidis. *Hort. cliff.* 493. *Fl. ſuec.* 81. *Roy. lugdb.* 64.
Gramen pratenſe criſtatum, ſ. ſpica criſtata lævi. *Bauh. pin.* 2. *prodr.* 8. *Scheuch gram.* 79.
Habitat in Europæ *pratis.*

echinatus. 2. CYNOSURUS bracteis pinnato-paleaceis ariſtatis. *Roy. lugdb.* 64.
Gramen alopecuroides, ſpica aſpera. *Bauh. pin.* 4. *Scheuch. gram.* 80.
Gramen alopecurum, ſpica aſpera. *Barr. rar. t.* 123.
Habitat in Europa *auſtraliori.*

Lima. 3. CYNOSURUS ſpica ſecunda, calycis gluma interiore ſpiculis ſubjecta. *Læfl.*
Habitat in Hiſpania. ☉
Gramen vix ſpithameum. Foliorum vaginæ tumidiuſculæ, folio ipſo parvo. Spica ſecunda, arcte imbricata, oblonga, ex floribus ſecundis, ſeſſilibus, duplici ſerie, compreſſo carinatis: calycina valvula exteriore compreſſa, majore; flores ſinguli conſtant floſculis 5.

durus. 4. CYNOSURUS ſpiculis alternis ſecundis ſeſſilibus rigidis pedicellatis.
Gramen arvenſe, polypodii panicula craſſiore. *Barr. rar.* 1213. *t.* 50.
Habitat in Europa *auſtrali.*

cæruleus. 5. CYNOSURUS bracteis integris. *Hort. cliff.* 495. *Fl. ſuec.* 82. *Roy. leid.* 64.
Gramen glumis variis. *Bauh. pin.* 10. *prodr.* 21. *Scheuch. gram.* 83.
Habitat in Europæ *paſcuis uliginoſis.* ♃

ægyptius. 6. CYNOSURUS ſpicis quaternis obtuſis dimidiatis, calycibus mucronatis.
Cynoſurus ſpicis quaternis terminalibus horizontalibus. *Roy. lugdb.* 64.
Gramen iſchæmum malabaricum ſpecioſius, longioribus mucronatis foliis. *Pluk. alm.* 175. *t.* 300. *f.* 8.
Gramen Dactylon ægyptiacum. *Bauh. pin.* 7. *theatr.* 110. *Roy. lugdb.* 109. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 184. *ſ.* 8. *t.* 3. *f.* 7. *Scheuch. gram.* 109.
Habitat in Africa, Aſia, America.

indicus. 7. CYNOSURUS ſpicis digitatis linearibus, floribus ovato-lanceolatis.

Cyno-

Cynoſurus ſpicis aggregatis terminalibus deorſum ariſtatis. *Roy. lugdb.* 65.
Gramen Dactyloides ſpicis deorſum ariſtatis. *Burm. zeyl.* 106. *t.* 47. *f.* 1.
Gramen dactylon americanum minus. *Scheuch. gram.* 107.
Habitat in Indiis.

8. CYNOSURUS panicula ſubſpicata, floſculis ſimplicibus biariſtatis. *paniceus.*
Panicum floribus conglomerato-ſpicatis lævibus ariſta dimidio brevioribus. *Fl. ſuec.* 54.
Panicum ſpica compoſita, ariſtis ſpica longioribus. *Virid. cliff.* 7. *Roy. lugdb.* 55.
Panicum ſpiculis ſpicatis ſcabritie adhærentibus. *Hor. cl.* 27.
Gramen paniceum, ſpica aſpera. *Bauh. pin.* 8. *Scheuch. gram.* 47.
Habitat in Europæ *agris cultis.* ☉

9. CYNOSURUS paniculæ ſpiculis ſterilibus pendulis ternatis, floribus ariſtatis. *aureus.*
Gramen barcinonenſe, panicula denſa aurea. *Tournef. inſt.* 523.
Gramen panicula pendula aurea. *Bauh. pin.* 3. *theatr.* 33. *Scheuch. gram.* 149.
Gramen ſciurum ſ. alopecurum minus, heteromalla panicula. *Barr. rar.* 1180. *t.* 4.
Habitat in Europa *auſtrali.*
Spiculæ *ternatae, ſteriles; Calyce bivalvi, lineari, acuminato, involvente Glumas ſolitarias, alternas, ovatas, obtuſas, concavas, abſque valvula minore, ſtaminibus aut piſtillis; nequeunt commode dici flores, ſed potius pro involucris haberi; Flores bini ad baſin ſpicularum, Calyce lineari, longitudine floſculorum, bifloro; Floſculo inferiori ſeſſili: Gluma exteriore ovata, infra apicem ariſta longa recta; interiore anguſtiſſima.* Floſculus alter, *pedunculo longitudine floſculi prioris, minor, ſimillimus; tertii floſculi ſolum rudimentum apparet.*

FESTUCA.

* *Panicula ſecunda.*

1. FESTUCA panicula ſecunda coarctata ariſtata, culmo tetragono nudiuſculo, foliis ſetaceis. *Fl. ſuec.* 95. *ovina.*
Poa foliis ſetaceis compreſſis: caulino latiore, panicula

contracta ſecunda, corollis acuminato-ariſtatis. *Act. ſtockh.* 1741. *p.* 164.

Poa foliis ſetaceis, panicula ramoſa, floribus petiolatis antrorſum ſpectantibus, glumis ſubulatis. *Roy. lugdb.* 62.

Poa ſpiculis ovato-anguſtis ariſtato-acuminatis. *Fl. lapp.* 55.

Gramen foliis junceis brevibus, majus, radice nigra. *Bauh. pin.* 5 *prodr.* 34. *Scheuch. gram.* 279.

Habitat in Europæ *collibus apricis aridis vulgatiſſimum.* ♃

β. Feſtuca ſpiculis viviparis. *Fl. ſuec.* 94.

Gramen paniculatum ſparteum alpinum, panicula anguſto-ſpadiceo viridi, proliferum. *Scheuch. gram.* 213. *t.* 1.

Habitat in Alpibus Lapponiæ, Helvetiæ, Scotiæ. ♃

duriuſcula. 2. FESTUCA panicula nutante inferne ramoſa, ſpicis adſcendentibus hiſpidis, foliis ſetaceis. *Roy. lugdb.* 68.

Gramen pratenſe, panicula duriore laxa unam partem ſpectante. *Raj. hiſt.* 1286. *Scheuch. gram.* 285.

Gramen tenue duriuſculum & pene junceum. *Bauh. hiſt.* 2. *p.* 463.

Habitat in Europæ *pratis ſiccis.*

rubra 3. FESTUCA panicula ſecunda ſcabra, ſpiculis ſexfloris ariſtatis: floſculo ultimo mutico, culmo ſemitereti. *Fl. ſuec.* 93.

Gramen alpinum pratenſe, panicula duriore laxa ſpadicea: loculis majoribus. *Scheuch. gram.* 287.

Habitat in Europæ *ſterilibus ſiccis.*

Magnitudine, colore maturitatis rubro, culmo tereti ſed altero latere planiuſculo, diſtingvitur a F. ovina.

amethyſtina. 4. FESTUCA panicula ſpicata, ſpiculis uno verſu inclinatis ſubmuticis. *Roy. lugdb.* 68.

Gramen montanum, foliis capillaribus longioribus, panicula heteromalla ſpadicea & velut amethyſtina. *Scheuch. gram.* 276.

Gramen paniculatum elatius, ſpicis longis muticis ſquamoſis. *Raj. hiſt.* 1286. *angl.* 3. *p.* 411.

Habitat in Italia, Gallia, Anglia.

myuros. 5. FESTUCA panicula ſpicata nutante, calycibus minutiſſimis muticis, floribus ſcabris. *Roy. leid.* 68.

Gramen feſtuceum myurum, minori ſpica heteromalla. *Barr. ic. t.* 99. *f.* 1.

Gra-

Gramen murorum, ſpica longiſſima. *Raj. angl.* 3. *p.* 415. *hiſt.* 286. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 215. *ſ.* 7. *t.* 43.
Habitat in Anglia, Italia.

6. FESTUCA panicula ſubnutante ſecunda, pedunculis incraſſatis, ariſtis calycinis longitudine floſculorum. *incraſſata.*
Gramen feſtuceum myurum ciliatum, ſpica heteromalla, gracili. *Barr. ic. t.* 99. *f.* 2. *Scheuch. gram.* 293?
Habitat in Hiſpania.
Singulare quod pedunculi membranacei floribus fere craſſiores. Calycinae ariſtae non breviores ariſtis floſculorum.

7. FESTUCA panicula ſecunda: ſpiculis erectis: calycis altera valvula integra; altera acuminata. *bromoides.*
Feſtuca ſpicis erectis ad unum latus, palea altera calycina minima, altera acuminata. *Roy. lugdb.* 68.
Gramen paniculatum bromoides minus, paniculis ariſtatis unam partem ſpectantibus. *Raj. angl.* 3. *p.* 415. *hiſt.* 1287. *Pluk. alm.* 174. *t.* 33. *f.* 10. *Scheuch. gram.* 297.
Habitat in Anglia, Gallia.

* *Panicula æquali.*

8. FESTUCA panicula erecta, ſpiculis ſubovatis muticis, calyce floſculis majore, caule decumbente. *Fl.* 92. *It. ſcan.* 226. *decumbens*
Gramen montanum avenaceum, locuſtis muticis tumentibus, piloſum. *Scheuch. gram* 170.
Gramen avenaceum parvum procumbens, paniculis non ariſtatis. *Raj. angl.* 3. *p.* 408. *hiſt.* 1288. *Pluk. alm.* 174. *t.* 34. *f.* 1. *Mont. prodr.* 53. *t.* 2. *f.* 1.
Habitat in Europæ *paſcuis ſiccis ſterilibus.*

9. FESTUCA panicula ſecunda erecta, ſpiculis ſubariſtatis exterioribus teretibus. *Fl. ſuec.* 91. *elatior.*
Feſtuca panicula ſpicata, ſpiculis uno verſu inclinatis ſubmuticis. *Roy. lugdb.* 68.
Gramen pratenſe majus, locuſtis tumidis. *Buxb. cent.* 5. *p.* 41. *t.* 16.
Habitat in Europæ *pratis fertiliſſimis.*

10. FESTUCA panicula ramoſa erecta, ſpiculis ſubſeſſilibus teretibus muticis. *Fl. ſuec.* 90. *fluitans.*
Poa ſpiculis oblongis erectis *Hort. cliff.* 28. *Roy. lugdb.* 62.
Gramen aquaticum fluitans, multiplici ſpica. *Bauh. pin.* 2. *theatr.* 41. *Scheuch. gram.* 199.
Habitat in Europæ *foſſis & paludibus.*

11. FE-

criſtata. 11. FESTUCA panicula ſpicata lobata, ſpiculis ovatis latis ſexfloris hirſutis. *Lœfl.*

Habitat in Luſitaniæ *collibus ſterilibus.*

Culmi e radice plurimi, vix digiti longitudine. Panicula ſubſpicata, fere ovata, diverſa ab Aira criſtata floſculis pluribus iisque hirſutis, culmo breviore, facie autem accedit.

BROMUS.

ſecalinus. 1. BROMUS panicula patente, ſpiculis ovatis: ariſtis rectis. *Fl. ſuec.* 84.

Feſtuca culmo paniculato, ſpicis compreſſo-ovatis. *Fl. lapp.* 28. *Roy. lugdb.* 67.

β. Feſtuca graminea, glumis hirſutis. *Bauh. pin.* 9. *theatr.* 143. *Scheuch. gram.* 250.

Gramen avenaceum ſegetale majus, gluma turgidiore. *Moriſ. hiſt.* 3. *ſ.* 8. *t.* 7. *f.* 16.

Habitat in Europæ *agris ſecalinis arenoſis.* ☉

ſquarroſus. 2. BROMUS panicula patula, ſpicis ovatis: ariſtis divaricatis.

Feſtuca graminea, glumis vacuis. *Scheuch. gram.* 251. *t.* 5. *f.* 11.

Gramen avenaceum, locuſtis amplioribus candicantibus glabris & ariſtatis. *Tournef. inſt.* 525.

Gramen phalaroides aceroſum, nutante ſpica. *Barr. ic.* 24. *f.* 1.

Habitat in Gallia, Helvetia, Sibiria.

purgans. 3. BROMUS panicula nutante criſpa, foliis utrinque nudis: vaginis piloſis, glumis villoſis.

Gramen bromoides catharticum. *Few. peruv.* 705. t. 1?

Habitat in Canada. *Kalm.* ♃

Culmus ſesquipedalis, firmus. Folia latitudine arundinis, carinata, viridia, ſupra fere nuda, ſubtus omnino glabra. Vaginae foliorum retrorſum piloſae. Panicula criſpa, flexuoſa, nutans. Spiculae floſculis 8 ad 14, oblongae. Glumae pilis breviſſimis undique extus villoſae. Ariſta ſub apice glumae exterioris. Differt noſtra a Fewillaei radicibus fibroſis nec ſquamoſis: ſpiculis anguſtioribus.

ciliatus. 4. BROMUS panicula nutante, foliis utrinque vaginisque ſubpiloſis, glumis ciliatis.

Habitat in Canada *ex ſemine. D. Kalm.*

Culmi tenues. Folia utrinque & vaginae vix manifeſte pubeſcentes. Panicula valde nutans, non criſpis pedunculis.

culis. Spiculæ oblongæ, compreſſæ, petalorum marginibus (non dorſo) valde piloſis, qua nota facile diſtinguitur. Floſculi 8, ſub apice ariſtati: calyces nudi. Glumæ corollae lanceolatae.

5. BROMUS panicula patula, ſpiculis oblongis diſtichis, glumis ſubulato-ariſtatis. *ſterilis.*
Feſtuca avenacea ſterilis elatior. *Bauh. pin* 9. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 212. *ſ.* 8. *t.* 7. *ſ.* 11.
Gramen avenaceum, panicula ſparſa, locuſtis majoribus & ariſtatis. *T. Scheuch. gram.* 258.
Habitat in Europæ *auſtralioris agris, ſylvis.*

6. BROMUS panicula nutante, ſpiculis ovato-oblongis. *Fl. ſuec.* 85. *arvenſis.*
Bromus culmo paniculato, ſpicis compreſſis. *Fl. lapp.* 27. *Hort. cliff.* 25.
Feſtuca graminea, juba affuſa. *Bauh. pin.* 192.
Feſtuca avenacea ſterilis elatior circa Upſaliam. *Rudb. elyſ.* 1. *p.* 87. *f.* 7. *opt.*
Gramen avenaceum villoſum, locuſtis amplioribus viridantibus margine argenteo cinctis ariſtatis. *T. Scheuch. gram.* 253
Ægilops major, caule & foliis arundinaceis, locuſtis glabrioribus & anguſtioribus e fuſco xerampelinis. *Dill. app.* 60.
Habitat in Europa *ad verſuras agrorum.* ☉

7. BROMUS panicula nutante, ſpiculis linearibus. *Fl. ſuec.* 86. *tectorum.*
Gramen avenaceum, locuſtis villoſis anguſtis candicantibus & ariſtatis. *Tournefort. inſt.* 526.
Gramen avenaceum, locuſtis villoſis anguſtis candicantibus & ariſtatis. *T. Scheuch. gram.* 254.
Habitat in Europæ *collibus ſiccis & tectis terreſtribus* ☿

8. BROMUS panicula erecta coarctata. *Fl. ſuec.* 87. *hordeaceus.*
Feſtuca avenacea ſterilis humilior. *Bauh. pin.* 10.
Gramen avenaceum pratenſe, panicula ſquamata & villoſa. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 213. *ſ.* 8. *t.* 7. *f.* 18. ?
Habitat in Europæ *collibus aridiſſimis ſabuloſis.* ☉

9. BROMUS panicula nutante, ſpiculis quadrifloris ariſtis brevioribus. *giganteus.*
Gramen ſylvaticum glabrum, panicula recurva. *Vaill. pariſ.* 93. *t.* 18. *f.* 3.
β Bromus paniculæ ramis conjugato-binatis. *Fl. ſuec.* 88.
Feſtu-

Feſtuca foliis digiti latitudine longiſſimis, panicula laxa. *Roy. lugdb.* 69.
Gramen bromoides aquaticum latifolium, panicula ſparſa tenuiſſima ariſtata. *Scheuch. gram.* 264.
Habitat in Europæ *ſylvis ſiccis.* ♃

pinnatus. 10. BROMUS culmo indiviſo, ſpiculis alternis ſubſeſſilibus teretibus. *Fl. ſuec.* 89. *it. gotl.* 180.
Feſtuca culmo alternatim ſpicato, ſpicis teretibus. *Fl. lapp.* 29. *Roy. lugdb.* 67.
Gramen, ſpica brizæ, majus. *Bauh. pin.* 9. *prodr.* 19. *theatr.* 133.
Habitat in Europæ *ſylvis montoſis aſperis.* ♃

criſtatus. 11. BROMUS ſpiculis diſtiche imbricatis ſeſſilibus depreſſis. *Plant. camtſch.* 1. *
Feſtuca culmo ſpicato, ſpiculis multifloris. *Gmel. ſibir.* 1. *p.* 115. *t.* 22.
Gramen triticeum, ſpica latiore compacta, criſtatum. *Buxb. cent.* 1. *p.* 32. *t.* 50. *f.* 3.
Habitat in Sibiria, Tataria. ♃

STIPA.

pennata. 1. STIPA ariſtis lanatis.
Feſtuca ariſtis paniculæ circiter longitudine plumoſis. *Roy. lugdb.* 68.
Gramen ſpicatum, ariſtis pennatis. *Tournef. inſt.* 518. *Scheuchz. gram.* 153.
Gramen ſparteum pennatum. *Bauh. pin.* 5. *theatr.* 70.
Spartum auſtriacum. *Cluſ. hiſt.* 2. *p.* 221.
Habitat in Auſtria, Gallia.

juncea. 2. STIPA ariſtis nudis, calycibus ſemine longioribus.
Feſtuca ariſtis circiter longitudine paniculæ nudis. *Roy. lugdb.* 68.
Feſtuca junceo folio. *Bauh. pin.* 9. *Theatr.* 145. *Scheuch. gram.* 151.
Feſtuca longiſſimis ariſtis. *Bauh. pin.* 10. *theatr* 153.
Habitat in Helvetia, Gallia.

avenacea. 3. STIPA ariſtis nudis, calycibus ſemen æquantibus.
Andropogon folio ſuperiore ſpathaceo, pedunculis lateralibus oppoſitis unifloris, ariſtis flexuoſis. *Gron. virg.* 153.
Habitat in Virginia.
Culmi *tenues*. Folium *ſummum ventricoſum longitudine pani-*

paniculae. Panicula *pedunculis conjugatis*, *unifloris.* Calycis *gluma uniflora*, *pallida*, *bivalis*, *aequalis.* *Corollae ariſta terminali*, *contorta baſi articulata*, *nuda*, *longitudine pedunculorum.* *Gramen hoc Avena ſativa minus eſt.*

AVENA.

1. AVENA paniculata, calycibus unifloris, ſeminibus hirſutis, ariſtis calyce triplo longioribus. *ſibirica.*
   Feſtuca glumis villoſis, ariſtis calyce triplo longioribus. *Gmel. ſibir.* 1. *p.* 113. *t.* 22.
   Habitat in Sibiria.

2. AVENA calycibus bifloris, floſculo hermaphrodito mutico, maſculo ariſtato. *Fl. ſuec.* 98. *elatior.*
   Avena calycibus bifloris, panicula laxe ſpicata: pedunculis prioribus faſciculatis. *Guett. ſtamp.* 1. *p.* 182.
   Gramen avenaceum, panicula acerofa, ſemine papoſo. *Dill. app.* 48.
   Gramen avenaceum elatius, juba longa ſplendente. *Raj. meth.* 179. *angl.* 3. *p.* 406. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 214. *ſ.* 8. *t.* 7. *f.* 37. *Scheuch. gram.* 239. *Hall. helv.* 225.
   β. Avena panicula nutante, calycibus bifloris: altero floſculo ariſtato. *Roy. lugdb.* 66.
   Gramen nudoſum, avenacea panicula, radice tuberibus prædita. *Bauh. pin.* 2. *prodr.* 3. *theatr.* 18. *Scheuch. gram.* 237.
   Habitat in Europæ *maritimis & apricis.*

3. AVENA panicula attenuata, calycibus bifloris ſeminibus villoſis, ariſtis calyce duplo longioribus. *penſylvanica.*
   Habitat in Penſylvania. *Kalm.*

4. AVENA panicula contracta, floſculis binis apice biariſtatis, dorſo ariſta reflexa. *Lœfl.* *lœflingiana.*
   Habitat in Hiſpania.
   Gramen vix digiti longitudine; culmi *plures ex radice.* Folia *planiuſcula: ſummum ventricoſum latius.* Panicula *coarctata*, *craſſa.* Calyx *floſculis longior.* Ariſtæ *terminales*, *ſetaceae*, *longitudine corollarum: dorſalis duplo longior*, *torta.*

5. AVENA calycibus diſpermis, ſeminibus lævibus. *Hort. cliff.* 25. *Hort. upſ.* 20. *Mat. med.* 38. *Roy. lugdb.* 65. *ſativa.*
   Avena nigra. *Bauh. pin.* 23.
   β. Avena alba. *Bauh. pin.* 23
   Habitat - - - ☉

6. AVE-




IMAGE EVALUATION
TEST TARGET (MT-3)

6″

Photographic
Sciences
Corporation

23 WEST MAIN STREET
WEBSTER, N.Y. 14580
(716) 872-4503


2.8
2.5
3.2
2.2
3.6
2.0
1.8
1.1
1.0

fatua. 6. AVENA panicula patente, calycibus trifloris, floſculis baſi piloſis. *Fl. ſuec.* 97.

Avena ſeminibus hirſutis. *Fl. lapp.* 30. *Roy. lugdb.* 65.
Feſtuca utriculis lanugine flaveſcentibus. *Bauh pin.* 10.
Gramen avenaceum, locuſtis lanugine flaveſcentibus. *Scheuch. gram.* 239.
Habitat in Europæ *agris inter ſegetes.* ☉

flaveſcens. 7. AVENA panicula laxa, calycibus trifloris brevibus, floſculis omnibus ariſtatis. *Roy. lugdb.* 66.

Gramen avenaceum pratenſe elatius, panicula flaveſcente, locuſtis parvis. *Raj. angl.* 3. *p.* 407. *hiſt.* 1284. *Scheuch. gram.* 223.
Gramen avenaceum, ſpica ſparſa flaveſcente, locuſtis parvis. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 215. *ſ.* 8. *t.* 7. *f.* 42.
Habitat in Germania, Anglia, Gallia.

fragilis. 8. AVENA ſpicata, floſculis ſubquaternis calyce longioribus.

Gramen loliaceum lanuginoſum ſpica fragili articulata, glumis piloſis ariſtatum. *Scheuch. gram.* 32.
Gramen loliaceum ſpurium hirſutum, ariſtis geniculatis. *Barr. ic.* 905. *f.* 1. 2. 3.
Habitat in Luſitania, Hiſpania. *Læfl.*

pratenſis. 9. AVENA calycibus quinquefloris, panicula ſpicata.

Avena panicula ſpicata, ſpiculis cylindricis culmo oppreſſis. *Guett. ſtamp.* 1 *p.* 182.
Avena ſpicis erectis, calyce ſpiculis breviore. *Fl. lapp.* 31. *Fl. ſuec.* 96.
Avena calycibus trifloris, panicula nutante, foliis planis. *Gmel. ſibir.* 1. *p.* 129.
Gramen avenaceum montanum, ſpica ſimplici, ariſtis recurvis *Raj. angl.* 3. *p.* 252. *t.* 21. *f.* 1. *Scheuch. gram.* 226.
β. Gramen avenaceum glabrum ſ. potius hirſutum, panicula purpureo-argentea ſplendente. *Raj. angl.* 3. *p.* 406. *t.* 21. *f.* 2.
Habitat in Europæ *paſcuis ſiccis apricis.*

ſpicata. 10. AVENA ſpicata, calycibus ſpiculis ſexfloris longioribus: petalo exteriore apice ariſtato furcatoque.

Habitat in Penſylvania.
Gramen anguſtum; Folia *linearia.* Spica *compoſita ex ſpiculis* 3. *ſ.* 4, *remotis, erectis:* Spiculæ *ſubpedunculatæ: ſingulis* Calyx *diphyllus, ſubulatus, aequalis, ſpicula longior*; Floſculi 6, *ſeſſiles, erecti*: Petalo exteri-

teriore *apice bifido in apices duos ſetaceos, e quorum diviſura* ariſta *articulata, longitudine ſpiculae.* Facies *Feſtucae decumbentis.*

LAGURUS.

1. LAGURUS ſpica ovata. *Hort. cliff.* 25. *ovato.*
Gramen alopecuroides ſpica rotundiore. *Bauh. pin.* 4. *theatr* 56.
Gramen ſpicatum tomentoſum longiſſimis ariſtis donatum. *T. Sheuch. gram.* 58
Habitat in Italia, Gallia. Sicilia, Luſitania. ⊙

ARUNDO.

1. ARUNDO arbor. *Bauh. pin.* 18. *Hort. cliff.* 25. *Fl. zeyl.* 47. *Roy. lugdb.* 67. *Bambo*
Tabaxir & Mombu arbor. *Bauh hiſt.* 1. *p.* 222.
Ily. *Rheed. mal* 1. *p.* 25. *t.* 16.
Habitat in India *utraque.* ♄

2. ARUNDO calycibus trifloris, panicula diffuſa. *Roy. lugdb* 66 *Donax.*
Arundo ſativa. *Virid. cliff.* 7. *Hort. cliff.* 26.
Arundo ſativa, quæ Donax dioſcoridis. *Bauh. pin.* 17. *theatr.* 271.
β Arundo indica laconica verſicolor. *Moriſ. hiſt* 3. *p.* 219. *ſ.* 8. *t.* 8. *f.* 9. *Hort. cliff.* 26.
Habitat in Hiſpania, Galloprovincia.

3. ARUNDO calycibus quinquefloris, panicula laxa. *Roy. lugdb* 66. *Gron. virg* 137. *phragmites.*
Arundo panicula laxa, floſculis quinis. *Fl. ſuec.* 99.
Arundo panicula laxa, calycibus ſubbifloris. *Sauv. monſp.* 38.
Arundo vulgaris ſ. phragmites dioſcoridis. *Bauh. pin.* 17. *Scheuch. gram.* 161.
Habitat in Europæ *lacubus fluviis.* ♃

4. ARUNDO calycibus unifloris, panicula erecta, foliis ſubtus glabris. *epigejos.*
Arundo panicula coarctata erecta integra, foliis inferne glabris. *Fl. ſuec.* 101.
Gramen arundinaceum paniculatum montanum, panicula ſpadiceo viridi, ſemine papposo. *Scheuch. gram.* 124.
Habitat in Europæ *collibus aridis.* ♃

Calamagroſtis. 5. ARUNDO calycibus unifloris, culmo ramoſo. *Fl. lapp.* 42. *Fl. ſuec.* 100. *Roy. lugdb.* 66.
Gramen arundinaceum, panicula molli ſpadicea, majus. *Bauh. pin.* 7. *theatr.* 94. *Scheuch. gram.* 122. *t.* 3. *f.* 5.
Habitat in Europæ *paludibus graminoſis.* ♃

arenaria. 6. ARUNDO calycibus unifloris, foliis involutis mucronato-pungentibus.
Arundo foliorum lateribus convolutis acumine pungente. *Fl. lapp.* 43. *Fl. ſuec.* 102.
Gramen ſparteum ſpicatum, foliis mucronatis longioribus. *Bauh. pin.* 5.
Gramen ſpicatum ſecalinum maritimum maximum, ſpica longiore. *T. Scheuch. gram.* 138.
Habitat in Europa *ad maris litora arenoſa.* ♃.

ARISTIDA.

adſcenſionis. 1. ARISTIDA.
Gramen avenaceum, panicula minus ſparſa, cujus ſingula grana tres ariſtas longiſſimas habent. *Sloan. jam.* 35. *hiſt.* 1. *p.* 16. *t.* 2. *f.* 56.
Gramen avenaceum maderaſpatanum, panicula ſparſa ariſtis longioribus ornata. *Pluk. alm.* 174. *t.* 191. *f.* 3?
Habitat in Inſula Adſcenſionis *una ex quatuor iſtius pauperrimæ Floræ plantis, quarum* 1. *Sherardia fruticoſa* 2. *Euphorbia origanoides*, 3. *Portulaca. Osbeck.* ♃.
Habitus *Feſtucæ ovinæ, ſed paulo major.* Radix *ceſpitem conſtituens.* Culmi *inferne ramoſi.* Folia *e baſi latiore ſenſim anguſtata, plano-canaliculata, ſubulata:* Panicula *oblonga, diſtincta glumis corollae univalvibus, filiformibus, longitudinaliter convolutis, triplici ariſta terminatis.*

APLUDA.

mutica. 1. APLUDA.
Schœnanthus avenaceus procumbens maderaſpatanus, bupleuri folio. *P. Scheuch. gram.* 119?
Habitat in India.
Culmi *longiſſimi, bipedales & ultra, debiles, glabri, geniculis tumidis.* Folia *longa, plana, lanceolata, petiolata ſ. verſus vaginam attenuata in petiolum.* Panicula *anguſta, parva, e lateribus exiens, e vaginis minorum foliorum uti Lagurus.* Flores *in noſtra omnino mutici, quo a Scheuchzeriana differunt.*

LO

LOLIUM.

1. LOLIUM ſpica mutica.
Lolium ſpicis muticis, radice perenni. *Hort. cliff.* 24. *Fl. ſuec.* 104. *Roy. lugdb.* 69. *perenne.*
Lolium ſpicis compreſſis, radice perenni. *Fl. lapp.* 32.
Gramen loliaceum, anguſtiore folio & ſpica. *Bauh. pin.* 9. *theatr.* 127. *Scheuch. gram.* 25.
Habitat in Europa *ad agrorum verſuras ſolo fertili.* ⊙

2. LOLIUM ſpica ariſtata.
Lolium ſpicis ariſtatis, radice annua. *Hort. cliff.* 23. *Fl. ſuec.* 105. *Roy lugdb.* 69. *temulentum.*
Gramen loliaceum, ſpica longiore, ſ. Lolium dioſcoridis. *Bauh. pin.* 9. *theatr.* 121. *Scheuch. gram.* 31.
Habitat in Europæ *agris inter Hordeum, Linum.* ♃

ELYMUS.

1. ELYMUS foliis mucronato-pungentibus. *It. ſcan* 336. *Gen. nov.* 1094. *arenarius.*
Secale ſpiculis geminatis. *Fl. ſuec.* 106.
Triticum foliis acuminatis pungentibus. *Roy. lugdb.* 71.
Gramen caninum maritimum, ſpica triticea, noſtras. *Raj. hiſt.* 1256. *Scheuch. gram.* 6.
Habitat ad Europæ *litora marina in arena mobili.* ♃

2. ELYMUS ſpica flaccido pendula ſpiculis binatis. *Hort. upſ.* 22.* *Gen. nov.* 1094. *Sibiricus.*
Triticum radice perenni, ſpiculis binis longiſſime ariſtatis. *Gmel. ſibir.* 1. *p.* 123. *t.* 28.
Habitat in Sibiria. ♃

3. ELYMUS ſpica flaccido-pendula, ſpiculis inferioribus ternatis; ſuperioribus binatis. *Gen. nov.* 1094. *canadenſis.*
Gramen ſecalinum majus altiſſimum virginianum *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 180. *ſ.* 8. *t.* 10. *f.* 2. *Raj. ſuppl.* 599.
Habitat in Canada. *Kalm.* ♃.
Convenit in plurimis cum E. Sibirico, *a quo tamen differt* 1. *Spiculis villoſis, nec nudis.* 2. involucris *in ariſtam exeuntibus longioribus ipſa ſpicula, demtis ariſtis; at in ſibirica involucrum minus ſubulatum, ſed fere lanceolatum in ariſtam deſinens, quae longe brevior ſua ſpicula.* 3. Spicae *inferne ternae, quum Sibirica ſemper duas obtineat.* 4. Spiculae, *dum florent, dehiſcunt a ſcapo patulo, in ſibirica vero ſpiculae approximatae ſunt ſcapo.* Variat *haec ſpicis incurvis & pendulis.*

F 2

lis. Ariſtæ *corollinæ cum matureſcit fructus patenti-reflexae ſunt contra ac in Sibirica.*

virginicus. 4. ELYMUS ſpica erecta, ſpicula involucro longiore. *Hort. upſ.* 22.
Hordeum floſculis omnibus hermaphroditis, involucris floſculos craſſitie & longitudine ſuperantibus. *Gron. virg.* 13.
Habitat in Virginia. ♃

caput meduſ. 5. ELYMUS ſpiculis unifloris involucris ſetaceis patentiſſimis.
Elymus involucris reflexo-patentibus. *Gen. nov.* 1094.
Avena luſitanica ſpicata, caput meduſæ referens. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 210. *Raj. ſuppl.* 611.
Gramen hordeaceum, ſpica ariſtis longiſſimis circumvallata. *Scheuch. gram.* 20.?
Habitat in Luſitaniæ, Hiſpaniæ *maritimis.*

SECALE.

cereale. 1. SECALE glumarum ciliis ſcabris. *Hort upſ.* 22.
hybernum. Secale hybernum vel majus. *Bauh. pin.* 22. *theatr.* 425.
vernum. β. Secale vernum ſ. minus. *Bauh. pin.* 23.
Habitat - - - - ☉

villoſum. 2. SECALE glumarum ciliis villoſis, ſquamis calycinis cuneiformibus.
Gramen ſpicatum ſecalinum, glumis villoſis in ariſtas longiſſimas deſinentibus. *Tourneſ. inſt.* 518.
Gramen ſecalinum maximum. *Park. theatr.* 1144.
β. Gramen creticum ſpicatum ſecalinum, glumis ciliaribus. *Tourneſ. cor.* 39. *Buxb. cent.* 5. *p.* 21. *t.* 41.
Habitat in Europa *auſtrali, & in oriente.*

orientale. 3. SECALE glumis hirſutis, ſquamis calycinis ſubulatis.
Gramen orientale ſecalinum, ſpica brevi & lata. *Tourneſ. cor.* 39.
Habitat ad Archipelagum.

creticum. 4. SECALE glumis extrorſum ciliatis.
Gramen creticum ſpicatum ſecalinum altiſſimum, tuberoſa radice. *Tourneſ. cor.* 39. *Scheuch. gram.* 22.
Habitat in Creta.

HORDEUM.

vulgare. 1. HORDEUM floſculis omnibus hermaphroditis ariſtatis; ordinibus duobus erectioribus.
Hordeum floſculis omnibus hermaphroditis, ſeminibus corticatis. *Hort. upſ.* 22. *Mat. med.* 35. Hor-

Hordeum floſculis omnibus hermaphroditis. *Hort. cliff.* 24. *Roy. lugab.* 69.

Hordeum polyſtichon vernum. *Bauh. pin.* 22. *theatr.* 439.

β. Hordeum floſculis omnibus hermaphroditis, ſeminibus decorticatis. *Hort. upſ.* 23. *cœleſte.*

Habitat - - - - ⊙

2. HORDEUM floſculis omnibus hermaphroditis ariſtatis, ſeminibus ſexfariam æqualiter poſitis. *Hort. upſ.* 23. *hexaſtichon.*

Habitat - - - - ⊙

3. HORDEUM floſculis lateralibus maſculis muticis, ſeminibus angularibus imbricatis. *Hort. upſ.* 23. *diſtichon.*

Hordeum diſtichon. *Bauh. pin.* 22.

β. Hordeum floſculis lateralibus maſculis muticis, ſeminibus angularibus imbricatis decorticatis. diſt. nudum

Habitat - - - - ⊙

4. HORDEUM floſculis lateralibus maſculis muticis, ſeminibus angularibus patentibus corticatis. *Hort. upſ.* 23. *n.* 5. *zeocriton.*

Zeocriton ſ. oryza germanica. *Bauh. pin.* 22.

Habitat - - - - ⊙

5. HORDEUM floſculis lateralibus maſculis ariſtatis. *Hort. cliff.* 24. *Fl. ſuec.* 107. *Roy. lugdb.* 69. *murinum.*

Gramen hordeaceum minus & vulgare. *Bauh. pin.* 8. *theatr.* 134. *Scheuch. gram.* 14.

β. Gramen ſpicatum ſecalinum minus. *Scheuch. gram.* 17. *Vaill. pariſ.* 83. t. 17. *f.* 6.

Habitat in Europæ *locis ruderatis.* ⊙

6. HORDEUM ariſtis involucriſque ſetaceis longiſſimis. *jubatum.*

Habitat in Canada. *Kalm.*

Habitus hordei murini, ſed involucra & ariſtæ ſetaceæ quadruplo longiores, quam tota ſpica, unde ſingularis facies graminis

TRITICA.

* *Annua.*

1. TRITICUM glumis ventricoſis glabris imbricatis ariſtatis. *Hort. upſ.* 21. *æſtivum.*

Triticum radice annua, ſpica glabra ariſtata. *Hort. cliff.* 24. *Roy. lugdb.* 170.

Triticum æſtivum. *Bauh. pin.* 21.

Habitat - - - - ⊙

hybernum. 2. TRITICUM glumis ventricoſis lævibus imbricatis ſubmuticis. *Hort. upſ.* 21. *Mat. med.* 36.
Triticum radice annua, ſpica mutica. *Hort. cliff.* 24. *Roy. lugdb.* 70.
Triticum hybernum, ariſtis carens. *Bauh. pin.* 21.
Habitat - - - - ⊙

turgidum. 3. TRITICUM glumis ventricoſis villoſis imbricatis obtuſis. *Hort. upſ.* 21.
Triticum radice annua, glumis villoſis. *Hort. cliff.* 24. *Roy. lugdb.* 70.
Triticum ſpica villoſa quadrata breviore & turgidiore. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 176. *ſ.* 8. *t.* 1. *f.* 14.
Habitat - - - - ⊙

Spelta. 4. TRITICUM calycibus truncatis quadrifloris, floſculis ariſtatis hermaphroditis: intermedio neutro. *Hort. upſ.* 21.
Hordeum floſculis lateralibus maſculis muticis involucro deſtitutis. *Sauv. monſp.* 39.
Zea dicoccos vel Spelta major. *Bauh. pin.* 22. *theatr.* 412. *t.* 414.
Habitat - - - ⊙

monococcum. 5. TRITICUM involucris unifloris, floribus ariſtatis, ſpica diſticha. *Sauv. monſp.* 39. †
Hordeum diſtichum ſpica nitida ſ. Briza nuncupatum. *Tourneſ. inſt.* 513.
Zea Briza dicta ſ. monococcos germanica. *Bauh. pin.* 21.
Briza monococcos dodonæi. *Lob. ic.* 31.
Habitat - - - -

* *Perennia.*

repens. 6. TRITICUM calycibus ſubulatis trifloris acuminatis.
Triticum radice repente, foliis viridibus. *Fl. lapp.* 33. *Fl. ſuec.* 105. *Hort. cliff.* 24. *Mat. med.* 37. *Roy. lugdb.* 70.
Gramen caninum arvenſe ſ. Gramen dioſcoridis. *Bauh. pin.* 1. *Scheuch. gram.* 5.
Habitat in Europæ *cultis.* ♃

caninum. 7. TRITICUM calycibus ſubulatis quadrifloris ariſtatis.
Gramen caninum non repens elatius, ſpica ariſtata. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 177. *ſ.* 8. *t.* 1. *f.* 2. *Buxb. cent.* 4. *p.* 29. *t.* 50. Gra-

Gramen loliaceum radice repente ſ. Gramen officinarum, longioribus ariſtis donatum. *T. Vaill. pariſ.* 81. *t.* 17. *f.* 2.
Graminis ſpica triticea repentis vulgaris varietas cum ſpica ariſtata. *Scheuch. gram.* 9.
Habitat in Europæ *ſepibus* ♃

TRIGYNIA.

ERIOCAULON.

1. ERIOCAULON culmo quinquangulari, calyce univerſali pentaphyllo. *Fl. zeyl* 48. * *quinquangulare.*
Scabioſa graminea nudicaulis, capitulis argenteis ſ. Statice minima maderaſpatana. *Pluk. alm* 366. *t.* 221. *f.* 7.
Habitat in India. ♃

2. ERIOCAULON culmo ſexangulari, foliis enſiformibus. *Fl. zeyl.* 49. *ſexangulare.*
Gramen junceum indiæ orientalis minus, capitulo rotundo ex paleaceis ſpiculis in cacumine caulis glomerato. *Pluk. mant.* 48.
Habitat in India. ♃

3. ERIOCAULON culmo ſexangulari, foliis ſetaceis. *Fl. zeyl.* 50. *ſetaceum.*
Randalia malabarica, capillaceo folio. *Petiv. topic.* 344
Tſieru-kotſijelleti-pullu. *Rheed. mal.* 12. *p.* 129. *t.* 63.
Habitat in India.

4. ERIOCAULON culmo decangulari, foliis enſiformibus. *decangulare.*
Eriocaulon noveboracenſe, capitulo albo globoſo ſ. Globularia americana ſtatices haud abſimilis, cauliculis lana atro-nitente refertis. *Pluk. amalth. t.* 409. *f.* 5
Randalia americana procerior. *Pet. gaz. t.* 6. *f.* 2.
Globulariæ affinis aquatica, caule tenui aphyllo gramineo, capitulis albicantibus parvis globoſis, foliis paucis humiſtratis gramineis. *Gron. virg.* 13.
Habitat in Americæ *ſeptentrionalis paludibus.*

MONTIA.

1. MONTIA. *Fl. lapp.* 30. *Fl. ſuec.* 108. *Roy. lugdb.* 199. *fontana*
Montia aquatica minor. *Mich. gen.* 18. *t.* 13. *f.* 2.
Cameraria arvenſis minor. *Dill. giſſ.* 46

Alſinoides annua verna. *Vall. pariſ. t. 3. f. 4.*
Alſine paluſtris, portulacæ aquaticæ ſimilis. *Raj. hiſt.* 1035. *Pet. herb. t. 10. f. 12.*
Portulaca arvenſis. *Bauh. pin.* 288.
Habitat in Europa *ad ſcaturigines.* ⊙

PROSERPINACA.

paluſtris. 1. PROSERPINACA. *Act. upſ.* 1741. *p.* 81.
Trixis. *Mitch. E. N. C.* 1748. *n.* 23.
Habitat in Virginiæ *paludibus.*
Radix *repens.* Caules *pedales, teretiuſculi. Folia alterna, lanceolata, ſerrata, in petiolos deſinentia: demerſa ſ. ima in lacinias lineares pinnatifida.* Flores *axillares, ſolitarii.* Fructus *figura Poligoni.*

HOLOSTEUM.

ovatum. 1. HOLOSTEUM foliis ſubcordatis. *Gen. nov.* 1095.
Alſine foliis ſubcordatis, ſtipulis utrinque quaternis. *Hort. upſ.* 24.
Alſine americana, nummulariæ folio. *Herm. parad.* 11. *t.* 11.
Habitat in Jamaica, Surinama.

ſucculentum. 2. HOLOSTEUM foliis ellipticis carnoſis. *Gen. nov.* 1095.
Alſine foliis ellipticis ſucculentis. *Cold. noveb.* 9.
Habitat in Noveboraco.

hirſutum. 3. HOLOSTEUM foliis orbiculatis hirſutis. *Gen. nov.* 1095.
Alſine foliis orbiculatis hirſutis, floribus ſeſſilibus. *Roy. mſſ.*
Habitat in Malabaria.

umbellatum. 4. HOLOSTEUM floribus umbellatis.
Spergula foliis oppoſitis, pedunculis umbellatis. *Guett. ſtamp.* 298. *Dalib. pariſ.* 134.
Holoſteum caryophyllæum arvenſe. *Tabern. ic.* 233.
Lychnis graminea hirſuta umbellifera. *Moriſ. hiſt.* 2. *p.* 546. *ſ.* 5. *t.* 22. *f.* 46.
Caryophyllus arvenſis umbellatus, folio glabro. *Bauh. pin.* 210.
Caryophyllus arvenſis. *Bauh. hiſt.* 3. *p.* 361.
Habitat in Germaniæ, Galliæ *arvis.* ⊙

MOL.

MOLLUGO.

1. MOLLUGO foliis oppoſitis lanceolatis, ramis alternis, pedunculis lateralibus confertis unifloris. *Fl. zeyl* 52. * *oppoſitifolia.*

Habitat in Zeylona.

2. MOLLUGO foliis quaternis obovatis, panicula dichotoma. *Hort. cliff* 28. *Roy. lugdb.* 215. *Sauv. monſp.* 164. *tetraphylla.*

Anthyllis marina alſinefolia. *Bauh. pin.* 282.

Anthyllis alſinefolia polygonoides major. *Barr. rar.* 103. *f.* 534.

Habitat in Italiæ, Narbonæ *vineis.* ⊙

Huic petala 4, *ovata, calyce breviora.*

3. MOLLUGO foliis quinis obovatis æqualibus, floribus paniculatis. *Fl. zeyl.* 51. *pentaphylla.*

Alſine ramoſa procumbens quadrifolia, ad radicem polyphylla. *Burm. zeyl.* 13. *t.* 8. *f.* 12

Habitat in Zeylona.

4. MOLLUGO foliis verticillatis cuneiformibus acutis, caule ſubdiviſo decumbente, pedunculis unifloris. *Hort upſ.* 24. *verticillata.*

Mollugo foliis ſæpius ſeptenis lanceolatis. *Gron. virg.* 14

Alſine Spergula mariana, latiori folio, floribus ad nodos pediculis curtis circa caulem inſidentibus, calycibus eleganter punctatis. *Pluk. mant.* 9. *t.* 332. *f.* 5.

β. Mollugo foliis ſeptenis linearibus. *Hort. cliff.* 28.

Alſine procumbens, gallii facie, africana. *Herm. lugdb.* 19. *t.* 21. *Ehret. pict. t.* 6. *f.* 3.

Habitat in Africa, Virginia. ⊙

MINUARTIA.

MINUARTIA *Lœfl.* *hiſpanica.*

Habitat in Hiſpania. ⊙

Plantula *rigida, dura, tenax, ſæpius ſimplex.* Folia *oppoſita, ſetacea.* Flores *cymoſi in capitulum quadratum, arcte dichotomum, faſtigiatum, caule ſæpius majus, ſeſſiles.* Bracteæ *ſetaceæ, flore longiores, apice recto.* Semina *quinque ad octo, ſubrotunda, reniformia.* Color *plantæ ſubfuſcus. Lœfl.*

GUEREZIA.

1. GUEREZIA floribus capitatis. *Lœfl.* *hiſpanica.*

Habitat in Hiſpania. ⊙

Antecedente *minor, fragilior.* Capitulum *florum obſoletius tetragonum, facillime a caule diſcedens.* Bracteæ *ſetaceæ, erectæ, apice extrorſum hamatæ, veſtibus adhærentes.* Semen 1. *compreſſum, ſubrotundum.* Color *plantæ albidus. Lœfl.* Habitus *antecedentis & ſtructura floris eadem; at* Semina *ſolitaria & plura conſtituunt genera diverſiſſima.*

canadenſis. 2. GUEREZIA floribus ſolitariis, caule dichotomo.

Mollugo foliis oppoſitis. ſtipulis quaternis, caule dichotomo. *Gron. virg.* 14?

Habitat in Canada, Virginia. ⊙

Radix *fibroſa.* Caulis *ſtrictus; dichotomus, ſpithamæus teres, filiformis, erectus, Herba lini cathartici.* Folia *oppoſita. lanceolato-ovata, integerrima, adſperſa utrinque punctis fuſcis.* Stipulæ *geminæ utrinque, acutæ, membranaceæ.* Flores *ſolitarii, ſubpedunculati, parvi, virides, ex ſingula dichotomia.* Calyx *quinquepartitus: foliolis obtuſiuſculis, ſubfornicatis* Petala *nulla.* Stamina 3, *Antheris flavis.* Germen *ſubrotundum.* Styli *tres* Spontanea *planta altior caule capillari;* culta *craſſior & foliis minime punctatis.*

LECHEA.

minor. 1. LECHEA foliis lineari-lanceolatis, floribus paniculatis. *Gen. nov.* 1074. *

Capraria foliis integerrimis. *Gron. virg.* 75.

Scoparia foliis tenuiſſimis in plurimos & tenuiſſimos ramulos diviſa & ſubdiviſa. *Raj. ſuppl.* 132.

Habitat in Canadæ *ſylvis glareoſis.* ♃

major 2. LECHEA foliis ovati-lanceolatis, floribus lateralibus vagis. *Gen. nov.* 1074. *ſ.* 4. *

Habitat in Canadæ *aridis.*

Clas-

Claſſis IV.

TETRANDRIA

MONOGYNIA.

LEUCADENDRON.

1. LEUCADENDRON foliis ſetaceis, floſculis diſjunctis racemoſis. *racemoſum.*
Protea foliis ſetaceis, floribus racemoſis. *Hort. cliff.* 496.
Habitat in Æthiopia. ♄

2. LEUCADENDRON foliis ſubulatis, ramis determinatis, floribus terminalibus. *proteoides.*
Protea foliis linearibus ſimpliciſſimis, ramis determinatis, floribus terminalibus. *Roy. lugdb.* 186.
Habitat ad Caput b. ſpei. ♄
Folia conferta. Rami ad determinata ſpatia conferti, ceterum nulli. Calyces ſubrotundi, pubeſcentes.

3. LEUCADENDRON foliis ſubulatis, ramis ſparſis, floribus lateralibus. *cancellatum.*
Lepidocarpodendron foliis anguſtiſſimis gramineis, fructu cancellato, ſemine coronato. *Boerh. lugdb.* 2. *p* 193. *t.* 193.
Habitat ad Caput b. ſpei. ♄

4. LEUCADENDRON foliis lanceolatis, floribus oblongis, calycum ſquamis ſummis hirſutis. *Lepidocarpodendron.*
Protea foliis lanceolatis integerrimis glabris, calycinis ſuperne villoſis. *Roy. lugdb.* 186.
Lepidocarpodendron foliis anguſtis longioribus ſalignis, calycis ſquamis elegantiſſime ex flavo fuſco albo nigro variegatis, florum plumis atropurpureis. *Boerh lugdb.* 2. *p.* 188. *t.* 188.
Protea foliis lanceolatis integerrimis glabris, calycem ſuccingentibus hirſutis. *Roy. prodr.* 188.
Lepidocarpodendron folio ſaligno viridi: nervo & margine flavo, cono longo ſuperiore parte maxime clauſo *Boerh. lugdb.* 2. *p.* 189. *t.* 189.
Habitat ad Cap. b. ſpei. ♄

5. LEUCADENDRON foliis lanceolatis, floribus oblongis, calycum ſquamis glabris. *repens.*

Pro-

Protea caule multifloro, calycibus oblongis, foliis lanceolatis integerrimis. *Roy. lugdb.* 185.

Lepidocarpodendron foliis anguſtis brevioribus ſalignis, calycis ſquamis elegantiſſime ex roſeo aureo albo atrorubro variegatis, florum plumis albis. *Boërh. lugdb.* 2. *p.* 187.

β. Leucadendron foliis longiſſimis obtuſe trigonis, longitudine florem ſuperantibus. *Wach. ultraj.* 204.

Protea caule unifloro, calyce oblongo, foliis linearibus longiſſimis. *Roy. lugdb.* 185.

Lepidocarpodendron foliis longisſimis anguſtisſimis, fructum elegantisſime ex rubro flavo & albo variegatum ſuccingentibus, radice repente. *Boerh. lugdb.* 2. *p.* 190. *t.* 190.

Habitat ad Caput. b. ſpei. ♄

acaulon. 6. LEUCADENDRON foliis lanceolatis, floribus ſubrotundis, caule ſuffruticoſo unifloro.

Leucadendron acaulon. *Wach. ultraj.* 204.

Protea caule unifloro, foliis lanceolatis. *Roy. lugdb.* 186.

Lepidocarpodendron acaulon, foliis paucis latis, nervo & marginibus rubris ornatis, fructu parvo. *Boerh. lugdb.* 2. *p.* 191. *t.* 191.

Habitat ad Caput b. ſpei. ♄

Scolymocephalum. 7. LEUCADENDRON foliis lanceolatis, floribus ſubrotundis, caule fruticoſo ramoſo.

Lepidocarpodendron acaulon, ramis numeroſis e terra excreſcens, calyce floris immaturo extus ex rubro & flavo variegato, intus flavo. *Boerh. lugdb.* 2. *p.* 192. *t.* 192.

Habitat ad Caput b. ſpei, *in ericetis mont. Tigridis.* ♄.

Cinaroides. 8. LEUCADENDRON foliis integris, floribus depreſſis, corollarum limbis cylindricis.

Leucadendron foliis ſubrotundis patentiſſimis petiolatis, foliolis calycinis carinatis. *Wach. ultraj.* 204.

Lepidocarpodendron folio ſubrotundo rigido, in pedunculo longo craſſo, flore maximo purpureo. *Boerh. lugdb.* 2. *p.* 184. *t.* 184.

Cinaroides frutex, folio ſubrotundo rigido, e monte tabulari. *Petiv. muſ.* 374.

β. Protea foliis lanceolatis integerrimis, flore patente glabro, ſtylis longiſſimis. *Roy. lugdb.* 186.

Habitat ad Caput b. ſpei in *humidis mont. Tabularis.* ♄

Variat foliis cordatis, ovatis, lanceolatis.

9.

9. LEUCADENDRON foliis calloſo-tricuſpidatis involventibus flores laterales. *cucullatum.*

Leucadendron foliis cuneiformibus apice tridentato-calloſis, ſummis ultra florem protenſis. *Wach. ultraj.* 203.

Protea foliis lanceolatis obtuſis flores involventibus: apice tridentato-calloſis. *Roy. lugdb.* 184.

Hypophyllocarpodendron foliis inferioribus apice trifido rubro; ſuperioribus penitus rubris glabris. *Boerh. lugdb.* 2. *p.* 206. t. 206.

Habitat ad Cap. b. ſpei *locis uliginoſis.* ♄

10. LEUCADENDRON foliis calloſo-tricuſpidatis, calycibus turbinatis nudis. *Hypophyllocarpodendr.*

Leucadendros africana f. Scolymocephalus folio anguſtiori: apicibus tridentatis. *Pluk. alm.* 212.

Protea foliis lanceolato-linearibus apice tridentato-calloſis, capitulis aphyllis. *Roy. lugdb.* 184.

Protea foliis lanceolato-linearibus: apice tridentato-calloſis. *Hort. cliff.* 29.

Conocarpodendron folio rigidio anguſto: apice tridentato rubro, flore aurantio. *Boerh. lugdb.* 2. *p.* 198. *t.* 198.

Habitat ad Cap. b. ſpei *in campis ſabuloſis.* ♄

11. LEUCADENDRON foliis calloſo-quinquedentatis. *Conocarpod.*

Leucadendron foliis obverſe ovatis oblongis: margine calloſo-fimbriatis: ad apicem crenatis. *Wach. ultraj.* 203.

Leucadendron africana arbor argentea, ſummo folio crenato. *Pluk. alm.* 212. *t.* 200. *f.* 2.

Protea foliis oblongo-ovatis apice quinquedentato-calloſis. *Roy. lugdb.* 184.

Conocarpodendron folio craſſo nervo lanuginoſo ſupra crenato ibique limbo rubro, flore aureo, cono facile deciduo. *Boerh. lugdb.* 2. *p.* 196. *t.* 196.

Scolymocephalus africanus latifolius lanuginoſus, foliis in ſummitate crenatis. *Herm. afr.* 20. *Raj. dendr.* 9.

Habitat in Æthiopia. ♄

12. LEUCADENDROS foliis ſetaceis ſemitrifidis. *cyanoides.*

Protea foliis linearibus ramoſis. *Roy. lugdb.* 186.

Cyanus æthiopicus, rigidis capillaceis tenuiſſimis foliis trifidis. *Pluk. mant.* 61. *t.* 345. *f.* 6.

Habitat ad. Cap. b. ſpei. ♄

13. LEUCADENDROS foliis ſetaceis multifidis. *Serraria.*

Abrotanoides arboreum monomatapenſe, floribus in ramulorum cymis. *Pluk. mant.* 1. *t.* 329. *f.* 1.

Ser-

Serraria foliis tenuiſſime diviſis, floribus rubris apetalis. *Burm. afr.* 264, *t.* 99. *f.* 1.

β. Serraria foliis tenuiſſime diviſis, capitulis tomentoſis. *Burm. afr.* 265. *t.* 99. *f.* 2.

γ. Anethifolius frutex africanus, flore ſericeo. *Seb. theſ.* 2. *t.* 43. *f.* 6.

Habitat in Æthiopia. ♄

PROTEA.

argentea. 1. PROTEA foliis lanceolatis obliquis acutis ſparſis, floralibus verticillatis.

Protea foliis lanceolatis integerrimis hirſutis nitidis. *Hort. cliff.* 29.

Leucadendros africana arbor tota argentea ſericea, foliis integris. *Pluk. alm.* 212. *t.* 200 *f.* 1.

Argyrodendros africana, foliis ſericeis & argenteis. *Comm. hort.* 2. *p.* 51. *Raj. dendr.* 9.

Conocarpodendron foliis argenteis ſericeis latiſſimis. *Boerh. lugdb.* 2. *p.* 195. *t.* 195.

Frutex æthiopicus conifer, foliis cneori lanuginoſis ſalici æmulis. *Breyn. prodr.* 2. *p.* 49.

Arbor ferens folia argentea. *Zanon. hiſt.* 24.

β Protea foliis lineari-lanceolatis integerrimis acutis. *Hort. cliff.* 29.

Protea foliis lineari-lanceolatis integerrimis: ſuperioribus hirſutis nitidis. *Roy. lugdb.* 184.

Globularia africana fruteſcens, thymeleæ folio lanuginoſo. *Tournef. inſt.* 467.

Frutex æthiopicus conifer, foliis cneori ſalici æmulis. *Breyn. cent.* 21. *t.* 9.

γ. Protea foliis lineari-lanceolatis glabris, capitulis ſquammoſis: corona foliacea ſuccinctis. *Roy. lugdb.* 185.

Conocarpodendron folio rigido craſſo anguſto, cono laricis parvo. *Boerh. lugdb.* 2. *p.* 197. *t.* 197.

δ. Protea foliis lineari-lanceolatis glabris, capitulis ad baſin ſquammoſis. *Roy. lugdb.* 185.

Conocarpodendron folio anguſto rigido brevi, cono parvo aureo: corona foliacea ſuccincto. *Boerh. lugdb.* 2. *p.* 200.

ε. Protea foliis lineari-lanceolatis glabris, caule inferne radicato. *Roy. lugdb.* 185.

Conocarpodendron folio tenuiſſimo anguſtiſſimo ſaligno, cono calyculato. *Boerh. lugdb.* 2. *p.* 203. *t.* 203.

ζ. Protea foliis lanceolatis acuminatis flexuoſis, capitulis corona foliacea ſuccinctis. *Roy. lugdb.* 185.

Cono-

Conocarpodendron folio tenui anguſto ſaligno, cono calyculato corona foliacea ſuccincto. *Boërh. lugdb.* 2. *p.* 204. *t.* 204.

Habitat aa Cap. b. ſpei. ♄

Planta naturalis, in patria, argentea excellit fronde, inter arbores nitidiſſima omnium; at culta & captiva extra patriam exuit decus; variat dein etiam domi mille modis vere Protea.

[illegible]. PROTEA foliis ovatis obtuſis imbricatis, capitulis globoſis. *fuſca.*

Conocarpodendron folio ſubrotundo breviſſimo, capituli immaturi globoſi parte inferiore fuſca, media aurea, ſuprema viridi. *Boërh. lugdb.* 2. *p.* 202. *t.* 202.

β. Protea foliis oblongo-ovatis lana obvolutis. *Roy. lugdb.* 187.

γ. Chryſanthemum fruticoſum, polygoni foliis, africanum, caulibus ſcabris, flore minore. *Pluk. mant.* 47. *t.* 343. *f.* 9.

Habitat in Æthiopia. ♄

CEPHALANTHUS.

1. CEPHALANTHUS foliis oppoſitis. *Fl. zeyl.* 53. *orientalis.*

Platanocephalos citri foliis bijugis, capite majore. *Vaill. act.* 1722. *p.* 259.

Katu-Tſiaca. *Rheed. mal.* 3. *p.* 29. *t.* 33.

Habitat in India & Africa. ♄

Capſulas habet binas monoſpermas; ſtipulas quibus folia uniuntur, diverſas gerit a ſequenti. B. juſſieu.

2. CEPHALANTHUS foliis oppoſitis ternisque. *Gron. virg.* 15. *occidentalis.*

Cephalanthus foliis ternis. *Hort. cliff.* 73. *Roy. lugdb.* 187.

Scabioſa dendroides americana, ternis foliis caulem ambientibus, floribus ochroleucis. *Pluk. alm.* 336. *t.* 77. *f.* 4.

Habitat in America *ſeptentrionali.* ♄

Capſulæ nullæ. Semina ſolitaria, longa pyramidata: baſi attenuata, angulata, lanuginoſa; unilocularia. Receptaculum commune globoſum, villoſum.

GLOBULARIA.

GLOBULARIA caule fruticoſo, foliis lanceolatis tridentatis integriſque. *Roy. lugdb.* 190. *Alypum.*

Aly-

Alypum monſpelienſium, ſ. Frutex terribilis. *Bauh. hiſt.* 1. *p.* 598. *Niſſ. act.* 1712. *p.* 336. *t.* 18.
Thymelæa foliis acutis, capitulo ſuccifæ. *Bauh. pin.* 473.
Habitat Monſpelii & *in regno Valentino.* ♄

biſnagarica. 2. GLOBULARIA caule fruticoſo, foliis radicalibus cuneiformibus retuſis, caulinis lanceolatis.
Scabioſa biſnagarica ſ. Globularia fruteſcens, rigidis foliis ad radicem rotundioribus cordatis. *Pluk. alm.* 336. *t.* 58 *f.* 5. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 51.
Habitat in Biſnagariæ *ſylvis.* ♃

vulgaris. 3. GLOBULARIA caule herbaceo, foliis radicalibus tridentatis; caulinis lanceolatis. *Fl. ſuec.* 109. *it. œl.* 65. * *Dalib. pariſ.* 43.
Globularia caule folioſo, foliis ovatis integerrimis. *Hort. cliff.* 490. *Roy. lugdb.* 190. *Hall. helv.* 667.
Aphyllanthes anguillare. *Cam. hort.* 18. *t.* 7.
Bellis cærulea, caule folioſo. *Bauh. pin.* 262.
β. Bellis cærulea apula. *Tabern. hiſt.* 2. *p.* 709.
γ. Bellis cærulea monſpeliaca. *Tabern. hiſt.* 2. *p.* 709.
Habitat in Europæ *apricis duris.* ♃

ſpinoſa. 4. GLOBULARIA foliis radicalibus crenato aculeatis, caulinis integerrimis mucronatis.
Globularia ſpinoſa. *Tourneſ. inſt.* 476
Bellis caerulea ſpinoſa. *Bauh. pin.* 262.
Bellis ſpinoſa, flore globoſo. *Bauh. prodr* 121
Habitat in Granadæ *montibus.* ♃

cordifolia. 5. GLOBULARIA caule ſubnudo, foliis cuneiformibus tricuſpidatis: intermedio minimo.
Globularia foliis radicalibus cuneiformibus retuſis dentatis: denticulo intermedio minimo. *Hort. cliff.* 491. *Roy. lugdb.* 190.
Scabioſa, bellidis folio, humilis, caulenudo, radice repente, folio cordato. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 50. *ſ.* 6. *t.* 15. *f. ult.*
Bellis cærulea montana fruteſcens. *Bauh. pin.* 262.
β. Globularia alpina minima, origani folio. *Tourneſ. inſt.* 467.
Scabioſa, bellidis folio, pyrenaica minima. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 51.
Habitat in Pannonia, Auſtria, Helvetia, Pyrenæis. ♃

6. GLO-

6. GLOBULARIA caule nudo, foliis integerrimis lanceolatis. *nudicaulis.*
Globularia pyrenaica, folio oblongo, caule nudo. *Tournef. inſt.* 467.
Scabioſa, bellidis folio, humilis, caule nudo, radice non repente. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 50. *ſ.* 6. *t.* 15. *f.* 4.
Bellis caerulea, caule nudo. *Bauh. pin.* 262. *Raj. hiſt.* 381.
Habitat in Pyrenæis & Auſtriæ *montibus.* ♃
Interdum unicum foliolum in ſcapo.

7. GLOBULARIA caule ſubnudo, capitulis alternis ſeſſilibus, foliis lanceolato-ovatis integris. *orientalis.*
Globularia orientalis, floribus per caulem ſparſis. *Tournef. cor.* 35.
Habitat in Natolia. *Bibrling.* ♃
Radix *perennis.* Folia *obverſe ovata, in petiolos deſinentia, acuta, integra, nuda, plurima.* Caulis *pedalis, herbaceus, ſimpliciſſimus, Foliis minimis, lanceolatis, alternis, remotis.* Capitula *in ſummitate caulis,* 7 *ad* 10, *alterna, ſeſſilia.*

DIPSACUS.

1. DIPSACUS foliis ſeſſilibus ſerratis. *fullonum.*
Dipſacus foliis connato-perfoliatis, *Hort. upſ.* 25. ariſtis fructus rectis. *Sauv. monſp.* 156.
Dipſacus capitulis florum conicis. *Hort. cliff.* 29. *Gron. virg.* 15. *Roy. lugdb.* 188. *Dalib. pariſ.* 44.
Dipſacus ſylveſtris aut Virga Paſtoris major. *Bauh. pin.* 385.
Dipſacus ſylveſtris. *Dod. pempt.* 735.
β. Dipſacus ſativus. *Bauh. pin.* 385. ariſtis fructus hamatis. *Sauv. monſp.* 156.
Habitat in Gallia, Anglia, Italia. ♂

2. DIPSACUS foliis connatis ſinuatis. *laciniatus.*
Dipſacus folio laciniato. *Bauh. pin.* 385. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 158. *ſ.* 7, *t.* 36. *f.* 4.
Habitat in Alſatia, Azow. ♂

3. DIPSACUS foliis petiolatis appendiculatis. *Hort. upſ.* 25. *Roy. lugdb.* 188. *Dalib. pariſ.* 44. *piloſus.*
Dipſacus capitulis florum ſubgloboſis. *Hort. cliff.* 30. *Roy. lugdb.* 188.
Dipſacus ſylveſtris, capitulo minore ſ. Virga Paſtoris minor. *Bauh. pin.* 385.

Dipſacus tertius. *Dod. pempt.* 735.
Habitat in Anglia, Gallia. ♂

SCABIOSA.

* *Corollulis quadrifidis.*

alpina. 1. SCABIOSA corollulis quadrifidis æqualibus, floribus cernuis, foliis pinnatis: foliolis lanceolatis ſerratis. *Hort. cliff.* 30. *Hort. upſ.* 26. *Roy. lugdb.* 188.
Scabioſa alpina, foliis centaurii majoris. *Bauh. pin.* 270.
Scabioſa alpina centauroides. *Beſl. eyſt. æſt.* 122.
Habitat in alpibus Helveticis, Italicis. ♃

tranſſylvanica. 2. SCABIOSA corollulis quadrifidis æqualibus calyce brevioribus, foliis radicalibus lyratis, caulinis pinnatifidis. *Roy. lugdb.* 189. *Hort. upſ.* 26. *
Scabioſa altiſſima annua, foliis agrimoniæ nonnihil ſimilibus. *Herm. lugdb.* 539. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 46. *ſ.* 6. *t.* 13. *f.* 13
Habitat in Tranſylvania. ⊙

leucantha. 3. SCABIOSA corollulis quadrifidis æqualibus, ſquamis calycinis ovatis obtuſis, *foliis pinnatifidis. Hort. cliff.* 30. *Roy. lugdb.* 188. *Sauv. meth.* 241.
Scabioſa flore globoſo niveo *Bauh. pin.* 207.
Scabioſa fruticans anguſtifolia alba. *Bauh. pin.* 270.
ſpuria. β. Scabioſa corollulis quadrifidis æqualibus, ſquamis calycinis ovatis, *foliis lanceolatis ſerratis.*
Scabioſa africana fruteſcens, foliis rigidis ſplendentibus & ſerratis, flore albicante. *Comm. hort.* 2. *p.* 185. *t.* 93.
Habitat in collibus Narbonæ, β. *in* Africæ. ♃
Differt β. *ab antecedente tantum foliis indiviſis.*

Succiſa. 4. SCABIOSA corollulis quadrifidis æqualibus, caule ſimplici, ramis approximatis, foliis lanceolato-ovatis. *Hort. cliff.* 30. *Fl. ſuec.* 112. *Mat. med.* 41. *Roy. lugdb,* 188. *Dalib. pariſ.* 45.
Succiſa glabra. *Bauh. pin.* 269.
Succiſa ſ. Morſus diaboli. *Cam. epit.* 397.
β. Succiſa hirſuta. *Bauh. pin.* 269.
Habitat in Europæ *paſcuis humidiuſculis.* ♃

ſyriaca. 5. SCABIOSA corollulis quadrifidis æqualibus, calycibus ariſtatis, caule dichotomo, foliis lanceolatis. *Hort. cliff.* 30. *Roy. lugdb.* 188.

Sca-

Scabioſa fruticans latifolia alba. *Bauh. pin.* 269. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 46. *ſ.* 6. *t.* 14. *f.* 14.

β. Scabioſa perſicæ folio, flore amethyſtino. *Vaill. act.* 1722. *p.* 238.

Habitat in Syria. ⊙

6. SCABIOSA corollis quadrifidis, foliis omnibus lanceolatis ſerratis. *Sauv. monſp.* 156. *integrifolia.*

Scabioſa annua integrifolia ſ. foliis bellidis. *Magn. monſp.* 231. *

Habitat monſpelii. ⊙

Caulis non hiſpidus; Rami patuli; Calycis *ſquamæ lanceolatæ, corollis breviores;* Corollæ *rubræ. Sauv.*

7. SCABIOSA corollulis quadrifidis radiantibus, caule hiſpido, foliis lanceolatis pinnatifidis: lobis imbricatis. *tatarica.*

Scabioſa floſculis quadrifidis, foliis pinatifidis: laciniis lateralibus erectiuſculis. *act. upſ.* 1744. *p.* 11. *t.* 1. *

Scabioſa altiſſima ſegetum. Triumf. *Raj. ſuppl.* 236?

Habitat in Tataria. ♂

8. SCABIOSA corollulis quadrifidis radiantibus, caule hiſpido. *Hort. cliff.* 31. *Fl. ſuec.* 110. *Mat. med.* 40. *Roy. lugdb.* 188. *Dalib. pariſ.* 44. *arvenſis.*

Scabioſa major hirſuta. *Bauh. pin.* 269.

Scabioſa arvenſis. *Tabern hiſt.* 442.

Scabioſa major communior hirſuta, folio non laciniato. *Bauh. hiſt.* 3. *p.* 2.

Habitat in Europa *ſolo glareoſo, juxta ſegetes inque pratis.* ♃

9. SCABIOSA corollulis trifidis, foliis caulinis tripinnatis filiformibus. *Sauv. monſp.* 268. † *triandra.*

Scabioſa capitulo globoſo, foliis in tenuiſſimas lacinias diviſis. *Bauh. pin.* 271. *Magn. monſp.* 231.

Habitat Monſpelii.

* * *Corollulis quinquefidis.*

10. SCABIOSA corollulis quinquefidis, foliis radicalibus ovatis crenatis, caulinis pinnatis ſetaceis. *Hort. cliff.* 31. *Fl. ſuec.* 111. *It. gotl.* 216. 228. * *Roy. lugdb.* 139. *Dalib. pariſ.* 45. *Sauv. monſp.* 242. *columbaria.*

Scabioſa, capitulo globoſo, major. *Bauh. pin.* 270.

Scabioſa minor. *Cam. epit.* 711.

β. Scabioſa, capitulo globoſo, minor. *Bauh. pin.* 270.

Habitat in Europæ *montoſis, ſiccioribus.*

ſtellata. 11. SCABIOSA corollulis quinquefidis, foliis diſſectis, receptaculis florum ſubrotundis. *Hort. cliff.* 31. * *Hort. upſ.* 26. *Roy. lugdb.* 189.
Scabioſa ſtellata, folio laciniato, major. *Bauh. pin.* 271.
Scabioſa major hiſpanica. *Cluſ. hiſt.* 2. *p.* 1.
β. Scabioſa ſtellata, folio laciniato, minor. *Bauh. pin.* 271.
Habitat in Hiſpania, *præſertim in agro* Granatenſi *ad verſuras.* ⊙

atropurpurea 12. SCABIOSA corollulis quinquefidis, foliis diſſectis, receptaculis florum ſubulatis. *Hort. cliff.* 31. *Hort. upſ.* 26.
Scabioſa peregrina rubra, capite oblongo. *Bauh. pin.* 270.
Scabioſa VI. Indica. *Cluſ, hiſt.* 2. *p.* 3.
Habitat in India? ⊙

argentea. 13. SCABIOSA corollulis quinquefidis, foliis pinnatis: laciniis lanceolatis, pedunculis nudis lævibus longiſſimis. *Roy. lugdb.* 190.
Scabioſa orientalis argentea, foliis inferioribus inciſis. *Tournef. cor.* 34.
Aſterocephalus perennis argenteus laciniatus, caule tenui eburneo. *Vaill. act.* 1722. *p.* 181.
Habitat in Oriente. ♃

africana. 14. SCABIOSA corollulis quinquefidis, foliis inciſis, caule fruticoſo. *Hort. cliff.* 31. *Roy. lugdb.* 189.
Scabioſa africana fruteſcens. *Herm. parad.* 219. *t.* 219.
β. Scabioſa africana fruteſcens maxima, foliis rugoſis & crenatis, minor. *Herm. parad.* 220.
γ. Scabioſa africana fruteſcens maxima, foliis tenuiſſime inciſis. *Boërh. lugdb.* 1. *p.* 128.
δ. Scabioſa minor æthiopica fruteſcens, foliis lanuginoſis *Breyn. ic* 33. *t.* 26.
Habitat in Africa.

cretica. 15. SCABIOSA corollulis quinquefidis, foliis lanceolatis ſub-integerrimis. *Hort. cliff.* 31. *Roy. lugdb.* 169.
Scabioſa ſtellata, folio non diſſecto. *Bauh. pin.* 271. *Moriſ. hiſt.* 3. *ſ.* 6. *t.* 15. *f.* 31.
β. Scabioſa cretica fruteſcens, auriculæ urſi folio. *Tournef. cor.* 34.
Aſterocephalus fruteſcens, leucoji folio longiore anguſto. *Vail. act.* 1722. *p.* 247.
Habitat in Creta & *adjacentibus.* ♄

Pterocephala 16. SCABIOSA corollulis quinquefidis, caule procumbente

bente fruticoſo, foliis laciniatis hirſutis, pappo plumoſo.
Pterocephalus perennis humilis laciniatus & incanus. *Vaill. act.* 1722. *p.* 184.
Habitat in Græcia?
Caulis vix e terra prominens Scapis breviſſimis, unifloris.

17. SCABIOSA corollulis quinquefidis radiantibus, foliis bipinnatis linearibus. *ochroleuca.*
Scabioſa corollulis quadrifidis, foliis pinnatis: foliolis lanceolatis ſuperne inciſis. *Sauv. monſp.* 241.
Scabioſa multifido folio, flore flaveſcente. *Bauh. pin.* 270. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 48. *ſ.* 6. *t.* 13. *f.* 23.
Scabioſa VII. *Cluſ. hiſt.* 2. *p.* 3.
Habitat in Germaniæ *pratis ſiccis.* ♃

18. SCABIOSA corollulis quinquefidis, caule herbaceo, calycibus folioſis florem ſuperantibus, calyce plumoſo. *Roy. lugdb.* 189. *papposa.*
Scabioſa cretica, capitulo pappos mentiente. *Tournef. inſt.* 34. *Boerh. lugdb.* 1. *p.* 130.
Habitat in Creta.

KNAUTIA.

1. KNAUTIA. *Hort. cliff.* 32. *Hort. upſ.* 27. *Roy. lugdb.* 190. *orientalis.*
Lychni Scabioſa, flore rubro, annua. *Boerh. lugdb.* 1. *p.* 131.
Scabioſa orientalis, caryophylli flore. *Vaill. act.* 1722. *p.* 241.
Habitat in Oriente. ☉
Conferatur Scabioſa cærulea virginiana, floſculis tetrapetalis caryophyllorum more patulis & laciniatis. *Pluk. alm.* 335.

HEDYOTIS.

1. HEDYOTIS foliis lanceolatis petiolatis, corymbis terminalibus involucratis. *Fl. zeyl.* 63. * *Amœn. acad.* 1. *p.* 392. *fruticosa.*
Valerianella foliis nervoſis acutis, floſculis in caulium ſummo quaſi involucratis. *Burm. zeyl.* 227. *t.* 107.
Habitat in Zeylona. ♄

2. HEDYOTIS foliis lanceolato-ovatis, floribus verticillatis. *Fl. zeyl.* 64. * *Mat. med.* 47. *Amœn. acad.* 1. *p.* 391. *Auricularia.*

 Va-

Valerianella paluſtris, foliis nervoſis oblongis, floſculis ad caulium nodos inter foliorum ſinus collectis. *Burm. zeyl.* 227. *t.* 108. *f.* 1.
Muriguti. *Rheed. mal.* 10. *p.* 63. *t.* 32.
Habitat in Zeylona. ♃

herbacea. 8. HEDYOTIS foliis lineari-lanceolatis, caule herbaceo dichotomo, pedunculis geminis. *Fl. zeyl.* 65. *
Habitat in Zeylona.

SPERMACOCE.

tenuior. 1. SPERMACOCE glabra, ſtaminibus incluſis.
Spermacoce verticillis tenuioribus. *Dill. elth.* 370. *t.* 227. *f.* 359.
Spermacoce. *Roy. lugdb.* 258.
Anonymos americana, foliis parietariæ ſcabris, floribus albis ad foliorum ortum vix conſpicuis. *Pluk. alm.* 33. *t.* 136. *f.* 4.
Habitat in Carolina. ⊙

verticillata. 2. SPERMACOCE glabra, ſtaminibus exſtantibus.
Spermacoce verticillis globoſis. *Dill. elth.* 369. *t.* 276. *f.* 358. *Hort. cliff.* 33.
Scabioſa jamaicenſis hyſſopifolia. *Pluk. alm.* 336. *t.* 58. *f.* 6?
Pulegium fruticoſum erectum, verticillis denſiſſimis. *Sloan. jam.* 64. *hiſt.* 1. *p.* 170?
Habitat in Jamaica. Africa.

hiſpida. 3. SPERMACOCE hiſpida, foliis oppoſitis obovatis. *Fl. zeyl.* 62. *
Galeopſis zeylanica, folio oblongo, flore albo. *Burm. zeyl.* 163. *t.* 20. *f.* 3.
Habitat in Zeylona. ♃

SHERARDIA.

arvenſis. 1. SHERARDIA foliis omnibus verticillatis, floribus terminalibus.
Sherardia. *Dill. gen.* 96. *Hort. cliff.* 33. *Fl. ſuec.* 113. *Roy. lugdb.* 257. *Hall. helv.* 456. *Dalib. pariſ.* 46.
Rubeola arvenſis repens caerulea. *Bauh. pin.* 334. *prod.* 145.
Rubia parva, flore caeruleo ſe ſpargens. *Bauh. hiſt.* 2. *p.* 719.
Habitat in arvis Scaniæ, Germaniæ, Angliæ. ⊙

2. SHE-

2. SHERARDIA foliis floralibus binis oppoſitis binis floribus. *muralis.*
Aſperula verticillata luteola. *Bauh. pin.* 334.
Aſperula verticillata muralis minima. *Columm. ecphr.* 302. *t.* 300.
Habitat in Italia. ☉

3. SHERARDIA foliis quaternis æqualibus, caule fruticoſo. *fruticoſa.*
Habitat in inſula Adſcenſionis. *Osbeck.* ♄
Frutex *toroſus, inæqualis, ſcaber, Ramis obtuſe tetragonis.* Folia *quaterna, anguſto-lanceolata, integerrima, glabra, marginibus revoluta, articulis ramorum paulo longiora, interſtincta* Stipulis *breviſſimis, ſubulatis.* Flores *oppoſiti, ſeſſiles, axillares.* Calyx *tetraphyllus, germini innatus, perſiſtens foliolis lanceolatis.* Corolla *infundibuliformis, quadrifida, alba, longitudine germinis.* Antheræ *quatuor, oblongæ.* Pericarpium *dicoccum.* Clinopodium africanum procumbens pſyllii foliis. *Pluk. mant.* 51. *t.* 344. *f.* 3. *demta hirſutie & dentibus foliorum, noſtram refert.*

ASPERULA.

1. ASPERULA foliis octenis lanceolatis, florum faſciculis pedunculatis. *Fl. ſuec.* 114. *Mat. med.* 45. *Dalib. pariſ.* 46. *odorata.*
Aſperula foliis pluribus, floribus pedunculo elevatis. *Hort. cliff.* 33. *Roy. lugdb.* 255.
Aſperula I. Rubeola montana odorata. *Bauh. pin.* 334.
Habitat in Sveciæ, Germaniæ *umbroſis.* ♃

2. ASPERULA foliis ſenis, floribus ſeſſilibus aggregatis terminalibus. *Hort. upſ.* 27. *arvenſis.*
Aſperula foliis pluribus, floribus ſeſſilibus. *Hort. cliff.* 33. *Roy. lugdb.* 255. *Dalib. pariſ.* 47.
Aſperula cærulea arvenſis *Bauh. pin.* 334.
Aſperula cærulea. *Dod. pempt.* 355.
Habitat in Gallia, Flandria, Germania, Anglia. ☉

3. ASPERULA foliis quaternis ovato-lanceolatis, floribus faſciculatis terminalibus. *taurina.*
Aſperula foliis quaternis ovato-lanceolatis, ramis alternis. *Hort. cliff.* 33. *Virid. cliff.* 9. *Roy. lugdb.* 255. *Hall. helv.* 457. *Sauv. monſp.* 164.
Rubia quadrifolia & latifolia lævis. *Bauh. pin.* 334. *Moriſ. hiſt.* 3. *ſ.* 9. *t.* 21. *f.* 1.
Habitat in alpibus Helvetiæ, Italiæ, ♃

4.

tinctoria. 4. ASPERULA foliis linearibus: inferioribus ſenis, intermediis quaternis, caule flaccido, floribus pleriſque trifidis.

Aſperula foliis quaternis linearibus, floribus ſæpius trifidis. *Fl. ſuec.* 115. *Sauv. monſp.* 163.

Rubeola quadrifolia, caule ramoſo flaccido, floribus trifidis. *Hall. rupp.* 8.

Gallium album tripetalum. *Moriſ. prælud.* 267. *Dalib. pariſ.* 49.

Gallium album 3. *Tabern. hiſt.* 433. *t.* 733. *f.* 1. *bona.*

Habitat in Sueciæ, Tyringiæ, Galliæ, Sibiriæ *collibus aridis ſaxoſis.* ♃

pyrenaica. 5. ASPERULA foliis quaternis lanceolato-linearibus caule erecto, floribus ſæpius trifidis.

Rubia cynanchica ſaxatilis. *Bauh. pin.* 333. *prodr.* 146. *Burſ. XIX.* 9.

Habitat in Pyrenæis *verſus* Hiſpaniam *&* *prope* Valentiam *Gallorum.* ♃

Caules *erecti, ſpithamæi, quadrangulares. Folia omnia in caule quaterna, linearia, carinata, acuta, lævia; inferiora etiam quaterna, ſed breviora lanceolata obtuſiora, folia ſumma & floralia oppoſita, latiora, acuta, lanceolata.* Flores *tubuloſi, rubri, ſæpius trifidi.* ♃

cynanchica. 6. ASPERULA foliis inferioribus ſenis, intermediis quaternis ſubulatis triquetris, floribus quadrifidis.

Aſperula foliis linearibus quaternis, ſummis oppoſitis. *Roy. lugdb.* 255. *Sauv. monſp.* 163.

Rubeola foliis quaternis, feminibus glabris, floribus umbellatis. *Hall. helv.* 458.

Rubia cynanchica. *Bauh. pin.* 333. *Bauh. hiſt.* 3. *p.* 723.

Gallium montanum latifolium cruciatum. *Col. ecphr.* 1. *p.* 296. *t.* 297. *f.* 1.

Gallium album minus. *Tabern. hiſt.* 433. *t.* 433. *f.* 2.

Habitat in Europæ *pratis aridis.* ♃

DIODIA.

virginiana. 1. DIODIA. *Hort. cliff.* 493. * *Gron. virg.* 71.

Habitat in Virginiæ *aquoſis.*

KNOXIA.

zeylanica. 1. KNOXIA. *Fl. zeyl.* 400.

Dentellaria zeylanica, flore minimo, antirrhini folio. *Raj. ſuppl.* 246.

Habitat in Zeylona *ſupra truncos arborum putridarum.*

1. HOU-

HOUSTONIA.

1\. HOUSTONIA foliis radicalibus ovatis, caule com- *cærulea.*
poſito, floribus ſolitariis. *Gron. virg.* 15.
Houſtonia. *Hort. cliff.* 35.
Rubia parva virginiana, foliis ad genicula binis, flore cæruleo fiſtuloſo. *Pluk. alm.* 324. *mant.* 164.
Paronychiæ facie planta tetrapetaloides virginiana, flore cæruleo. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 614. *ſ.* 15. *t.* 4. *f.* 1.
β. Chamejaſme inodora, alſines facie, diſpermos tetrapetaloides, quadrato caule, virginiana. *Pluk. alm.* 97. *mant.* 45. *t.* 97. *f.* 9. *Raj. ſuppl.* 502.
Habitat in Virginia.

2\. HOUSTONIA foliis ovato-lanceolatis, corymbis *purpurea.*
terminalibus. *Gron. virg.* 15.
Rubia mariana, alſines majoris folio ad caulem binato, flore purpuro-rubente. *Pluk. mant.* 164. *Raj. ſuppl.* 262.
Habitat in Virginia.

GALIUM.

* *Fructu glabro.*

1\. GALIUM foliis quaternis lanceolato-ovatis æqualibus *rubioides.*
ſubtus ſcabris, caule erecto, fructibus glabris.
Habitat in Europa *auſtrali. D. Bæck.*
Facies Galii borealis, ſed folia duplo latiora, nervis ſubtus ſcabra, Caulis firmus erectus. Panicula brevis, conglomerata. Semina lævia.

2\. GALIUM foliis quaternis obovatis inæqualibus, cau- *paluſtre.*
libus diffuſis. *Fl. ſuec.* 119.
Gallium caulibus diffuſis, foliis quaternis verticillatis. *Fl. lapp.* 52.
Gallium paluſtre album. *Bauh. pin.* 335.
Habitat in Europæ *rivulis limoſis.* ♃

3\. GALIUM foliis quaternis linearibus obtuſis, ramis *bermudenſe.*
ramoſiſſimis.
Aparine foliis quaternis obtuſis lævibus. *Gron. virg.* 16.
Rubia tetraphylla glabra, latiore folio, bermudenſis, ſeminibus binis atropurpureis. *Pluk. alm.* 324. *t.* 248. *Raj. ſuppl.* 261.
Habitat in Virginia.

4\. GALIUM foliis quaternis linearibus, caule procum- *trifidum.*
bente ſcabro, corollis trifidis.

Habitat in Canada. *Kalm.*

Caulis *procumbens*, *ramoſiſſimus*, *Ramis ternis quaterniſve*, *divaricatis*. Folia *linearia*, *obtuſa*, *latiuſcula*, *glabra*, *ſubtus parum ſcabra*. Pedunculi *ſæpius terni*, *tenuiſſimi*, *foliorum longitudine*, *uniflori*; Flores *minimi*, *albi*, *tripartiti*. Stamina *tria*; Fructus *didymus*, *globoſus*, *lævis*.

tinctorium. 5. GALIUM foliis linearibus: caulinis ſenis; ramorum quaternis, caule flaccido, pedunculis ſubbifloris, fructibus glabris.

Habitat in America *ſeptentrionali. Kalm.*

uliginoſum. 6. GALIUM foliis ſenis lanceolatis retrorſum ſerrato-aculeatis mucronatis rigidis, corollis fructu majoribus.

Aparine foliis lineari-lanceolatis acuminatis rigidis, corollis fructu majoribus. *Roy. lugdb.* 255. *Fl. ſvec.* 121.

Aparine minor paluſtris pariſienſis, flore albo. *Tournef. inſt.* 114. *Vaill. pariſ.* 14. *Fl. lapp.* 58.

Habitat in Europæ *paſcuis aquoſis ſterilibus.* ♃

ſpurium. 7. GALIUM foliis ſenis lanceolatis carinatis ſcabris retrorſum aculeatis, geniculis ſimplicibus, fructibus glabris. *Hort. upſ.* 28. *

Aparine ſemine læviore. *Raj. hiſt.* 484.

Aparine foliis crebrioribus & ſemine læviore. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 332.

Habitat in Europæ *cultis.* ☉

ſaxatile. 8. GALIUM foliis ſenis obovatis obtuſis, caule ramoſiſſimo procumbente.

Galium caule ramoſiſſimo, foliis quinis obverſe ovatis. *Hort. cliff.* 34. *Roy. lugdb.* 257.

Gallium ſaxatile ſupinum, molliore folio. *Juſſ. act.* 1714. *p.* 492. *t.* 15.

Habitat in Hiſpaniæ *maritimis lapidoſis.*

minutum. 9. GALIUM foliis octonis lanceolatis mucronatis ſerrato-aculeatis glabris incurvis.

Galium foliis ſenis cuneiformi-lanceolatis mucronatis glabris. *Hort. upſ.* 28. *

Gallium ſaxatile minimum ſupinum & pumilum, flore luteo. *Tournef. inſt.* 1152.

Habitat in imperio Ruthenico. ♃

puſillum. 10. GALIUM foliis octonis hiſpidis linearibus acuminatis ſubimbricatis, pedunculis dichotomis.

Rubeola

Rubeola ſaxatilis. *Bauh. pin.* 334. *prodr.* 145.
Habitat in montibus Galloprovinciæ.
Caules *numeroſi*, *digitales*, *angulati*; Folia *verticillata foliolis* 8. ſ. 6, *lanceolato-linearibus vel linearibus*, *acutis*, *uti caulis undique pilis patentibus hiſpida. Rami rariores*, *alterni*; *Foliorum verticilli ſæpe ita conferti*, *ut folia imbricatim digeſta conſpiciantur.* Panicula *rarior*, *fere terminalis ex pedunculis bis dichotomis.*

11. GALIUM foliis octonis linearibus ſulcatis, ramis *verum.*
floriferis brevibus. *Hort. cliff.* 34. *Fl. ſvec.* 116, *Mat. med.* 46. *Roy. lugdb.* 256.
Galium caule erecto, foliis plurimis verticillatis linearibus, *Fl, lapp.* 61.
Gallium luteum. *Bauh. pin.* 335.
Habitat in Europa *frequens.* ♃

12. GALIUM foliis octonis ovatis linearibus ſubſerra- *mollugo.*
tis patentiſſimis mucronatis, caule flaccido, ramis patentibus.
Galium foliis pluribus acutis, caule flaccido, ramis patentiſſimis. *Hort, cliff.* 34. *Roy, lugdb.* 257. *Fl, ſvec.* 117.
Mollugo montana latifolia ramoſa. *Bauh. pin.* 334.
Rubia ſylveſtris lævis. *Bauh. pin.* 333.
Mollugo belgarum. *Lob. ic.* 802.
Habitat in Europa *mediterranea.* ♃

13. GALIUM foliis verticillatis linearibus, peduncu- *glaucum.*
lis dichotomis ſummo caule floriferis. *Roy. lugdb.* 256. *Hort. upſ.* 27. *Sauv. monſp.* 161.
Gallium ſaxatile, glauco folio. *Bocc. muſ.* 2. *p.* 172, *t.* 116.
Rubia montana anguſtifolia. *Bauh. pin.* 333. *prodr.* 145.
Habitat in Tataria, Helvetia, Auſtria, Monſpelii. ♃

14. GALIUM foliis verticillatis lineari-ſetaceis, pe- *purpureum.*
dunculis folio longioribus. *Hort. cliff.* 34. *Roy. lugdb.* 256.
Gallium nigropurpureum montanum tenuifolium. *Col. ecphr.* 1. *p.* 298. *Bauh. pin.* 335.
Habitat in Italia.

15. GALIUM foliis verticillatis linearibus, peduncu- *rubrum.*
lis breviſſimis. *Hort. cliff.* 34. *Roy. lugdb.* 256.
Gallium rubrum. *Bauh. pin.* 335. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 332.

Gallium

Gallium rubro flore. *Cluſ. hiſt.* 2. *p.* 175.
Habitat in Italia.

* *Fructu hiſpido.*

boreale. 16. GALIUM foliis quaternis lanceolatis trinerviis glabris, caule erecto, ſeminibus hiſpidis. *Fl. lapp* 60. *Fl. ſuec.* 118. *Hort. cliff.* 64. *Roy. lugdb.* 257 *Hall. helv.* 450.
Rubia pratenſis lævis, acuto folio. *Bauh. pin.* 333. *prodr.* 145.
Habitat in Europæ *borealis pratis.* ♃

ſcabrum. 17. GALIUM foliis quaternis ovatis aculeato-ciliatis, ſeminibus hiſpidis.
Rubia ſemine duplici hiſpido, latis & hirſutis foliis. *Bocconi. Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 329. *ſ.* 9. *t.* 21. *f.* 5.
Habitat in Europa *auſtrali.* ♃

rotundifol. 18. GALIUM foliis quaternis ovatis lævibus obtuſis, panicula dichotoma, ſeminibus hiſpidis.
Rubia quadrifolia ſ. rotundifolia lævis. *Bauh. pin.* 334. *prodr.* 145.
Rubia quadrifolia, ſemine duplici hiſpido. *Bauh. hiſt.* 3. *p.* 718. *Moriſ. hiſt.* 3. *ſ.* 9. *t.* 21. *f.* 4.
Habitat in alpibus Helvetiæ, Styriæ. ♃

Aparine. 19. GALIUM foliis octonis lanceolatis carinatis ſcabris retrorſum aculeatis, geniculis villoſis, fructu hiſpido.
Aparine foliis lanceolatis acuminatis ſcaberrimis, corollis fructu minoribus. *Roy. lugdb.* 455. *Fl. ſuec.* 120.
Aparine foliis lanceolatis. *Hort. cliff.* 34.
Aparine vulgaris. *Bauh. pin.* 334.
Habitat in Europæ *cultis & ruderatis.* ☉

pariſienſe. 20. GALIUM foliis verticillatis linearibus, pedunculis bifidis, fructibus hiſpidis.
Aparine foliis lineari-lanceolatis acuminatis flaccidis, corollis fructu minoribus. *Roy. lugdb.* 255.
Aparine minima. *Raj. angl.* 3 *p.* 225. *t.* 9. *f.* 1.
Galium pariſienſe tenuifolium, flore atropurpureo. *Tournef. inſt.* 664.
Habitat in Anglia, Gallia. ♃

CRUCIANELLA.

anguſtifolia. 1. CRUCIANELLA erecta, foliis ſenis linearibus. *Hort. upſ.* 27. * *Sauv. monſp.* 164.

Cru-

Crucianella foliis linearibus. *Hort. cliff.* 32.
Rubia anguſtifolia ſpicata. *Bauh. pin.* 334 *prodr*, 145.
Habitat Monſpelii. ☉

2. CRUCIANELLA procumbens, foliis quaternis lanceolatis, floribus ſpicatis. *Hort. upſ.* 27.* *Sauv. monſp.* 164 *latifolia.*
Crucianella foliis lanceolatis. *Hort. cliff.* 33.
Rubia latifolia ſpicata. *Bauh. pin.* 334.
Habitat, in Creta & Monſpelii. ☉

3. CRUCIANELLA procumbens, foliis quaternis, floribus ſubverticillatis. *maritima.*
Crucianella erecta, foliis quaternis, corolla ad ſolem conivente. *Sauv. monſp.* 164.
Rubia maritima. *Bauh. pin.* 334. *Dod. pempt.* 357.
Rubia ſ. Aparine ſpicata cretenſis *Cluſ. hiſt.* 2. *p.* 176
Habitat in Creta & Monſpelii. *D. Sauvages.*

4. CRUCIANELLA repens, foliis ſenis, ſpicis longis. *Sauv. monſp.* 225. *monſpeliaca.*
Rubia ſpicata repens. *Magn. monſp.* 225.
Habitat Monſpelii.

RUBIA.

1. RUBIA foliis ſenis. *Hort. cliff.* 35. *Hort. upſ.* 28. *Mat. med.* 44. *Roy. lugdb.* 254. *tinctorum.*
Rubia perennis, foliis ſæpius quinis. *Sauv. monſp.* 161.
Rubia ſylveſtris aſpera. *Bauh. pin.* 33.
β. Rubia tinctorum ſativa. *Bauh. pin.* 33.
Habitat Monſpelii & *ad* Danubium. ♃

2. RUBIA foliis quaternis. *Roy. lugdb.* 254. *peregrina.*
Rubia quadrifolia aſperrima lucida peregrina. *Herm. lugdb.* 523.
Habitat - - - - ♃

SIPHONANTHUS.

1. SIPHONANTHUS ſalicis folio, flore flaveſcente. *Amm. ruth.* 1736. *p.* 214. *t.* 15. *indica.*
Habitat in India. ♄
Folia *alterna, lanceolata*; Pedunculi *ſæpe e regione oppoſiti folii, umbellati.*

CATESBÆA.

1. CATESBÆA *ſpinoſa.*

Frutex

Frutex ſpinoſus, buxi foliis plurimis ſimul naſcentibus, flore tetrapetaloide pendulo ſordide flavo tubo longiſſimo, fructu ovali croceo ſemina parva continente. *Cateſb. carol.* 2. *p.* 100. *t.* 100.
Habitat in Providentia. ♄

IXORA.

coccinea. 1. IXORA foliis ovalibus ſemiamplexicaulibus. *Fl. zeyl.* 22.
Jaſminum flore tetrapetalo, Ixora linnæi, Schetti horti malab. *Burm. zeyl.* 125. *t.* 57.
Jaſminum indicum, lauri folio, inodorum umbellatum, floribus coccineis. *Pluk, alm.* 196. *t.* 59. *f.* 9.
Schetti. *Rheed. mal.* 2. *p.* 17. *t.* 13.
Habitat in India. ♄

alba. 2. IXORA foliis ovato-lanceolatis.
Jaſminum indicum, lauri folio, inodorum umbellatum, floribus albicantibus & Schetti album. *Pluk. alm.* 196. *t.* 109. *f.* 2.
Bemſchetti. *Rheed. mal.* 2. *p.* 19. *t.* 14.
Habitat in India. ♄

SCURRULA.

paraſitica. 1. SCURRULA.
Viſcum vitici innaſcens. *Camell. luz.* 3. *n.* 36. *Pet. gaz. t.* 63. *f.* 8.
Habitat in China. ♄
Arbor. Folia *oppoſita, petiolata, ovata, integerrima, altero latere paulo latiora, glabra.* Flores *axillares*, 3 *ad* 6, *propriis pedicellis.* Germina *inferne attenuata.*

PAVETTA.

indica. 1. PAVETTA. *Fl. zeyl.* 56. * *Amœn. acad.* 1. *p.* 388.
Arbor malabarienſium, fructu lentiſci. *Bauh. pin* 399.
Pavate. *Raj. hiſt.* 1581.
Pavetta ſ. Malleomorhe. *Rheed. mal.* 5. *p.* 19. *t.* 10.
Habitat in India. ♄
Corymbi *trichotomi, faſtigiati, pedunculo filiformi longo inſidentes. Stigma oblongum, bifidum.*

AVICENNIA.

officinalis. 1. AVICENNIA. *Fl. zeyl* 57. *Mat. med.* 41.
Anacardium. *Bauh. pin.* 511.

Oepata

Oepata. *Rheed. mal.* 4. *p.* 95. *t.* 45.
Habitat in India. ♄

MITCHELLA.

1. MITCHELLA. *Gen. nov.* 1083. *repens.*
Chamædaphne, *Mitch. gen.* 27.
Lonicera foliis ſubovatis, germine bifloro, corollis interne hirſutis, ſtylo bifido, *Gron. virg.* 22.
Syringa baccifera, myrti ſubrotundis foliis, floribus albis gemellis. *Pluk. amalth.* 198. *t.* 444. *f.* 2. *Cateſb. carol.* 1. *p.* 20. *t.* 20.
Baccifera mariana, clematis daphnoides minori folio. *Pet. gaz.* 1. *t.* 1. *f.* 13.
Habitat in Carolina, Terra Mariana, Virginia. ♄

CALLICARPA.

1. CALLICARPA. *Act. upſ.* 1741. *p.* 80. *americana.*
Sphondylococcos. *Mitch. E. N. C.* 8. p. 218.
Anonymos baccifera verticillata, folio molli & incano, ex america. *Pluk. alm.* 33. *t.* 136. *f.* 3.
Frutex baccifer verticillatus, foliis ſcabris latis dentatis & conjugatis. *Catesb. carol.* 2. *p.* 47. *t.* 47.
Frutex foliis amplis ſubrotundis acuminatis ex adverſo binis, viminibus lentis infirmis quaſi leni canitie tectis. *Gron. virg.* 138.
Habitat in Virginia, Carolina. ♄

POLYPREMUM.

1. POLYPREMUM. *Act. upſ.* 1741. *p.* 78. *procumbens.*
Linum carolinianum. *Pet. gaz.* 9. *t.* 5. *f.* 6.
Habitat in Carolina, Virginia. ⊙

PENÆA.

1. PENÆA foliis ovatis planis. *Sarcocolla.*
Tithymali myrſinitis ſpecie arbuſcula æthiopica, ſubrotundis foliis e ſtœchadis arabicæ ſquamato capitulo duro lacrymam fundens. *Pluk. mant.* 183. *t.* 44.
Habitat in Æthiopia. ♄
Folia *obtuſiuſcula*; Corollæ *obtuſæ*, Calyx *intermedio flori nullus*; Stylus *magis ſubulatus quam in reliquis.*

2. PENÆA foliis cordatis acuminatis. *Mat. med.* 48. *mucronata.*
Penæa foliis ovatis acuminatis. *Roy. lugdb.* 399.
Penæa. *Hort. cliff.* 37.

Erica africana, unedonis flore amplo, foliis cordiformibus in acumen deſinentibus. *Raj. dendr.* 97.

Tithymali myrſinitis ſpecie arbuſcula æthiopica, flore parvo e lata baſi in acutiſſimum mucronem ſubito deſinente, capitulis origani. *Pluk. mant.* 183.

Habitat in Æthiopia. ♄

ſquamoſa. 3. PENÆA foliis rhombæo-cuneiformibus carnoſis.

Habitat in Æthiopia

Hæc reliquis minor; Corolla (ut in præcedente) acuta. Folia parte dimidia ſuperiore patula.

BLÆRIA.

ericoides. 1. BLÆRIA *Hort. cliff.* 49.

Erica carnea, promontorii bonæ ſpei, foliis & floribus villoſis. *Pet. gaz. t.* 2. *f.* 10.

Habitat ad Cap. b. Spei. ♄

BUDDLEJA.

americana. 1. BUDDLEJA. *Amm. herb.* 577. *Hort. cliff.* 35.

Ophioxylon americanum, foliis oblongis mucronatis leviter ſerratis bardanæ inſtar ſubtus lanuginoſis. *Pluk. alm.* 270. *t.* 210. *f.* 1.

Verbaſci folio minore arbor, floribus ſpicatis luteis, ſeminibus ſingulis oblongis in ſingulis vaſculis ſiccis. *Sloan. jam.* 139. *hiſt.* 2. *p.* 29. *f.* 1. *Raj. dendr.* 97.

Habitat in Caribæis *ad ripas & torrentes.*

EXACUM.

ſeſſile. 1. EXACUM floribus ſeſſilibus. *Fl. zeyl.* 25. *

Exacum. *Amœn. acad.* 1. *p.* 391. *

Planta annua, facie centaurii æthiopici. *Pluk. phyt.* 275. *f.* 3.

Habitat in Aſia & Africa.

pedunculat. 2. EXACUM floribus pedunculatis.

Centaurium minus hypericoides, flore luteo, lini capitulis. *Pluk. mant.* 43. *t.* 343. *f.* 3

Habitat in India. ☉

PLANTAGO.

* *Scapo nudo*

major. 1. PLANTAGO foliis ovatis glabris, nudo ſcapo tereti, ſpica floſculis imbricatis.

Plantago foliis ovatis glabris. *Hort. cliff.* 43. *Fl. ſuec.* 122.

122. *Mat. med.* 49. *Roy. lugdb.* 401. *Hall. helv.* 470. *Dalib. pariſ.* 50.
Plantago ſcapo ſpicato, foliis ovatis. *Fl. lapp.* 62.
Plantago latifolia ſinuata. *Bauh. pin.* 189.
Plantago major. *Cam. epit.* 261.
β. Plantago latifolia glabra minor. *Bauh. pin* 189.
γ. Plantago latifolia roſea, floribus quaſi in ſpica diſpoſitis. *Bauh. pin.* 189. *Hort. upſ.* 29.
δ. Plantago latifolia roſea, flore expanſo. *Bauh. pin.* 189.
ε. Plantago latifolia, ſpica multiplici ſparſa. *Bauh.pin.*189.
Habitat in Europa *ad vias.* ♃

2. PLANTAGO foliis ovatis glabris, ſcapo angulato; ſpica floſculis diſtinctis. *aſiatica.*
Habitat in China, Sibiria.
Planta ita refert P. majorem, *ut quivis facile eandem diceret. At differt* Spica *longiore, floribus remotis & diſtantibus,* Foliis *ſæpius baſi ſubdentatis,* Scapo *angulato.*

3. PLANTAGO foliis ovato-lanceolatis pubeſcentibus, ſpica cylindrica, ſcapo tereti. *Hort. cliff.* 36. *Fl. ſuec.* 123, *Roy. lugdb.* 401. *Hall. helv.* 472. *Dalib. pariſ.* 50. *media.*
Plantago latifolia incana. *Bauh. pin.* 189.
Plantago major incana. *Cluſ. hiſt.* 2. *p.* 109.
β. Plantago latifolia hirſuta minor. *Bauh. pin.* 189.
Plantago latifolia incana, ſpicis variis. *Bauh. pin.* 189. *Moriſ. hiſt.* 3. *ſ.* 8. *t.* 15. *f.* 9.
Habitat in Europæ *paſcuis ſterilibus apricis argilloſis.* ♃

4. PLANTAGO foliis lanceolato-ovatis pubeſcentibus ſubdenticulatis, ſpicis laxis pubeſcentibus, ſcapo angulato. *Gron. virg.* 16. *virginica.*
Plantago media incana virginiana, ſerratis foliis, annua. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 259. *ſ.* 8. *t.* 15. *f.* 8.
Plantago virginiana, piloſellæ foliis anguſtis, radice turbinata. *Pluk. alm.* 298.
Plantago myoſotis ſ. trinervia hirſuta carolina. *Raj. hiſt.* 2. *p.* 1889.
Habitat in Virginia.

5. PLANTAGO foliis lanceolatis, ſpica ſubovata nuda, ſcapo angulato, *Vir. cliff.* 9. *Hort. cliff.* 36. *Roy. lugdb.* 401. *Hall. helv.* 471. *Dalib. pariſ.* 50. *lanceolata.*
Plantago anguſtifolia major. *Bauh. pin.* 189.
Plantago minor. *Dod. pempt.* 102

β. Plantago trinervia, folio anguſtiſſimo. *Bauh. pin.* 189. *prodr.* 98.

δ. Plantago anguſtifolia major, caulium ſummitate folioſa. *Bauh. pin.* 189.

Habitat in Europæ *campis ſterilibus.* ♃

lagopus. 6. PLANTAGO foliis lanceolatis, ſpica ovata hirſuta, ſcapo angulato.

Plantago anguſtifolia, paniculis lagopi. *Bauh. pin* 189. *prodr.* 98. *Moriſ. hiſt.* 3. *ſ.* 8. *t.* 16. *f.* 13.

Habitat in G. Narbonenſi, Hiſpania, Luſitania.

Bracteæ ſ. ſquamæ in ſpica ſunt denſiſſimo tomentoſo-hirſutæ; Baſis foliorum piloſa.

albicans. 7. PLANTAGO foliis lineari-lanceolatis hirſutis, ſpica cylindrica erecta, ſcapo tereti foliis longiore.

Plantago foliis lanceolato-linearibus, ſcapo longitudine foliorum, ſpica oblonga.. *Hort. cliff.* 37. *Roy. lugdb.* 401.

Plantago foliis lanceolato-linearibus, ſcapo foliis duplo longiore, ſpica oblonga. *Sauv. monſp.* 26.

Holoſteum hirſutum albicans majus. *Bauh. pin.* 190.

Holoſteum ſalmanticenſe majus. *Cluſ. hiſt.* 2. *p.* 110.

β. Holoſteum hirſutum albicans minus. *Bauh. pin.* 190.

Habitat in Hiſpaniæ & Narbonæ *aridis.*

alpina. 8. PLANTAGO foliis linearibus planis hirſutis, ſpica oblonga erecta.

Plantago foliis linearibus, ſpica oblonga. *Hall. helv.* 471.

Holoſteum hirſutum nigricans. *Bauh, pin.* 190.

Habitat in Helvetiæ *alpibus.*

cretica. 9. PLANTAGO foliis linearibus, ſcapo breviſſimo lanato nutante, ſpica ſubrotunda, ſcapo tereti. *Hort. cliff.* 36. *Roy, lugdb.* 401.

Holoſteum ſ. Leontopodium creticum. *Bauh. pin.* 190.

Leontopodium creticum. *Cluſ. hiſt.* 2. p. 11.

Habitat in Creta.

maritima. 10. PLANTAGO foliis ſemicylindraceis integerrimis: baſi lanatis, ſcapo tereti. *Fl. ſvec.* 127.

Plantago ſcapo ſpicato, foliis linearibus ſubtus convexis. *Fl. lapp.* 69. *Lob. obſ.* 163.

Coronopus maritimus major. *Bauh. pin.* 190.

Habitat in littoribus marinis Europæ *borealis.*

Baſis foliorum piloſa eſt, unde affinitas ſumma ſpecierum 6. 7.

6. 7. 8. 9. 11. *ſed quæ vis naturæ efficeret tam varia? an locus; an copula.*

11. PLANTAGO foliis ſubulatis triquetris rigidis, ſcapo tereti. *Roy. lugdb.* 402. *ſubulata.*
Plantago foliis triangulari-priſmaticis. *Guett. ſtamp.* 2. *p.* 428.
Holoſteum, ſtrictiſſimo folio, minus. *Bauh. pin.* 191.
Serpentina omnium minima. *Lob. ic.* 439.
β. Holoſteum maſſilienſe. *Bauh. pin.* 190.
Habitat in maritimis Mediterranei *arenoſis.*

12. PLANTAGO foliis linearibus dentatis, ſcapo tereti. *Coronopus.*
Plantago foliis linearibus pinnato-dentatis. *Hort. cliff.* 37. *Fl. ſuec.* 126. *Roy. lugdb.* 401. *Dalib. pariſ.* 50.
Coronopus ſylveſtris hirſutior. *Bauh. pin.* 190. *
Herba ſtella. ſ. Cornu Cervinum. *Dod. pempt.* 109.
β. Coronopus hortenſis. *Bauh. pin.* 190.
Habitat in Europæ *glareoſis.*

13. PLANTAGO foliis linearibus ſubdentatis, ſcapo tereti, ſpica ovata: bracteis carinatis membranaceis. *Lœfl.* *Lœflingii.*
Habitat in Hiſpaniæ *collibus agrorumque marginibus.* ☉
Differt a P. Coronopo *quod ſit minor & praecocior; ſpica ovata, ejus vero longa.* Floribus *rarius imuricatis: bracteis glabris navicularibus; ejus vero ſubulatis anguſtiſſimis pubeſcentibus. Staminibus brevioribus. Calycis foliolis acutioribus; colore corollæ magis fuſco. Foliis linearibus, nec lanceolatis, parce dentatis. Scapus piloſus eſt. Lœfl.*

14. PLANTAGO ſcapo unifloro. *Fl. lapp.* 64. *Fl. ſuec.* 128. *Dalib. pariſ.* 50. *uniflora.*
Plantago floribus femineis ſesſilibus ad exortum ſcapi uniflori maris. *Juſſ. act.* 1742. *p.* 131. *t.* 7. *Guett. ſtamp.* 2. *p.* 26.
[illegible]men junceum, capitulis quatuor longiſſimis filamen[illegible]donatis. *Pluk. alm.* 180. *t.* 35. *f.* 2. *Moris. hiſt.* [illegible] *ſ.* 8. *t.* 9. *f.* 30.
Habitat ad Europæ *littora lacuum.*

β Caule ramoſo.

15. PLANTAGO caule ramoſo, foliis integerrimis, ſpicis folioſis. *Hort. upſ.* 29. * *Pſyllium.*
Plantago caule ramoſo. *Vir. cliff.* 9. *Roy. lugdb.* 401.
Plantago annua, foliis integerrimis, caule ramoſo erecto. *Hort. cliff.* 37. *Dalib. pariſ.* 51.

H 2 Pſyl-

Pſyllium majus erectum. *Bauh. pin.* 191.
Habitat in Europæ *auſtralis ſepibus.* ⊙

Cynops. 16. PLANTAGO caule ramoſo, foliis dentatis, ſpicis aphyllis. *Hort. upſ.* 28. *Mat. med.* 50.
Pſyllium dioſcoridis vel indicum, foliis crenatis. *Bauh. pin.* 191.
Habitat in India. ⊙

SCOPARIA.

dulcis. 1. SCOPARIA. *Gen. nov.* 1098.
Capraria foliis ternis, corollis quadripartitis. *Hort. cliff* 320. *Roy. lugdb.* 301.
Samoloides. *Boerh. lugdb.* 2. *p.* 265. *
Veronica americana erecta fruteſcens & ramoſa. *Herm parad.* 241. *t.* 241.
Veronica fruticoſa erecta dulcis, hexangulari caule. *Sloan. hiſt.* 1. *p.* 195. *t.* 108. *f.* 2.
Phyteuoides americanum, flore albo tetrapetalo. *Pluk. alm.* 296. *t.* 215. *f.* 1.
Habitat in Jamaica, Curaſſao. ⊙

CENTUNCULUS.

minimus. 1. CENTUNCULUS. *Dill. giſſ.* 161. *gen.* 111. *E.N.C.* 5. *app.* 92. *t.* 10. *f.* 31.
Centunculus foliis alternis ovatis. *Fl. ſuec.* 129. *Dalib. pariſ.* 52.
Anagallidiaſtrum exiguum, foliis lanceolatis alternis. *Mitch. gen.* 14. *t.* 18.
Anagallis paludoſa minima. *Vaill. pariſ.* 12. *t.* 4. *f.* 2.
Alſine paluſtris minima, floſculis albis. *Mentz. pug. t.* 4. *f.* 5.
Habitat in Italiæ, Galliæ, Germaniæ, Scaniæ *arenoſis.* ⊙

SANGUISORBA.

officinalis. 1. SANGUISORBA ſpicis ovatis. *Hort. cliff.* 39. *Fl. ſuec.* 130. *Mat. med.* 51. *Roy. lugdb.* 240. *Dalib. pariſ.* 51.
Pimpinella ſangviſorba major. *Bauh. pin.* 160.
Pimpinella ſylveſtris ſ. ſangviſorba major. *Dod. pempt.* 105.
β. PIMPINELLA major rigida præalta auriculata ſubnuda. *Bocc. muſ.* 2. *p.* 19. *t.* 7.
Habitat in Europæ *pratis ſiccioribus.* ♃

2. SAN-

2. SANGUISORBA ſpicis longiſſimis. *Hort. cliff.* 39. *Roy. lugdb.* 240. *canadenſis.*
Pimpinella ſanguiſorba canadenſis major, ſpica longiore alba. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 264. *ſ.* 18. *t.* 8. *f.* 12.
Pimpinella maxima canadenſis longius ſpicata. *Corn. canad.* 175. *t.* 174. *Barr. rar.* 18. *f.* 739.
Habitat in Canada. ♃

CISSUS.

1 CISSUS. *Fl. zeyl.* 60. * *Amœn. acad.* 1. *p.* 390. * *vitiginea.*
Arbuſcula baccifera circumplicatilis, vitigineo folio ſubtus lanato, fructu racemoſo fervidiore odoro. *Pluk. mant.* 27. *t.* 337. *f.* 2.
Schunambu-valli. *Rheed. mal.* 7. *p.* . *t.* 11.
Habitat in India. ♄

EPIMEDIUM.

1. EPIMEDIUM. *Hort. cliff.* 37. *Hort. upſ.* 29. *Roy. lugdb.* 402. *Dod. pempt.* 599. *Lob. hiſt.* 176. *alpinum.*
Habitat in Alpium Euganeorum, Ligurinorum, Pontebarum *umbroſis.* ♃

CORNUS.

1. CORNUS arborea, involucro maximo: foliolis obverſe cordatis. *Hort. cliff.* 38. *Hort. upſ.* 29. *Roy. lugdb.* 249. *Gron. virg.* 17. *florida.*
Cornus mas virginiana, floſculis in corymbo digeſtis a perianthio tetrapetalo albo radiatim cinctis. *Pluk. alm.* 120. *Cateſb. car.* 27. *t.* 27.
Habitat in Virginia. ♄

2. CORNUS arborea, umbellis involucrum æquantibus. *Hort. cliff.* 38. *Hort. upſ.* 29. *Roy. lugdb.* 249. *Dalib. pariſ.* 52. *mas.*
Cornus ſylveſtris mas. *Bauh. pin.* 447.
Cornus mas pumilio. *Cluſ. hiſt.* 1. *p.* 13.
β. Cornus hortenſis mas. *Bauh. pin.* 447.
Habitat in ſepibus Auſtriæ. ♄

3. CORNUS arborea, cymis nudis. *it. W-goth.* 32. *ſanguinea.*
Cornus umbellis involucro multoties longioribus. *Hort. cliff.* 38. *Roy. lugdb.* 249. *Hall. helv.* 463. *Dalib. pariſ.* 52.
Cornus femina. *Bauh. pin.* 447.

Virga ſanguinea. *Dod. pempt.* 782.
Habitat in Europæ, Aſiæ, Americæ *borealis dumetis.* ♄

ſuecica. 4. CORNUS herbacea, ramis binis. *Fl. lapp.* 65. *t.* 5. *f.* 3. *Fl. ſuec.* 132. *Roy. lugdb.* 249.
Cornus pumila herbacea, Chamæpericlymenum dicta. *Dill. elth.* 108. *t.* 91.
Periclymenum humile. *Bauh. pin.* 302. norvegicum. *Bauh. pin.* 302. *Buxb. act.* 3. *p.* 268.
Habitat in Suecia, Norvegia, Ruſſia. ♃

canadenſis. 5. CORNUS herbacea, ramis nullis. *Amœn. acad.* 1. *p.* 157.
Pyrola, alſines flore, braſiliana. *Bauh. prodr.* 100. *pin.* 191. *Burſ.* X. 106.
Habitat in Canada. ♃

TOMEX.

tomentoſa. 1. TOMEX.
Tomex tomentoſa. *Fl. zeyl.* 59. * *Amœn. acad.* 1. *p.* 389.
Arbor malabarica illa dicta. *Burm. zeyl.* 26.
Habitat in India. ♄.

PTELEA.

trifoliata. 1. PTELEA foliis ternatis.
Ptelea. *Hort. cliff.* 36.
Frutex virginianus trifolius, ulmi ſamaris. *Pluk. alm.* 59. *Dill. elth* 147. *f.* 122. *f.* 148.
Habitat in Virginia. ♄

viſcoſa. 2. PTELEA foliis ſimplicibus.
Dodonæa. *Hort. cliff.* 144. *Fl. zeyl.* 141. *Roy. lugdb.* 206.
Carpinus viſcoſa, ſalicis folio integro oblongo. *Burm. zeyl.* 55. *t.* 23.
Arbuſcula viſcoſa, æleagni foliis læte virentibus, americana tricoccos. *Pluk. phyt.* 141. *f.* 1.
Habitat in India. ♄.
Hanc arborem idem genus cum Ptelea agnoſcere obſervavit Ill. B. Juſſiæus.

LUDVIGIA

alternifolia. 1. LUDVIGIA foliis alternis lanceolatis.
Ludvigia capſulis cubicis apice perforatis. *Hort. upſ.* 30.
Ludvigia capſulis ſubrotundis. *Hort. cliff.* 491. *Roy. lugdb.* 252.

Lud-

Ludvigia. *Gron. virg.* 17.
Lyſimachia non pappoſa, flore luteo majore, ſiliqua caryophylloide minore, ex virginia. *Pluk. alm.* 235. *t.* 203. *f.* 2.
Habitat in Virginia. ⊙

2. LUDVIGIA foliis oppoſitis lanceolatis, capſulis pedunculatis. *perennis.*
Ludvigia caule diffuſo, foliis lanceolatis, capſulis pedunculatis folio dimidio brevioribus *Fl. zeyl.* 66. *
Carambu. *Rheed. mal.* 2. *p.* *t.* 49.
Habitat in India. ♃

OLDENLANDIA.

1. OLDENLANDIA pedunculis ſimplicisſimis, fructibus hiſpidis. *uniflora.*
Oldenlandia calycibus fructuum maximis coloratis. *Gron. virg.* 138.
Alſine aquatica major repens, foliis acuminatis, virginiana. *Pluk. alm.* 20. *t.* 74. *f.* 5. *mala.*
Habitat in Virginia.
Caules *ramoſo-ſubdiviſi, repentes.* Folia *oppoſita, lanceolato-ovata, ſubpetiolata, integerrima.* Flores *axillares, pauci, pedunculis propriis.* Germina *hiſpida.*

2. OLDENLANDIA pedunculis bifloris petiolo longioribus, foliis lanceolatis. *Fl. zeyl.* 68. * *biflora.*
Habitat in India. ⊙

3. OLDENLANDIA umbellis nudis lateralibus alternis, foliis linearibus. *Fl. zeyl.* 67. * *umbellata.*
Lyſimachiæ affinis, ſatureiæ folio, maderaſpatenſis, capſulis in ſummitate fere umbellatis. *Pluk. alm.* 236. *t.* 119. *f.* 4.
Habitat in India. ♃

4. OLDENLANDIA pedunculis multifloris, foliis lineari-lanceolatis. † *corymboſa.*
Oldenlandia humilis hyſſopifolia. *Plum. gen.* 42. *Ehret. pict. t.* 4. *f.* 1.
Habitat in America *meridionali.* ⊙

AMMANNIA.

AMMANNIA foliis ſemiamplexicaulibus, caule tetragono, *Hort. cliff.* 344. *Hort. upſ.* 30. *latifolia.*
Ammannia paluſtris, caule quadrangulari, foliis anguſtis. *Amm. herb.* 344.

Apa-

Aparines folio anomala, vaſculo ſeminali rotundo, ſemine minutiſſimo. *Sloan. hiſt.* 1. *p.* 44. *t.* 7. *f.* 4.
Habitat in Caribæis, *locis humidis.* ☉

ramoſior. 2. AMMANNIA foliis ſubpetiolatis, caule ramoſo.
Ludvigia aquatica erecta, caule rubente, foliis ad genicula binis longis anguſtis hyſſopi inſtar, flore tetrapetalo albo. *Clayt.* 774.
Habitat in Virginia. *D. Gronovius.* ☉
Planta *pedalis, inferne Ramis oppoſitis, teretibus, ſimplicibus.* Calyces *ex alis foliorum ſolitarii* (*nec ut in præcedenti terni*), *ad apices ramorum magis conferti & ferme ſpicati.*

baccifera. 3. AMANNIA foliis ſubpetiolatis, capſulis calyce majoribus coloratis.
Anonymos, linariæ folio, orientalis, gallii lutei flore, herba capſularis verticilata. *Pluk. alm.* 33. *t.* 136. *f.* 2. ? *at non ramoſa.*
Habitat in China. *Osbeck.* ☉
Planta *tenera, digiti longitudine, erecta, abſque ramis, caule rufeſcente, tereti.* Folia *oppoſita, lanceolata, ſubpetiolata, integerrima.* Flores *verticillati, ad axillas foliorum plurimi, propriis pedunculis inſidentes, minimi.* Capſula *globoſa, rubra, calyce major.*

ISNARDIA.

paluſtris. 1. ISNARDIA. *Dalib. pariſ.* 53.
Dantia paluſtria. *Petit. gen.* 49. *t.* 49.
Dantia foliis ſubovatis pediculatis, floribus in foliorum alis ſeſſilibus. *Guett. ſtamp.* 2. *p.* 115.
Ocymophyllum. *Buxb. act.* 4. *p.* 277. *t.* 27.
Glaux major paluſtris, flore herbaceo. *Moriſ. præl.* 268. *Raj. hiſt.* 1102. *ſuppl.* 635. *Bocc. muſ.* 105. *t.* 84. *f.* 2.
Alſine paluſtris rotundifolia repens, foliis portulacæ pingvibus. *Lind. alſat.* 114. *t.* 2.
Habitat in Galliæ, Alſatiæ, Ruſſiæ, Virginiæ *fluviis,* ☉

TRAPA.

natans. 1. TRAPA
Trapa petiolis foliorum natantium ventricoſis. *Hort. cliff.* 483. *Fl. ſuec.* 134. *Mat. med.* 52. *Dalib. pariſ.* 52.
Tribulus aquaticus. *Bauh. pin.* 194.

Pano-

Panover-Tſieraua. *Rheed. mal.* 11. *p.* 65. *t.* 33.
Habitat in Europæ *auſtralis*, Aſiæ*que ſtagnis limoſis*. ⊙

DORSTENIA.

DORSTENIA ſcapis radicatis. *Hort. cliff.* 32. *Mat. med.* 53. *Contrajerva.*
Dorſtenia dentariæ radice, ſphondylii folio, placenta ovali. *Houſt. act. n.* 421. *f.* 1.
Dorſtenia ſphondylii folio, dentariæ radice. *Plum. gen.* 29.
Drakena radix. *Cluſ. exot.* 83.
Cyperus longus odoratus peruanus. *Bauh. pin.* 14.
Tuzpatlis. *Hern. mex.* 147.
β. Dorſtenia dentariæ radice, folio minus laciniato, placenta quadrangulari & undulata. *Houſt. act. n.* 421. *f.* 2. *houſtoni.*
Habitat in nova Hiſpania, Mexico, Peru, Vera Cruce, *inſula* Vicentii. ♃

2. DORSTENIA pedunculis caulinis. *Hort. cliff.* 32. *cauleſcens.*
Parietaria racemoſa, foliis ad oras villoſis. *Plum. ſpec.* 10.
Habitat in America *meridionali*. ♃

ELÆAGNUS.

1. ELÆAGNUS foliis lanceolatis. *Roy. lugdb.* 250. *Hort. upſ.* 31. *anguſtifolia.*
Elæagnus. *Cam. epit.* 106. *Hort. cliff.* 38.
Olea ſylveſtris, folio molli incano. *Bauh. pin.* 473.
Habitat in Bohemia, Hiſpania, Syria, Cappadocia. ♄

2. ELÆAGNUS foliis ovatis. *Roy. lugdb.* 250. *Fl. zeyl.* 58. *latifolia.*
Eleachnus foliis rotundis maculatis. *Burm. zeyl.* 92. *t.* 39. *f.* 2.
Habitat in Zeylona. ♄

BRABEJUM.

1. BRABEJUM. *Hort. cliff.* 36. *Roy. lugdb.* 400. *ſtellatifolium.*
Amygdalus æthiopica, fructu holoſericeo. *Breyn. cent.* 1. *t.* 1.
Arbor æthiopica hexaphylla, foliis circa caulem ad intervalla ſenis. *Pluk. alm.* 47. *t.* 265, *f.* 3.
Habitat in Æthiopia. ♄

RIVINA.

1. RIVINA. *Hort. cliff.* 35. *Roy. lugdb.* 207. *humilis.*

caneſcens. α. Rivina humilis racemoſa, baccis puniceis. *Plum. gen.* 48.
Solanoides americana, circææ foliis caneſcentibus. *Tournef. act.* 1706.
Solanum barbadenſe racemoſum minus tinctorium. *Pluk. alm.* 353. *t.* 112. *f.* 2.
Amarantus baccifer, circææ foliis. *Comm. hort.* 1. *p.* 127. *t.* 66.

ſcandens. β. Rivina ſcandens racemoſa, amplis ſolani foliis, baccis violaceis. *Plum. gen.* 48.

glabra. δ. Solanoides americana, circææ foliis glabris. *Tournef. act.* 1706.
Habitat in Caribæis, Jamaica, Barbados. ♄

SALVADORA.

perſica. 1. SALVADORA. *Garc. act. angl.* 1749. *n.* 491. *Gen. nov.* 1097.
Habitat ad Sinum Perſicum. ♄
Frutex foliis *oppoſitis*, Racemo *terminali*.

CAMPHOROSMA.

monſpeliaca. 1. CAMPHOROSMA foliis hirſutis linearibus. *Amœn. acad.* 1. *p.* 392. *Mat. med.* 43.
Camphoroſma. *Sauv. monſp.* 45.
Selago caule procumbente, foliis ſparſis. *Hort. cliff.* 321. *Roy. lugdb.* 300.
Camphorata hirſuta. *Bauh. pin.* 486. *Tournef. act.* 1705. *p.* 313. *Buxb. cent.* 1. *p.* 18. *t.* 28. *f.* 1.
Camphorata monſpelienſium. *Bauh. hiſt.* 3. *p.* 379. *Lob. adv.* 174.
Habitat in Hiſpaniae, Narbonae, Tatariae *arenoſis.*

acuta. 2. CAMPHOROSMA foliis ſubulatis rigidis glabris. *Amœn. acad.* 1. *p.* 393.
Camphorara altera. *Tabern. hiſt.* 57.
Camphoratæ congener. *Bauh. pin.* 486. (*variæ*)
Anthylis altera italorum. *Lob. ic.* 404. *Dalech. hiſt.* 1150.
Habitat in Italia, Tataria. ♃

glabra. 3. CAMPHOROSMA foliis ſemitriquetris glabris inermibus. *Amœn. acad.* 1. *p.* 393.
Camphorata foliis confertiſſimis inermibus lævibus. *Hall. helv.* 193.
Camphorata glabra. *Bauh. pin.* 286. *Dalech. hiſt.* 1179.
Habitat in Helvetia. ♃

AL-

ALCHEMILLA.

1. ALCHEMILLA foliis lobatis. *Fl. ſuec.* 135. *Mat. med.* 54. *vulgaris.*
Alchemilla foliis palmatis. *Hort. cliff.* 38. *Roy. lugdb.* 231.
Alchemilla foliis ſimplicibus. *Fl. lapp.* 66.
β. Alchemilla vulgaris. *Bauh. pin.* 319.
Alchemilla minor. *Tournef. inſt.* 502.
Habitat in Europæ *paſcuis.* ♃

2. ALCHEMILLA foliis digitatis ſerratis. *Fl. lapp.* 61. *Fl. ſuec.* 136. *Hort. cliff.* 39. *Roy. lugdb.* 232. *alpina.*
Alchemilla perennis incana argentea, ſ. ſericea ſatinum provocans. *Moriſ. hiſt.* 2. *p.* 195. *ſ.* 2. *t.* 20. *f.* 3.
Tormentilla alpina, foliis ſericeo. *Bauh. pin.* 326.
β. Alchemilla alpina pubeſcens minor. *Tournef. inſt.* 508. *Pluk. phyt.* 240. *f.* 1. hybrida.
Habitat in Alpibus *Europæ.* ♃

3. ALCHEMILLA foliis quinatis multifidis glabris. *pentaphyllea*
Alchemilla alpina quinquefolia. *Bauh. pin.* 320. *prodr.* 138.
Alchemilla alpina pentaphyllea minima, lobis fimbriatis. *Bocc. muſ.* 1. *p.* 18. *t.* 1.
Habitat in monte Caniſio, Furca, Gotthardo. ♃

DIGYNIA.

APHANES.

1. APHANES *Hort. cliff.* 39. *Fl. ſuec.* 137. *Roy. lugdb.* 231. *Gron. virg.* 17. *Dalib. pariſ.* 53. *arvenſis.*
Chærophyllo nonnihil ſimilis. *Bauh. pin.* 182.
Alchemilla minima montana. *Col. ecphr.* 145. *t.* 146.
Habitat in Europæ *arvis.* ⊙

BUFONIA.

1. BUFONIA. *Sauv. monſp.* 141. *Amœn. acad.* 1. *p.* 386. *tenuifolia.*
Alſinoides. *Raj. angl.* 3. *p.* 346.
Herniaria anguſtiſſimo gramineo folio, erecta. *Magn. hort.* 97. *t.* 97.
Alſine polygonoides tenuifolia, floſculos ad longitudinem caulis velut in ſpicam diſpoſitis. *Pluk. alm.* 22. *t.* 75. *f.* 3.
Habitat in Anglia, Gallia, Hiſpania. ♃
Stamina 4 *numeravit in flore Lœfl.*

HAMA-

HAMAMELIS.

virginiana. 1. HAMAMELIS, *Gron. virg.* 139. *Cold. noveb.* 18. *Cateſb. car.* 3. *p.* 2. *t.* 2.
Trilopus. *Mitch. gen.* 22.
Piſtacia virginiana nigra, coryli foliis. *Pluk. alm.* 298.
Habitat in Virginia.

CUSCUTA.

europæa. 1. CUSCUTA floribus ſeſſilibus.
Cuſcuta nuda repens filiformis. *Fl. ſuec.* 138. *Mat. med.* 55. *Dalib. pariſ.* 53.
Cuſcuta nuda repens fumiformis. *Sauv. monſp.* 11.
Cuſcuta major. *Bauh. pin.* 219.
Cuſcuta. *Cam. epit.* 984.
epithymum β. Cuſcuta nuda repens filiformis. *Sauv. monſp.* 11.
Epithymum ſ. Cuſcuta minor. *Bauh. pin.* 219.
Habitat in Plantis Europæ *paraſitica.*

americana. 2. CUSCUTA floribus pedunculatis.
Cuſcuta caule aphyllo volubili repente. *Gron. virg.* 18.
Cuſcuta inter majorem & minorem media, filamentis longis & floribus late ſuper arbores & campos ſe extendens, *Sloan. jam.* 85. *hiſt.* 1. *p.* 201. *t.* 128. *f.* 4.
Habitat in Virginia.

HYPECOUM.

procumbens. 1. HYPECOUM ſiliquis arcuatis compreſſis articulatis. *Hort. upſ.* 31.
Hypecoum. *Bauh. pin.* 172. *Dod. pempt.* 449. *Hort. cliff.* 38. *Roy. lugdb.* 402.
Habitat inter Archipelagi, Narbonæ & *Salmanticenſes ſegetes.* ⊙

pendulum. 2. HYPECOUM ſiliquis cernuis teretibus cylindricis. *Hort. upſ.* 31. *Sauv. monſp.* 263.
Hypecoum ſiliquis pendentibus non articulatis bivalvibus incurvis. *Moriſ. hiſt.* 2. *p.* 280.
Cuminum ſylveſtre ſiliquatum ponæ. *Dalech. hiſt.* 698.
Habitat in Galloprovincia ⊙

erectum. 3. HYPECOUM ſiliquis erectis teretibus toruloſis. *Hort. upſ.* 32.
Hypecoum tenuifolium, ſiliquis erectis teretibus. *Amm. ruth.* 58. *t.* 9.
Habitat in Dauria.

TRI-

TETRAGYNIA.

ILEX.

* *Flores quadrifidi.*

1. ILEX foliis ovatis acutis ſpinoſis. *Hort. cliff.* 40. *Hort. upſ.* 32. *Roy. lugdb.* 400. *Gron. virg.* 12. *Dalib. pariſ.* 54. **Aquifolium**
Ilex aculeata baccifera. *Bauh. pin.* 425.
Habitat in Europa *auſtraliori*, Japonia, virginia. ♄

2. ILEX foliis ovato-lanceolatis ſerratis. *Hort. cliff.* 40. *Mat. med.* 56. *Roy. lugdb.* 400. **Caſſine.**
Aquifolium carolinenſe, foliis dentatis, baccis rubris. *Catesb. car.* 1. *p.* 31. *t.* 31.
β. Caſſine vera floridanorum arbuſcula baccifera, alterni ferme facie, foliis alternatim ſitis, tetrapyrene. *Pluk. mant.* 40. *Catesb. car.* 2. *p.* 57. *t.* 57.
Habitat in Carolina. ♄

3. ILEX foliis lato-lanceolatis obtuſis integerrimis. **aſiatica.**
Habitat in India Aſiæ. ♄

β *Flores trifidi.*

4. ILEX foliis cuneiformibus tricuſpidatis. **cuneifolia.**
Ilex aculeata, folio tricuſpidi. *Plum. hiſt. mſſ.*
Habitat in America *meridionali.* ♄

5. ILEX foliis pinnatis. **Dodonæa.**
Dodonæa aquifolii folio tricuſpidato. *Plum. gen.* 20.
β. Dodonæa aquifolii folio anguloſo & aculeato. *Plum. gen.* 20.
γ. Dodonæa aquifolii folio anguloſo non aculeato. *Plum. gen.* 20,
Habitat in America *meridionali.* ♄.
Folia *pinnata: foliolis* 21, *ſeſſilibus, rigidis, ovatis, acuminatis, in medio utrinque denticulo angulatis.* Flores *racemoſi ut in Rhoe.*

COLDENIA.

1. COLDENIA. *Fl. zeyl.* 69. **procumbens.**
Teucri facie biſnagarica tetracoccos roſtrata. *Pluk. alm.* 363. *t.* 64. *f.* 6. *Raj. ſuppl.* 283. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 423.
Habitat in India. ☉
Fructificationem ulterius examinent alii in viventi planta, ego ſiccam tantum vidi.

PO-

POTAMOGETON.

natans. 1. POTAMOGETON foliis oblongo-ovatis petiolatis natantibus. *Hort. cliff.* 40. *Fl. ſuec.* 139. *Roy. lugdb.* 212. *Hall. helv.* 199. *Dalib. pariſ.* 54.

Potamogeton foliis ovato-oblongis natantibus. *Fl. lapp.* 68.

Potamogeton rotundifolium. *Bauh. pin.* 193.

β. Potamogeton foliis lanceolato-oblongis, petiolis longis. *Gron. virg.* 139.

Habitat in Europæ lacubus & fluviis. ♃

perfoliatum. 2. POTAMOGETON foliis cordatis amplexicaulibus. *Fl. lapp.* 69. *Fl. ſuec.* 140 *Roy. lugdb.* 212. *Hall. helv.* 199. *Dalib. paris.* 54.

Potamogeton rotundifolium alternum. *Loeſ. pruſſ.* 205. *t.* 65.

Habitat in Europæ *lacubus fluviisque argilloſis.* ♃

denſum. 3. POTAMOGETON foliis ovatis acuminatis oppoſitis confertis, caulibus dichotomis, *Guett. ſtamp.* 1. *p.* 102. †

Potamogeton minus, foliis denſis mucronatis non ſerratis. *Magn. monſp.* 303.

Habitat in Gallia.

lucens. 4. POTAMOGETON foliis lanceolatis planis in petiolos deſinentibus. *Hort. cliff.* 40. *Fl. ſuec.* 141. *Roy. lugdb.* 212. *Dalib. pariſ.* 54.

Potamogeton foliis anguſtis ſplendentibus. *Bauh. pin.* 193.

Fontinalis lucens major. *Bauh. hiſt.* 3. *p.* 769.

Habitat in Europæ *lacubus, ſtagnis, fluviis argilloſis* ♃

criſpum. 5. POTAMOGETON foliis lanceolatis alternis undulatis ſerratis. *Roy. lugdb.* 212. *Fl. ſuec.* 142. *Dalib. pariſ.* 55.

Potamogeton foliis criſpis ſ. Lactuca ranarum ſarmentis planis. *Bauh. pin* 193.

Habitat in Europæ *foſſis & rivulis.*

ſerratum. 6. POTAMOGETON foliis lanceolatis oppoſitis ſubundulatis.

Potamogeton foliis lanceolatis obſcure undulatis, caulibus longe ramoſis. *Guett. ſtamp.* 1. *p.* 102. *Dalib. pariſ.* 55

Potamogeton longo ſerrato folio. *Bauh. pin.* 193.

Habitat in Europæ *rivulis.*

7. PO-

7. POTAMOGETON foliis linearibus obtuſis, caule compreſſo. *Hort. cliff.* 40. *Fl. ſuec.* 143. *Roy. lugdb.* 213. *Dalib. pariſ.* 55. *compreſſum.*
Potamogeton caule plano, foliis gramineis undulatis, ſpica exigua. *Hall. helv.* 201.
Potamogeton caule compreſſo, folio graminis canini. *Raj. hiſt.* 189.
Habitat in Europæ *foſſis paludoſis.*

8. POTAMOGETON foliis ſetaceis parallelis approximatis diſtichis. *Fl. ſuec.* 145. *Dalib. pariſ.* 55. *pectinatum.*
Potamogeton foliis linearibus acutis longiſſimis alternis confertis. *Roy. lugdb.* 213.
Potamogeton gramineum ramoſum. *Bauh. pin.* 193. *prodr.* 101.
Habitat in Europæ *foſſis & paludibus.*

9. POTAMOGETON foliis lanceolatis oppoſitis acuminatis. *Roy. lugdb.* 213. *Dalib. pariſ.* 55. *ſetaceum.*
Potamogeton ramoſum anguſtifolium. *Bauh. in* 193.
Habitat in Europæ *foſſis paludoſis.*

10. POTAMOGETON foliis lineari-lanceolatis alternis ſeſſilibus ſtipula latioribus. *Fl. ſuec.* 144. *gramineum.*
Potamogeton gramineum latiuſculum foliis & ramiſicationibus denſe ſtipatis. *Raj. angl.* 3. *p.* 149. *t.* 4. *f.* 3. *Fl. lapp.* 70.
Habitat in Europæ *foſſis & paludibus.* ☉

11. POTAMOGETON foliis linearibus alternis diſtinctis inferne vaginantibus. *Fl. ſuec.* 146. *marinum.*
Potamogeton puſillum fluitans. *Bocc. ſic.* 42. *t.* 20. *f.* 5. *it. gotl.* 221.
Habitat in Europa *ad maris littora.* ☉

12. POTAMOGETON foliis linearibus oppoſitis alternisque diſtinctis: baſi patentibus, caule tereti. *Fl. ſuec.* 147. *Dalib. pariſ.* 56. *puſillum.*
Potamogeton foliis linearibus alternis remotis. *Roy. lugdb.* 213.
Potamogeto puſillum, gramineo folio breviore. *Vaill. pariſ. t.* 32. *f.* 4.
Habitat in Europæ *paludibus.* ☉

RUPPIA.

1. RUPPIA. *Hort. cliff.* 436. *It. wgoth.* 186. *Guett. ſtamp.* 2. *p.* 416. *maritima.*

Bucca

Buccaferrea maritima, foliis acutiſſimis. *Mich. gen.* 72. *t.* 35.

Potamogeton maritimum, gramineis longioribus foliis, fructu fere umbellato. *Raj. angl.* 3. *p.* 134. *t.* 6. *f.* 1

Fucus folliculaceus, fœniculi folio longiore. *Baub. pin* 365.

Habitat in Europæ *maritimis.* ⊙

SAGINA.

procumbens. 1. SAGINA ramis procumbentibus. *Fl. lapp.* 157. *Fl. ſuec.* 148. *Roy. lugdb.* 452.

Sagina ſcapis & ramis unifloris. *Guett. ſtamp.* 2. *p.* 277

Alſine puſilla graminea, flore tetrapetalo. *Segn. veron* 421. *t.* 5. *f.* 3.

β. Alſine ſaxifraga graminifolia, floſculis tetrapetalis herbidis & muſcoſis. *Pluk. alm.* 23. *t.* 74. *f.* 2.

γ. Saxifraga graminea puſilla foliis brevioribus craſſioribus & ſucculentis. *Raj. angl.* 3. *p.* 345.

Habitat in Europæ *paſcuis ſterilibus uliginoſis aridis.*

erecta. 2. SAGINA caule erecto, unifloro.

Sagina ſcapis unifloris. *Guett. ſtamp.* 2. *p.* 276. *Dalib. pariſ.* 56.

Alſine foliis caryophyllæis. *Raj. angl.* 3. *p.* 344. t. 15. *f.* 4.

Alſine verna glabra. *Vaill. pariſ.* 6. *t.* 3. *f.* 2.

Habitat in Galliæ, Angliæ, Germaniæ *ſterilibus glareoſis.*

virginica. 3. SAGINA caule erecto, floribus oppoſitis.

Saginæ affinis planta minima, floribus albis *Clayt. mſſ* 649.

Habitat in Virginia *inter muſcos ad margines fontium. D. Gronovius.*

Caulis *digitalis, filiformis, erectus*; Folia *oppoſita, ſubulata, remota, minima.* Flos *terminalis & oppoſiti non nulli propriis pedunculis.* Perianthium *4partitum, erectum.* Petala 4, *oblonga.* Stamina 4, *longitudine calycis.* Germen *conicum, longitudine calycis.* Stylus *nullus.* Stigma *obtuſum.* Capſula *pyramidalis, roſtrata, unilocularis.* Semina *numeroſa. An proprii generis?*

TILLÆA.

aquatica. 1. TILLÆA erecta dichotoma, foliis acutis.

Cras-

Craſſula caule dichotomo, floribus linearibus, floribus quadrifidis. *Fl. ſvec.* 259. *Dalib. pariſ.* 98.
Craſſula floribus quadrifidis. *Hort. cliff.* 497.
Sedum minimum annuum, flore roſeo tetrapetalo. *Vaill. pariſ.* 181. *t.* 10. *f.* 2.
Habitat in Europæ *inundatis.* ☉

2. TILLÆA erecta, floribus lateralibus, foliis obtuſis. *rubra.*
Tillæa erecta. *Hort. upſ.* 24. * *Sauv monſp.* 129.
Sedum annuum minimum ſtellatum rubrum. *Magn. monſp.* 238. *t.* 237.
Habitat Monſpelii *inter muſcos.* ☉

3. TILLÆA procumbens. *Hort. upſ.* 24. *Sauv. monſp.* 129. *muſcoſa.*
Tillæa. *Dalib. pariſ.* 43.
Tillæa muſcoſa annua perfoliata. *Mich. gen.* 22. *t.* 20.
Craſſula foliis ſeſſilibus connatis, floribus aggregatis in foliorum alis. *Guett. ſtamp.* 1. *p.* 97.
Polygonum muſcoſum minimum. *Bocc. ſic.* 56. *t.* 29.
Sempervivum omnium minimum repens muſcoſum, polygoni facie. *Bocc. muſ.* 2. *p.* 36. *t.* 22.
Habitat in Italiae, Siciliae, Galliae *muſcoſis.*
Flores hujus ſæpius trifidi, antecedentium quadrifidi; **Phil. Bot.** 178.

I *Claſ-*

Claſſis V.

PENTANDRIA

MONOGYNIA.

HELIOTROPIUM.

indicum. 1. HELIOTRPIUM foliis cordato-ovatis acutis ſcabriuſculis, ſpicis ſolitariis, fructibus bifidis. *Fl. zeyl.* 70.
Heliotropium foliis ovatis acutis, ſpicis ſolitariis. *Hort. cliff.* 45. *Roy. lugdb.* 405.
Heliotropium americanum cæruleum. *Dod. mem.* 83. *Pluk. phyt.* 245. *f.* 4.
β. Heliotropium americanum cæruleum, foliis hormini anguſtioribus. *Herm. lugdb.* 307. *Sloan. jam.* 98.
Habitat in India *utraque.* ☉

europæum. 2. HELIOTROPIUM foliis ovatis integerrimis tomentoſis rugoſis, ſpicis conjugatis. *Hort. upſ.* 33. *Sauv. monſp.* 305.
Heliotropium foliis ovatis integerrimis, ſpicis conjunctis. *Hort. cliff.* 45. *Roy. lugdb.* 404.
Heliotropium majus dioſcoridis. *Bauh. pin.* 253.
Habitat in Europa *auſtrali.* ☉

ſupinum. 3. HELIOTROPIUM foliis ovatis integerrimis tomentoſis plicatis, ſpicis ſolitariis,
Heliotropium minus ſupinum. *Bauh. pin.* 253.
Heliotropium ſupinum. *Cluſ. hiſt.* 2. *p.* 47.
Habitat Salmanticæ *juxta agros,* Monſpelii *in littore.* ☉

curaſſavicum 4. HELIOTROPIUM foliis lanceolato-linearibus glabris aveniis, ſpicis conjugatis, *Hort. cliff.* 45. *Hort. upſ.* 33. *Roy. lugdb.* 405. *Dalib. pariſ.* 57.
Heliotropium indicum procumbens glaucophyllon, floribus albis. *Pluk. alm.* 182. *t.* 36. *f.* 3.
Heliotropium maritimum minus, folio glauco, flore albo. *Sloan. hiſt.* 1. *p.* 213. *t.* 132. *f.* 3.
Heliotropium curaſſavicum, foliis lini umbilicati. *Moriſ hiſt.* 3. *p.* 452. *ſ.* 11. *t.* 31. *f.* 12.
Heliotropium americanum procumbens, facie lini umbilicati. *Herm. par.* 183. *t.* 183.
Habitat in Americæ *calidioris maritimis.* ☉

5. HE-

5. HELIOTROPIUM foliis linearibus glabris aveniis, floribus ſparſis lateralibus. *orientale.*
Habitat in Aſia. ⊙
Planta *parva, procumbens, repens.* Folia *linearia, alterna.* Flores *ſubſeſſiles, alterni, ſolitarii, inter folia ſparſi.*

MYOSOTIS.

1. MYOSOTIS ſeminibus nudis: foliorum apicibus calloſis. *Vir. cliff.* 149. *Fl. ſuec.* 149. *Roy. lugdb.* 404. *Hort. cliff.* 45. *ſcorpioides.*
α. Myoſotis foliis hirſutis. *Hort. cliff.* 46. arvenſis.
Myoſotis hirſuta arvenſis major. *Dill. giſſ.* 55. *Fl. lapp.* 74.
Echium ſcorpioides arvenſe. *Bauh. pin.* 254.
β. Myoſotis foliis glabris. *Hort. cliff.* 46. *Dalib. pariſ.* 58. paluſtris.
Myoſotis glabra pratenſis. *Dill. giſſ.* 67. *Fl. lapp.* 75.
Echium ſcorpioides paluſtre. *Bauh. pin.* 254.
Habitat in Europæ *α campis aridis & β aquoſis ſcaturiginoſis.* ⊙

2. MYOSOTIS ſeminibus aculeatis glochidibus, foliis ovato-oblongis, ramis divaricatis. *virginiana.*
Myoſotis ſeminibus hiſpidis, foliis lanceolato-ovatis. *Gron. virg.* 19.
Cynogloſſum virginianum, flore & fructu minimo. *Pluk. alm.* 126.
Habitat in Virginia. ⊙
Semina interiori latere nuda, angulata, erecta, baſi affixa, ut in ſequenti, fructus nutans.

3. MYOSOTIS ſeminibus aculeis glochidibus, foliis lanceolatis piloſis. *Fl. ſvec.* 150. *Dalib. pariſ.* 57. *Lappula.*
Lithoſpermum ſeminibus echinatis. *Hort. cliff.* 46. *Roy. lugdb.* 405.
Cynogloſſum folis lanceolatis, floribus in foliorum alis ſubſeſſilibus. *Guett. ſtamp.* 1. *p.* 92.
Cynogloſſum minus. *Bauh. pin.* 257.
Habitat in Europæ *argilloſis, nudis, ruderatis.* ⊙

4. MYOSOTIS ſeminibus nudis, foliis hiſpidis, racemis folioſis. *apula.*
Lithoſpermum ſeminibus lævibus, corollis vix calycem ſuperantibus, foliis lanceolatis. *Roy. lugdb.* 405. *Sauv. monſp.* 62.
Echium luteum minimum. *Bauh. pin.* 255.

 Echi-

Echioides lutea minima apula campeſtris. *Col. ecphr* 1. *p.* 184. *t.* 185.
Habitat in Italia, Hiſpania, Narbona. ⊙

LITHOSPERMUM.

officinale. 1. LITHOSPERMUM ſeminibus lævibus, corollis calycem vix ſuperantibus, foliis lanceolatis. *Hort. cliff.* 46. *Fl. ſuec.* 151. *Mat. med.* 57. *Roy. lugdb.* 405. *Dalib. pariſ.* 58.
Lithoſpermum majus erectum. *Baub. pin.* 158.
Habitat in Europæ *ruderatis.* ♃

arvenſe. 2. LITHOSPERMUM ſeminibus rugoſis, corollis vix calycem ſuperantibus. *Hort. cliff* 46. *Fl. ſuec.* 152. *Roy. lugdb.* 405. *Hall. helv.* 518. *Dalib. pariſ.* 59
Lithoſpermum arvenſe, radice rubra. *Baub. pin.* 258 *Fl. lapp.* 73.
Habitat in Europæ *agris & arvis.* ⊙

virginianum 3. LITHOSPERMUM foliis ſubovalibus nervoſis, corollis acuminatis.
Lithoſpermum corollarum laciniis acuminatis hirſutis. *Gron. virg.* 140.
Lithoſpermum latifolium virginianum, flore albido longiore. *Moriſ. hiſt.* 3 *p.* 447. *ſ.* 11. *t.* 28. *f.* 3.
Habitat in Virginia.
Puncta adſperſa foliis ſunt excavata, horum latiora ſeta egrediente notata.

purpurocæruleum. 4. LITHOSPERMUM ſeminibus lævibus, corollis calycem multoties ſuperantibus. *Hort. cliff.* 46. *Roy. lugdb.* 405.
Lithoſpermum flore magno, caule ex apice radices agente. *Hall. helv.* 517.
Lithoſpermum minus repens latifolium. *Bauh. pin.* 258.
Lithoſpermum repens majus. *Cluſ. hiſt.* 2. *p.* 163.
Habitat in Ungariæ, Angliæ, Galliæ *nemoribus.* ♃

tinctorium. 5. LITHOSPERMUM villoſum, caulibus procumbentibus ſimpliciſſimis. *Mat. med.* 58.
Lithoſpermum procumbens, ſeminibus rugoſis, foliis hiſpidis, radice rubra. *Sauv. monſp.* 63.
Anchuſa puniceis floribus. *Bauh. pin.* 255.
Anchuſa monſpeliana. *Bauh. hiſt.* 3. *p.* 584.
Habitat in Oriente, Monſpelii. ♃

6. LI-

6. LITHOSPERMUM fruticoſum, ſtaminibus corol- *fruticoſum.*
lam æquantibus.
Lithoſpermum fruticoſum, corollis calyce majoribus, foliis linearibus hiſpidis. *Sauv. monſp.* 50. 63.
Anchuſa anguſtifolia. *Bauh. pin.* 255.
β. Anchuſa arborea. *Alp. exot.* 67. *t.* 68.
Bugloſſum ſamium fruteſcens, foliis roſmarini obſcure virentibus lucidis & hirſutis. *Tournef. cor.* 6.
Habitat in Gallia, Samo & Europa *auſtrali.* ♄

ANCHUSA.

1. ANCHUSA foliis lanceolatis, ſpicis imbricatis ſecun- *officinalis.*
dis. *Hort. cliff.* 46. *Fl. ſvec.* 152. *Mat. med.* 59. *Roy. lugdb.* 406. *Dalib. pariſ.* 59.
Bugloſſum anguſtifolium majus. *Bauh. pin.* 256.
Habitat ad Europæ *ruderata, vias, agros.* ♃

2. ANCHUSA racemis ſubnudis conjugatis. *Roy. lugdb.* *anguſtifolia.*
408.
Borago ſylveſtris perennis, flore rufo kermeſino. *Zan. hiſt.* 49. *t.* 20.
Bugloſſum anguſtifolium minus. *Bauh. pin.* 256. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 438. *ſ.* 11. *t.* 26. *f.* 4.
Echii facie Bugloſſum minimum, flore rubente. *Lob. ic.* 576.
Habitat in Italia, Germania. ♃

3. ANCHUSA ſtrigoſa, foliis linearibus dentatis, pedi- *undulata.*
cellis bractea minoribus, calycibus fructiferis inflatis. *Lœfl.*
Bugloſſum luſitanicum, echii folio undulato. *Tournef. inſt.* 134.
Habitat in Hiſpaniae, Luſitaniae *pratis.*

4. ANCHUSA ramis floribusque alternis axillaribus, *orientalis.*
bracteis ovatis.
Anchuſa foliis aveniis, floribus ſolitariis ex alis ramorum, uti rami e caule. *Hort. cliff.* 47. *Roy. lugdb.* 404.
Bugloſſum orientale, flore luteo. *Tournef. cor.* 6. *Buxb. cent.* 3. *p.* 17. *t.* 29. *Dill. elth.* 60. *t.* 52. *f.* 60.
Habitat in Oriente. ♃

5. ANCHUSA floribus ſparſis, caule glabro. *virginiana.*
Anchuſa lutea minor, quam alii Paccoon vocant. *Gron. virg.* 19.

I 3 An-

Anchuſa minor lutea virginiana, Puccoon indigenis dicta, qua ſe pingunt americani. *Pluk. alm.* 30.

Lithoſpermum virginianum, flore luteo duplici ampliori. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 447. *ſ.* 11. *t.* 28. *f.* 4.

Habitat in Virginia. ♃

ſempervirens 6. ANCHUSA pedunculis diphyllis capitatis.

Anchuſa ſcapis diphyllis. *Hort. cliff.* 47. *Roy. lugdb.* 407.

Bugloſſum latifolium ſempervirens. *Bauh. pin.* 256. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 437. *ſ.* 11. *t.* 26. *f.* 2.

Habitat in Anglia, Hiſpania. ♃

CYNOGLOSSUM.

officinale, 1. CYNOGLOSSUM ſtaminibus corolla brevioribus, foliis lato-lanceolatis tomentoſis ſeſſilibus.

Cynogloſum foliis lanceolato-ovatis, corollis calycem æquantibus. *Roy. lugdb.* 406. *Fl. ſuec.* 154. *Mat. med.* 154.

Cynogloſſum foliis ovato-lanceolatis. *Hort. cliff.* 47.

Cynogloſſum majus vulgare. *Bauh. pin.* 257.

Habitat in Europæ *ruderatis.* ⊙

virginianum 2. CYNOGLOSSUM foliis amplexicaulibus ovatis.

Cynogloſſum foliis amplexicaulibus. *Gron. virg.* 19.

Habitat in Virginia. ⊙

cheirifolium 3. CYNOGLOSSUM corollis calyce duplo longioribus, foliis lanceolatis. *Roy. lugdb.* 406. *Sauv. monſp.* 64.

Cynogloſſum creticum, argenteo anguſto folio. *Bauh. pin.* 257. *Hort. cliff.* 47.

Cynogloſſum creticum 1. *Cluſ. hiſt.* 2. *p.* 162.

Habitat in Creta, Hiſpania. ⊙

Corollæ albæ venis ſangvineis.

apenninum, 4. CYNOGLOSSUM ſtaminibus corollam æquantibus. *Hort. upſ.* 33. *Sauv. monſp.* 64.

Cynogloſſa montana maxima frigidarum regionum. *Col. ecphr.* 1. *p.* 168. *t.* 170.

Habitat in alpibus Apenninis, Campoclarenſibus, *umbroſis.* ⊙

linifolium, 5. CYNOGLOSSUM foliis lineari-lanceolatis glabris. *Hort. cliff.* 47. *Hort. upſ.* 33. *Roy. lugdb.* 406.

Cynogloſſum minus album, lini foliis glaucis, ſemine umbilicato. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 449. *ſ.* 11. *t.* 30. *f.* 11.

β Om-

β. Omphaloides luſitanica elatior, cynogloſſi folio. *Tourneſ. inſt.* 140.
Habitat in Luſitania. ⊙

5. CYNOGLOSSUM repens, foliis radicalibus cordatis. *Hort. cliff.* 47. *Roy. lugdb.* 406. *Omphaloide.*
Borago minor verna repens, folio lævi. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 437. *ſ.* 11. *t.* 26. *f.* 3.
Symphytum minus, boraginis facie. *Bauh. pin.* 109.
Habitat in Luſitaniæ *nemoroſis.* ♃

PULMONARIA.

** Perianthium longitudine tubi corollæ.*

1. PULMONARIA foliis radicalibus lanceolatis. *Hort. cliff.* 44. *Roy. lugdb.* 404. *Dalib. pariſ.* 60. *anguſtifolia.*
Pulmonaria foliis radicalibus ovato-lanceolatis inferius decurrentibus. *Bœhm. lipſ.* 14.
Pulmonaria 5 pannonica. *Cluſ. hiſt.* 2. *p.* 170.
Habitat in Pannonia, Helvetia, Suecia.
Sequenti nimis affinis, ſolum foliis anguſtis diſtinguenda.

2. PULMONARIA foliis radicalibus ovato-cordatis ſcabris. *Hort. cliff.* 44. *Fl. ſuec.* 156. *Mat. med.* 62. *Roy. lugdb.* 403. *Hall. helv.* 516. *Dalib. pariſ.* 60. *officinalis.*
Symphytum maculoſum ſ. Pulmonoria latifolia. *Bauh. pin.* 259.
β. Pulmonaria vulgaris latifolia, flore albo. *Tourneſ. inſt.* 136.
γ. Pulmonaria non maculoſo folio. *Cluſ. hiſt.* 2. *p.* 168. *Bauh. pin.* 259.
Habitat in Europæ *nemoribus.* ♃

** Calyces tubo corollæ dimidio breviore.*

3. PULMONARIA calycibus abbreviatis, foliis lanceolatis obtuſiuſculis. *virginica.*
Pulmonaria calyce tubo corollæ breviore, perianthiis quinquepartitis. *Gron. virg.* 20.
Symphytum ſ. Pulmonaria non maculata, foliis glabris acuminatis, flore patulo cæruleo. *Pluk. alm.* 359. *t.* 227. *f.* 6. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 444.
Habitat in Virginia. ♃

4. PULMONARIA calycibus abbreviatis, foliis radicalibus ſubcordatis. *ſibirica.*
Habitat in Sibiria. ♃

Radix *perennis*. Folia *glabra*, *glauca*: *radicalia cordata*; *caulina ovata*. Corymbi *ramoſi*, *nutantes* Media *inter antecedentem & ſequentem*.

maritima. 5. PULMONARIA calycibus abbreviatis, foliis ovatis, caule ramoſo procumbente.

Cerinthe foliis ovatis petiolatis. *Hort. cliff.* 48. *Roy. lugdb.* 408.

Cerinthe maritima procumbens. *Dill. elth.* 75. *t.* 65. *f.* 75.

Cynogloſſum procumbens glaucophyllum maritimum. *Pluk. alm.* 126. *t.* 172. *f.* 3.

Cynogloſſum perenne maritimum procumbens. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 450. *ſ.* 11. *t.* 28. *f.* 12.

Habitat in Angliæ *littoribus ſiliceis.* ♃ ☉

SYMPHYTUM.

officinale. 1. SYMPHYTUM foliis ovato-lanceolatis decurrentibus. *Hort. cliff.* 47. *Fl. ſuec.* 155. *Mat. med.* 61. *Roy. lugdb.* 407.

Symphytum Conſolida major. *Bauh. pin.* 259.

Habitat in Europæ *umbroſis ſubhumidis.* ♃

tuberoſum. 2. SYMPHYTUM foliis ſummis oppoſitis.

Symphytum majus, tuberoſa radice. *Bauh. pin.* 259.

Symphytum radice tuberoſa. *Cam. epit.* 701.

Habitat in Germania *auſtrali.* ♃

orientale 3. SYMPHYTUM foliis ovatis ſubpetiolatis.

Symphytum orientale, folio ſubrotundo aſpero, flore cæruleo. *Tournef. cor.* 7.

Symphytum conſtantinopolitanum, boraginis folio & facie, flore albo. *Tournef. cor.* 7. *Buxb. cent.* 5. *p.* 36. *t.* 68.

Habitat juxta Conſtantinopoli *rivulos primo vere.* ♃

CERINTHE.

major. 1. CERINTHE foliis amplexicaulibus, fructibus geminis, corollis obtuſiuſculis patulis.

Cerinthe foliis cordatis ſeſſilibus. *Hort. cliff.* 48. *Hort. upſ.* 35. *Roy. lugdb.* 408.

Cerinthe foliis caulem amplexantibus, dentibus floris revolutis breviſſimis. *Hall. helv.* 515.

Cerinthe flore rubro purpuraſcente. *Bauh. pin.* 258.

β. Cerinthe, flavo flore, aſperior. *Bauh. pin.* 258.

Habitat in Europa auſtrali. ☉

2. CE-

2. CERINTHE foliis amplexicaulibus emarginatis, fru- *maculata.*
ctibus geminis, corollis acutis clauſis.
Cerinthe ſ. Cynogloſſum montanum majus. *Bauh. pin.* 258. ?
Habitat in montanis Europæ *auſtralis. D. Monti.*
Differt a C. minore, cui flore convenit, quod major & folia *maculata emarginata.*

3. CERINTHE foliis amplexicaulibus integris, fructibus *minor.*
geminis, corollis acutis clauſis.
Cerinthe foliis caulem amplexantibus, floribus profunde quinquefidis. *Hall. helv.* 516.
Cerinthe minor. *Bauh. pin.* 258.
Cerinthe minor ſ. quarta. *Cluſ. hiſt.* 2. *p.* 168.
Habitat in Auſtriæ, Styriæ *agris.* ☉
Præcedenti maxime affinis, at Corolla ½ *quinquefida, præcedentis vero tantum margine quinqueloba.*

4. CERINTHE foliis lanceolato-linearibus hiſpidis, ſe- *echioides.*
minibus quaternis diſtinctis. *Hort. cliff.* 48. *Roy. lugdb.* 408.
Anchuſa lutea minor. *Bauh. pin.* 255.
Anchuſa echioides lutea, cerinthæ flore, montana. *Col. ecphr.* 1. *p.* 182. *t.* 183.
β. Anchuſa lutea major. *Bauh. pin.* 255.
Anchuſa tertia. *Cam. epit.* 736.
Anchuſa lutea. *Dalech. hiſt.* 1102.
Habitat in Auſtriæ, Pannoniæ, Helvetiæ, Galliæ, Italiæ *rupibus.* ♃

BORAGO.

1. BORAGO foliis omnibus alternis, calycibus patenti- *officinalis.*
bus. *Hort. upſ.* 34. *Mat. med.* 63.
Borago calycibus patentibus. *Hort. cliff.* 44. *Roy. lugdb.* 403. *Dalib. pariſ.* 61.
Bugloſſum latifolium, Borago. *Bauh. pin.* 256.
Habitat hodie in Normannia *ad Colbeck & alibi in Europa; venit olim ex Aleppo.* ☉

2. BORAGO foliis ramificationum oppoſitis, calycinis ſo- *indica.*
liolis ſagittatis.
Borago calycinis foliis ſagittatis erectis *Hort. cliff.* 45. *Fl. zeyl.* 71. *Roy. lugdb.* 403.
Cynogloſſoides folio caulem amplexante. *Iſnard. act.* 1718. *p.* 325. *f.* 10.
Anchuſæ degeneris facie, indiæ orientalis herba, quadricapſularis. *Pluk. alm.* 30. *t.* 70. *f.* 3.
Habitat in India *Orientali.* ☉

3. BO-

africana. 3. BORAGO calycinis foliolis ovatis acutis erectis. *Hort. cliff.* 45. *Roy. lugdb.* 403.
Cynogloſſoides africana verrucoſa & hiſpida. *Iſnard. act.* 1718. *p.* 325. *t.* 11.
Cynogloſſum, boraginis folio & facie, æthiopicum. *Pluk. alm.* 34.
Habitat in Æthiopia. ⊙
Affinis eſt admodum antecedenti.

orientalis. 4. BORAGO calycibus tubo corollæ brevioribus, foliis cordatis. *Hort. cliff.* 45. *Roy. lugdb.* 403.
Borago conſtantinopolitana, flore reflexo cæruleo, calyce veſicario. *Tournef. cor.* 6. *itin.* 523. *t.* 523. *Buxb. cent.* 5. *pag.* 16. *t.* 30.
Habitat circum Conſtantinopolin. ♃

ASPERUGO.

procumbens. 1. ASPERUGO. *Fl. lapp.* 76. *Fl. ſuec.* 159. *Hort. cliff.* 44. *Roy. lugdb.* 404. *Hall. helv.* 522. *Dalib. pariſ.* 61.
Bugloſſum ſylveſtre, caulibus procumbentibus. *Bauh. pin.* 257. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 439. *ſ.* 11. *t.* 26. *f.* 13.
Habitat in Europæ *ruderatis pinguibus.* ⊙

LYCOPSIS.

veſicaria. 1. LYCOPSIS foliis integerrimis, calycibus fructeſcentibus inflatis pendulis. *Hort. cliff.* 44. *Hort. upſ.* 35. *Roy. lugdb.* 403.
Echioides flore pullo. *Riv. mon.* 11.
Bugloſſum procumbens annuum, pullo minimo flore. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 439. *ſ.* 11. *t.* 26. *f.* 11.
Habitat in Europæ *auſtrali* ⊙

variegata. 2. LYCOPSIS foliis repandis dentatis calloſis, caule decumbente, corollis cernuis. *Hort. upſ.* 34.
Lycopſis foliis repando-dentatis. *Hort. cliff.* 44. *Roy. lugdb.* 404.
Bugloſſum creticum verrucoſum. *Stiſſ. bot.* 57. *t.* 57.
Bugloſſum annuum humile, bullatis foliis, flore cæruleo eleganter variegato. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 439. *ſ.* 11. *t.* 26. *f.* 10.
Habitat in Creta. ⊙

ægyptiaca. 3. LYCOPSIS foliis calloſo-verrucoſis, caule diffuſo, corollis regularibus.
Habitat in Ægypto. ⊙

4. LY

4. LYCOPSIS foliis lanceolatis hiſpidis, calycibus floreſcentibus erectis, *Fl. lapp.* 77. *Fl. ſuec.* 157. *Hort. cliff.* 44. *Roy. lugdb.* 404. *Gron. virg.* 20. *Dalib. pariſ.* 61. *arvenſis.*
Bugloſſum minus ſylveſtre. *Bauh. pin.* 257.
Habitat in Europæ *agris.* ⊙

5. LYCOPSIS foliis ovatis integerrimis ſcabris, calycibus erectis. *orientalis.*
Bugloſſum orientale anguſtifolium, flore parvo cæruleo. *Tournef. cor.* 6.
Habitat in Oriente. ⊙

6. LYCOPSIS foliis lineari-lanceolatis confertis tomentoſis mollibus, caule erecto. *Gron. virg.* 140. *virginica.*
Habitat in Virginia *ad vias.* ♃

ECHIUM.

1. ECHIUM caule fruticoſo. *Hort. cliff.* 43. *Roy. lugdb.* 407. *fruticoſum.*
Echium africanum fruticans, foliis piloſis. *Comm. hort.* 2. *pag.* 107. *t.* 54.
Habitat in Æthiopia. ♄

2. ECHIUM corollis vix calycem excedentibus margine villoſis. *Hort. upſ.* 35. *italicum.*
Echium majus & aſperius, flore albo. *Cam. epit.* 738.
β. Lycopſis. *Bauh. pin.* 255.
Habitat in Anglia, Italia.

3. ECHIUM caule ſimplici erecto, foliis caulinis lanceolatis hiſpidis, floribus ſpicatis lateralibus. *Hort. cliff.* 43. *Fl. ſuec.* 158. *Roy. lugdb.* 407. *Dalib. pariſ.* 61. *vulgare.*
Echium vulgare. *Bauh. pin.* 254. *Cluſ. hiſt.* 2. *p.* 143.
Habitat in Europa *ad vias & agros.* ♂

4. ECHIUM calycibus fructeſcentibus diſtantibus, caule procumbente. *Hort. upſ.* 35. *creticum.*
Echium caule ſimplici, foliis caulinis linearibus, floribus ſpicatis ex alis. *Hort. cliff.* 43.
Echium creticum anguſtifolium rubrum. *Bauh. pin.* 254.
Echium creticum latifolium rubrum. *Bauh. pin.* 254.
Echium creticum 1. 2. *Cluſ. hiſt.* 2. *p.* 165.
Habitat in Creta. ⊙
Stamina non longiora labio breviore corollæ.

5. ECHIUM caule ramoſo, foliis caulinis ovatis, floribus ſolitariis lateralibus. *Hort. cliff.* 43. *Roy. lugdb.* 407. *orientale.*

Echi-

Echium orientale, verbaſci folio, flore maximo campanulato *Tournef. cor.* 6. *itin.* 3. *pag.* 94.
Habitat in Oriente.

luſitanicum. 6. ECHIUM corollis ſtamine longioribus.
Echium caule ſimplici, foliis caulinis lanceolatis ſericeis, floribus ſpicatis lateralibus. *Roy. lugdb.* 407.
Echium, ampliſſimo folio, luſitanicum. *Tournef. inſt.* 135. ?
Habitat in Europa *auſtrali.* ♃

TOURNEFORTIA.

ſerrata. 1. TOURNEFORTIA foliis ovatis ſerratis, petiolis ſpineſcentibus, ſpicis terminatis recurvis.
Pittonia arboreſcens chamædrifolia major. *Plum. gen.* 5.
β. Pittonia arboreſcens chamædrifolia minor *Plum. gen.* 5
Habitat in America calidiore. ♄

hirſutiſſima. 2. TOURNEFORTIA foliis ovatis petiolatis, caule hirſuto, ſpicis ramoſiſſimis terminalibus.
Pittonia hirſutiſſima & ramoſiſſima, baccis albis. *Plum. gen.* 5.
Habitat in America *calidiore.* ♄

volubilis. 3. TOURNEFORTIA foliis ovatis acuminatis, petiolis reflexis, caule volubili.
Tournefortia foliis ovatis acuminatis. *Hort. cliff.* 48.
Pittonia ſcandens, baccis niveis: nigris maculis notatis. *Plum. gen.* 5.
Bryonia nigra fruticoſa, racemi ramulis varie implicatis *Sloan. hiſt.* 1. *p.* 234. *t.* 143. *f.* 2.
Virga aurea americana fruteſcens glabra, foliis ſubtus cæſiis. *Pluk. alm.* 389. *t.* 235. *f.* 6. *Raj. ſuppl.* 348.
Habitat in Jamaica, Mexico, *arbores ſcandens.* ♄

fœtidiſſima. 4. TOURNEFORTIA foliis ovato-lanceolatis, ſpicis ramoſiſſimis pendulis.
Tournefortia foliis ovato-lanceolatis. *Hort. cliff.* 48. *Roy. lugdb.* 408.
Pittonia racemoſa, nicotianæ foliis fœtidiſſimis. *Plum. gen.* 5.
Heliotropium maximum jamaicenſe, limonii mali folio ſupra ſcabro ſubtus lanugine ferruginea molli. *Pluk. alm.* 182. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 452.
Habitat in Mexico, Jamaica. ♄

5. TOUR-

5 TOURNEFORTIA foliis lanceolatis ſeſſilibus, ſpicis ſimplicibus recurvis lateralibus. *humilis.*
Pittonia humilis, anchuſæ folio. *Plum. gen.* 5.
Habitat in America calida. ♄

6 TOURNEFORTIA foliis ovatis integerrimis nudis, ſpicis cymoſis. *glabra.*
Heliotropii flore frutex, folio maximo oblongo acuminato glabro. *Sloan. jam.* 173. *hiſt.* 2. *p.* 109. *t.* 212 *f.* 2. *Raj. dendr.* 76.
Habitat in Jamaica. ♄

7. TOURNEFORTIA foliis lanceolatis, floribus corymboſis, caule herbaceo. *Sibirica.*
Meſſerſchmidia. *Hort. upſ.* 36.
Arguzia montana, *Amm. ruth.* 38.
Habitat in Dauriæ *apricis glareoſis aridis.* ♃
Planta dubii etjamnum generis, interim huc relata

DIAPENSIA.

1. DIAPENSIA floribus pedunculatis. *lapponica.*
Diapenſia. *Fl. lapp.* 88. *t.* 1. *f.* 1. * *Fl. ſuec.* 172
Habitat in alpibus Lapponicis. ♃

2. DIAPENSIA floribus ſubſeſſilibus. *helvetica.*
Androſace cauleſcens, foliis alternis, pedunculis unifloris. *Amœn. acad.* 1. *p.* 164.
Aretia caulibus teretibus foliis imbricatis, floribus ſeſſilibus. *Hall. helv.* 486. *t.* 8. *f.* 4.
Habitat in alpibus Helveticis *Gemmi & Pyndtuerberg.* ♃
Habitus antecedentis; fructum non vidi.

ARETIA.

1. ARETIA villoſa, ſcapis unifloris. *Hall. helv.* 486. *f.* 4. *alpina.*
Habitat in Valleſiæ *monte Loch dicto.* ♃
Fructus anatome nobis deeſt in hac planta.

ANDROSACE.

1. ANDROSACE perianthiis maximis. *Hort. upſ.* 36. *maxima.*
Androſace calycibus fructuum maximis. *Hort. cliff.* 50. *Roy. lugdb.* 414.
Androſace foliis lanceolato-ovatis dentatis, calycibus corolla longioribus. *Wachend. ultr.* 28.
Androſace altera. *Cam. epit.* 639. *Cluſ. hiſt.* 2. *p.* 134.
Alſine affinis Androſace dicta major. *Bauh. pin.* 251.
Habitat inter Auſtriæ *ſegetes.* ☉

2. AN-

ſeptentrionalis. 2. ANDROSACE foliis lanceolatis dentatis glabris, perianthiis angulatis corolla brevioribus. *Fl. ſuec.* 160.
Androſace calyce fructus parvo. *Fl. lapp.* 78.
Androſace montana, flore minore. *Buxb. act.* 2. *p.* 369. *t.* 23. *f.* 2.
Alſine verna, androſaces capitulis. *Bauh. pin.* 251. *prod.* 118.
Alſine minor, androſaces alterius facie. *Bauh. pin.* 251. *prodr.* 118.
Alſine adfinis Androſace dicta minor. *Bauh. pin.* 251.
Habitat in alpibus Lapponiæ, Ruſſiæ *apricis glareoſis.* ☉

villoſa. 3. ANDROSACE foliis piloſis, perianthiis hirſutis.
Aretia villoſa, floribus umbellatis. *Hall. helv.* 486.
Sedum alpinum hirſutum, lacteo flore, *Bauh. pin.* 284.
Sedum minus X, alpinum IV. *Cluſ. hiſt.* 2. *p.* 62.
Habitat in alpibus Rheticis, Pyrenæis.

halleri. 4. ANDROSACE foliis ciliatis.
Aretia foliis ciliatis linearibus, floribus umbellatis. *Hall. helv.* 486. *t.* 7.
Habitat in alpibus Helvetiæ.

lactea. 5. ANDROSACE foliis linearibus glabris, umbella involucris multoties longiore.
Androſace alpina perennis anguſtifolia glabra, flore ſingulari. *Tournef. inſt.* 123.
Sedum alpinum, gramineo folio, lacteo flore. *Bauh. pin.* 284. *Raj. hiſt.* 1042.
Sedum minus XI. *Cluſ. hiſt.* 2. *p.* 61.
Habitat in Auſtriæ *alpibus.* ♃

carnea. 6. ANDROSACE foliis ſubulatis glabris, umbella involucris breviore.
Androſace alpina perennis anguſtifolia glabra & multiflora. *Tournef. inſt.* 123.
Sedum alpinum, anguſtiſſimo folio, flore carneo. *Bauh. pin.* 284.
Sedum alpinum ejusdem. *Columν. ecphr.* 2. *p.* 64. *t.* 65. *f.* 2.
Sanicula alpina, anguſtiſſimo folio. *Pluk. alm.* 332. *t.* 108. *f.* 5.
Habitat in alpibus Pyrenæis, Helveticis. ♃

PRIMULA.

veris. *officinalis.* 1. PRIMULA foliis dentatis rugoſis. *Hort. cliff.* 51. *Fl ſuec.* 161. *Roy. lugdb.* 415. *Dalib. pariſ.* 62. *limbo corollarum concavo. mat. med.* 64.

Pri-

Primula veris odorata, flore luteo ſimplici. *Bauh. hiſt.* 3. *p.* 495.
Verbaſculum pratenſe odoratum. *Bauh. pin.* 241.
β. Primula. - - - - *limbo corollarum plano.* elatior.
Verbaſculum pratenſe vel ſylvaticum inodorum. *Bauh. pin.* 241.
Primula veris, pallido flore, elatior. *Cluſ. hiſt.* 1. *p.* 301.
γ. Primula - - - - *ſcapo nullo.* acaulis.
Primula veris, pallido flore, humilis. *Cluſ. hiſt.* 1. *p.* 302.
Verbaſculum ſylveſtre majus, ſingulari flore. *Bauh. pin.* 241.
Habitat in Europæ *pratis.* ♃

2. PRIMULA foliis crenatis glabris, florum limbo plano. *Hort. cliff.* 50. *Fl. ſuec.* 162. *farinoſa.*
Primula foliis crenatis glabris. *Vir. cliff.* 12. *Roy. lugdb.* 415.
Primula foliis erectis faſtigiatis. *Fl. lapp.* 79.
Primula veris rubro flore. *Cluſ. pan.* 340.
Verbaſculum umbellatum alpinum minus. *Bauh. pin.* 242.
Habitat in Alpinis *frigidisque* Europæ *pratis uliginoſis.* ♃

3. PRIMULA foliis ſerratis glabris. *Vir. cliff.* 12. *Hort. upſ.* 36. *Roy. lugdb.* 415. *Auricula.*
Primula foliis ſerratis carnoſis glabris. *Hort. cliff.* 50.
Sanicula alpina lutea. *Bauh. pin.* 242.
β. Sanicula alpina purpurea *Bauh. p.* 242.
γ. Sanicula alpina, foliis rotundis. *Bauh. pin.* 242.
δ. Sanicula alpina, flore variegato. *Bauh. pin.* 242.
ε. Sanicula alpina anguſtifolia. *Bauh. pin.* 243.
ζ. Sanicula alpina, foliis quaſi farina adſperſis. *Bauh. pin.* 243.
Habitat in alpibus Helveticis, Styriacis. ♃

4. PRIMULA foliis cuneiformibus dentatis minimis corolla longe minoribus. *minima.*
Sanicula alpina minima carnea. *Bauh. pin.* 243.
Auricula urſi VIII. minima. *Cluſ. hiſt.* 1. *p.* 305.
Habitat in Sneberg, Tauro, Judenberg *inque altiſſimo monte prope ſalinas* Auſtriæ *ſuperioris, qua tenditur in Styriam.* ♃

5. PRIMULA foliis linearibus integerrimis; floribus ſeſſilibus. *vitaliana.*

Pri-

Primula flore ſubſeſſili, foliis linearibus. *Amœn. acad.* 1 *p.* 160.
Vitaliana. *Seſl. epiſt.* 69. *t.* 10. *f.* 1. *
Sedum alpinum exiguis foliis. *Baub. pin.* 284.
Sedum alpinum & gregorii ragienſis 1. *Columm. ecphr.* 2. *p.* 63. *t.* 65. *f.* 1. *Raj. hiſt.* 1044.
Habitat in alpibus Pyrenæis & Italicis. ♃
Calyces *longitudine tubi corollæ, ultra medium quinquefidi, corollæ limbus quinquefidus, lobis ovato oblongis*

integrifolia. 6. PRIMULA foliis integerrimis glabris oblongis, calycibus tubuloſis obtuſis.
Primula foliis glabris carnoſis integerrimis. *Hall. helv* 485.
Sanicula alpina rubeſcens, folio non ſerrato. *Baub. pin.* 243.
Auricula urſi IV. *Cluſ hiſt.* 1. *p.* 303. *t.* 304.
Habitat in alpibus Helveticis, Styriacis, Pyrenaicis. ♃

cortuſoides. 7. PRIMULA foliis petiolatis cordatis ſublobatis crenatis.
Habitat in Sibiria. *D. Gmelin.*
Herba foliis ſequentis, floribus antecedentis.

CORTUSA.

matthioli. 1. CORTUSA calycibus corolla brevioribus.
Cortuſa foliis cordatis petiolatis. *Hort. cliff.* 50. *Roy. lugdb.* 414.
Cortuſa matthioli. *Cluſ. hiſt.* 1. *p.* 307.
Sanicula montana latifolia laciniata. *Baub. pin.* 243.
Habitat in alpibus Auſtriæ, Sibiriæ.

Gmelini. 2. CORTUSA calycibus corollam excedentibus. *Amœn acad.* 2. *p.* 340. *
Habitat in Sibiria. *D. Gmelin.* ♃

SOLDANELLA.

alpina. 1. SOLDANELLA. *Hort. cliff.* 49. *Roy. lugdb.* 414 *Hall. helv.* 488.
Soldanella alpina rotundifolia. *Baub. pin.* 295. *Moriſ. hiſt.* 2. *p.* 285. *ſ.* 3. *t.* 15. *f.* 8.
Soldanella alpina. *Cam. epit.* 254.
Habitat in alpibus Helvetiæ, Auſtriæ, Pyrenæorum. ♃

DODECATHEON.

Meadia. 1. DODECATHEON.
Meadia. *Catesb. car.* 3. *p.* 1. *t.* 1.

Auri-

Auricula urſi virginiana floribus boraginis inſtar roſtratis, cyclaminum more reflexis. *Pluk. alm.* 62. *t.* 79. *f.* 6.
Habitat in Virginia. ♃

CYCLAMEN.

1. CYCLAMEN corolla retroflexa. *europæum.*
   Cyclamen foliis cordatis, corolla reflexa. *Hort. upſ.* 47. *Mat. med.* 65.
   Cyclamen. *Hort. cliff.* 49. *Roy. lugdb.* 414.
   Cyclamina omnia 1 --- 13. *Bauh. pin.* 308.
   Cyclaminus. *Cam. epit.* 357.
   Habitat in Auſtriæ, Tatariæ, Europæ *auſtralis nemoroſis.* ♃
   Varietates ſic conjungunt plantas folio anguloſo & rotundo, ut vix ac ne vix limites dentur.

2. CYCLAMEN corollæ limbo nutante. *Fl. zeyl.* 401. *indicum.*
   Habitat in Zeylona. ♃

MENYANTHES.

1. MENYANTHES foliis cordatis integerrimis, corollis ciliatis. *Nymphoides*
   Menyanthes foliis orbiculatis, corollis margine laceris. *Hort. cliff.* 53. *Roy. lugdb.* 430. *Dalib. pariſ.* 62.
   Nymphæa lutea minor, flore fimbriato. *Bauh. pin.* 194.
   Habitat in Belgii, Danticì *foſſis majoribus.* ♃
   Umbella ſimplex, ſeſſilis e latere petioli, ut in ſequenti.

2. MENYANTHES foliis cordatis ſubcrenatis, corollis interne piloſis. *Fl. zeyl.* 72. *indica.*
   Nedel-ambel. *Rheed. mal.* 11. *p.* 55. *t.* 28.
   Habitat in Malabariæ, Zeylonæ *foſſis.*

3. MENYANTHES foliis ternatis. *Fl. lapp* 80. *Fl. ſuec.* 163. *Hort. cliff.* 52. *Mat. med.* 66. *Roy. lugdb.* 430. *Hall. helv.* 487. *Dalib. pariſ.* 62. *trifoliata.*
   Trifolium paluſtre. *Bauh. pin.* 327.
   Habitat in Europæ *paludibus.* ♃

HOTTONIA.

1. HOTTONIA *Boerh. lugdb.* 1. 207. *Hort. cliff.* 51. *Fl. ſuec.* 164. *Roy. lugdb.* 41. *Hall. helv.* 487. *Dalib. pariſ.* 63. *paluſtris.*
   Millefolium aquaticum ſ. Viola aquatica, caule nudo. *Bauh. pin.* 141.

K Mille-

Millefolium aquaticum equiſetifolium, caule nudo. *Bauh. pin.* 141.
Habitat in foſſis & paludibus Europæ *borealioris.* ♃

HYDROPHYLLUM.

virginianum 1. HYDROPHYLLUM *Hort. cliff.* 44. *Roy. lugdb.* 413. *Gron. virg.* 21.
Dentariæ facie planta monopetalos, fructu rotundo monopyreno. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 599. *ſ.* 15. *t.* 1. *f.* 1.
Habitat in Virginia. ♃
Hydrophyllum verum canadenſium in aquis natum diverſiſſima planta foliis binis petiolatis palmatis, baſi excavatis: lobis auctis lobulo utrinque laterali ſerratis, viridibus, facie aceris; Fructificatio hujus mihi ignota eſt.

LYSIMACHIA.

* *Pedunculis multifloris,*

vulgaris. 1. LYSIMACHIA paniculata, racemis terminalibus.
Lyſimachia foliis lanceolatis, racemo compoſito terminali. *Virid. cliff.* 415. *Fl. ſuec.* 166. *Roy. lugdb.* 416.
Lyſimachia foliis lanceolatis, corymbo terminali. *Fl. lapp.* 81. *Hort. cliff.* 50.
Lyſimachia lutea major. *Bauh. pin.* 245.
Habitat in Europa *ad ripas & paludes.* ♃

Ephemerum. 2. LYSIMACHIA racemis ſimplicibus terminalibus, petalis obtuſis, ſtaminibus corolla brevioribus.
Lyſimachia racemo ſimplici terminali, foliis lanceolato-linearibus. *Vir. cliff.* 13. *Hort. cliff.* 3. *Roy. lugdb.* 415.
Lyſimachia ſpicata purpurea minor. *Buxb. cent.* 1. *p.* 22. *t.* 33.
Lyſimachia orientalis minor, foliis glaucis. *Till. piſ.* 106. *t.* 40. *f.* 2.
Habitat in Media. ⊙
Conf. Ephemerum matthioli. *Bauh. pin.* 244. *Bauh. hiſt.* 2. *p.* 905. *Dod. pempt.* 203.
Convenit cum L. atropurpurea habitu, ſtructura, glauco colore. Differt Petalis obtuſis, patulis, ſtaminibus corolla brevioribus, floribus pedicillo inſidentibus; cum illa Petala gerit acuminata, calyce paulo longiora, conniventia, ſaturate rubra; ſtamina corolla longiora, antheris fuſcis; Flores in ſpicam ſeſſiles; interim maxime affines ſunt.

3. LY

3. LYSIMACHIA ſpicis terminalibus patulis lanceolatis, ſtaminibus corolla longioribus. *atropurpurea*
Lyſimachia foliis lanceolato-linearibus caulem & ramos ſpica ovata terminante. *Hort. cliff.* 51.
Lyſimachia foliis lanceolato-linearibus, ſpicis terminalibus. *Roy. lugdb.* 415. *Hort. upſ.* 37. *
Lyſimachia orientalis anguſtifolia. *Comm. rar.* 93. *t.* 33.
Habitat in Oriente. ⊙

4. LYSIMACHIA racemis lateralibus pedunculatis. *thyrſiflora.*
Lyſimachia racemis ſimplicibus lateralibus. *Virid. cliff.* 13. *Fl. ſuec.* 167. *Roy. lugdb.* 416.
Lyſimachia ex alis foliorum thyrſifera. *Fl. lapp.* 82. *Hort. cliff.* 52.
Lyſimachia bifolia, flore globoſo luteo. *Bauh. pin.* 242.
Lyſimachia lutea. *Cluſ. hiſt.* 2. *p.* 53. *f.* 12.
Habitat in Europa, *in paludibus.* ♃

* *Pedunculis unifloris.*

5. LYSIMACHIA foliis quaternis ſubſeſſilibus, pedunculis quaternis unifloris. *quadrifolia.*
Lyſimachia foliis ovato-acutis quaternis. *Gron. virg.* 20.
Anagallis marina lutea, foliis latis ſtellatis. *Pet. gaz.* 5. *t.* 2. *f.* 5.
Anagallis lutea foliis & floribus ex eodem exortu quatuor ex æqualibus ſurculorum intervallis cruciatim poſitis. *Pluk. mant.* 12.
Habitat in Virginia.

6. LYSIMACHIA foliis ſubquaternis, pedunculis verticillatis unifloris. *punctata.*
Lyſimachia foliis lanceolatis, floribus ſolitariis. *Hort. cliff.* 52. *Roy. lugdb.* 416. *Gron. virg.* 20.
Lyſimachia lutea minor, foliis nigris punctis notatis. *Bauh. pin.* 245.
Lyſimachia lutea II. *Cluſ. hiſt.* 2. *p.* 52. *f.* 2.
Blattariæ affinis planta minor, flore luteo, foliis nigris punctis notatis. *Moriſ. hiſt.* 2. *p.* 491. *ſ.* 5. *t.* 10. *f.* 15.
Habitat in Hollandia *inter arundines.*

7. LYSIMACHIA petiolis ciliatis, floribus cernuis. *ciliata.*
Lyſimachia foliis ovato-lanceolatis ſubcordatis, petiolis margine utrinque lanatis, flore ſolitario. *Wach. ultr.* 390.
Lyſimachia canadenſis, jalappæ foliis. *Sarac. canad.* *Walth. hort.* 32. *t.* 12.

K 2 *Habi-*

Habitat in Virginia, Canada.

Caulis *erectus*. Folia *oppoſita*, *oblongo-ovata*, *integerrima*, *acuta*, *glabra*: *nervis lateralibus*; *petioli canaliculati*, *ciliati*. Pedunculi *ſolitarii*, *uniflori*, *nudi*.

Linum ſtellatum. 8. LYSIMACHIA calycibus corollam ſuperantibus, caule erecto ramoſiſſimo. *Roy. lugdb.* 416. *Hort. upſ.* 37. *Sauv. monſp.* 130.

Linum minimum ſtellatum. *Bauh. pin.* 214. *prodr.* 107. *Magn. monſp.* 163. *t.* 162.

Habitat in Gallia. ☉

nemorum. 9. LYSIMACHIA foliis ovatis acutis, floribus ſolitariis, caule procumbente. *Hort. cliff.* 52. *Roy. lugdb.* 416.

Anagallis lutea nemorum. *Bauh. pin.* 252. *Moriſ. hiſt.* 2. *p.* 569. *ſ.* 5. *t.* 26. *f.* 5.

Anagallis. *Cluſ. hiſt.* 2. *p.* 182.

Habitat in Germaniæ, Galliæ, Angliæ *nemoribus glareoſis*.

Nummularia. 10. LYSIMACHIA foliis ſubcordatis, floribus ſolitariis, caule repente. *Vir. cliff.* 13. *Hort. cliff.* 52. *Fl. ſuec.* 168. *Mat. med.* 67. *Roy. lugdb.* 416. *Hall. helv.* 481.

Nummularia major lutea. *Bauh. pin.* 309.

Anagallis mas. *Cam. epit.* 394.

Habitat in Europa *juxta agros & ſcrobes*. ♃

tenella. 11. LYSIMACHIA foliis ovatis acutiuſculis, pedunculis folio longioribus, caule repente.

Lyſimachia foliis ſubrotundis, floribus ſolitariis longe pedunculatis. *Guett. ſtamp.* 2. *p.* 119.

Lyſimachia foliis orbiculatis planis, floribus ſolitariis rubellis, caule repente. *Sauv. monſp.* 135.

Nummularia minor, purpuraſcente flore. *Bauh. pin.* 310. *prodr.* 139. *Moriſ. hiſt.* 2. *p.* 567. *ſ.* 5. *t.* 26. *f.* 2.

Habitat in Galliæ, Angliæ *humidis*.

ANAGALLIS.

arvenſis. 1. ANAGALLIS foliis indiviſis, caule procumbente.

Anagallis foliis indiviſis. *Roy. lugdb.* 416. *Fl. ſuec.* 169.

Anagallis foliis ovatis. *Hort. cliff.* 52.

Anagallis phœniceo flore. *Bauh. pin.* 252.

Habitat in Europæ arvis. ☉

monelli. 2. ANAGALLIS foliis indiviſis, caule erecto.

Anagallis foliis lanceolatis. *Hort. cliff.* 52. *Hort. upſ.* 38.

Ana-

Anagallis cærulea, foliis binis ternisve ex adverſo naſcentibus. *Bauh. pin.* 252.
Anagallis tenuifolia monelli. *Cluſ. app. alt.*
Habitat - - - - ⊙

3. ANAGALLIS foliis cordatis amplexicaulibus, caulibus compreſſis. *latifolia.*
Anagallis hiſpanica latifolia, maximo flore. *Tournef. inſt.* 143.
Cruciata montana minor, flore cæruleo. *Barr. ic.* 584.
Habitat in Hiſpania. *Lœfl.* ⊙
Caulis *erecto-patens, brachiatus, ramoſus, quadrangularis: angulis oppoſitis triplo latioribus, anguſtioribus vero margine acuto utrinque ſeptis.* Folia *ſubcordata, maxime ſeſſilia & amplexicaulia, baſi deorſum ſpectantia, obtuſiuſcula, nervoſa, glabra, ſubtus pallide punctata.* Pedunculi *axillares, ſolitarii, uniflori, nudi, teretes, corolla cærulea, fundo purpuraſcente.* Filamenta *purpurea;* Antheris *oblongis flavis.* Notabilis *foliis magnis & latis, caule compreſſo, A. arvenſi attamen valde affinis.*

4. ANAGALLIS foliis ſinuatis. *Roy. lugdb.* 416. † *capenſis.*
Anagallis purpurea, burſæ paſtoris foliis minoribus. *Pet. muſ.* 245.
Habitat ad Caput b. ſpei.

THEOPHRASTA.

1. THEOPHRASTA. *Roy. lugdb.* 528. *americana.*
Ereſia foliis aquifolii longiſſimis. *Pluk. gen.* 8.
Habitat in America *æquinoctiali.* ♄
Caudex *nudus, ſimpliciſſimus, apice frondoſus ut in Palmis.* Folia *lanceolata, longiſſima, dentata nervis undulatis; omnia ex apice caudicis undique diffuſa.* Fructificationes *ramoſæ, diffuſæ, inter folia ad apicem caulis.*

PATAGONULA.

1 PATAGONULA † *americana.*
Patagonica foliis partim ſerratis partim integris. *Dill. elth.* 306. *t.* 226. *f.* 293.
Habitat in Patagonia Americes *auſtralis.* ♄

SPIGELIA.

1. SPIGELIA. *Anthelmia.*
Arapabaca quadrifolia, fructu teſticulato. *Plum. gen.* 11. *Barr. equin.* 15.
Ara-

Arapabaca braſilienſibus dicta planta. *Marcgr. braſ.* 46.
Habitat in Cajenna, Braſilia.
Caulis *ſimplex, herbaceus.* Folia *terminalia, quatuor, lanceolata.* Folia *caulina alia duo oppoſita.* Ramus *ex ala ſingula folii caulini ſolitarius, cauli ſimillimus, terminatus foliis quatuor cruciatim poſitis, ut in caule. Racemi terminales ſolitarii in caule & ramis.*

OPHIORRHIZA.

Mungos. 1. OPHIORRHIZA foliis lanceolato-ovatis.
Ophiorrhiza. *Fl. zeyl.* 402. *Mat. med.* 79. *t.* 1. *Amœn. acad.* 2. *p.* 118.
Habitat in India *orientali.* ♃
Conf. Limonium mauritanicum, flore minimo, caule folioſo. *Pet. gaz.* 66. *t.* 41, *f.* 12.

Mitreola. 2. OPHIORRHIZA foliis ovatis.
Mitreola. *Hort. cliff.* 492. *Gron. virg.* 28.
Mitra. *Houſt. mſſ. t. bon.*
Habitat in America *meridionali.*

AZALEA.

indica. 1. AZALEA floribus ſubſolitariis, calycibus piloſis.
Chamærhododendron exoticum, ampliſſimis floribus liliaceis. *Breyn. prodr.* 1. *p.* 23.
Ciſtus indicus, iedi alpini foliis, floribus amplis. *Herm. lugdb.* 152. *t.* 153. *Raj. hiſt.* 1895.
Tſutſuſi. *Kæmph. amœn.* 845. *t.* 846.
Habitat in India. ♄

pontica. 2. AZALEA arborea. †
Chamærhododendros pontica maxima, meſpili folio, flore luteo. *Tournef. cor.* 42. *Buxb. cent.* 5. *p.* 36. *t.* 69.
Habitat in Ponto, Trapezunte. ♄

lutea. 3. AZALEA foliis ovatis, corollis piloſis, ſtaminibus longiſſimis.
Azalea ramis infra flores nudis. *Gron. virg.* 21.
Azalea ſcapo nudo, floribus confertis terminalibus, ſtaminibus declinatis. *Hort. cliff.* 69.
Azalea erecta, foliis ovatis integris alternis, flore luteo piloſo præcoci. *Cold. ebor.* 25.
Ciſtus virginiana, periclymeni flore ampliori minus odorato. *Pluk. mant.* 49.
Habitat in Virginia. ♄

4. AZALEA foliis margine ſcabris, corollis piloſo-glutinoſis. *viſcoſa*

Azalea ramis infra flores folioſis. *Gron. virg.* 21. *Cold. ebor.* 24.

Ciſtus virginiana, flore & odore periclymeni. *Pluk. alm.* 106 *t.* 161. *f.* 4. *Cateſb. car.* 1. *p.* 57. *t.* 57.

Habitat in Virginia. ♄

5. AZALEA foliis adſperſis punctis excavatis. *lapponica.*

Azalea ramis compoſitis ſuberectis. *Fl. ſuec.* 171.

Azalea maculis ferrugineis ſubtus adſperſa. *Fl. lapp.* 89. *t.* 6. *f.* 1.

Habitat in Alpibus Lapponiæ. ♄

6. AZALEA ramis diffuſo procumbentibus. *Fl. lapp.* 90. *t.* 6. *f.* 2. *Fl. ſuec.* 170. *Hall. helv.* 416. *procumbens.*

Chamærhododendros ſupina ferruginea, thymi folio, alpina. *Bocc. muſ.* 2. *p.* 64. *t.* 53.

ChamæCiſtus ſerpyllifolia, floribus carneis. *Bauh. pin.* 466.

Habitat in Alpibus Europæ. ♄

PLUMBAGO.

1. PLUMBAGO foliis amplexicaulibus. *Hort. cliff.* 53. *Mat. med.* 75. *Roy. lugdb.* 417. *Sauv. monſp.* 63. *europæa.*

Lepidium Dentillaria dictum. *Bauh. pin.* 97.

Tripolium dioſcoridis, *Col. ecphr.* 1. *p.* 160. *t.* 161.

Habitat in Europa *auſtrali.* ♃

2. PLUMBAGO foliis petiolatis. *Hort. cliff.* 53. *Hort. upſ.* 43. *Fl. zeyl.* 73. *Roy. lugdb.* 417. *zeylanica.*

Dentillaria lychnoides ſylvatica ſcandens, flore albo. *Sloan. hiſt.* 1. *p.* 211. *t.* 133. *f.* 1.

Lychnis indica ſpicata, ocymaſtri foliis, fructibus lappaceis oblongis, radice urente. *Comm. hort.* 2. *p.* 169. *t.* 5.

Habitat in India *utraque.* ♃

PHLOX.

1. PHLOX foliis lanceolatis margine ſcabris, corymbis compoſitis, *paniculata.*

Lyſimachia virginiana umbellata maxima, lyſimachiæ luteæ floribus amplioribus, *Pluk. mant.* 121.?

Habitat in America *ſeptentrionali. Collinſon.* ♃

Planta *magna*, *alta*. Caulis *lævis*, *obtuſus*. Folia *lato-lanceolata*: *margine Aculeis minutiſſimis ſparſis exa-*

ſperata. Corymbi *conferti in umbellam* Floribus *numeroſiſſimis.*

maculata. 2. PHLOX foliis cordato-lanceolatis lævibus.
Lychnoides marilandica, foliis binis oppoſitis baſi & auriculis caulem utrinque amplexantibus. *Raj. ſuppl.* 489.?
Habitat in Virginia. *Kalm.* ♃
Plantæ caulis *teretiuſculus, ſubſcaber, rubro viridique undique tenuiſſime maculatus, erectus.* Folia *lævia, e baſi amplexicauli cordata, elongata in lanceolatum ſenſim acutius.* Flores *in Racemum compoſitum digeſti.*

piloſa. 3. PHLOX foliis lanceolatis villoſis, caule erecto, corymbo terminali.
Lychnoides marilandica, calycibus lanuginoſis, foliis anguſtis acutis. *Raj. ſuppl.* 490.
Lychnidea umbellifera, blattariæ accedens virginiana, major repens pſeudomelanthii foliis piloſis, flore pentapetaloide fiſtuloſo. *Pluk. alm.* 133. *t.* 98. *f.* 1.
Habitat in Virginia. ♃

glaberrima. 4. PHLOX foliis lineari-lanceolatis glabris, caule erecto, corymbo terminali. *Hort. cliff.* 63. *Roy. lugdb.* 432. *Gron. virg.* 21.
Lychnidea folio melampyri. *Dill. elth.* 203. *t.* 166. *f.* 202.
Habitat in Virginia. ♃

divaricata. 5. PHLOX foliis lato-lanceolatis: inferioribus alternis, caule ramoſo.
Lychnidea virginiana, alſines aquaticæ foliis, floribus in ramulis divaricatis. *Pluk. mant.* 121?
Habitat in Virginia.
Plantæ Caules *erectiuſculi.* Folia *lanceolata ſ. ovato-lanceolata, oleracea & molliuſcula, glabra aut parum piloſa: ſuperiora oppoſita, inferiora alterna.* Rami *alterni, baſi divaricati.* Corollæ *cæruleæ.*

ovata. 6. PHLOX foliis ovatis, floribus ſolitariis.
Lychnidea fiſtuloſa marilandica, clinopodii vulgaris folio, flore amplo ſingulari. *Pluk. mant.* 122. *t.* 348. *f.* 4.
Habitat in Virginia. ♃

ſubulata. 7. PHLOX foliis ſubulatis hirſutis, floribus oppoſitis.
Lych-

Lychnidea, blattariæ accedens virginiana, minor repens, hirſutis camphoratæ foliis. *Pluk. alm.* 233. *t.* 98. *f.* 2.
Habitat in Virginia.
Corollæ *lobi emarginati & tubus calyce duplo longior eſt.*

8. PHLOX foliis linearibus villoſis, pedunculis ternis. *ſibirica.*
Amæn. acad. 2. *p.* 342.
Habitat in Aſia *boreali.* ♃
Lobi Corollæ *rotundatæ integræ &* calyces *longitudine tubi corollæ.*

9. PHLOX foliis ſetaceis glabris, floribus ſolitariis. *ſetacea.*
Lychnidea, blattariæ accedens virginiana, camphoratæ congeneris, glabris foliis. *Pluk. alm.* 233. *t.* 98. *f.* 3.
Habitat in Virginia.

CONVOLVULUS.

* *Caule volubili.*

1. CONVOLVULUS foliis ſagittatis utrinque acutis, pedunculis unifloris. *Fl. ſuec.* 173. *Dalib. pariſ.* 65. *arvenſis.*
Convolvulus foliis ſagittatis utrinque acutis. *Hort. cliff.* 66. *Roy. lugdb.* 427.
Convolvulus minor arvenſis. *Bauh. pin.* 294.
Habitat in Europæ *agris.* ♃

2. CONVOLVULUS foliis ſagittatis poſtice truncatis, pedunculis unifloris. *Roy. lugdb.* 427. *Fl. ſuec.* 174. *Dalib. pariſ.* 65. *ſepium.*
Convolvulus foliis ſagittatis poſtice truncatis. *Hort. cliff.* 66.
Convolvulus major albus. *Bauh. pin.* 294.
Habitat in Europæ *ſepibus.* ♃

3. CONVOLVULUS foliis ſagittatis poſtice truncatis, pedunculis bifloris. *Roy. lugdb.* 427. *Mat. med.* 82. *Scammonia.*
Convolvulus ſyriacus ſ. Scammoniaca ſyriaca. *Moriſ. hiſt.* 2. p. 12. *ſ.* 1. *t.* 3. *f.* 5.
Scammonia ſyriaca. *Bauh. pin.* 294.
Habitat in Syria, Myſia, Cappadocia. ♃

4. CONVOLVULUS foliis cordatis integris panduriformibusque, calycibus lævibus. *panduratus.*
Convolvulus foliis inferioribus cordatis, ſuperioribus trilobis, calycibus pedunculis petiolisque glabris, caule rubeſcente. *Gron. virg.* 141.
Habitat in Virginiæ *arenoſis.*

 5. CON-

carolinus. 5. CONVOLVULUS foliis cordatis integris trilobisque villoſis, calycibus lævibus, capſulis hirſutis, pedunculis ſubbifloris.

Convolvulus, folio hederaceo, arvenſis, flore dilute purpureo. *Dill. elth.* 100. *t.* 84. *f.* 98.

Habitat in Carolina. ♃

Pedunculi uniflori aut biflori.

hederaceus. 6. CONVOLVULUS calycibus tuberculatis piloſis. *Virid. cliff.* 18. *Hort. upſ.* 38. *Gron. virg.* 141. *Roy. lugdb.* 428.

Convolvulus annuus, foliis cordatis rarius trilobis, calyce tuberculato piloſo. *Hort. cliff.* 67.

Convolvulus purpureus, folio ſubrotundo. *Bauh. pin.* 295.

β. Convolvulus cæruleus minor, folio ſubrotundo. *Dill. elth.* 97. *t.* 82. *f.* 94.

γ. Convolvulus flore purpureo, calyce punctato. *Dill. elth.* 99. *t.* 83. *f.* 96.

δ. Convolvulus flore minore lacteo fundo atrorubente. *Dill. elth.* 98. *t.* 83. *f.* 95.

ε. Convolvulus folio cordato glabro, flore vilolaceo. *Dill. elth.* 100. *t.* 84. *f.* 97.

ζ. Convolvulus cæruleus, hederaceo anguloſo folio. *Bauh. pin.* 295. *Dill. elth.* 96. *t.* 80. *f.* 91.

η. Convolvulus cæruleus, hederaceo folio magis anguloſo. *Dill. elth.* 96. *t.* 80. *f.* 92.

Convolvulus cæruleus major, folio hederaceo. *Dill. elth.* 97. *t.* 81. *f.* 93.

Habitat in Aſia, Africa, America. ⊙

Pedunculi in aliis uniflori, in aliis triflori ſ. multiflori, limites autem inter ſingulas α---η vix occurrunt.

Batatas. 7. CONVOLVULUS foliis cordatis angulato-nervoſis, caule repente tuberrifero.

Convolvulus foliis cordatis angulatis, radice tuberoſa. *Hort. cliff.* 67. *Roy. lugdb.* 427.

Convolvulus radice tuberoſa eſculenta &c. *Catesb. car. p.* 60. *t.* 60.

Convolvulus indicus orientalis Inhame ſ. Batatas. *Moriſ. hiſt.* 2. *p.* 11. *ſ.* 1. *t.* 3. *f.* 4.

Convolvulus indicus vulgo Patates dictus. *Raj. hiſt.* 728.

Batatas. *Bauh. pin.* 91.

Kappa kelengu. *Rheed. mal.* 7. *p.* 95. *t.* 50.

Habitat in India *utraque.* ♃

Conf. Convolvulus indicus vulgo Patates dictum. *Feu per.* 3. *p.* 16. *t.* 11. foliis palmatis.

8. CON

8. CONVOLVULUS foliis cordatis, pedunculis umbellatis. *umbellatus.*
Convolvulus americanus, vulgaris folio, capſulis triquetris numeroſis. *Pluk. alm.* 114. *t.* 167. *f.* 1.
Convolvulus luteus polyanthos. *Plum. amer.* 88. *t.* 102.
Convolvulus polyanthos, folio ſubrotundo, flore luteo. *Sloan. jam.* 55.
Habitat in Martinica, Domingo, Jamaica. ♃

9. CONVOLVULUS foliis cordatis glabris, caule perenni villoſo. *malabaricus.*
Convolvulus foliis cordatis acuminatis, caule arboreo ſcandente. *Roy. lugdb.* 429.
Kattu-kelengu. *Rheed. mal.* 11. *p.* 105. *t.* 5. *Raj. ſuppl.* 376.
Habitat in Malabariæ *arenoſis.* ♄

10. CONVOLVULUS foliis cordatis pubeſcentibus, caule perenni villoſo, pedunculis multifloris. *canarienſis.*
Convolvulus foliis cordatis, caule fruticoſo villoſo. *Vir. cliff.* 18. *Hort. cliff.* 67. *Roy. lugdb.* 428.
Convolvulus canarienſis ſempervirens, foliis mollibus & incanis. *Comm. hort.* 2. *p.* 101. *t.* 51.
Convolvulus canarienſis, foliis longioribus mollibus incanis. *Pluk. alm.* 114. *t.* 325. *f.* 1.
Habitat in Canarienſibus *inſulis.* ♄

11. CONVOLVULUS foliis cordatis, caule aculeato. *Hort. cliff.* 496. *aculeatus.*
Convolvulus americanus, ſubrotundis foliis, viticulis ſpinoſis. *Pluk. alm.* 115. *t.* 276. *f.* 3.
Convolvulus maximus, caule ſpinulis obtuſis obſito. *Sloan. jam.* 55. *hiſt.* 1. *p.* 151. *t.* 96. *f.* 1? *Raj. ſuppl.* 371?
Smilax aſpera indiæ occidentalis. *Bauh. pin.* 296.
Habitat in America *calidiore.* ♄

12. CONVOLVULUS foliis cordatis angulatis, caule membranaceo quadrangulari, pedunculis multifloris. *Fl. zeyl.* 74. *Mat. med.* 84. *Turpethum.*
Convolvulus zeylanicus alatus maximus, foliis ibiſci nonnihil ſimilibus anguloſis. *Herm. lugdb.* 177. *t.* 178. 179.
Turpethum repens, foliis althææ vel indicum. *Bauh. pin.* 149.
Habitat in Zeylona. ♃

13. CON-

tomentoſus. 13. CONVOLVULUS foliis trilobis tomentoſis, caule lanuginoſo.

Convolvulus folio lanato in tres lacinias diviſo, flore oblongo purpureo. *Sloan. jam.* 55. *hiſt.* 1. *p.* 154. *t.* 98. *f.* 2. *Raj. ſuppl.* 381.

Convolvulus jamaicenſis trilobus, foliis tomentoſa lanugine denſiori ac veluti inſtar utrinque obductis. *Pluk. alm.* 115. *t.* 167. *f.* 4.

Habitat in Jamaica.

althæoides. 14. CONVOLVULUS foliis palmatis cordatis ſericeis: lobis repandis, pedunculis bifloris.

Convolvulus foliis cordato-digitatis ſericeis: foliolis linearibus: intermediis duplo longioribus. *Vir. cliff.* 18. *Roy. lugdb.* 429. *Sauv. monſp.* 202.

Convolvulus foliis ovatis diviſis baſi truncatis: laciniis intermediis duplo longioribus. *Hort. cliff.* 67.

Convolvulus argenteus, folio althææ. *Bauh. pin.* 295.

Convolvulus, betonicæ althææque foliis, repens argenteus. *Barr. rar.* 5. *t.* 312.

β. Convolvulus argenteus elegantiſſimus, foliis tenuiter inciſis. *Tournef. inſt.* 85.

Habitat in Europa *meridionali.*

paniculatus. 15. CONVOLVULUS foliis palmatis: lobis ſeptem ovatis acutis integerrimis, pedunculis paniculatis.

Pal-modecca. *Rheed. mal.* 11. *p.* 101. *t.* 49. *Raj. ſuppl.* 374.

Habitat in Malabariæ *arenoſis.*

Medium. 16. CONVOLVULUS foliis haſtato-acuminatis: auriculis dentatis, pedunculis ſubunifloris, calycibus ſagittatis.

Tala-neli. *Rheed. mal.* 11. *p.* 113. *t.* 55.

Habitat in India.

Folia *lanceolata, apice integra, glabra, acuta, baſi dilatata in* 2. *auriculas recurvas extrorſum ſubdentatas.* Pedunculi *uniflori, rarius biflori;* Stipulis *lanceolatis oppoſitis, duabus, acuminatis.* Calycis *foliola ſagittata hinc Campanulæ Medii inſtar poſtice appendiculata retroſpectantia.*

* * *Caule proſtrato.*

ſiculus. 17. CONVOLVULUS foliis cordato-ovatis, pedunculis unifloris: bracteis lanceolatis, flore ſeſſili.

Convolvulus foliis ovatis acutis, floribus duplici bracteæ ſuccinctis. *Roy. lugdb.* 428.

Con

Convolvulus foliis ovatis acutis. *Hort. cliff.* 67.
Convolvulus ſiculus minor, flore parvo auriculato. *Bocc. ſic.* 89. *t.* 48. *Moriſ. hiſt.* 2. *ſ.* 1. *t.* 7. *f.* 5.
Habitat in Sicilia. ☉
Caulis vix vel admodum parum, ſæpius minime volubilis.

18. CONVOLVULUS foliis ſubrotundis, caule repente. *nummularius.*
Convolvulus minor repens, nummulariæ folio, flore cæruleo. *Sloan. jam.* 58. *hiſt.* 1. *p.* 157. *t.* 99. *f.* 2. *Raj. ſuppl.* 382.
Habitat in Jamaicæ & Barbados *pratis.*

19. CONVOLVULUS foliis ſubovatis obtuſis petiolatis piloſis, caule diffuſo, pedunculis trifloris. *Fl. zeyl.* 76. *alſinoides.*
Convolvulus foliis ovatis obtuſis, caule filiformi. *Hort. cliff.* 68.
Convolvuli minimi ſpecies biſnagarica hirſuta, alſines folio. *Pluk. alm.* 116. *t.* 9. *f.* 1.
Anagallis hirſuta minor, foliis alternis, floribus ſolitariis. *Burm. zeyl.* 11. *t.* 6. *f.* 1.
Viſtnu-clandi. *Rheed. mal.* 11. *p.* 131. *t.* 64.
Habitat in Malabaria, Zeylona, Biſnagaria, Bahama.
Varietas habitu lini: caulibus, panicula, foliis lanceolatis ſericeis, hujus forte ſola varietas.

20. CONVOLVULUS foliis lineari-cuneiformibus tricuſpidatis: baſi dilatata dentatis, pedunculis unifloris. *tridentatus.*
Convolvulus minor procumbens, acetoſellæ foliis tricuſpidatis ad imum quaternis: ſummo apice tricuſpidatis. *Pluk. ant.* 117. *t.* 167. *f.* 5.
Sendera-Clandi. *Rheed. mal.* 11. *p.* 133. *t.* 65.
β. Convolvulus indicus barbatus minor: foliorum apicibus lunulatis. *Pluk. alm.* 117. *t.* 276. *f.* 6.
Habitat in India.

21. CONVOLVULUS foliis lanceolatis obtuſis ſericeis, pedunculis multifloris. *Hort. cliff.* 68. *Roy. lugdb.* 429. *Sauv. monſp.* 56. *Cneorum.*
Convolvulus major rectus creticus argenteus. *Moriſ. hiſt.* 2. *p.* 11. *ſ.* 1. *t.* 3. *f.* 1.
Cneorum album, folio oleæ argenteo molli. *Bauh. pin.* 463.
β. Convolvulus ſerpens maritimus ſpicæfolius. *Triumf. obſ.* 91. *t.* 91. *f.* 2.
Convolvulus ſaxatilis erectus villoſus perennis. *Barr. rar.* 4. *t.* 470. *Bocc. muſ.* 2. *p.* 79. *t.* 70.

γ Do-

γ. Dorycnium. *Alp. exot.* 73.
Habitat in Hiſpaniæ, Italiæ, Siciliæ, Cretæ *maritimis campeſtribus.* ♃

Cantabrica 22. CONVOLVULUS foliis lineari-lanceolatis acutis, caule ramoſo recto, pedunculis bifloris. *Hort. cliff.* 68. *Sauv. monſp.* 56.
Convolvulus minimus ſpicæfolius. *Moriſ. hiſt.* 2. *p.* 17. *ſ.* 1. *t.* 4. *f.* 3.
Convolvulus linariæ folio. *Bauh. pin.* 295.
Cantabrica quorundam. *Cluſ. hiſt.* 2. *p.* 49.
Habitat in Italia, Sicilia, Narbona, Verona.

ſpithamæus. 23. CONVOLVULUS foliis cordatis pubeſcentibus, caule recto, pedunculis unifloris.
Convolvulus ſpithamæus, caule recto, foliis ſubrotundis. *Gron. virg.* 141.
Habitat in Virginia..

perſicus. 24. CONVOLVULUS foliis ovalibus tomentoſis, pedunculis unifloris. *Amœn. acad.* 2. *p.* 341. *
Habitat in Perſia, *ad maris Caſpici littus.* ♃

tricolor. 25. CONVOLVULUS foliis lanceolato-ovatis glabris, caule declinato, floribus ſolitariis. *Vir. cliff.* 19. *Roy. lugdb.* 428.
Convolvulus foliis lanceolato-ovatis nudis, caule recto, floribus ſolitariis. *Hort. cliff.* 68. *Hort. upſ.* 38.
Convolvulus peregrinus cæruleus, folio oblongo. *Bauh pin.* 295. flore triplici colore inſignito. *Moriſ. hiſt.* 2. *p.* 17. *ſ.* 1. *t.* 4. *f.* 4.
Habitat in Africa, Mauritania, Hiſpania, Sicilia. ⊙

repens. 26. CONVOLVULUS foliis ſagittatis poſtice obtuſis, caule repente, pedunculis unifloris.
Convolvulus lacteſcens, foliis ſagittatis, radice longa alba perenni. *Gron. virg.* 141.
Convolvulus marinus catharticus, foliis acetoſæ, flore niveo. *Plum. amer.* 89. *t.* 105.
Habitat in Americæ *maritimis.* ♃

reptans. 27. CONVOLVULUS foliis haſtato-lanceolatis: auriculis rotundatis, caule repente, pedunculis unifloris
Ballel. *Rheed mal.* 11. *p.* 107. *t.* 52.
Habitat in India.
Planta *ex minoribus.* Caulis *filiformis, nec volubilis*

Folia

Folia *lanceolata, baſi auricula utrinque recurvata, obtuſa, glabra, anguſta, acuminata, petiolis breviſſimis inſidentia.* Pedunculi *breves, uniflori.* Calyx *rotundatus.*

28. CONVOLVULUS foliis cordatis ſubhaſtatiſque villoſis, caule petioliſque piloſis, pedunculis multifloris. *hirtus.*

Convolvulus foliis cordato-haſtatis glabris acuminatis anguſtis rotundatis, caule petioliſque villoſis. *Hort. cliff.* 496.? *Roy. lugdb.* 429.

Habitat in India. *Osbeck.*

Planta non magna, minus volubilis. Pedunculi & *Caulis pilis flaveſcentibus exſtantibus hirti.* Folia *parum villoſa: primaria cordato-ſubrotunda, ſecundaria proprie cordata; floribus proxima ſæpe haſtata.* Pedunculi *nudi, foliis longiores, floribus alternis pedicellatis, involucris ad ſingulum pedicellum minimis, lanceolatis.*

29. CONVOLVULUS foliis reniformibus, pedunculis unifloris. *Hort. cliff.* 67. *Mat. med.* 81. *Roy. lugdb.* 428. *Soldanella.*

Soldanella maritima minor. *Bauh. pin.* 295.

Braſſica marina. *Cord. hiſt.* 205.

Habitat in Angliæ, Friſiæ *littoribus maris.*

30. CONVOLVULUS foliis bilobis, pedunculis unifloris. *Pes capræ.*

Convolvulus foliis bilobis. *Fl. zeyl.* 75.

Convolvulus foliis ſubrotundis apice emarginatis baſi integris. *Roy. lugdb.* 428.

Convolvulus maritimus zeylanicus, folio craſſo cordiformi. *Herm. lugdb.* 174. *t.* 175.

Schovanna-adamboe. *Rheed. mal.* 11. *p.* 117. *t.* 57.

Habitat in India.

31. CONVOLVULUS foliis emarginatis, pedunculis trifloris. *braſilienſis.*

Convulvulus marinus catharticus, folio rotundo, flore purpureo. *Plum. amer.* 89. *t.* 104.

Convolvulus marinus ſ. Soldanella braſilienſis. *Marcgr. braſ.* 51. *Piſ. braſ.* 258.

Habitat in Braſiliæ, Domingo *maritimis.*

IPOMOEA.

* *Floribus ſparſis.*

1. IPOMOEA foliis pinnatifidis linearibus, floribus ſolita- *Quamoclit.*

litariis. *Hort. cliff.* 60. *Hort. upſ.* 39. *Fl. zeyl.* 77. *Roy. lugdb.* 430.

Quamoclit ſ. Jaſminum americanum. *Cluſ. poſth.* 9.

Convolvulus pennatus exoticus rarior. *Col. aquat.* 73. t. 72.

Jaſminum millefolii folio. *Bauh. pin.* 398.

Habitat in India. ☉

Nyctelea. 2. IPOMOEA foliis pinnatifidis ſinuatis acutis.

Habitat in Virginia. *D. Gronovius.*

carolina. 3. IPOMOEA foliis digitatis: foliolis petiolatis, pedunculis unifloris.

Convolvulus minor pentaphyllos, flore purpureo minore. *Cateſb. car.* 2. *p.* 9. *t.* 91.

Habitat in Carolina.

coccinea. 4. IPOMOEA foliis cordatis acuminatis: baſi angulatis, pedunculis multifloris. *Hort. upſ.* 39.

Ipomœa foliis cordatis acuminatis vix dentatis. *Hort cliff.* 66. *Roy. lugdb.* 429.

Ipomœa foliis cordatis integerrimis, limbo floris quinquefido. *Sauv. meth.* 114.

Quamoclit americana, folio hederæ, flore coccineo. *Comm. rar.* 21. *t.* 21.

Convolvulus coccineus, folio anguloſo. *Plum. amer* 89. *t.* 103. *Raj. ſuppl.* 380.

Habitat in Domingo. ☉

tuberoſa. 5. IPOMOEA foliis palmatis: lobis ſeptenis lanceolatis integerrimis. *Hort. upſ.* 39.

Convolvulus major heptaphyllus, flore ſulphureo odorato. *Sloan. jam.* 55. *hiſt.* 1. *p.* 152. *t.* 96. *f.* 2.

Convolvulus americanus, mandiuccæ multifido folio, heptaphyllos, flore albo fundo purpureo, radice tuberoſa, cortice albo. *Pluk. alm.* 116. *t.* 276. *f.* 5.

Habitat in Jamaica. ♄

campanulata 6. IPOMOEA foliis cordatis, pedunculis multifloris, perianthio exteriore orbiculari, corollis campanulatis lobatis.

Adamboe *Rheed. mal.* 11. *p.* 115. *t.* 56.

Habitat in India.

Corolla craſſior, quam in reliquis; ſub Perianthio *quinquepartito, aliud perianthium minus orbiculatum integerrimum.*

7. IPO-

7. IPOMOEA foliis cordatis acutis integerrimis villoſis, floribus ternis, corollis indiviſis. † *alba.*
Munda-valli. *Rheed. mal.* 11. *p.* 103. *t.* 50.
Habitat in Malabariæ *arenoſis, arbores ſcandens.*

8. IPOMOEA foliis cordatis integerrimis, floribus confertis, corollis indiviſis. *Sauv. monſp.* 114. † *violacea.*
Quamoclit foliis ampliſſimis cordiformibus. *Plum. ſpec.* 3.
Habitat in America *meridionali.*

9. IPOMOEA foliis cordatis acutis integerrimis, floribus ſolitariis. *Roy. lugdb.* 430. *ſolanifolia.*
Quamoclit ſolani folio, flore roſeo. *Plum. ſpec.* 3.
Habitat in America.

10. IPOMOEA foliis cordatis integerrimis glabris lacunoſis, pedunculis bifloris. *lacunoſa.*
Convolvulus ſtellatus, periplocæ rotundioris folio. *Dill. elth.* 103. *t.* 87. *f.* 103.
Habitat in Carolina.

11. IPOMOEA foliis ſagittatis poſtice truncatis, pedunculis bifloris. *glaucifolia.*
Convolvulus foliis cordato-lanceolatis. *Hort. cliff.* 67.
Convolvulus ſtellatus arvenſis, folio glauco. *Dill. elth.* 103. *t.* 87. *f.* 101.
Habitat in Mexicæ *arvis.*

12. IPOMOEA foliis trilobis cordatis, pedunculis trifloris. *triloba.*
Convolvulus pentaphyllos minor, flore purpureo? *Sloan. jam.* 55. *hiſt.* 1. *p.* 153. *t.* 97. *f.* 1. *Raj. ſuppl.* 381.
Habitat in America. ⊙
Caulis *volubilis, angulatus.* Folia *cordata, profunde triloba: intermedio ovato; lateralibus ſemicordatis, integerrima, glabra.* Pedunculi *triflori.* Corollæ *cylindricæ, violaceæ.* Stigmata *duo, globoſa.* Capſulæ *piloſæ.*

* * *Floribus aggregatis.*

13. IPOMOEA foliis trilobis, floribus aggregatis. *Fl. zeyl.* 79. *hepaticæfolia*
Convolvulus indicus villoſus, hederæ folio tripartito, flore cæruleo. *Herm. lugdb.* 182.
Convolvulus zeylanicus hirſutus, foliis hepaticæ. *Herm. prodr.* 327.
Habitat in Zeylona.

tamnifolia. 14. IPOMOEA foliis cordatis acuminatis piloſis, floribus aggregatis.
Volubilis carolinienſis, tamni folio ſubhirſuto. *Dill. elth.* 428. *t.* 318. *f.* 414.
Habitat in Carolina.

Pes tigridis. 15. IPOMOEA foliis palmatis, floribus aggregatis. *Fl. zeyl.* 79.
Convolvulus zeylanicus villoſus pentaphyllos & heptaphyllos minor, Pes tigrinus. *Herm. lugdb.* 184. *t.* 187. *Act. bonon.* 11. *p.* 2. *p.* 362. *t.* 23. *f.* 2.
Volubilis zeylanica, Pes tigrinus dicta. *Dill. elth.* 429. *t.* 318. *f.* 411.
Pulli-ſchovadi. *Rheed. mal.* 11. *p.* 121. *t.* 59.
Habitat in India.

ægyptia. 16. IPOMOEA foliis digitatis ſupra glabris, caule piloſo, pedunculis multifloris. *Hort. upſ.* 39.
Convolvulus foliis digitatis piloſis, caule piloſo. *Roy. lugdb.* 429.
Convolvulus americanus pentaphyllus & heptaphyllus major. *Herm. lugdb.* 183. *t.* 185. *Raj. hiſt.* 1881.
Convolvulus ægypticus. *Veſl. alp.* 73.
Herba non nominata. *Marcgr. braſ.* 54.
Habitat in America *calidiore.* ☉

quinquefolia 17. IPOMOEA foliis digitatis glabris: foliolis ſeſſilibus, caule lævi.
Convolvulus foliis digitatis glabris, caule lævi. *Roy. lugdb.* 429.
Convolvulus quinquefolius glaber americanus. *Pluk. alm.* 116. *t.* 167. *f.* 6.
Habitat in America.

POLEMONIUM.

cæruleum. 1. POLEMONIUM calycibus corollæ tubo longioribus.
Polemonium, *Fl. lapp.* 86. *Fl. ſuec.* 175. *Hort. cliff.* 163. *Roy. lugdb.* 432. *Hall. helv.* 490.
Valeriana cærulea. *Bauh. pin.* 164.
α. Polemonium calycibus lanatis. *Hort. upſ.* 40.
γ. Polemonium foliis pinnatis, radicibus reptatricibus. *Gron. virg.* 22.
Habitat in Europæ, Aſiæ, Americæ *ſeptentrionalibus.* ♃

2. PO-

2. POLEMONIUM calycibus tubo corollæ brevioribus: *rubrum.*
Quamoclit pinnnatum erectum, floribus in thyrſum digeſtis. *Dill. elth.* 321. *t.* 241. *f.* 312.
Habitat in Carolinæ *citerioris arenoſis. B. Juſſieu.*

3. POLEMONIUM foliis inferioribus haſtatis, ſuperioribus lanceolatis *Gron. virg.* 142. *dubium.*
Habitat in Virginia.
Facies aliena a Polemoniis, genus mihi dubium.

CAMPANULA.

α. Foliis lævioribus anguſtioribus.

1. CAMPANULA caule unifloro. *Fl. lapp.* 85. *t.* 9. *f.* 5. 6. *Fl. ſuec.* 177. *uniflora.*
Habitat in alpibus Lapponicis. ☉

2. CAMPANULA cauliculis unifloris, foliis caulinis ovatis crenatis, calycibus cernuis. *pulla.*
Campanula alpina latifolia, flore pullo *Bauh. pin.* 93. *prodr.* 33. *Burſ. IV.* 21.
β. Campanula foliis ſubrotundis. *Bauh. pin.* 94 *prodr.* 34. *t.* 35.
Habitat in Auſtria.
Radix *filiformis, repens.* Caules *ſpithamæi, erecti flexuoſi, filiformes, raro ramo uno alterove, eoque florifero.* Folia *radicalia & caulina ovata, obtuſa, ſubcrenata crenis diſtantibus, nuda, petiolata.* Pedunculus *terminalis.* Flos *cernuus: magnitudine* C. rotundifoliæ, calyce *levi. β: floribus pluribus in ſummitate caulis variat.*

3. CAMPANULA foliis radicalibus reniformibus, caulinis linearibus. *Fl. lapp.* 83. *Fl. ſuec.* 176. *Hort. upſ.* 65. *Roy. lugdb.* 247. *Dalib. pariſ.* 66 *rotundifolia.*
Campanula minor rotundifolia vulgaris. *Bauh. pin.* 93.
β Campanula minor rotundifolia alpina. *Bauh. pin.* 93. *prodr.* 34. *t.* 34.
γ. Campanula alpina linifolia cærulea. *Bauh. pin.* 93. *Fl. lapp.* 84. *it. gotl.* 229.
Habitat in Europæ *paſcuis.* ♃

4. CAMPANULA foliis ſtrictis: radicalibus lanceolato-ovalibus, panicula patula. *patula.*
Campanula eſculentæ facie, ramis & floribus patulis. *Dill. elth.* 68. *t.* 58. *f.* 68.
Habitat in Angliæ, Sueciæ *arvis.* ♂

Rapunculus. 5. CAMPANULA foliis undulatis: radicalibus lanceolato-ovalibus, panicula coarctata. *Hort. upſ.* 40.
Campanula foliis radicalibus lanceolato-ovalibus, caule ramoſiſſimo patulo. *Hort. cliff.* 65. *Dalib. pariſ.* 68.
Rapunculus eſculentus. *Bauh. pin.* 92.
Rapunculum. *Dod. pempt.* 165.
Habitat in Helvetia, Anglia, Gallia. ♂
Folia *lanceolata*. Racemus *terminalis*: rami *ſimiles, breviores, erecti*. Pedunculi *terni ſæpius, intermedio longiore*. Caulis *angulatus, ſcaber*.

decurrens. 6. CAMPANULA foliis caulinis lanceolatis ſerratis decurrentibus. *Fl. ſuec.* 178.
Campanula minor rotundifolia, flore in ſummis caulibus. *Bauh. pin.* 93.
Habitat in Finlandia.

perſicifolia. 7. CAMPANULA foliis radicalibus obovatis, caulinis lanceolato-linearibus ſubſerratis ſeſſilibus remotis. *Fl. ſuec.* 179. *Dalib. pariſ.* 67.
Campanula foliis lineari-lanceolatis crenatis, caule longiſſimo ſimpliciſſimo, floribus raris. *Vir. cliff.* 17. *Hort. cliff.* 65. *Roy. lugdb.* 246.
Rapunculus perſicifolius, magno flore. *Bauh. pin.* 93.
β. Rapunculus nemoroſus anguſtifolius, magno flore, major. *Bauh. pin.* 93.
Habitat in Europæ *ſeptentrionalis aſperis.* ♃

pyramidalis. 8. CAMPANULA foliis ovatis glabris ſubſerratis, caule erecto paniculato: ramulis brevibus.
Campanula foliis ovatis glabris obſolete ſerratis, ramis breviſſimis cauli approximatis. *Vir. cliff.* 17. *Roy. lugdb.* 246.
Campanula foliis ovatis margine cartilagineo crenatis, caule ramoſiſſimo anguſtato. *Hort. cliff.* 64.
Rapunculus hortenſis latiore folio: ſ. Pyramidalis. *Bauh. pin.* 93.
Habitat - - - - ♂

americana. 9. CAMPANULA caule ramoſo, foliis lingviformibus crenulatis margine cartilagineo. *Roy. lugdb.* 246.
Campanula minor americana, foliis rigidis, flore cæruleo patulo. *Herm. lugdb.* 107.
Trachelium americanum minus, flore cæruleo patulo. *Dodart. mem.* 4. *p.* 111. *t.* 111.
Habitat in America.

10. CAM-

10. CAMPANULA foliis lanceolatis: caulinis acute ſer- *lilifolia.*
ratis, floribus paniculatis nutantibus. *Hort. upſ.* 41.
Campanula urticæ foliis glabra, floribus minoribus pendulis. *Amm. ruth.* 11. *n.* 17.
Habitat in Tataria, Sibiria. ♂

11. CAMPANULA foliis rhomboidibus ſerratis, ſpica *rhomboidalis*
ſecunda.
Campanula foliis rhomboidibus ſerratis, ſpica unilaterali ſubnuda. *Hall. helv.* 491.
Campanula drabæ minoris foliis. *Bauh. pin.* 94. *prodr.* 36.
Rapunculus teucrii folio. *Barr. ic.* 78. 567.
Rapunculus alpinus, (teucrii folio) rhomboidalis. *Bocc. muſ.* 75. *t.* 61.
Habitat in alpibus Helvetiæ, Italiæ.

12. CAMPANULA foliis longis laciniatis ſublyratis. *laciniata.*
Campanula græca ſaxatilis, jacobææ foliis. *Tournef. itin.* 1. *p.* 260. *t.* 260.
Habitat in Græciæ rupibus.

β. *Foliis ſcabris latioribus.*

13. CAMPANULA foliis ovato-lanceolatis, caule ſim- *latifolia.*
pliciſſimo tereti, floribus ſolitariis pedunculatis, fructibus cernuis. *vir. cliff.* 17. *Hort. cliff.* 65. *Fl. ſuec.* 180. *Roy. lugdb.* 245.
Campanula maxima, foliis latiſſimis. *Bauh. pin.* 94.
Habitat in Angliæ, Sueciæ *montoſis, ſepibus* ♃
Caulis *ſimpliciſſimus, teres.* Folia *lanceolato-ovata, ſerrata.* Flores *ex alis ſuperioribus, ſolitarii, pedunculati.* Calyces *glabri.* Fructus *cernui.*

14. CAMPANULA foliis cordato-lanceolatis, caule ra- *rapunculoi-*
moſo, floribus ſecundis ſparſis. *Vir. cliff.* 17. *Roy.* *des.*
lugdb. 246. *Dalib. pariſ.* 66.
Campanula foliis ovatis crenatis, floribus per caulem uno verſu ſparſis. *Hort. cliff.* 64.
Campanula hortenſis, rapunculi radice. *Bauh. pin.* 94. *Moriſ. hiſt.* 2. *p.* 460. *ſ.* 5. *t.* 3. *f.* 32.
Habitat in Helvetia, Gallia.

15. CAMPANULA foliis ovato-lanceolatis ſubtus ſca- *bononienſis.*
bris ſeſſilibus, caule paniculato. †
Campanula ſ. Cervicaria bononienſis, flore parvo. *Bauh. hiſt.* 2. *p.* 804. *Moriſ. hiſt.* 2. *p.* 461. *ſ.* 5. *t.* 4. *f.* 38.

Campanula foliis lanceolatis leviter ſerratis alternis, floris thyrſo ſpicato & ad baſin ramoſo. *Segu. ver. 1. p.* 176.

Habitat in Baldi *Leſſinenſium jugis*, Bononiæ.

graminifolia 16. CAMPANULA foliis lineari-ſubulatis, capitulo terminali. †

Campanula alpina, tragopogi folio. *Bauh. pin.* 94.

Trachelium, tragopogi folio, montanum. *Col. phyt. 1. p.* 25. *Bauh. hiſt.* 2. *p.* 802.

Trachelium minus gramineum cæruleo-violaceum. *Barr. ic.* 332.

Habitat in Italiæ *montibus*. Aprutii *Salmone vicinis*.

ſpicata. 17. CAMPANULA hiſpida, ſpica laxa: floribus alternis, foliis linearibus.

Campanula foliis anchuſæ, floribus oblongis. *Bauh. pin.* 94.

Campanula hirſuto folio anguſto leviter ſerrato, floribus parvis ſpicatis. *Pluk. alm.* 76. *t.* 153. *f.* 3.

Habitat in Valleſia.

Radix *craſſitie digiti.* Folia *radicalia lineari-lanceolata*, caulina *ſimilia ſed breviora.* Caulis *pedalis, ramis alternis, terminatis ſpica longiſſima ex* Floribus *ſeſſilibus, alternis, remotis, plurimis.* Corollæ *ſubcylindricæ. Planta caule, foliis, calycibus pilis albis hiſpida.*

Trachelium 18. CAMPANULA caule angulato, foliis petiolatis, calycibus ciliatis, pedunculis trifidis. *Vir. cliff.* 16. *Fl. ſuec.* 181. *Roy. lugdb.* 245. *Dalib. pariſ.* 66.

Campanula foliis radicalibus cordatis, calycibus ciliatis. *Hort. cliff.* 64.

Campanula vulgatior, foliis urticæ, vel, major & aſperior. *Bauh. pin.* 94.

Habitat in Europæ *ſepibus.* ♃

Folia *ovata, ſubcordata, petiolata, dentata.* Pedunculi *trifidi, triflori.*

glomerata. 19. CAMPANULA caule angulato ſimplici, floribus ſeſſilibus, capitulo terminali. *Vir. cliff.* 16. *Fl. ſuec.* 182. *it. gotl.* 196. *it. ſcan.* 306. *Roy. lugdb.* 245. *Dalib. pariſ.* 67.

Campanula foliis lanceolato-ovatis crenatis, ramis capitulo florali terminatis. *Hort. cliff.* 64.

Campanula pratenſis, flore conglomerato. *Bauh. pin.* 94.

Trachelium alpinum, floribus conglomeratis, foliis aſarinæ rigidis & hirſutis. *Herm. par.* 235. *t.* 235.

Ha-

Habitat in Angliæ, Galliæ, Sueciæ *pratis aridis.* ♃
Folia *ovato-oblonga, ſeſſilia, obtuſiuſcula.* Flores 3, *ſeſſiles in alis foliorum*; captiulum *terminale.*

20. CAMPANULA hiſpida, floribus ſeſſilibus, capitulo terminali, foliis lanceolato-linearibus undulatis. *it. œland.* 115. *Fl. ſuec.* 183. *Cervicaria.*
Trachelium altiſſimum, foliis aſperis anguſtis, floribus parvis. *Bauh. hiſt.* 2. *p.* 801. *t.* 801. *f.* 801.
Habitat in Helvetiæ, Sveciæ, Germaniæ *aſperis ſylvaticis.*

21. CAMPANULA hiſpida, racemo ovato-oblongo terminali, caule ſimpliciſſimo, foliis lanceolato-linearibus. *thyrſoides.*
Campanula foliis echii. *Bauh. pin* 94.
Alopecurus alpinus quibusdam, Echium montanum dalechampii. *Bauh. hiſt.* 2. *p.* 809.
Cervicaria major tenuifolia. *Thal. harc.* 32. *t.* 3. *
Habitat in alpibus Harcyniæ *aliisque.* ♃

22. CAMPANULA capſulis quinquelocularibus tectis calycis ſinubus reflexis. *Vir. cliff.* 16. *Roy. lugdb.* 245. *Medium.*
Campanula calycibus a tergo lamellis quinque notatis. *Hort. cliff.* 64.
Campanula hortenſis, folio & flore oblongo. *Bauh. pin.* 94.
Viola mariana. *Dod. pempt.* 163.
β. Campanula foliis anchuſæ, floribus oblongis. *Bauh. pin.* 94. *Hall. helv.* 493.
γ. Campanula foliis echii, floribus villoſis. *Bauh. pin.* 94. *prodr.* 36. *t.* 36.
Habitat in Germaniæ, Italiæ *nemoribus.* ♂

23. CAMPANULA capſulis trilocularibus tectis calycis ſinubus reflexis. *ſibirica.*
Campanula hirſuta ocymi folio caulem ambiente, flore pendulo. *Bocc. ſic.* 83. *t.* 45. *Moriſ. hiſt.* 2. *p.* 459. *ſ.* 5. *t.* 3. *f.* 26.
Habitat in Sibiria. *D. Gmelin:* & Meſſanæ.
Plantæ Caulis *pedalis, angulatus, parum hiſpidus.* Panicula *rarior, laxa.* Folia *linearia, ſemiamplexicaulia: caulina ſcabra.* Flores *oblongi, parvi.* Calyces *hiſpidi.* Varietas *ludit caule ſubdiviſo, foliis latioribus.*

24. CAMPANULA foliis obovatis crenatis, floribus alternis nutantibus, capſulis quinquecarinatis. † *ſaxatilis.*

Campanula cretica ſaxatilis, bellidis folio, magno flore. *Tournef. inſt.* 111. *Barr. rar.* 79. *t.* 813.

Trachelium ſaxatile, bellidis folio, cæruleum creticum. *Bocc. muſ.* 2. *p.* 76. *t.* 64.

Habitat in Cretæ *ſcopulis ſaxoſis.*

* *Caule ſubdiviſo.*

canarienſis. 25. CAMPANULA foliis haſtatis dentatis oppoſitis petiolatis, capſulis quinquelocularibus.

Campanula foliis haſtatis dentatis, caule determinate folioſo. *Hort. cliff.* 65. *t.* 8. *Roy. lugdb.* 247.

Campanula canarienſis regia ſ. Medium radice tuberoſa, foliis ſinuatis cæſiis atriplicis æmulis ternis circum caulem ambientibus, flore amplo pendulo: colore flammeo rutilante. *Pluk. alm.* 76. *t.* 276. *f.* 1.

Habitat in inſulis Canariis. ♃

fruticoſa. 26. CAMPANULA caule fruticoſo, foliis lineari-ſubulatis, pedunculis longiſſimis, capſulis columnaribus quinquelocularibus.

Campanula africana, ericæ folio, flore cæruleo patulo. *Herm. afr.* 5.

Habitat ad Caput b. Spei. ♄

Speculum. ♀ 27. CAMPANULA caule ramoſiſſimo diffuſo, foliis oblongis ſubcrenatis, calycibus ſolitariis corolla longioribus, capſulis priſmaticis. *Hort. upſ.* 41.

Campanula caule ramoſo, foliis ovato-oblongis crenatis. *Hort. cliff.* 65.

Campanula calycibus corollam ſuperantibus, capſulis columnaribus. *Vir. cliff.* 17. *Roy. lugdb.* 247. *Dalib. pariſ.* 68.

Onobrychis arvenſis ſ. Campanula arvenſis erecta. *Baub. pin.* 215.

Habitat inter ſegetes Europæ *auſtralis.* ☉

hybrida. 28. CAMPANULA caule baſi ſubramoſo ſtricto, foliis oblongis crenatis, calycibus aggregatis corolla longioribus, capſulis priſmaticis.

Campanula arvenſis minima erecta. *Moriſ. hiſt.* 2. *p.* 457. *ſ.* 5. *t.* 2. *f.* 22.

Speculum veneris minus. *Raj. hiſt.* 743.

Habitat in Anglia, Gallia, *inter ſegetes.*

Differt a Speculo ♀ *ſ. matre*: Caule *baſi tantum ramoſo, erecto, ſuperne vix ramoſo, ſtricto*; Floribus *ſeſſilibus* 3 *ſ.* 4 *ſimul, Corollis ſæpius in rudimento latentibus nec explicatis. Quin hæc ex C. Spec.* ♀ *olim orta ſit, dubium vix videtur.*

29.

29. CAMPANULA caule ſubdiviſo ramoſiſſimo, foliis linearibus acuminatis. *Hort. cliff.* 66. *Roy. lugdb.* 247. *Pentagonia.*

Campanula pentagonia, flore ampliſſimo, thracica. *Tournef. inſt.* 112.

Speculum veneris, flore amplisſimo, thracicum. *Raj. hiſt.* 742,

Habitat in Thracia. ⊙

30. CAMPANULA caule dichotomo, foliis ſeſſilibus utrinque dentatis. *Hort. cliff.* 65. *Roy. lugdb.* 247. *Guett. ſtamp.* 2. *p.* 429.

Rapunculus minor, foliis inciſis. *Bauh. pin.* 92.

Erini ſ. Rapunculi minimum genus. *Column. phytob.* 122. *t.* 28.

Alſine oblongo folio ſerrato, flore cæruleo. *Bauh. hiſt.* 3. *p.* 367.

Habitat in Italia, Galloprovincia, Monſpel. ⊙

31. CAMPANULA caule ſimplici, foliis cordatis dentatis amplexicaulibus, floribus ſeſſilibus aggregatis. *Hort. upſ.* 40. *perfoliata.*

Campanula caule ſimpliciſſimo, foliis amplexicaulibus. *Hort. cliff.* 65. *Roy. lugdb.* 247. *Gron. virg.* 22.

Campanula pentagonia perfoliata. *Moriſ. hiſt.* 2. *p.* 457. *ſ.* 5. *t.* 2. *f.* 23. *Barr. rar.* 83. *t.* 1133.

Habitat in Virginia. ⊙

32. CAMPANULA foliis lanceolatis dentatis hiſpidis, pedunculis longiſſimis, capſulis ſtrigoſis. *capenſis.*

Campanula africana annua hirſuta, latis ſerratisque foliis, flore magno violaceo. *Comm. hort.* 69. *t.* 35.

Habitat ad Caput b. Spei. ⊙

33. CAMPANULA foliis cordatis quinquelobis petiolatis glabris, caule laxo. *Dalib. pariſ.* 68. *hederacea.*

Campanula cymbalariæ vel hederæ folio. *Bauh. pin.* 93. *prodr.* 34. *Moriſ. hiſt.* 2. *p.* 456. *ſ.* 5. *t.* 4. *f.* 18. *Pluk. phyt.* 23. *f.* 1.

Habitat in Anglia, Gallia, Hiſpania *locis umbroſis humiduſculis.*

34. CAMPANULA caulibus diffuſis, foliis ſubovatis integerrimis.

Campanula ſaxatilis, foliis inferioribus bellidis, cæteris nummulariæ. *Tournef. cor.* 3. *itin.* 1. *p.* 243. *t.* 244.

Habitat in Oriente. ♃

ROELLA.

ciliata. 1. ROELLA foliis ciliatis: mucrone recto.
Roellia. *Hort. cliff.* 492. *t.* 35.
Campanula africana fruteſcens aculeoſa, flore violaceo. *Comm. hort.* 2. *p.* 77. *t.* 39.
Campanula africana humilis piloſa, flore exalbido languide purpureo. *Seb. theſ.* 1. *p.* 25. *t.* 16. *f.* 5.
Aculeoſa mauritanica, ericæ foliis hirſutis rigidis infeſto mucrone pungentibus. *Pluk. alm.* 8. *t.* 252. *f.* 4.
Habitat in Mauritania, Æthiopia. ♃

reticulata. 2. ROELLA foliis ciliatis: mucrone reflexo.
Roella foliis imbricatis. *Roy. lugdb.* 248.
Campanula capitis bonæ ſpei, foliis reticulatis ſpinoſis. *Pet. muſ.* 21. *f.* 157.
Habitat ad Caput b. Spei. ♃

PHYTEUMA.

pauciflora. 1. PHYTEUMA capitulo ſubfolioſo, foliis omnibus lanceolatis.
Rapunculus foliis obtuſis, ſpica pauciflora. *Hall. helv.* 497.
Rapunculus alpinus parvus comoſus. *Bauh. hiſt.* 2. *p.* 811.
Habitat in alpibus Helveticis Styriacis.

hemiſphærica. 2. PHYTEUMA capitulo ſubrotundo, foliis linearibus integerrimis.
Phyteuma foliis linearibus, floribus capitatis. *Roy. lugdb.* 248.
Rapunculus umbellatus, folio gramineo. *Bauh. pin.* 92.
Rapunculus ſylveſtris cæruleus umbellatus. *Thal. harc.* 94. *t.* 8.
Rapuntium alterum anguſtifolium alpinum. *Column. ecphr.* 2. *p.* 23. *t.* 26.
Habitat in alpibus Helvetiæ, Italiæ, Pyrenæis. ♃

orbicularis. 3. PHYTEUMA capitulo ſubrotundo, foliis ſerratis: radicalibus cordatis.
Phyteuma foliis oblongis, ſpica orbiculari. *Guett. ſtamp.* 1. *p.* 34. *Dalib. pariſ.* 69.
Rapunculus folio oblongo, ſpica orbiculari. *Bauh. pin.* 92. *Moriſ. hiſt.* 2. *p.* 463. *ſ.* 5. *t.* 5. *f.* 47.
Rapuntium montanum rarius corniculatum. *Column. ecphr.* 1. *p.* 222. *t.* 224.

Ha

Habitat in alpibus Italiæ, Helvetiæ, Veronæ, Suſſexiæ.

4. PHYTEUMA ſpica oblonga, capſulis bilocularibus, foliis radicalibus cordatis. *ſpicata.*

Phyteuma ſpica oblonga nuda, foliis caulinis lanceolatis ſerratis. *Amœn. Acad.* 1. *p.* 149.

Phyteuma foliis cordato-lanceolatis, ſpica oblonga. *Guet. ſtamp.* 1. *p.* 34. *Dalib. pariſ.* 69.

Rapunculus ſpicatus. *Bauh. pin.* 92. cæruleus. *prodr.* 32. *t.* 32.

Rapunculus corniculatus ſpicatus ſ. Alopecuroides, flore albo & cæruleo. *Moriſ. hiſt.* 2. *p.* 463. *ſ.* 5. *t.* 5. *f.* 46.

Habitat in Alpeſtribus Helvetiæ, Baldi, Angliæ, Galliæ.

5. PHYTEUMA faſciculo terminali ſeſſili, foliis dentatis: radicalibus cordatis. *comoſa.*

Rapunculus alpinus corniculatus. *Bauh. pin.* 113. *prodr.* 33. *t.* 33.

Trachelium petræum minus. *Pon. bald.* 326. *t.* 326.

Campanula ſphærocephalus pervenuſta, foliorum ad oras inſigniter denticulata. *Pluk. alm.* 77. *t.* 152. *f.* 6.

Habitat in Baldi & Tyrolenſibus *montibus.* ♂

6. PHYTEUMA floribus ſparſis, foliis pinnatis. *Roy. lugdb.* 248. *pinnata.*

Rapunculus creticus ſ. Pyramidalis altera. *Bauh. pin.* 93.

Rapunculus creticus, Petromarula. *Bauh. hiſt.* 2. *p.* 811. *t.* 812.

Habitat in Creta.

TRACHELIUM.

1. TRACHELIUM. *Hort. upſ.* 41. *cæruleum.*

Trachelium foliis ovatis ſerratis, corymbis compoſitis. *Vir. cliff.* 17. *Roy. lugdb.* 248.

Trachelium foliis ovatis ſerratis, caule umbella terminato. *Hort. cliff.* 66.

Cervaria valerianoides cærulea. *Bauh. pin.* 95.

Habitat in Italiæ *umbroſis.* ♂

SAMOLUS.

1. SAMOLUS *Hort. cliff.* 51. *Hort. upſ.* 42. *Fl. ſuec.* 165. *Roy. lugdb.* 249. *Gron. virg.* 23. *Dalib. pariſ.* 69. *valerandi.*

Anagallis aquatica, rotundo folio non crenato. *Bauh. pin.* 252.

Alſi-

Alſine aquatica, foliis rotundis beccabungæ. *Moriſ. hiſt. 2. p. 323. ſ. 3. t. 24. f. 28.*

africanus, β. Samolus africanus, folio rotundiore. *Walth. hort. 162. t. 23.*

Habitat in maritimis Europæ, Aſiæ & Americæ *borealis.* ♃

Differt africana *planta, Caule magis ramoſo & firmiore; ſed vix ſufficiunt notæ pro diſtincta ſpecie.*

RONDELETIA.

americana. 1. RONDELETIA foliis ſeſſilibus.

Rondeletia arboreſcens, tini facie. *Plum. gen. 15.*

Habitat in America. ♄

Arbuſculæ Folia *oppoſita, ſeſſilia, lanceolata.* Pedunculi *communes ſolitarii, longiſſimi, nudi, apice formantes* corymbum *dichotomum; in cujus ſingula dichotomia* Flos *ſeſſilis, cum* involucro *diphyllo.*

aſiatica. 2. RONDELETIA foliis petiolatis. *Fl. zeyl. 80.*

Cupi. *Rheed. mal. 2. p. 37. t. 23. Raj. hiſt. 1494.*

Habitat in Malabaria, Zeylona. ♄

BELLONIA.

aſpera. 1. BELLONIA

Bellonia fruteſcens, folio meliſſæ aſpero. *Plum. gen. 19.*

Habitat in America. ♄

Arbuſculæ Folia *oppoſita, ovata, ſerrata, ſubtus aſpera: petiolis breviſſimis.* Flores *in corymbum.*

CINCHONA

officinalis, 1. CINCHONA. *Mat. med. 71.*

Quinquina. *Cond. act. pariſ. 1738. Godofr. mat. 2. p. 180.*

Habitat in Loxa *Peruviæ.* ♄

COFFEA.

arabica. 1. COFFEA *Hort. cliff. 59. Hort. upſ. 41. Mat. med. 70. Roy lugdb. 239.*

Jaſminum arabicum, lauri folio, cujus ſemen apud nos coffe dicitur. *Juſſ. act. 1713. p. 388. t. 7.*

Evonymo ſimilis ægyptiaca, fructu baccis lauri ſimili. *Bauh. pin. 498.*

Bon. *Alp. ægypt. 36. t. 36.*

Habitat in Arabia felici. ♄

LO-

LONICERA.

* Periclymena *caule volubili.*

1\. LONICERA floribus verticillatis terminalibus ſeſſilibus, foliis ſummis connato-perfoliatis. *Hort. cliff.* 45. *Hort. upſ.* 42. *Virid. cliff.* 14. *Roy. lugdb.* 237. *Sauv. monſp.* 139. *Caprifolium.*
Periclymenum perfoliatum. *Bauh. pin.* 302.
Caprifolium Italicum. *Dod. pempt.* 411. *Hortul. angl. t.* 5. *f.* 1. 2. 3.
Habitat in Europa *auſtrali.* ♄

2\. LONICERA ſpicis nudis verticillatis terminalibus, foliis ſummis connato-perfoliatis. *ſempervirens.*
Lonicera floribus capitatis terminalibus, foliis ſummis connatis, inferioribus perfoliatis, *Hort. cliff.* 58. *Roy. lugdb.* 237.
Periclymenum perfoliatum virginianum ſempervirens & florens. *Herm. lugdb.* 484. *t.* 483.
Periclymenum virginianum. *Riv. mon.* 116.
Habitat in Virginia, Mexico. ♄

3\. LONICERA capitulis ovatis imbricatis terminalibus, foliis omnibus diſtinctis. *Hort. cliff.* 58. *Hort. upſ.* 42. * *Fl. ſuec.* 191. *Roy. lugdb.* 237. *Dalib. pariſ.* 69. *Sauv. monſp.* 139. *it. ſcan.* 305. *Periclymenum.*
Periclymenum non perfoliatum germanicum. *Bauh. pin.* 302.
β. Caprifolium non perfoliatum. *Hort. angl. t.* 6. & 8. *f.* 1. 2.
Caprifolium germanicum, flore rubello, ſerotinum. *Tournef. inſt* 226.
Habitat in Europa *media.* ♄
Caulis & folia pubeſcentia, & in β. glabra.

* Chamæceraſa *pedunculis bifloris.*

4\. LONICERA pedunculis bifloris, baccis diſtinctis, foliis ſerratis. *Roy. lugdb.* 238. *Sauv. monſp.* 140. *nigra.*
Chamæceraſus alpina, fructu nigro gemino. *Bauh. pin.* 451.
Periclymenum rectum, folio ſerrato. *Bauh. hiſt.* 2 *p.*107.
Periclymenum rectum 2. *Cluſ. hiſt.* 1. *p.* 58.
Habitat in Delphinatu, Gallia, Helvetia

5\. LONICERA pedunculis bifloris, baccis diſtinctis, foliis cordatis obtuſis. *Hort. upſ.* 42. *tatarica.*

Cha-



IMAGE EVALUATION
TEST TARGET (MT-3)

6″

Photographic
Sciences
Corporation

23 WEST MAIN STREET
WEBSTER, N.Y. 14580
(716) 872-4503



Chamæceraſus fructu gemino rubro, foliis glabris cordatis. *Amm. ruth.* 184.
Habitat in Tataria. ♄

Xylosteum. 6. LONICERA pedunculis bifloris, baccis diſtinctis, foliis integerrimis pubeſcentibus. *Roy. lugdb.* 238. *Fl. ſuec.* 192. *Dalib. pariſ.* 69. *Sauv. monſp.* 140.
Lonicera pedunculis bifloris, foliis ovatis obtuſis integris. *Hort. cliff.* 58.
Chamæceraſus dumetorum, fructu gemino rubro. *Bauh. pin.* 451.
Xyloſteum. *Dod. pempt.* 412.
Habitat in Europæ *frigidioris ſepibus.* ♄

pyrenaica. 7. LONICERA pedunculis bifloris, baccis diſtinctis, foliis oblongis glabris.
Lonicera pedunculis bifloris, baccis diſtinctis, floribus infundibuliformibus, ramis divaricatis. *Roy. lugdb.* 238.
Xyloſteum pyrenaicum. *Tournef. inſt.* 609. *Magn. hort.* 209. *t.* 209. *Raj. dendr.* 29.
Habitat in Pyrenæis.
Differt a præcedente Corollis regularibus, Ramis divaricatis, Foliis glabris.

alpigena. 8. LONICERA pedunculis bifloris, baccis coadunatis didymis.
Lonicera pedunculis bifloris, foliis ovatis acutis integris. *Hort. cliff.* 58. *Sauv. monſp.* 140.
Lonicera baccis bifloris concretis, floribus bilabiatis. *Roy. lugdb.* 238.
Chamæceraſus alpina, fructu rubro gemino, duobus punctis notato. *Bauh. pin.* 451.
Periclymenum rectum quartum. *Cluſ. hiſt.* 1. *p.* 59.
Habitat in Alpibus Helveticis, Pyrenaicis, Allobrogicis. ♄

cærulea. 9. LONICERA pedunculis bifloris, baccis coadunato-globoſis, ſtylis indiviſis.
Lonicera pedunculis bifloris bilabiatis, bacca ſingulari globoſa integerrima. *Roy. lugdb.* 239.
Chamæceraſus montana, fructu ſingulari cæruleo. *Bauh. pin.* 451.
Periclymenum rectum, fructu cæruleo. *Cluſ. pon.* 85. *Bauh. hiſt.* 2. *p.* 108. *Raj. hiſt.* 1492.
Habitat in Helvetia. ♄

* *Can-*

** Caule erecto pedunculis multifloris.*

10. LONICERA ſpicis terminalibus, foliis ovato-oblon- *marilandica*
gis acuminatis diſtinctis ſeſſilibus. *Gron. virg.* 142.
Periclymeni virginiani flore coccinea planta marilandica, ſpica erecta foliis conjugatis. *Raj. dendr.* 32.
Catesb. carol. 2. *p.* 78. *t.* 78.
Habitat in Virginia, Marilandia, Carolina. ♄

11. LONICERA capitulis lateralibus pedunculatis, foliis *Symphoricarpos.*
petiolatis.
Lonicera pedunculis axillaribus capitatis, foliis petiolatis. *Hort. cliff.* 58. *Roy. lugdb.* 237. *Gron. virg.* 23.
Symphoricarpos foliis alatis. *Dill. elth.* 371. *t.* 278. *f.* 360.
Vitis idæa caroliniana, foliis ſubrotundis hirſutis. *Hortul. angl.* 85. *t.* 20.
Habitat in Virginia, Carolina. ♄

12. LONICERA pedunculis multifloris, involucris pen- *paraſitica.*
taphyllis, foliis ovato-lanceolatis petiolatis. *Fl. zeyl.* 83.
Periclymenum ſurrectum, perſicæ foliis, maderaſpatanum. *Pluk. alm.* 287. *t.* 212. *f.* 5.
Itticanni. *Rheed. mal.* 7. *p.* *t.* 27.
Habitat in India *orientali.* ♄

13. LONICERA racemis lateralibus ſimplicibus, floribus *alba.*
pendulis, foliis integerrimis.
Lonicera racemis lateralibus ſimplicibus laxis, floribus oppoſitis pendulis, geniculis compreſſis. *Hort. cliff.* 496.
Periclymenum racemoſum, flore flaveſcente, fructu niveo. *Dill. elth.* 306. *t.* 228. *f.* 295.
Jaſminum folio myrtino acuminato, aliorum adminiculo ſe ſuſtentans, flore albicante racemoſo. *Sloan. jam.* 169. *hiſt.* 2. *p.* 97. *t.* 188. *f.* 3. *Raj. dendr.* 64.
Habitat in Jamaicæ, Barbados *locis confragoſis.* ♄

14. LONICERA racemis terminalibus, foliis ſerratis. *Diervilla.*
Diervilla. *Hort. cliff.* 63. *t.* 7.
Diervilla acadienſis fruticoſa, flore luteo. *Tournef. act.* 1706. *t.* 7. *f.* 1.
Habitat in Acadia, Noveboraco. ♄

15. LONICERA corymbis terminalibus, foliis ovatis a- *corymboſa.*
cutis.
Periclymanum foliis acutis, floribus profunde diſſectis. *Fewill. pernv.* 2. *p.* *t.* 45.
Habitat in Peru. ♄

TRI-

TRIOSTEUM.

perfoliatum. 1. TRIOSTEUM floribus verticillatis ſeſſilibus.
Trioſteoſpermum, latiore folio, flore rutilo. *Dill. elth.* 394. *t.* 293. *f.* 378.
Habitat in America *ſeptentrionali.* ♃

anguſtifol. 2. TRIOSTEUM floribus oppoſitis pedunculatis.
Lonicera humilis hirſuta, caule obſolete rubente quadrato, foliis lanceolatis adverſis, flore luteo ad alas unico. *Gron. virg.* 143.
Periclymenum herbaceum rectum virginianum. *Pluk. alm.* 287. *t.* 104. *f.* 2.
Habitat in Virginia. ♃

MORINDA.

umbellata. 1. MORINDA erecta, foliis lanceolato-ovatis, pedunculis confertis. *Fl. zeyl.* 81. *
Habitat in India. ♄

citrifolia. 2. MORINDA arborea, pedunculis ſolitariis. *Fl. zeyl.* 82.
Coda-pilava. *Rheed. mal.* 1. *p.* 97. *t.* 52. *Raj. hiſt.* 1442.
Habitat in India. ♄

Royoc. 3. MORINDA procumbens. *Hort. cliff.* 73. *Roy. lugdb.* 187.
Morinda americana humifuſa laurifolia. *Vaill. act.* 1722. *p.* 275.
Royoc humifuſum, fructu cupreſſino. *Plum. ſpec.* 11.
Periclymenum americanum e cujus radice fit atramentum. *Pluk. alm.* 287. *t.* 212. *f.* 4.
Habitat in America *calidiore.* ♄

CONOCARPUS.

erecta. 1. CONOCARPOS erecta, foliis oblongis.
Conocarpus. *Hort. cliff.* 485.
Alnus maritima myrtifolia coriariorum. *Pluk. alm.* 18. *t.* 240. *f.* 3.
Alni fructu laurifolia arbor maritima. *Sloan. jam.* 135. *hiſt.* 2. *p.* 18. *t.* 161. *f.* 2. *Raj. dendr.* 11.
Rudbeckia laurifolia maritima. *Amm. herb.* 581.
Habitat in Jamaicæ, Bermudenſium, Braſiliæ *maritimis.* ♄

CO-

2. CONOCARPUS procumbens foliis ſubrotundis. *procumbens.*
Rudbeckia ſupina. foliis ſubrotundis. *Amm. herb.* 581.
Habitat in Cuba.

MUSSÆNDA.

1. MUSSÆNDA *Herm. zeyl.* 36. *Fl. zeyl.* 84. *fl. frondoſa.*
Muſſænda zeylanica, flore rubro, folio ex florum thyrſo prodeunte albo. *Burm. zeyl.* 165. *t.* 76.
Belilla. *Rheed. mal.* 2. *p.* 27. *t.* 18. *Raj. hiſt.* 1493. *dendr.* 126.
Habitat in India. ♄

MIRABILIS.

1. MIRABILIS. *Hort. cliff.* 53. *Hort. upſ.* 43. *Fl. zeyl.* 85. *Mat. med.* 76. *Jalapa*
Nyctage. *Roy. lugdb.* 417. *Cold. noveb.* 29.
Jalapæ ſpecies omnes. *Tournef. inſt.* 130.
Solanum mexiocanum, flore parvo. *Bauh. pin.* 168. *prodr.* 91.
β. Solanum mexiocanum, flore magno. *Bauh. pin.* 168.
Admirabilis peruviana. *Cluſ. hiſt.* 2. *p.* 87.
Habitat in India *utraque.* ♃

CORIS.

1. CORIS. *Hort. cliff.* 68. *Hort. upſ.* 46. *Mat. med.* 80. *monſpelienſis*
Roy. lugdb. 304. *Sauv. monſp.* 46.
Coris cærulea maritima. *Bauh. pin.* 280.
Symphytum petræum. *Cam. epit.* 699.
Habitat in Europæ *auſtralis arenoſis maritimis.*

VERBASCUM.

VERBASCUM foliis decurrentibus utrinque tomentoſis. *Vir. cliff.* 13. *Fl. ſuec.* 186. *Mat. med.* 90. *Roy. lugdb.* 421. *Dalib. pariſ.* 71. *Thapſus.*
Verbaſcum caule ſimplici ſuperne floribus ſeſſilibus clavato, foliis utrinque lanigeris. *Hort. cliff.* 55.
Verbaſcum mas latifolium luteum. *Bauh. pin.* 239.
Verbaſcum latius. *Dod. pempt.* 143.
Habitat in Europæ *glareoſis ſterilibus.* ♂

VERBASCUM foliis cuneiformi-oblongis. *Hort. upſ.* 45. *Lychnitis.*
Verbaſcum foliis ovato-acutis ſubtus villoſis crenatis, ſpicis laxis lateralibus & terminalibus. *Hort. cliff.* 54. *Roy. lugdb.* 421. *Dalib. pariſ.* 71.

M Ver-

Verbaſcum pulverulentum, flore luteo parvo. *Bauh. hiſt.* 3. *p.* 812. *Raj. hiſt.* 1094.
Verbaſcum mas, anguſtioribus foliis, floribus pallidis. *Bauh. pin.* 239.
β. Verbaſcum lychnitis, flore albo parvo. *Bauh. pin.* 240.
Verbaſcum candidum femina. *Fuch. hiſt.* 847.
γ. Phlomis mas alter. *Lob. ic.* 562.
Habitat in Europæ *ruderatis cultis.* ♂

nigrum. 3. VERBASCUM foliis cordato-oblongis petiolatis. *Mat. med.* 91.
Verbaſcum foliis ovatis crenatis ſubtus tomentoſis, caule angulato. *Vir. cliff.* 13. *Fl. ſuec.* 187. *Roy. lugdb.* 421. *Dalib. pariſ.* 91.
Verbaſcum foliis ovatis ſubtus incanis crenatis, ſpica laxa rarius ramoſa. *Hort. cliff.* 54.
Verbaſcum nigrum, flore ex luteo purpuraſcente. *Bauh. pin.* 240.
Habitat in Europa *ad pagos, vias.* ♃

Blattaria. 4. VERBASCUM foliis amplexicaulibus oblongis glabris, pedunculis ſolitariis. *Hort. upſ.* 46.
Verbaſcum annuum, foliis oblongis ſinuatis obtuſis. *Hort. cliff.* 15. *Guet. ſtamp.* 2. *p.* 309.
Verbaſcum foliis glabris ſerrato-dentatis, radicalibus ſinuatis. *Roy. lugdb.* 421. *Dalib. pariſ.* 72. *Sauv. monſp.* 276.
Blattaria lutea, folio longo laciniato. *Bauh. pin.* 240.
Habitat in Europæ *auſtralioris locis argillaceis.* ⊙

Arcturus. 5. VERBASCUM foliis lyrato-pinnatis.
Verbaſcum humile creticum laciniatum. *Bauh. pin.* 240.
Verbaſcum braſſicæ folio. *Columm. ecphr.* 2, *p.* 81. *t.* 82.
Habitat in Creta.

ſinuatum. 6. VERBASCUM foliis radicalibus oblongis ſinuatis undatis tomentoſis, caulinis cordatis amplexicaulibus nudiuſculis.
Verbaſcum foliis pinnato-ſinuatis hirſutis: ſubtus tomentoſis. *Roy. lugdb.* 421. *Sauv. monſp.* 276.
Verbaſcum nigrum, foliis papaveris corniculati. *Bauh. pin.* 240. *Camer. hiſt.* 403. *t.* 403.
β. Verbaſcum græcum fruticoſum, folio ſinuato candidiſſimo. *Tourn. cor.* 8. *itin.* 1. *p.* 335. *t.* 335.
Habitat Monſpelii, Florentiæ.

phœniceum. 7. VERBASCUM foliis ovatis nudis crenatis radicalibus, caule ſubnudo racemoſo. Ver-

Verbaſcum foliis ovatis crenatis nudis ſcabris, caule ramoſo. *Hort. cliff.* 55.
Blattaria purpurea. *Bauh. pin.* 241?
Habitat in Europa *auſtrali*, Bohemia, Luſitania *inferiore.* ♃

8. VERBASCUM foliis incifis nudis, caule folioſo, calycibus lanatis, pedunculis bifloris. *Osbeckii.*
Habitat in Hiſpania. *Osbeck.*

9. VERBASCUM foliis lanatis radicalibus, ſcapo nudo. *myconi,*
Cortuſa foliis ovatis ſeſſilibus. *Hort. cliff.* 50. *Roy. lugdb.* 417.
Sanicula alpina, foliis boraginis, villoſa. *Bauh. pin.* 242.
Auricula urſi myconi. *Dalech. hiſt.* 837. *Bauh. hiſt.* 3. *p.* 869.
Habitat in Pyrenæorum *nemoroſis.*

DATURA.

1. DATURA pericarpiis ſpinoſis erectis ovatis. *Hort. cliff.* 55. *Hort. upſ.* 43. *Fl. ſvec.* 185. *Gron. virg.* 23. *Roy. lugdb.* 422. *Dalib. pariſ.* 70. *Stramonium*
Solanum fœtidum, pomo ſpinoſo oblongo, flore albo. *Bauh. pin.* 168.
Solanum ſativum, pomo ſpinoſo oblongo, flore albo. *Bauh. pin.* 168.
Tatula. *Cam. epit.* 176.
Habitat in America, *nunc vulgaris per* Europam. ☉

2. DATURA pericarpiis ſpinoſis nutantibus globoſis. *Hort. cliff.* 55. *Hort. upſ.* 44. *Fl. zeyl.* 86. *Mat. med.* 85. *Roy. lugdb.* 422. *Metel.*
Solanum pomo ſpinoſo rotundo, longo flore. *Bauh. pin.* 168.
Hummatu. *Rheed. mal.* 2. *p.* 47. *t.* 28.
Habitat in Aſia, Africa. ☉

3. DATURA pericarpiis inermibus nutantibus, caule arboreo. *arborea.*
Stramonioides arboreum, oblongo & integro folio, fructu lævi. *Fewil. peruv.* 2. *p.* *t.* 46.
Habitat in Peru. ♄

HYOSCYAMUS.

1. HYOSCYAMUS foliis amplexicaulibus. *Hort. cliff.* 56. *Fl. ſuec.* 184. *Mat. med.* 86. *Roy. lugdb.* 422. *Dalib. pariſ.* 70. *Hall. helv.* 512. *niger,*

Hyoſcyamus vulgaris & niger. *Bauh. pin.* 169.
Habitat in Europæ *ruderatis pinguibus.* ♂

albus. 2. HYOSCYAMUS foliis petiolatis, floribus ſeſſilibus. *Hort. cliff.* 56. *Roy. lugdb.* 422. *Sauv. monſp.* 275.
Hyoſcyamus albus major. *Bauh. pin.* 169.
β. Hyoſcyamus albus minor. *Bauh. pin.* 169.
Hyoſcyamus albus vulgaris. *Cluſ. hiſt.* 2. *p.* 118
Habitat in Europa *auſtrali.* ☉

aureus. 3. HYOSCYAMUS foliis petiolatis, floribus pedunculatis. *Hort. cliff.* 56. *Roy. lugdb.* 422.
Hyoſcyamus creticus luteus major *Bauh. pin.* 169 *prodr.* 92.
β. Hyoſcyamus creticus luteus minor. *Bauh. pin.* 169.
Hyoſcyamus aureus. *Alp. exot.* 99. *t.* 98.
Habitat in Creta. ☉

pusillus. 4. HYOSCYAMUS foliis lanceolatis ſubdentatis, calycibus ſpinoſis. *Hort. upſ.* 44.
Hyoſcyamus foliis lanceolatis. *Hort. cliff.* 56. *Roy. lugdb.* 422.
Hyoſcyamus puſillus aureus americanus, antirrhini foliis glabris. *Pluk. alm.* 188. *t.* 37. *f.* 5.
Habitat in Perſia. ☉

physalodes. 5. HYOSCYAMUS foliis ovatis integerrimis, calycibus inflatis ſubgloboſis. *Hort. upſ.* 44. *
Habitat in Sibiria. ♃

NICOTIANA.

Tabacum. 1. NICOTIANA foliis lanceolatis. *Hort. cliff.* 56. *Hort. upſ.* 45. *Mat. med.* 87. *Roy. lugdb.* 423.
Nicotiana major latifolia. *Bauh. pin.* 169.
Blennochoes. *Reneal. ſpec.* 37. *t.* 38.
Habitat in America, *nota Europæis ab* 1560. ☉

ruſtica. 2. NICOTIANA foliis ovatis. *Hort. cliff.* 56. *Hort. upſ.* 45. *Roy. lugdb.* 423.
Nicotiana minor. *Bauh. pin.* 170.
Pachyphylla. *Reneal. ſpec.* 40.
Habitat in America, *nunc in Europa.* ☉

paniculata. 3. NICOTIANA foliis cordatis, floribus paniculatis: tubis clavatis.
Nicotiana minor, folio cordiforum tubo floris prælongo. *Fewill. peruv.* 1. *p.* 717. *t.* 10.

Ha-

Habitat in Peru. ☉

Differt *a ſecunda* Caule *teneriore, altiore, paniculato.* Corollis *anguſtioribus: limbo breviſſimo, obtuſiſſimo, tubo longo clavato*; calycibus capſulisque *acutis.*

4. NICOTIANA foliis cordatis, corollis racemoſis ſubringentibus, calycibus inæqualibus. *glutinoſa.*
Habitat in Peru. *D. B. Juſſieu.* ☉
Folia *magis cordata, glutinoſa.* Flores *in racemos paucos, longos.* Corollæ *ferme ſpeciei primæ, ſed magis inæquales & fere ringentes fauce biantes.* Stamina *ad latus ſuperius inflexa.* Calycis *una lacinia reliquis duplo major.*

MANDRAGORA.

1. MANDRAGORA *Hort. cliff.* 51. *Roy. lugdb.* 423. *Mat. med.* 88. *officinarum.*
Mandragora fructu rotundo. *Baub. pin.* 169.
Mandragoras. *Dod. pempt.* 457.
Habitat in Hiſpaniæ, Italiæ, Cretæ, Cycladum *apricis.*

ATROPA.

1. ATROPA caule herbaceo, foliis ovatis integris. *Bella donna.*
Atropa. *Hort. cliff.* 57. *Hort. upſ.* 45. *Roy. lugdb.* 423.
Solanum melanoceraſus. *Baub. pin.* 166.
Solanum lethale. *Cluſ. hiſt.* 2. *p.* 86.
Habitat in Auſtriæ, Angliæ *montibus ſylvoſis.* ♃

2. ATROPA foliis ſinuato-angulatis, calycibus clauſis acutangulis. *phyſalodes.*
Alkekengi amplo flore violaceo. *Few. peruv.* 724. *t.* 16.
Habitat in Peru. *D. B. Juſſieu.* ☉
Radix *fibroſa, annua.* Caulis *bipedalis, patulus, erectus, ramis angulatis.* Folia *alterna, glabra, oblonga, per petiolum decurrentia, obtuſe ſinuata* (Daturæ). Pedunculi *ad latus petiolorum ſolitarii, nudi, uniflori.* Calyx *ovatus, baſi excifus, angulis quinque compreſſis, profunde 5 partitus: foliolis ſagittato-ovatis.* Corolla *campanulata, parum quinqueloba, obtuſa, Limbo erecto, ſubplicato, cæruleſcente.* Stamina 5, *ſubulata, baſi dilatata, ſubvilloſa, corolla longe breviora, ſuperne divergentia.* Antheræ *erectæ.* Germen *intra baſin ſtaminum.* Stylus *filiformis, longitudine ſtaminum.* Stigma *ca-*

capitatum. Fructus *cernuus, tectus calyce majore, quinquangulari angulis compreſſis arcte clauſis, baſi mucronatis.* Bacca *exſucca, 3. 4. ſ. 5-locularis;* ſemina *ſubrotunda, compreſſa.* Media *inter Atropam & Phyſalidem; a Phyſalide differt figura corollæ, ſtaminibus diſtantibus, calyce quinquepartito, capſula loculamentis pluribus.*

fruteſcens. 3. ATROPA caule fruticoſo.
Bella-donna fruteſcens rotundifolia hiſpanica. *Tournef. inſt.* 77. *Barr. ic.* 1173.
Habitat in Hiſpania. ♄
Habitus & omnia Phyſalidis ſomniferæ, *ut limites generum in ſolo calyce conſiſtant.*

PHYSALIS.

* *perennes.*

ſomnifera. 1. PHYSALIS caule fruticoſo, ramis rectis, floribus confertis.
Phyſalis caule fruticoſo tereti, foliis ovatis integerrimis, floribus confertis. *Hort. cliff.* 62. *Roy. lugdb.* 426.
Solanum ſomniferum verticillatum. *Bauh. pin.* 166.
Solanum ſomniferum. *Cluſ. hiſt.* 2. *p.* 85.
Habitat in Mexico, Creta, Hiſpania. ♄
Fructus Phyſalidis; *Flos* Atropæ; *Herba præcedentis, cui ita ſimilis, ut vix genere ſeparari queat.*

flexuoſa. 2. PHYSALIS caule fruticoſo, ramis flexuoſis, floribus confertis.
Baccifera indica, floribus ad foliorum exortus, fructu ſulcato decapyreno. *Raj. hiſt.* 1632.
Pevetti. *Rheed. mal.* 4. *p.* 113. *t.* 55.
Habitat in India. ♄
Habitus & ſtatura P. ſomniferæ; Flores *itidem ſparſi ad axillas foliorum;* Calyces *etiam enaſcuntur & involvunt baccam; Manifeſte vero differt floribus minoribus, ramis bifariam valde flexuoſis, hinc folia quaſi diſtiche diſpoſita, flexuræ angulis exterioribus inſerta.*

curaſſavica. 3. PHYSALIS caule fruticoſo, foliis ovatis tomentoſis. *Vir. cliff.* 16. *Roy. lugdb.* 426.
Phyſalis caule perenni, foliis ovatis ſolitariis, ramis annotinis ſimpliciſſimis. *Hort. cliff.* 62. *
Solanum veſicarium curaſſavicum, ſolano antiquorum ſimile, foliis origani ſubincanis. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 527. *Pluk. alm.* 352. *t.* 111. *f.* 5.
Habitat in Curaſſao ♄

4. PHYSALIS foliis cordatis integerrimis obtuſis ſcabris, corollis glabris. *viſcoſa.*
Phyſalis radice perenni, foliis cordatis obtuſis. *Hort. cliff.* 496. *Roy. lugdb.* 426 *Gron. virg.* 24.
Alkekengi bonarienſe repens, bacca turbinata viſcoſa. *Dill. elth.* 11. *t.* 10. *f.* 10.
Habitat in Virginia, Bonaria. ♃

5. PHYSALIS foliis geminis. *Alkekengi.*
Phyſalis caule ſimplici annuo, foliis integerrimis geminatis, floribus ſolitariis. *Hort. cliff.* 62. *Hort. upſ.* 49. *Mat. med.* 93. *Dalib. pariſ.* 73.
Phyſalis radice perenni, foliis lanceolato-cordatis. *Vir. cliff.* 16. *Roy. lugdb.* 426.
Solanum veſicarium. *Bauh. pin.* 166. *Dod. pempt.* 454.
Habitat in Italia. ♃

* *Annuæ.*

6. PHYSALIS ramoſiſſima, ramis angulatis glabris. *angulata.*
Phyſalis annua ramoſiſſima, ramis anguloſis glabris, foliis dentato-ſerratis. *Hort. cliff.* 62. *Hort. upſ.* 50. *Fl. zeyl.* 97. *Roy. lugdb.* 427.
Halicacabum ſ. Solanum indicum. *Comm. hort.* 1. *p.* 70. *t.* 17.
Solanum veſicarium indicum. *Bauh. pin.* 166.
Alkekengi indicum glabrum, chenopodii folio. *Dill. elth.* 13. *t.* 12. *f.* 12.
β. Alkekengi indicum glabrum, capſicii folio. *Dill. elth.* 12. *t.* 11. *f.* 11.
Habitat in India *utraque.* ⊙

7. PHYSALIS ramoſiſſima, foliis villoſo-viſcoſis, pedunculis nutantibns. *pubeſcens.*
Phyſalis annua ramoſiſſima, ramis teretibus pubeſcentibus: geniculis nodoſis. *Hort. cliff.* 62.
Alkekengi virginianum, fructu luteo. *Fewill. peruv.* 3. *p.* 5. *t.* 1.
Solanum veſicarium virginianum procumbens annuum, folio lanuginoſo. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 527. *ſ.* 13. *t.* 3. *f.* 24.
Habitat in India *utraque.* ⊙
Fructus *villoſo-viſcoſus, nec glaber; maculæ* corollæ *fuſcæ, nec pallidæ.* Pedunculi *nutantes, nec cernui.*

8. PHYSALIS ramoſiſſima, pedunculis fructiferis folio longioribus. *Hort. cliff.* 62. *Roy. lugdb.* 427. *minima.*

M 4 So-

Solanum veſicarium indicum minimum. *Herm. lugdb.* 569. *t.* 571.
Pee-inota-inodien. *Rheed. mal.* 10. *t.* 140. *f.* 71.
Habitat in Indiæ *aridis ſordidis.* ⊙

pruinoſa. 9. PHYSALIS ramoſiſſima, divaricationibus farinaceo-germinantibus.
Habitat in America. ⊙
Facies *antecedentium* 5. 6. 7. 8, *ſed* antheræ *flavæ, nec cæruleæ*; rami *teretes: ſupra plani villoſi*; Folia *villoſo-viſcoſa*; *Alæ ramificationum viridi quaſi* pruina *germinant.*

SOLANUM.

* *inermia.*

verbaſcifolium. 1. SOLANUM caule inermi fruticoſo, foliis ovatis tomentoſis integerrimis, umbellis compoſitis.
Solanum arboreſcens, verbaſci folio. *Plum. ſpec.* 4.
Solanum maxime tomentoſum, ſpinis carens, virginianum. *Pluk. alm.* 351. *t.* 316. *f.* 1.
Habitat in America. ♄

guineenſe. 2. SOLANUM caule inermi fruticoſo, foliis ovatis integerrimis, pedunculis lateralibus filiformibus.
Solanum caule inermi perenni, foliis ovatis integris, floribus ad baſin ramulorum confertis. *Roy. lugdb.* 424.
Solanum africanum lignoſum, folio atroviridi anguſto oblongo obtuſo. *Boerh. lugdb.* 2. *p.* 68.
Habitat in Guinea. ♄

PſeudoCapſicum. 3. SOLANUM caule inermi fruticoſo, foliis lanceolatis repandis, umbellis ſeſſilibus.
Solanum caule inermi fruticoſo, foliis ovato-lanceolatis integris, floribus ſolitariis. *Hort. cliff.* 61. *Hort. upſ.* 48. *Roy. lugdb.* 424.
Solanum fruticoſum bacciferum. *Bauh. pin.* 61.
Pſeudocapſicum. *Dod. pempt.* 718.
Habitat in Madera. ♄

diphyllum. 4. SOLANUM caule inermi fruticoſo, foliis geminis altero minore, floribus cymoſis.
Solanum caule inermi perenni, foliis ovato-lanceolatis geminis: altero minimo. *Vir. cliff.* 15. *Hort. cliff.* 61. *Roy. lugdb.* 424.
Solanum americanum ſtrychnodendro accedens, fructu-

ctu medio quaſi fiſſo. *Pluk. alm.* 349. *t.* 111. *f.* 4. *mala.*

Habitat in America? ♄

5. SOLANUM caule inermi fruteſcente flexuoſo, foliis ſuperioribus haſtatis, racemis cymoſis. *Hort. cliff.* 60. *Fl. ſuec.* 189. *Mat. med.* 95. *Roy. lugdb.* 424. *Dalib. pariſ.* 73. *Dulcamara.*

Solanum ſcandens ſ. Dulcamara. *Bauh. pin.* 167.

β. Solanum dulcamarum africanum, foliis craſſis hirſutis. *Dill. elth.* 365. *t.* 273. *f.* 352.

Habitat in Europæ *ſepibus humentibus.* ♄

6. SOLANUM caule inermi fruteſcente flexuoſo, foliis oblongis lateribus ſinuatis, racemis cymoſis. *quercifolium*

Solanum foliis quernis. *Few. peruv.* 722. *t.* 15.

Habitat in Peru. *D. Juſſieu.* ♄

Habitus S. Dulcamaræ; Rami *angulati.* Folia *ovato-oblonga, in petiolum decurrentia, venoſa, glabra, lateribus pinnato-ſinuata.* Pedunculi *ramoſi.* Corollæ *violaceæ, obtuſiores quam Dulcamaræ: maculis duabus pallidis ad baſin ſinguli lobi.* Antheræ *flavæ, ſtylo breviores.*

7. SOLANUM caule fruteſcente ſubinermi, foliis cuneiformibus ſinuato-repandis. *bonarienſe.*

Solanum bonarienſe arboreſcens, papas floribus. *Dill. elth.* 364. *t.* 272. *f.* 351.

Habitat in agro Bonarienſi. ♄

Folia & Flores maximi; Aculei aliquot in tenella planta, non vero in adulta.

8. SOLANUM caule inermi herbaceo, foliis pinnatis integerrimis. *Vir. cliff.* 15. *Hort. cliff.* 60. *Hort. upſ.* 48. *Roy. lugdb.* 423. *Dalib. pariſ.* 73. *tuberoſum.*

Solanum tuberoſum eſculentum. *Bauh. pin.* 167. *prodr.* 89. *t.* 89.

Habitat in Peru. ⊙--♃

9. SOLANUM caule inermi herbaceo, foliis pinnatis inciſis, racemis ſimplicibus. *Vir. cliff.* 15. *Hort. cliff.* 60. *Roy. lugdb.* 423. *Lycoperſicum*

Solanum pomiferum, fructu rotundo ſtriato molli. *Bauh. pin.* 167.

Poma amoris. *Cam. epit.* 821.

β. Solanum racemoſum ceraſorum forma. *Bauh. pin.* 167. *prodr.* 90.

Habitat in America *calidiore.* ⊙. β ♃

peruvianum. 10. SOLANUM caule inermi herbaceo, foliis pinnatis inciſis, racemis bipartitis reflexis, baccis ſubpiloſis.
Lycoperſicon pimpinellæ folio. *Few. peruv.* 3. *p.* 37. *t.* 25.
Habitat in Peru. *D. Juſſieu.* ♃

montanum. 11. SOLANUM caule inermi herbaceo, foliis ſubcordatis repandis.
Solanum tuberoſum minus, atriplicis folio, vulgo Papa montana. *Few. peruv.* 3. *p.* *t.* 46.
Habitat in Peru. ♃

nigrum. 12. SOLANUM caule inermi herbaceo, foliis ovatis dentato-angulatis, umbellis nutantibus.
vulgare. Solanum caule inermi herbaceo, foliis ovatis angulatis. *Vir. cliff.* 15. *Hort. cliff.* 60. *Hort. upſ.* 48. *Fl. ſuec* 188. *Mat. med.* 94. *Gron. virg.* 24. *Roy. lugdb.* 433. *Dalib. pariſ.* 72.
Solanum officinarum. *Bauh. pin.* 166.
patulum. β — *ramis teretibus glabris, foliis integerrimis glabris.*
Solanum procerius patulum vulgaris fructu. *Dill. elth* 367. *t.* 275. *f.* 355.
villoſum. γ. — *ramis teretibus villoſis, foliis angulatis ſubvilloſis*
Solanum annuum hirſutius, baccis luteis. *Dill. elth.* 366. *t.* 274. *f.* 353.
guineenſe. δ. — *ramis angulatis dentatis, foliis integerrimis glabris*
Solanum guineenſe, fructu magno inſtar ceraſi. *Dill elth.* 366. *t.* 274. *f.* 354.
virginicum ε — *ramis angulatis dentatis, foliis repandis glabris.*
Solanum nigrum vulgari ſimile, caulibus exaſperatis. *Dill. elth.* 368, *t.* 275. *f.* 256.
judaicum. ζ. — *ramis aculeis incurvis, foliis repandis nudis.*
Habitat in Orbis *totius cultis.* ☉
Tot varietates β. γ. δ. ε. ζ. videntur eſſe hybridæ proles.

S. *Spinoſa.*

Melongena. 13. SOLANUM caule inermi herbaceo, foliis ovatis tomentoſis integris, calycibus ſpinoſis.
Solanum calycibus aculeatis, foliis ovatis integerrimis tomentoſis. *Hort. cliff.* 61. *Hort. upſ.* 49. *Fl. zeyl.* 93. *Roy. lugdb.* 426.
Solanum pomiferum, fructu oblongo. *Bauh. pin.* 167.
Mala inſana. *Dod. pempt.* 458.
Habitat in Aſia, Africa, America. ☉

14. SO

14. SOLANUM caule aculeato herbaceo, foliis cordatis ſinuatis, calycibus aculeatis. *Vir. cliff.* 16. *Hort. cliff.* 61. *Campechienſe.*

Solanum campechienſe, calycibus echinatis. *Dill. elth.* 361. *t.* 268. *f.* 347.

Habitat in America *ad ſinum* Campechienſe.

15. SOLANUM caule aculeato herbaceo, foliis cordatis quinquelobis: utrinque villoſis aculeatis. *Vir. cliff.* 15. *Hort. cliff.* 61. *Hort. upſ.* 49. *Roy. lugdb.* 425. *mammoſum.*

Solanum barbadenſe ſpinoſum annuum, fructu aureo rotundiore pyri parvi inverſi forma & magnitudine. *Pluk. alm.* 350. *t.* 225. *f.* 1.

Habitat in Virginia, Barbados. ⊙

16. SOLANUM caule aculeato herbaceo, foliis pinnatifidis: laciniis ſinuatis obtuſis, calycibus aculeatis. *Roy. lugdb.* 425. * *virginianum*

Solanum americanum laciniatum ſpinoſiſſimum. *Dill. elth.* 360. *t.* 368. *f.* 267.

Solanum annuum virginianum nigricans ſpinoſiſſimum, flore cæruleo. *Pluk. alm.* 351. *t.* 62. *f.* 3.

Habitat in America. ⊙

17. SOLANUM caule aculeato fruticoſo, foliis angulatis tomentoſis integerrimis: aculeis utrinque rectis, calycibus inermibus. *Fl. zeyl.* 94. * *indicum.*

Solanum caule aculeato fruticoſo, foliis ovatis ſinuatis integerrimis, ſpinis utrinque erectis. *Hort. cliff.* 61. *Roy. lugdb.* 424.

Solanum indicum ſpinoſum, flore boraginis. *Robert. ic.* 28. *Dill. elth.* 362. *t.* 270. *f.* 349.

Solanum americanum perenne ſubincanum, fructu pyriformi [illegible]giore, ſpinis plurimis armatum. *Pluk. alm.* 350. *t.* [illegible]5. *f.* 6.

Habitat in India *utraque* ♄

18. SOLANUM caule aculeato fruticoſo, foliis haſtato-angulatis: aculeis utrinque tectis, racemis laxis. *carolinenſe*

Solanum caule aculeato fruticoſo, foliis ovatis lateribus laciniatis: aculeis utrinque rectis. *Hort. cliff.* 61. * *Vir. cliff* 15 *Roy. lugdb.* 424.

Solanum carolinenſe ſpinoſum, boraginis floribus ſpicatis. *Dill. elth.* 362. *t.* 269 *f* 348.

Habitat in Carolina. ♄

19. SOLANUM caule aculeis recurvis, foliis ſinuatis *Sodomeum* ſub-

ſubtus tomentoſis utrinque aculeatis, pedunculis aculeatis. *Fl. zeyl.* 95. * *Hort. upſ.* 49.

Solanum caule aculeato fruticoſo, foliis oblongis pinnato-laciniatis, ſpinis ſupinis erectis, pronis recurvis. *Hort. cliff.* 61. *Vir. cliff.* 15. *Roy. lugdb.* 424.

Solanum pomiferum fruteſcens africanum ſpinoſum nigricans, borraginis flore, foliis profunde laciniatis. *Herm. lugdb.* 573. *t.* 575. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 521. *ſ.* 13. *t.* 1. *f.* 15. *Pluk. alm.* 251. *t.* 226. *f.* 5.

Habitat in Africa. ♄

incanum. 20. SOLANUM caule aculeato fruticoſo, foliis repandis, calycibus aculeatis. *Roy. lugdb.* 425.

Solanum ſpinoſum incanum, foliis ſinuatis, flore boraginis, fructu luteo ovuli gallinacei magnitudine & forma. *Boerh.* 2. *p.* 68.

Habitat - - - -

tomentoſum. 21. SOLANUM caule aculeato fruticoſo, foliis cordatis villoſis margine repandis, calycibus inermibus. *Hort. cliff.* 61. *Roy. lugdb.* 425.

Solanum pomiferum fruteſcens, flore boraginis, folio tomentoſo incano, ſolo caule ſpinoſo. *Boerh. lugdb.* 2. *p.* 69.

Habitat in America *ſeptentrionali.*

bahamenſe. 22. SOLANUM caule aculeato fruticoſo, foliis lanceolatis anguloſo-dentatis. *Hort. cliff.* 61. *Roy. lugdb.* 424.

Solanum bahamenſe ſpinoſum, petalis anguſtis reflexis. *Dill. elth.* 263. *t.* 271. *f.* 250.

Solanum ſpiniferum fruteſcens, ſpinis igneis, americanum. *Pluk. alm.* 350. *t.* 225. *f.* 5.

Habitat in Americæ *inſula* Providentia. ♄

trilobatum. 23. SOLANUM caule aculeato fruticoſo, foliis ſubtrilobis glabris obtuſis inermibus.

Habitat in India.

Caulis *ſubfruteſcens.* Folia *parva, glabra, obtuſa, ſubtriloba, raro etiam ad baſin lobata.* Aculei *reflexi in caule, petiolis, pedunculis.* Pedunculi *uniflori;* Calyces *minimi, inermes.* Stylus *adſcendens.* Figura *proxime accedit ad. Pluk. tab.* 316. *f.* 5.

CAPSICUM.

annuum. 1. CAPSICUM caule herbaceo. *Roy. lugdb.* 426.

Cap-

Capſicum annuum. *Hort. cliff.* 59. *Hort. upſ.* 47. *Fl zeyl.* 92. *Mat. med.* 96.
Piper indicum vulgatiſſimum. *Bauh. pin.* 132.
Vallia-capo-molago. *Rheed. mal.* 2. *p. t.* 35.
Habitat in America *meridionali.* ☉

2. CAPSICUM caule fruticoſo. *Roy. lugdb.* 426. *fruteſcens.*
Capſicum fruteſcens. *Hort. cliff.* 59.
Capo-molago. *Rheed. mal.* 2. *p.* 109. *t.* 56.
Habitat in India. ♄

STRYCHNOS.

1. STRYCHNOS foliis ovatis, caule inermi. *Fl. zeyl.* 91. *Mat. med.* 77. *Nux vomica*
Strychnos foliis quinquenerviis. *Wach. ultr.* 32.
Nux Vomica officinarum. *Bauh. pin.* 511. *Raj. hiſt.* 1814.
Colubrini ligni tertium genus in malabar. *Bauh. pin.* 301.
Caniram. *Rheed. mal.* 1. *p.* 67. *t.* 37. *Raj. hiſt.* 1661.
Habitat in India. ♄

2. STRYCHNOS foliis ovatis acutis, cirrhis ſimplicibus. *Mat. med.* 78. *Amœn. acad.* 2. *p.* 119. *colubrina.*
Strychnos foliis trinerviis ovatis binatis. *Wach. ultr.* 32.
Clematis indica ſpinoſa, foliis luteis. *Bauh. pin.* 301.
Fructus orbicularis major fuſcus ſtriatus. *Bauh. pin.* 405.
Modira-caniram. *Rheed. mal.* 7. *p.* 10. *t.* 5. *Raj. hiſt.* 1661.
Habitat in India. ♄

CHIRONIA.

1. CHIRONIA herbacea, calycinis foliolis membranaceo-carinatis. *Fl. zeyl.* 90. * *trinervia.*
Chironia foliis lanceolatis trinerviis. *Hort. cliff.* 54.
Lyſimachia folio ſinuato acuminato trinervio, flore cæruleo amplo, calyce carinato alato. *Burm. zeyl.* 145. *t.* 67.
Habitat in Zeylona. ☉

2. CHIRONIA herbacea, foliis linearibus. *Hort. cliff.* 54. *Roy. lugdb.* 433. *linoides.*
Rapuntio affinis, lini facie, capitis b. ſpei. *Breyn. cent.* 175. *t.* 90.
Habitat in Capitis b. Spei *herbidis.* ♃

3. CHI

campanulata. 3. CHIRONIA herbacea, foliis ſublinearibus, calycibus longitudine corollæ.
Habitat in Canada. *Kalm.*
Caulis *pedalis, teres: Ramis longis.* Folia *lanceolato-linearia, levia.* Flores *terminales, ſolitarii rotati, purpurei, pedunculo longo inſidentes;* calycis *foliola longitudine corollæ, ſubulata.* Antheræ *ſpirales.*

angularis. 4. CHIRONIA herbacea, caule acutangulo, foliis ovatis amplexicaulibus.
Habitat in Virginia. *Kalm.*
Facies *Centaurii minoris.* Caulis *pedalis, tetragonus: alis membranaceis.* Folia *ovata, hyperici, oppoſita, ſeſſilia & ſemiamplexicaulia.* Flores *congeſti, ut in Hyperico;* Antheræ *ſpirales,* Stylus *bifidus.*

dodecandra. 5. CHIRONIA floribus duodecemfidis.
Gentiana floribus duodecim-petalis, foliis diſtinctis. *Gron. virg.* 27.
Habitat in Virginia

baccifera. 6. CHIRONIA fruteſcens baccifera.
Centaurium minus arboreſcens pulpiferum. *Comm. rar.* 9. *t.* 9.
Centaurium minus africanum arboreſcens anguſtifolium. *Old. afr.* 26.
Habitat in Æthiopia. ♄

fruteſcens. 7. CHIRONIA fruteſcens capſulifera.
Centaurium minus africanum arboreſcens latifolium, flore ruberrimo. *Comm. rar.* 8. *t.* 8. *Old. afr.* 26.
Habitat in Æthiopia. ♄

CORDIA.

Myxa. 1. CORDIA foliis ſubovatis ſerrato-dentatis. *Hort. cliff.* 63. *Mat. med.* 171.
Sebeſtena ſylveſtris & domeſtica. *Bauh. pin.* 446. *Alp. ægypt.* 30.
Sebeſtena domeſtica ſ. Myxa. *Comm. hort.* 1. *p.* 139. *t.* 79.
Vidi-maram. *Rheed. mal.* 4. *p.* 77. *t.* 37.
Habitat in Ægypto, Malabaria. ♄

Sebeſtena. 2. CORDIA foliis oblongo ovatis repandis ſcabris.
Sebeſtena ſcabra, flore miniato criſpo. *Dill. elth.* 341. *t.* 255. *f.* 331.

Ca-

Caryophyllus ſpurius inodorus, folio ſubrotundo ſcabro, flore racemoſo hexapetaloide coccineo. *Sloan. jam.* 136. *hiſt.* 2. *p.* 20. *t.* 164. *Raj. ſuppl.* 86. *Cateſb. car.* 2. *p.* 91. *t.* 91.
Habitat in America *calidiore.* ♄

3. CORDIA foliis ovatis integerrimis. *glabra.*
Cordia nucis iuglandis folio. *Plum. gen.* 13?
Habitat in America *meridionali.* ♄
Folia *exacte ovata, lævia, in neutra pagina ſcabra.* Corollæ tubus *longitudine tantum calycis.*

BRUNSFELSIA.

1. BRUNSFELSIA. *americana.*
Brunsfelſia flore albo, fructu croceo molli. *Plum. gen.* 12.
Habitat in America *meridionali.*
Folia *oblonga, obtuſa, integerrima, petiolata;* Flores *in apice ramorum plures.*

CESTRUM.

1. CESTRUM floribus pedunculatis. *Hort. cliff.* 490. *nocturnum.*
Jaſminoides foliis piſhaminis, flore vireſcente noctu odoratiſſimo. *Dill. elth.* 183. *t.* 153. *f.* 185.
Jaſminum laurinis foliis, flore pallido luteo, fructu atrocæruleo polypyreno venenato. *Sloan, jam.* 169. *hiſt.* 2. *p.* 96. *t.* 204. *f.* 2. *Raj. dendr.* 63.
Syringa laurifolia jamaicenſis, floribus ex flavo palleſcentibus. *Pluk. alm.* 35. *t.* 64. *f.* 3.
Parqui. *Fewill. peruv.* 2. *p.* 32. *t.* 32. *f.* 1.
Habitat in Jamaica, Chilli. ♄

2. CESTRUM floribus ſeſſilibus. *Hort. cliff.* 491. *diurnum.*
Jaſminoides laureolæ folio, flore candido interdiu odorato. *Dill. elth.* 186. *t.* 154. *f.* 186.
Laureola ſempervirens americana, latioribus foliis, floribus albis odoratis. *Pluk. alm.* 209. *t.* 95. *f.* 1. *Raj. dendr.* 53.
Hediunda jaſmini flore. *Fewill. peruv.* 2. *p.* 25. *t.* 20. *f.* 3.
Habitat in Chilli, Havana. ♄

LYCIUM.

1. LYCIUM foliis linearibus. *Hort. cliff.* 57. *Hort. upſ.* 47. *afrum*

Jas-

Jaſminoides africanum, jasmini aculeati foliis & facie. *Niſſ. act.* 1711. *p.* 420. *t.* 12.
Rhamnus alter, foliis ſalſis, flore purpureo. *Bauh. pin.* 477.
β. Jasminoides aculeatum humile, halimi minoris folio, flore minore, per maturitatem flaveſcente. *Mich. gen.* 224. *t.* 105. *f.* 2.
Habitat in Africa & *in Regno* Valentino. ♄

barbarum. 2. LYCIUM foliis lanceolatis craſſiuſculis, calycibus bifidis.
Rhamnus peregrinus, roſmarini folio, candidior. *Pluk alm.* 317. *mant.* 160. *t.* 322. *f.* 2. *mala.*
Jasminoides aculeatum, polygoni folio, floribus parvis albidis. *Schaw. afric.* 349. *f.* 349?
Habitat in Aſia, Africa? ♄
Calycis ore bilobo, aut interdum trilobo, a reliquis ſpeciebus diverſum.

europæum. 3. LYCIUM foliis cuneiformibus. *Vir. cliff.* 14. *Roy lugdb.* 436.
Jasminoides aculeatum, ſalicis folio, flore parvo ex albo purpuraſcente. *Mich. gen.* 224. *t.* 105. *f.* 1
Rhamnus ſpinis oblongis, flore candicante. *Bauh. pin* 477.
Habitat in Narbona, Hiſpania, Luſitania, Italia. ♄

CHRYSOPHYLLUM.

Cainito. 1. CHRYSOPHYLLUM.
Chryſophyllum foliis ovatis ſuperne glabris, parallele ſtriatis, ſubtus tomentoſo-nitidis. *Hort. cliff.* 491.
Anona foliis ſubtus ferrugineis, fructu rotundo majore lævi purpureo, ſemine nigro partim rugoſo partim glabro. *Sloan. jam.* 206. *hiſt.* 2. *p.* 170. *t.* 229. *Raj. dendr.* 78.
Cainito, *Laet. amer.* 390.
Cainito folio ſubtus aureo, fructu maliformi. *Plum. gen.* 10.
β. Cainito folio ſubtus aureo, fructu oliviformi *Plum. gen.* 10.
Habitat in America *calidiore.* ♄
Folia *alterna, petiolata, ovata, integerrima.* Pedunculi *laterales, uniflori, numeroſi, breviſſimi.*

SIDEROXYLON.

inerme. 1. SIDEROXYLON inerme. *Hort. cliff.* 69.

Si-

Sideroxylon primum ſ. dein Coriæ indorum nomine data arbor. *Dill. elth.* 357. *t.* 265. *f.* 344.

Padus foliis oblongis, fructu ſolitario. *Burm. afric.* 238. *t.* 84. *f.* 2.

Habitat in Æthiopia. ♄

2. SIDEROXYLON ſpinoſum. *Hort. cliff.* 69. *ſpinoſum.*

Ebenus jamaicenſis arbuſcula, buxi foliis, ſpinoſa. *Pluk alm.* 132. *t.* 89. *f.* 1.

Carou-mœlli. *Rheed. mal.* 5. *p.* 77. *t.* 39. *Raj. hiſt.* 1634.

Habitat in Malabaria. ♄

RHAMNUS.

* *Spinoſi.*

1. RHAMNUS ſpicis terminalibus, floribus quadrifidis dioicis. *Hort. cliff.* 70. *Fl. ſuec.* 193. *Mat. med.* 72. *Roy. lugdb.* 224. *catharticus.*

Rhamnus catharticus. *Bauh. pin.* 478.

Cervispina. *Cord. hiſt.* 175.

Habitat in Europæ *auſtralioris ſepibus.* ♄

* * *inermes.*

2. RHAMNUS inermis, floribus dioicis, foliis duplicato-crenatis. *alpinus.*

Frangula ora folii ferrata. *Hall. helv.* 164.

Frangula rugoſiore & ampliore folio. *Tournef. inſt.* 612.

Frangula altera polycarpos. *Bauh. prodr.* 160.

Alnus nigra baccifera, rugoſiore folio. ſ. major. *Bauh. hiſt.* 1. *p.* 562.

Alnus nigra polycarpos. *Bauh. pin.* 428.

Habitat in alpibus Helveticis. ♄

3. RHAMNUS inermis, floribus monogynis hermaphroditis, foliis integerrimis. *Hort. cliff.* 70. *Fl. ſuec.* 224. *Mat. med.* 73. *Roy. lugdb.* 224. *Frangula.*

Rhamnus inermis, foliis annuis. *Fl. lapp.* 60.

Alnus nigra baccifera. *Bauh. pin.* 428.

Frangula. *Dod. pempt.* 784.

β. Alnus inermis, foliis ovatis integerrimis glabris. *Roy. lugdb.* 224. lævifolius.

Habitat in Europæ *borealis nemoroſis humidiuſculis.* ♄

4. RHAMNUS inermis, floribus dioicis, ſtigmate triplici. *Vir. cliff.* 19. *Hort. upſ.* 47. *Sauv. monſp.* 95. *Alaternus.*

N Rham-

Rhamnus inermis, floribus polygamis, ſtigmate triplici, foliis ſerratis. *Hort. cliff.* 70. *Roy. lugdb.* 225.
Phylica elatior. *Bauh. pin.* 477.
Phylica humilior. *Bauh. pin.* 477.
Alaternus. 1. 2. *Cluſ. hiſt.* 1. *p.* 50.
Habitat in Europa *auſtrali.* ♄

* * * *Aculeati.*

Paliurus. 5. RHAMNUS aculeis geminatis: inferiore reflexo, floribus trigynis. *Hort. cliff.* 69. *Hort. upſ.* 47. *Roy. lugdb.* 224. *Sauv. monſp.* 306.
Rhamnus folio ſubrotundo, fructu compreſſo. *Bauh. pin.* 477.
Paliurus. *Dod. pempt.* 576.
Habitat in Europa *auſtrali.* ♄

Lotus. 6. RHAMNUS aculeis geminatis: altero recurvo, foliis ovato-oblongis.
Zizyphus ſylveſtris. *Tournef. inſt.* 627. *Shaw. afr.* 631. *f.* 631.
Habitat in Regno Tunetano. ♄
Frutex *ramulis teretibus.* Aculei *duo ad exortum foliorum: altero horizontali, altero recurvo ut in Paliuro, ſed* Folia *omnia zizyphi, figura, nervis, glabritie, magnitudine, at margo obſolete & rarius crenatus.*

Napeca. 7. RHAMNUS aculeis ſubgeminatis recurvis, pedunculis corymboſis, floribus ſemidigynis, foliis ſerratis utrinque lævibus. *Fl. zeyl.* 87. *
Habitat in Zeylona. ♄

Jujuba. 8. RHAMNUS aculeis ſolitariis recurvis, pedunculis aggregatis, floribus ſemidigynis, foliis retuſis ſubtus tomentoſis. *Fl. zeyl.* 89. *
Jujuba indica ſpinoſa, folio & fructu rotundo. *Plnk. alm.* 199. *Raj. dendr.* 44.
Habitat in India, ♄

OEnoplia. 9. RHAMNUS aculeis ſolitariis recurvis, pedunculis aggregatis ſubſeſſilibus, foliis ſemicordatis ſubtus tomentoſis. *Fl. zeyl.* 88.
Jujuba aculeata, nervoſis foliis infra ſericeis flavis. *Burm. zeyl.* 131. *t.* 61.
Habitat in Zeylona ♄

Zizyphus. 10. RHAMNUS aculeis geminatis rectis, floribus digynis, foliis ovato-oblongis. *Hort. cliff.* 69. *Mat. med.* 74. *Roy. lugdb.* 224. *Sauv. monſp.* 59.

Ju-

Jujuba ſylveſtris. *Bauh. pin.* 446.
Zizyphus. *Dod. pempt.* 807.
β. Jujubæ majores oblongæ. *Bauh. pin.* 446.
Habitat in Europa *auſtrali.* ♄

11. RHAMNUS aculeis geminatis rectis, foliis ovatis. *Hort. cliff.* 63. * *Roy. lugdb.* 224. *Spina Chriſti*
Jujube ſ. Zizyphus africana, mucronatis foliis, ſpina gemella. *Pluk. alm.* 199. *t.* 197. *f.* 3.
Habitat in Æthiopia, Palæſtina. ♄
Arbuſcula e ſeminibus miſſis ſub nomine Spinæ Chriſti. *Hieroſolyma a D. Haſſelquiſt.*

PHYLICA.

1. PHYLICA foliis linearibus verticillatis. *ericoides.*
Phylica foliis ovato-linearibus. *Hort. cliff.* 70. *Roy. lugdb.* 199.
Alaternoides africana, ericæ foliis, floribus albicantibus & muſcoſis. *Comm. hort.* 2. *p.* 1. *t.* 1.
Habitat in Æthiopia. ♄

2. PHYLICA foliis lineari-ſubulatis: ſummis hirſutis. *Roy. lugdb.* 199. *plumoſa.*
Ricinus arboreſcens africanus, tomentoſis capitulis. *Seb. theſ.* 1. *p.* 38. *t.* 23. *f.* 4. 5.
Chamælea africana tricoccos & tetracoccos taxifolia, villoſa cæſarie coronata. *Pluk. mant.* 45. *t.* 342. *f.* 3.
Chamælea foliis anguſtis ſubtus incanis, floribus capitatis muſcoſis. *Burm. afr.* 117. *t.* 43. *f.* 2
Habitat in Æthiopia. ♄

3. PHYLICA foliis ovatis ſparſis. *buxifolia.*
Chamælea folio ſubrotundo ſubtus incano, floribus in capitulum collectis. *Burm. afr.* 119. *t.* 44. *f.* 1.
Chamælea africana, foliis ſubrotundis. *Herman. afr.* 6.
Habitat in Æthiopia. ♄

CEANOTHUS.

1 CEANOTHUS foliis trinerviis. *americanus.*
Ceanothus corymbis folio longioribus. *Hort. upſ.* 51.
Ceanothus. *Act. upſ* 1741. p. 77.
Celaſtrus inermis, foliis ovatis ſerratis trinerviis, racemis ex ſummis alis longiſſimis. *Hort. cliff.* 73. *Gron. virg.* 25. *Roy. lugdb.* 435.
Evonymus novi belgii, corni feminæ foliis. *Comm. hort.* 1. *p.* 167. *t.* 86. *Raj. dendr.* 69.

Evonymus, jujubinis foliis, carolinenſis. fructu parvo fere umbellato. *Pluk. alm.* 139. *t.* 28. *f.* 6.
Habitat in Virginia, Carolina. ♃. ♄

aſiaticus. 2. CEANOTHUS foliis ovatis enerviis.
Ceanothus racemis folio brevioribus, *Fl. zeyl.* 98. *
Habitat in Zeylona. ♄

africanus 3. CANOTHUS foliis lanceolatis enerviis, ſtipulis ſubrotundis.
Celaſtrus inermis, foliis lanceolatis obtuſe ſerratis petiolatis appendiculatis. *Hort. cliff.* 73. *Roy. lugdb.* 435.
Alaternoides africana, lauri ſerratæ folio. *Comm. præl.* 61. *t.* 11.
Ricinoides africana arboreſcens, folio phillyreæ longifoliæ ſerratæ. *Seb. theſ.* 1. *p.* 35. *t.* 22. *f.* 6.
Habitat in Æthiopia: ♄

MYRSINE.

africana. 1. MYRSINE. *Hort. cliff.* 72. *
Vitis idæa æthiopica, myrti tarentinæ folio, flore atropurpureo. *Comm. hort.* 1. *p.* 123. *t.* 64.
Buxus africana rotundifolia ſerrata. *Pluk. alm.* 74. *t.* 80. *f.* 5.
Frutex æthiopicus baccifera, foliis myrtilli. *Breyn. cent.* 9. *t.* 5.
Habitat in Æthiopia. ♄

CELASTRUS.

bullatus. 1. CELASTRUS inermis, foliis ovatis integerrimis.
Evonymoides virginiana, foliis non ſerratis, fructu coccineo eleganter bullato. *Iſnard. act.* 1716. *p.* 369.
Evonymus virginianus rotundifolius, capſulis coccineis eleganter bullatis. *Pluk. alm.* 139. *t.* 28. *f.* 5.
Habitat in Virginia. ♄

ſcandens. 2. CELASTRUS inermis, caule volubili.
Evonymoides canadenſis ſcandens, foliis ſerratis. *Iſn. act.* 1716. *p.* 369.
Frutex viminibus lentis infirmis, foliis profunde ſerratis, *Gron. virg.* 55.
Habitat in Canada. ♄

myrtifolius. 3. CELASTRUS inermis, foliis ovatis ſerrulatis floribus racemoſis, caule erecto. *Hort. cliff.* 72.

Myr-

Myrtifolia arbor, foliis latis ſubrotundis, flore albo racemoſo. *Sloan. jam.* 162. *hiſt.* 2. *p.* 79. *t.* 193. *f.* 1. *Raj. dendr.* 36.
Habitat in Virginia, Jamaica. ♄

4. CELASTRUS ſpinis folioſis, ramis angulatis, foliis obtuſis. *Hort. cliff.* 73. *Roy. lugdb.* 434. *buxifolius.*
Lycium portoricenſe, buxi foliis anguſtioribus. *Pluk. alm.* 234. *t.* 202. *f.* 3.
Habitat in Æthiopia. ♄
Rami & *ramuli angulati.* Folia *obovata, obtuſa, acute ſerrata.* Cymæ *pedunculatæ, ex alis.*

5. CELASTRUS ſpinis nudis, ramis teretibus, foliis acutis. *Hort. cliff.* 72. *pyracanthus*
Lycium æthiopicum, pyracanthæ folio. *Comm. hort.* 1. *p.* 163. *t.* 84. *Raj. dendr.* 72.
Evonymo affinis æthiopica, lycii foliis & aculeis, fructu evonymi. *Pluk. alm.* 139. *t.* 280. *f.* 5.
Habitat in Æthiopia. ♄
Rami & *ramuli teretiuſculi.* Folia *ovali-lanceolata, utrinque acuta, in petiolos deſinentia, ſuperne ſerraturis acuminatis ut fere ſpinoſis, perſiſtentia;* Cymæ *pedunculatæ, laterales.*

EVONYMUS.

1. EVONYMUS floribus plerisque quadrifidis. *europæus.*
Evonymus foliis oblongo-ovatis. *Hort. cliff.* 38. *Fl. ſuec.* 133. *Roy. lugdb.* 436. *Hall. helv.* 523.
Evonymus vulgaris, granis rubentibus. *Bauh. pin.* 428. tenuifolius.
Evonymus 2. *Cluſ. hiſt.* 1. *p.* 57.
β. Evonymus latifolius. *Bauh. pin.* 428. latifolius.
Evonymus 1. ſ. latifolia. *Cluſ. hiſt.* 2. *p.* 56.
Habitat in Europæ *ſepibus* (β. *in* Pannonia. ♄
Ex *flore primario convenit cum congeneribus. Phil. Bot.* 178.

2. EVONYMUS floribus omnibus quinquefidis. *americanus.*
Evonymus foliis lato-lanceolatis ſerratis. *Hort. upſ.* 30.
Evonymus foliis lanceolatis. *Gron. virg.* 17.
Evonymus virginianus, pyracanthæ foliis, capſula verrucarum inſtar exaſperata. *Pluk. alm.* 139. *t.* 115. *f.* 5.
Celaſtrus foliis oppoſitis ovatis integerrimis, floribus ſubſolitariis. *Hort. cliff.* 32.
Rhus virginianum, folio myrti. *Comm. hort.* 1. *p.* 157. *t.* 81. *Raj. dendr.* 57.
Habitat in Virginia. ♄

DI-

DIOSMA.

oppoſitifolia. 1. DIOSMA foliis ſubulatis acutis oppoſitis. *Hort. cliff.* 71. *Roy. lugdb.* 434.
Spiræa africana, foliis cruciatim poſitis. *Comm. rar.* 1. *t.* 1.
Hypericum africanum vulgare. *Seb. theſ.* 2. *p.* 41. *t.* 40. *f.* 5.
Habitat ad Caput b. Spei. ♄

hirſuta. 2. DIOSMA foliis linearibus hirſutis. *Hort. cliff.* 71. *Roy. lugdb.* 434.
Spiræa africana odorata, foliis piloſis. *Comm. rar.* 3. *t.* 3.
Habitat ad Caput b. Spei. ♄

rubra. 3. DIOSMA foliis linearibus acutis glabris ſubtus bifariam punctatis.
Dioſma foliis ſetaceis acutis. *Hort. cliff.* 72.
Spiræa africana odorata, floribus ſvavcrubentibus. *Comm. rar.* 2. *t.* 2.
Erica æthiopica, roſmarini ſylveſtris folio eleganter punctato, flore tetrapetalo purpureo. *Pluk. mant.* 68. *t.* 347. *f.* 4.
Habitat in Æthiopia. ♄

ericoides. 4. DIOSMA foliis lineari-lanceolatis ſubtus convexis bifariam imbricatis.
Spiræa africana, ericæ bacciferæ foliis. *Raj. dendr.* 91.
Ericæformis, coridis folio, æthiopica, floribus pentapetalis in apicibus. *Pluk. amalth.* 236. *t.* 279. *f.* 5.
Habitat in Æthiopia. ♄

ciliata. 5. DIOSMA foliis lanceolatis ciliatis.
Spirææ forte genus africanum, ſerpilli hirſutis foliis, fruticoſum, floribus albis umbellatis. *Pluk. amalth.* 197. *t.* 411. *f.* 3.
Habitat in Æthiopia. ♄

lanceolata. 6. DIOSMA foliis lanceolatis glabris.
Spiræa africana, ſaturejæ foliis brevioribus. *Raj. dendr.* 91.
Habitat in Æthiopia. ♄

uniflora. 7. DIOSMA foliis ovato-oblongis, floribus ſolitariis terminalibus.
Ciſtus humilis æthiopicus, inferioribus foliis roſmarini ſylveſtris punctatis, cæteris autem ſerpilli ſubrotundis, flore carneo. *Pluk. mant.* 49. *t.* 342. *f.* 5.

Habi-

Habitat in Æthiopia. ♄

Folia *rigidiora, & longe majora, quam in præcedentibus.* Flos *etjam ſextuplo major: margine ut & ſubtus punctatus.*

BRUNIA.

1. BRUNIA foliis quadrifariam imbricatis. *Hort. cliff.* 70. *nodiflora.*
Cupreſſo-Pinulus capitis b. ſpei. *Breyn. cent.* 22. *t.* 10.
Erica capitata ſ. nodiflora cupreſſiformis africana. *Pluk. mant.* 69. *t.* 346. *f.* 4.
Scabioſæ affinis Arbuſcula africana ericoides ſphærocephalos. *Raj. hiſt.* 1444.
Habitat in Æthiopia. ♄

2. BRUNIA foliis linearibus patulis. *Hort. cliff.* 71. *lanuginoſa.*
Tamariſcus monomapatenſis, ericæ tenuiſſimo folio, pilulifera, ramulis lanugine aranearum inſtar implexis. *Pluk. alm.* 361. *t.* 318. *f.* 4.
Habitat in Æthiopia. ♄

3. BRUNIA foliis ovatis acuminatis ciliatis. *ciliata.*
Habitat in Æthiopia.

4. BRUNIA foliis lineari-lanceolatis confertis. *abrotanoides*
Brunia foliis creberrimis lanceolatis, floribus conglobatis. *Burm. afric.* 266. *t.* 100. *f.* 1.
Leviſanus africanus, ericæ folio, capitulo majore. *Raj. dendr.* 130.
Habitat in Æthiopia. ♄

5. BRUNIA foliis obovatis tomentoſis. *Leviſanus.*
Brunia foliis oblongis incanis, florum capitulo ramulum terminante. *Burm. afric.* 267. *t.* 100. *f.* 2.
Leviſanus capenſis, ſerpylli folio. *Pet. gaz.* 9. *t.* 5. *f.* 7.
Erica capitata ſ. nodiflora, corios foliolis rectis, æthiopica. *Pluk. mant.* 69. *t.* 346. *f.* 7.
Habitat in Æthiopia. ♄

6. BRUNIA floribus ſolitariis. *Hort. cliff.* 71. *uniflora.*
Ericæformis æthiopica, cupreſſi foliis compreſſiuſculis. *Pluk. alm.* 136. *t.* 279. *f.* 2.
Habitat in Æthiopia. ♄

ITEA.

1. ITEA. *Gron. virg.* 143. *virginica.*
Diconangia. *Mitch. gen.* 5.
Habitat in Virginia. ♄

GALAX.

aphylla. 1. GALAX.
Viticella. *Mitch. gen.* 24.
Anonymos ſ. Belvedere. *Gron. virg.* 25.
Habitat in Virginia. ♃

MANGIFERA.

indica. 1. MANGIFERA.
Mangifera arbor. *Bon. jav.* 95. *Fl. zeyl.* 471.
Manga indica, fructu magno reniformi. *Raj. hiſt.* 1550.
Perſicæ ſimilis, putamine villoſo. *Bauh. pin.* 440.
Mao ſ. Mau ſ. Manghos. *Rheed. mal.* 4. *p.* 1. *t.* 1. 2.
Habitat in India. ♄
Racemus compoſitus, brachiatus; an flores omnes hermaphroditi?

CUPANIA.

americana. 1. CUPANIA.
Cupania caſtaneæ folio, fructu ſericeo & ramoſo. *Plum. gen.* 45.
Habitat in America *calidiore.* ♄
Folia *alterna, obovata, oblonga, obtuſa, dentato-ſerrata. nervis tranſverſalibus craſſis.* Flores *racemoſi*

RIBES.

* *Ribeſia inermia.*

rubrum. 1. RIBES inerme, racemis glabris pendulis, floribus planiuſculis.
Ribes inerme, floribus planiuſculis, racemis pendulis. *Hort. cliff.* 82. *Fl. ſuec.* 197. *Hort. upſ.* 59. *Mat. med.* 99. *Vir. cliff.* 21. *Roy. lugdb.* 270. *Dalib. pariſ.* 75.
Ribes vulgare acidum. *Bauh. hiſt.* 2. *p.* 97. *Fl. lapp.* 68.
Groſſularia, multiplici acino, ſ. non ſpinoſa hortenſis rubra. *Bauh. pin.* 455.
β. Groſſularia hortenſis, fructu margaritis ſimili. *Bauh. pin.* 455.
Habitat in Sueciæ *borealibus.* ♄

alpinum. 2. RIBES inerme, racemis erectis: bracteis flore longioribus.
Ribes inerme, floribus planiuſculis, racemis erectis. *Hort. cliff.* 82. *Fl. ſuec.* 198.
Ribes alpinum dulce. *Bauh. hiſt.* 2. *p.* 98. *Fl. lapp.* 97.
Groſſularia vulgaris fructu dulci. *Bauh. pin.* 455.

β. Ri-

β. Ribes montana, oxyacanthæ ſapore. *Bauh. prodr.* 160. *Amœn. acad.* 1. *p.* 170.
Habitat in Sueciæ, Helvetiæ, Angliæ *ſepibus ſiccis.* ♄

3. RIBES inerme, racemis piloſis, floribus oblongis. *nigrum.*
Ribes inerme, floribus oblongis. *Hort. cliff.* 269. *Hort. upſ.* 51. *Fl. ſuec.* 196. *Mat. med.* 100. *Roy. lugdb.* 269. *Dalib. pariſ.* 74.
Ribes vulgaris, fructu nigro. *Rudb. vall.* 32. *Fl. lapp.* 99.
Groſſularia non ſpinoſa, fructu nigro. *Bauh. pin.* 455.
β. Ribeſium nigrum penſylvanicum. floribus oblongis. *Dill. elth.* 324. *t.* 246. *f.* 315.
Habitat in Suecia, Helvetia, Penſylvania. ♄

* *Groſſulariæ aculeata.*

4. RIBES ramis ſubaculeatis reclinatis, pedunculi bractea triphylla. *reclinatum.*
Ribes ramis ſubaculeatis reclinatis. *Hort. cliff.* 82. *Hort. upſ.* 51. *Roy. lugdb.* 270.
Groſſularia ſpinoſa ſativa altera, foliis latioribus. *Bauh. pin.* 455.
Habitat in Germania, Helvetia. ♄

5. RIBES ramis aculeatis, petiolorum ciliis piloſis, baccis hirſutis. *Groſſularia.*
Ribes ramis aculeatis, racemis erectis, baccis hirſutis. *Hort. cliff.* 82.
Ribes ramis aculeatis erectis, fructu hiſpido. *Vir. cliff.* 21. *Roy. lugdb.* 269.
Groſſularia fructu maximo hiſpido margaritarum fere colore. *Raj. hiſt.* 1484.
Habitat in Europa. ♄

6. RIBES ramis undique aculeatis. *Hort. upſ.* 51. *oxyacanthoides.*
Groſſularia oxyacanthæ foliis amplioribus, e ſinu hudſonis. *Pluk. amalth.* 212. *Dill. elth.* 166. *t.* 139. *f.* 116.
Habitat in Canada. ♄

7. RIBES racemis aculeatis, baccis glabris, petioli bractea monophylla. *Uva criſpa.*
Ribes ramis aculeatis erectis, fructu glabro. *Hort. cliff.* 82. *Fl. ſuec.* 195. *Roy. lugdb.* 273. *Hall. helv.* 346. *Dalib. pariſ.* 74.
Groſſularia ſimplici acino vel ſpinoſa ſylveſtris. *Bauh. pin.* 455.
Habitat in Europa *boreali.* ♄

cynosbati. 8. RIBES aculeis ſubaxillaribus, baccis aculeatis racemoſis.
Habitat in Canada. *Kalm.* ♄
Facies *præcedentium.* Folia *parum fiſſa. Aculeus inſtar ſpinæ ſubalis.* Baccæ *magnitudine nucis coryli, undique armatæ aculeis robuſtis.*

GRONOVIA.

ſcandens. 1. GRONOVIA. *Hort. cliff.* 74.
Gronovia ſcandens lappacea, pampinea fronde. *Houſt. Mart. cent.* 1. *p.* 40. *t.* 40. *Amm. herb.* 346.
Habitat in Vera Cruce.

HEDERA.

Helix. 1. HEDERA foliis ovatis lobatiſque. *Fl. lapp.* 91. *Fl. ſuec.* 190. *Hort. cliff.* 74. *Mat. med.* 98. *Roy. lugdb.* 223. *Hall. helv.* 164.
Hedera arborea. *Bauh. pin.* 305.
β. Hedera poetica. *Bauh. pin.* 305.
γ. Hedera major ſterilis. *Bauh. pin.* 305.
Habitat in Europæ *arboribus putreſcentibus, inque ſepibus.* ♄

quinquefolia 2. HEDERA foliis quinatis ovatis ſerratis. *Hort. cliff.* 74. *Roy. lugdb.* 223. *Gron. virg.* 24.
Vitis hederacea indica. *Stapel. theatr.* 364.
Edera quinquefolia canadenſis. *Corn. canad.* 99. *t.* 100.
Helix. *Mitch. gen.* 30.
Habitat in Canada. ♄
Capſula *utrinque turbinata, bilocularis, polyſperma.* Flores *maſculi a femineis diſtincti D. Mitchell.*

VITIS.

vinifera. 1. VITIS foliis lobatis ſinuatis nudis.
Vitis foliis palmato-angulatis. *Hort. cliff.* 74. *Hort. upſ.* 50. *Mat. med.* 97. *Gron. virg.* 144. *Roy. lugdb.* 222.
Vitis vinifera. *Bauh. pin.* 229.
apyrena. β. Vitis corinthiaca ſ. apyrena. *Bauh. hiſt.* 2. *p.* 72.
Habitat in Orbis *quatuor partibus temperatis.* ♄

indica. 2. VITIS foliis cordatis dentatis ſubtus villoſis, cirrhis racemiferis. *Fl. zeyl.* 99. *
Vitis ſylveſtris indica, acinis rotundis. *Raj. dendr.* 67.
Habitat in India. ♄

3. VI-

3. VITIS foliis cordatis ſubtrilobis dentatis ſubtus tomentoſis. *Labruſca.*
Vitis ſylveſtris virginiana. *Bauh. pin.* 299.
Vitis vinifera ſylveſtris americana, foliis averſa parte denſa lanugine tectis. *Pluk. phyt.* 249. *f.* 1.
Vitis fructu minore rubro acerbo, folio ſubrotundo minus laciniato, ſubtus alba lanugine tecto. *Sloan. hiſt.* 2. *p.* 104. *t.* 210. *f.* 4.
Habitat in America *ſeptentrionali.* ♄

4. VITIS foliis cordatis dentato-ſerratis utrinque nudis. *vulpina.*
Vitis vulpina dicta virginiana nigra. *Pluk. alm.* 392.
Vitis aceris folio. *Raj. dendr.* 68.
Habitat in Virginia. ♄

5. VITIS foliis ternatis: foliolis ſubrotundis ſerratis. *trifolia.*
Vitis pearme doorica, foliis ternis ſubrotundis ſerratis. *Raj. dendr.* 68.
Habitat in India. ♄

6. VITIS foliis quinatis: foliolis multifidis. *Hort. cliff.* 74. *Roy. lugdb.* 223. *laciniosa.*
Vitis laciniatis foliis. *Corn. canad.* 182. *t.* 183.
Vitis apii folio. *Bauh. hiſt.* 2. *p.* 73.
Habitat - - - - ♄

7. VITIS foliis ſupradecompoſitis: foliolis lateralibus pinnatis. *arborea.*
Vitis caroliniana, foliis apii, uva corymboſa purpuraſcente. *Act. bonon.* 2. *part.* 2. *p.* 365. *t.* 24.
Frutex ſcandens, petroſelini foliis, virginianus claviculis donatus. *Pluk. mant.* 85. *t.* 412
Habitat in Carolina, Virginica. ♄

LAGOECIA.

1. LAGOECIA. *Hort cliff.* 73. *Hort. upſ.* 52. *Cuminoides.*
Cuminum ſylveſtre, capitulis globoſis. *Bauh. pin.* 186.
Cuminum ſylveſtre. *Cam. epit.* 518.
Habitat in Creta, Lemno, Lyſia, Galatia. ☉

SAUVAGESIA.

1. SAUVAGESIA. *erecta.*
Habitat in Domingo.
Habitus Hyperici aut Corchori. Caulis *erectus.* Folia *alterna, ovato-lanceolata, obtuſe ſerrata.* Stipulæ *acutæ, ciliatæ.*

CLAYTONIA.

virginica. 1. CLAYTONIA foliis linearibus.
Claytonia. *Gron. virg.* 25.
Ornithogalo affinis virginiana, flore purpureo pentapetaloide. *Pluk. alm.* 272. *t.* 102. *f.* 3. *Rudb. elyſ.* 2. *p.* 139. *f.* 6.
Habitat in Virginia. ♃

ſibirica. 2. CLAYTONIA foliis ovatis. *Hort. upſ.* 52. *
Limnia. *Act. ſtockh.* 1746. *p.* 130. *t.* 5. *
Habitat in Sibiria ♃

ACHYRANTHES.

aſpera. 1. ACHYRANTHES caule erecto, calycibus reflexis ſpicæ adpreſſis. *Fl. zeyl.* 105.
Achyranthes caule erecto. *Hort. cliff.* 42. *Roy. lugdb.* 418.

ſicula. α. Amaranthus ſiculus ſpicatus. *Bocc. ſic.* 16. *t.* 9. *Pluk. phyt.* 260. *f.* 2.

indica. β. Amarantus ſpicatus zeylanicus, foliis obtuſis amarantho ſiculo bocconi ſimilis. *Burm. zeyl.* 16. *t.* 5. *f.* 3.
Amaranthus ſpicatus, dictamni cretici folio, maderaſpatenſis. *Pluk. alm.* 26. *t.* 60. *f.* 4.
Habitat in Sicilia, Zeylona, Jamaica. ♄
Planta indica β foliis obtuſioribus differt a ſicula.

lappacea. 2. ACHYRANTHES caule erecto, ſpica interrupta, floribus externe lanatis.
Achyranthes floribus externe lanatis interrupte ſpicatis. *Fl. zeyl.* 103.
Blitum ſcandens, fructu lappaceo. *Burm. zeyl.* 47. *t.* 18. *f.* 1.
Centaurium ciliare minus, circææ foliis firmioribus, ſpicatis floribus. *Pluk. alm.* 93. *t.* 82. *f.* 2.
Wellia-Codiveli. *Rheed. mal.* 10. *p.* *t.* 59.
Habitat in India.

lanata. 3. ACHYRANTHES caule erecto, ſpicis ovatis lateralibus, calycibus lanatis.
Chenopodium incanum racemoſum, folio majore minori oppoſito. *Burm. zeyl.* 60. *t.* 26. *f.* 1.
Amaranthus indicus verticillatus albus, foliis lanugine incanus. *Pluk. alm.* 27. *t.* 75. *f.* 8.
Scherubala. *Rheed. mal.* 10. *p.* 57. *t.* 29.
Habitat in India.

4. A

4. ACHYRANTHES caule repente, capitulis lateralibus ſeſſilibus. *repens.*

Achyrantha repens, foliis bliti pallidi. *Dill. elth.* 8. *t.* 7. *f.* 7.

Habitat in Turcomannia. ⊙

5. ACHYRANTHES foliis oppoſitis linearibus, panicula dichotoma. *Fl. zeyl.* 100. *corymboſa*

Paronychia foliis ad genicula confertis acutis, floribus umbellatis. *Burm. zeyl.* 184. *t.* 65. *f.* 2.

Amaranthus folio tenuiſſimo incano mollugini æmulante. *Bocc. muſ.* 44. *t.* 39.

Elichryſo affinis herba indica polygonoides ramoſior, foliis caulium nodos ambientibus. *Pluk. alm.* 134. *t.* 8. *f.* 6.

Habitat in Zeylona.

CELOSIA.

1. CELOSIA foliis lanceolatis, pedunculis angulatis, ſpica ovato-oblonga. *argentea.*

Celoſia foliis lineari-lanceolatis. *Hort. cliff.* 43. * *Roy. lugdb.* 419.

Amaranthus ſpica albeſcente habitiore. *Mart. cent.* 7. *t.* 7.

Habitat in America. ⊙

2. CELOSIA foliis oblongo-ovatis, pedunculis teretibus ſubſtriatis, ſpica oblonga. *criſtata.*

Celoſia foliis lanceolato-ovatis. *Hort. cliff.* 43. *Hort. upſ.* 52. *Roy. lugdb.* 419.

Amaranthus panicula incurva. *Bauh. pin.* 121.

β. Amaranthus criſtatus. *Cam. epit.* 792.

Habitat in India? ⊙

3. CELOSIA foliis lanceolatis tomentoſis obtuſis, ſpicis confertis, ſtaminibus lanatis. *Fl. zeyl.* 102. * *lanata.*

Habitat in Zeylona.

4. CELOSIA foliis cuneiformibus acutiuſculis, ſpicis globoſis lateralibus. *Fl. zeyl.* 101. * *nodiflora.*

Amaranthoides indicum nodiflorum, capitulis ex albo vireſcentibus. *Burm. zeyl.* 16. *t.* 5. *f.* 2.

Amaranthoides indicum globoſum, ad caulium nodos floridum, foliis ſolitariis ſummo apice barbatis. *Pluk. alm.* 27. *t.* 133. *f.* 2.

Habitat in Zeylona.

paniculata. 5. CELOSIA foliis lanceolato-ovatis, panicula diffuſa filiformi. *Gron. virg.* 144.
Amaranthus panicula flavicante gracili holoſericea. *Sloan. jam.* 49. *hiſt.* 1. *p.* 142. *t.* 90.
Amaranthus nodoſus, palleſcentibus foliis bliti parvis, americanus, multiplici ſpecioſa ſpica laxa, ſ. panicula ſparſa candicante. *Pluk. alm.* 26. *t.* 261. *f.* 1.
Habitat in America *ſeptentrionali*

ILLECEBRUM.

verticillatum. 1. ILLECEBRUM floribus verticillatis nudis, caulibus procumbentibus.
Illecebrum caulibus procumbentibus. *Roy. lugdb.* 214. *Dalib. pariſ.* 76. 126.
Illecebrum. *Hort. cliff.* 492.
Paronychia ſerpillifolia paluſtris. *Vaill. pariſ.* 157. *t.* 15. *f.* 1.
Polygala repens nivea. *Bauh. pin.* 215.
Habitat in Europæ *paſcuis udis.*

ſuffruticoſum. 2. ILLECEBRUM floribus lateralibus ſolitariis, caulibus ſuffruticoſis.
Illecebrum caule erecto. *Roy. lugdb.* 214.
Polygonum herniariæ foliis. *Lob. adv.* 404? *Dalech hiſt.* 1124?
Paronychia hiſpanica fruticoſa, myrti folio. *Tourneſ. inſt.* 508.
Habitat in Hiſpania.

cymoſum. 3. ILLECEBRUM ſpicis cymoſis ſecundis, caule diffuſo.
Polygoni hiſpanici genus Cluſii. *Dalech. hiſt.* 1125?
Habitat Monſpelii. *D. Sauvages.* ⊙
Planta facie Sedi aut Polygoni; caulis *filiformis, brachiatus.* Folia *oppoſita, linearia, craſſiuſcula.* Flores *digeſti in ſpicas ſecundas, Spicæ in cymas tam laterales quam terminales.* Calyces *margine membranaceo ut in Statice, terminati ſetis quinque.*

Paronychia. 4. ILLECEBRUM floribus bracteis nitidis obvallatis, caulibus procumbentibus.
Herniaria ſquamis nitidis flores ſuperantibus. *Hort cliff.* 41. *Hort. upſ.* 54. *Roy. lugdb.* 215. *Sauv. monſp.* 129.
Paronychia hiſpanica. *Cluſ. hiſt.* 2. *p.* 183.
Polygonum minus candicans, *Bauh. pin.* 281.
Habitat in Hiſpania & Narbona. ♃

ILLE-

5. ILLECEBRUM floribus bracteis nitidis occultatis, capitulis terminalibus, caule erecto. *capitatum.*
Herniaria erecta, ſquamis nitidis flores occultantibus. *Sauv. monſp.* 129.
Paronychia narbonenſis erecta. *Tournef. inſt.* 508.
Polygonum minus candicans, capitulis ſurrectis. *Magn. monſp.* 209.
Polygonum montanum niveum minimum. *Lob. ic.* 420.
Habitat in G. Narbonenſis, Hiſpania.

GLAUX.

1. GLAUX. *Hort. cliff.* 43. *Fl. ſuec.* 199. *Roy. lugdb.* 417. *maritima.*
Glaux foliis elliptico-oblongis. *Fl. lapp.* 72.
Glaux maritima. *Bauh. pin.* 215.
Alſine bifolia, fructu coriandri, radice geniculata. *Lœſel pruſſ.* 13. *t.* 3.
Habitat in Europæ *maritimis, ſalſis.* ♃

THESIUM.

1. THESIUM panicula foliata, foliis linearibus. *Linophyllon.*
Theſium. *Hort. cliff.* 41. *Hall. helv.* 183. *Dalib. pariſ.* 75.
Theſium floribus ſparſis. *Sauv. monſp.* 48.
Linaria montana, floſculis albicantibus. *Bauh. pin.* 213.
Seſamoides procumbens montanum, linariæ folio, floribus albicantibus. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 601. *ſ.* 15. *t.* 1. *f.* 3.
Anonymos lini folio. *Cluſ. hiſt.* 1. *p.* 324.
β. Onobrychis IV lutea. *Bauh. pin.* 215. *Dalech. hiſt.* 491.
Habitat in Europæ *ſiccis montoſis.* ☉

2. THESIUM floribus ſeſſilibus lateralibus, foliis linearibus. *alpinum.*
Alchimilla alpina, linariæ foliis, calyce florum albo in foliorum alis. *Till. piſ.* 6.
Alchimilla linariæ folio, floribus & vaſculis in foliorum alis ſeſſilibus. *Shaw. ſpec.* 14.
Habitat in Italiæ *alpibus.*

3. THESIUM floribus capitatis, foliis triquetris. *capitatum.*
Theſium floribus capitatis. *Roy. lugdb.* 214.
Thymelæa foliis linearibus alternis, floribus ex uno petiolo copioſis. *Burm. afric.* 133. *t.* 48. *f.* 3.
Thymelæa africana, lini anguſto folio, floribus albis villoſis. *Raj. dendr.* 55.
Habitat in Æthiopia. ♄

4. THE-

umbellatum. 4. THESIUM floribus umbellatis, foliis oblongis.
Centaurium luteum aſcyroides virginianum. *Pluk. mant.* 43. *t.* 342. *f.* 1.
Habitat in Virginiæ, Penſylvaniæ *paſcuis ſiccis. Kalm.* ♃
Radix *perennis.* Folia *alterna, ovali-lanceolata, integerrima.* Rami *alterni, in ſummitate caulis: Umbellula terminales: involucro tetraphyllo, parvo: Floſculi* 5

RAUVOLFIA.

tetraphylla. 1. RAUVOLFIA. *Hort. cliff.* 75. *t.* 9.
Rauvolfia tetraphylla anguſtifolia. *Plum. gen.* 19.
β. Rauvolfia tetraphylla latifolia. *Plum. gen.* 19.
Habitat in America *calidiore.* ♄

CERBERA.

Ahouaj. 1. CERBERA foliis ovatis.
Thevetia. *Hort. cliff.* 75. *Roy. lugdb.* 413.
Ahouaj. *Thev. antarct.* 66. *Tourneſ. inſt.* 658. *Raj. hiſt.* 1676.
Ahouaj major. *Piſ. braſ.* 49.
Arbor americana, foliis pomi, fructu triangulo. *Bauh pin.* 434.
Habitat in Braſilia. ♄

Manghas. 2. CERBERA foliis lanceolatis: nervis transverſalibus *Fl. zeyl.* 106. *
Manghas lacteſcens, foliis nerii craſſis venoſis, jaſmini flore, fructu perſici ſimili venenato. *Burm. zeyl* 150. *t.* 70. *f.* 1.
Manghas fructu venenato. *Bauh. pin.* 440. *Raj. hiſt.* 1552
Odollam. *Rheed. mal.* 1. *p.* 71. *t.* 39.
Habitat in Indiis *ad aquas.* ♄
Arbor *lacteſcens.* Folia *alterna, ſparſa ad apices ramorum, lato-lanceolata, petiolata, glabra, integerrima, pedalia.* Racemi *terminales, ramoſi, inæquales.* Perianthium *pentaphyllum foliolis lanceolatis, patentibus, coloratis, deciduis.* Corolla *alba, infundibuliformis: Tubo calyce longiore, interne angulato. Limbo quinquepartito, lobis ovatis, tubo brevioribus.* Stam. *Filamenta* 5, *breviſſima, tubi ſuperiori parti inſerta. Antheræ ovatæ, tetragonæ, tectæ lanugine tubi.* Piſt. *Germen bifidum. Stylus filiformis, tubo fere brevior. Germen ovatum, fiſſum.* Pericarpium *Drupa ovata, magnitudine ovi anſeris, viride punctis albis minutiſſimis, uno latere compreſſum ſuturaque obſoleta;* Semina

mina 2, *veluti duas caſtaneas magnas includens, venenatus, vomitorius. Osbeck.*

3. CERBERA foliis linearibus longiſſimis confertis. *Thevetia.*
Ahouaj nerii folio, flore luteo. *Plum. ſpec.* 20.
Nerio affinis anguſtifolia lacteſcens, flore luteo. *Pluk. alm.* 253. *t.* 207. *f.* 2.
Habitat in America *calidiore.* ♄

VINCA.

1. VINCA caulibus procumbentibus, foliis lanceolato-ovatis. *minor.*
Vinca foliis ovatis. *Hort. cliff.* 77. *Hort. upſ.* 53. *Mat. med.* 101. *Roy. lugdb.* 412. *Dalib. pariſ.* 75.
Clematis Daphnoides minor. *Bauh. pin.* 301.
Clematis Daphnoides. *Dod. pempt.* 405.
Habitat in Germania, Anglia, Gallia. ♄

2. VINCA caulibus erectis, foliis ovatis. *major.*
Clematis Daphnoides major. *Bauh. pin.* 302. *Dod. pempt.* 406.
Habitat in Gallia Narbonenſi, Hiſpania. ♄
Hæc ſpecies vix ſufficienter a priori diſtincta, licet major erectior, quod a loco vel parentibus ortum ſuſpicamur; qui itaque conjungere velit vix errat

NERIUM.

1. NERIUM foliis lineari-lanceolatis ternis. *Hort. cliff.* 76. *Hort. upſ.* 53. *Fl. zeyl.* 108. *Roy. lugdb.* 412. *Oleander.*
Nerium floribus rubeſcentibus. *Bauh. pin.* 464.
Rhododendrum. *Dod. pempt.* 851.
Habitat in Creta, Palæſtina, Syria, India. ♄

2. NERIUM foliis lanceolato-ovatis, ramis divaricatis. [illegible] 109. * *divaricatum*
Apo[illegible]lanicum indicum fruteſcens, nerii flore ca[illegible] *Herm. par.* 40.
Habitat [illegible] ♂

3. Nerium foliis ovatis acuminatis petiolatis. *Fl. zeyl.* 107. *Mat. med.* 102. *antidyſentericum.*
Codaga pala. *Rheed. mal.* 1. *p.* 85. *t.* 47.
Habitat in India. ♄

PLUMERIA.

PLUMERIA foliis ovato-oblongis. *Hort. cliff.* 76. *Roy. lugdb.* 412. *rubra.*

Plumeria flore roſeo odoratiſſimo. *Tourneſ. inſt.* 659. *Cateſb. car.* 2. *p.* 92. *t.* 92.
Nerium arboreum, folio maximo obtuſiore, flore incarnato. *Sloan. jam.* 154, *hiſt.* 2. *p.* 61. *t.* 185. *f.* 1. & *t.* 186. *f.* 1.
Jaſminum indicum. *Mer. ſurin.* 8. *t.* 8.
Clematis arborea americana, laurinis ampliſſimis foliis, flore laccæ colore odoratiſſimo. *Pluk. mant.* 50. *alm.* 109. *t.* 207. *f.* 2.
Habitat in Jamaica, Surinamo. ♄

alba. 2. PLUMERIA foliis lanceolatis revolutis, pedunculis ſuperne tuberoſis.
Plumeria flore niveo, foliis longis anguſtis & acuminatis. *Tournef. inſt.* 659.
Apocynum americanum fruteſcens, longiſſimo folio, flore albo odoratiſſimo. *Comm. hort.* 2. *p.* 47. *t.* 24.
Nerium arboreum altiſſimum, folio anguſto, flore albo *Sloan. jam.* 154. *hiſt.* 2. *p.* 62. *Raj. dendr.* 114. *Herm. parad.* 49.
Habitat in Jamaica.

obtuſa. 3. PLUMERIA foliis lanceolatis petiolatis obtuſis.
Plumeria flore niveo, foliis brevioribus obtuſis. *T. Cateſb. car.* 2. *p.* 93. *t.* 93.
Habitat in America *calidiore.* ♄

CAMERARIA.

latifolia. 1. CAMERARIA foliis ſubrotundis utrinque acutis. *Hort. cliff.* 76. *Roy. lugdb.* 412.
Cameraria lato myrti folio. *Plum. gen.* 18.
Habitat in America *calidiore.*

anguſtifolia. 2. CAMERARIA foliis linearibus. †
Cameraria anguſto linariæ folio. *Plum. gen.* 18.
Habitat in America *calidiore.*

TABERNÆMONTANA.

citrifolia. 1. TABERNÆMONTANA foliis oppoſitis lanceolatis.
Tabernæmontana foliis lanceolatis. *Hort. cliff.* 76. *Roy. lugdb.* 413.
Tabernæmontana citri foliis undulatis. *Plum. gen.* 18.
Pala. *Rheed. mal.* 1. *p.* 81. *t.* 46.
Habitat in utraque India. ♄

laurifolia. 2. TABERNÆMONTANA foliis oppoſitis ovatis. †
Tabernæmontana laurifolia, flore albo, fructu rotundiore. *Amm. herb.* 212.

Ne-

Nerium arboreum, folio latiore obtuſo, flore luteo minore. *Sloan. jam.* 154. *hiſt.* 2. *p.* 62. *t.* 186. *f.* 2.
Habitat in Jamaica *ad ripas fluviorum.* ♄.

3. TABERNÆMONTANA foliis alternis. *alternifolia*
Curutu-pala. *Rheed. mal.* 4. *p. t.* 43.
Habitat in Malabaria. ♄

CEROPEGIA.

1. CEROPEGIA umbellis pendulis, floribus erectis. *Candelabrum.*
Niota-niodem-valli. *Rheed. mal.* 9. *p.* 27. *t.* 16.
Habitat in Malabaria. ♃

2. CEROPEGIA pedunculis biſloris. *Fl. zeyl.* 46. * *biflora.*
Habitat in Zeylona. ♃

DIGYNIA.

PERIPLOCA.

1. PERIPLOCA floribus interne hirſutis. *græca.*
Periploca foliis lanceolato-ovatis. *Hort. cliff.* 78. *Roy. lugdb.* 410.
Periploca folio oblongo. *Bauh. pin.* 303.
Apocynum 2 anguſtifolium. *Cluſ. hiſt.* 1. *p.* 125.
Habitat in Syria. ♃

2. PERIPLOCA ſpicis imbricatis. *indica.*
Periploca foliis ovatis acutis glabris, ſpicis imbricatis. *Fl. zeyl.* 113. *
Apocynum caule volubili perenni, foliis ovato-lanceolatis. *Roy. lugdb.* 412.
Periploca foliis anguſtis acutis glabris. *Burm. zeyl.* 187. *t.* 83. *f.* 1.
Apocyni genus ſcandens ex India orientali. *Pluk. mant.* 17. *t.* 359. *f.* 2.
Habitat in Zeylona. ♄

3. PERIPLOCA caule hirſuto. *africana.*
Cynanchum caule volubili ramoſo, foliis ſubovatis cum acumine. *Hort. cliff.* 79.
Apocynum ſcandens africanum, vincæ pervincæ foliis, ſubincanum. *Comm. rar.* 18. *t.* 18.
Apocynum ſcandens africanum, convolvuli minoris folio. & caule hirſuto. *Pluk. alm.* 37. *t.* 137. *f.* 4.
Apocynum indicum minus, nummulariæ foliis. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 611. *ſ.* 15. *t.* 3. *f.* 62.

 β. Cy-

β. Cynanchum foliis planis ſinuatis, flore pallide viridi, fructu craſſo glabro viridi. *Burm. afric.* 34. *t.* 14. *f.* 2.
Habitat in Africa. ♃

tenuifolia. 4. PERIPLOCA foliis lineari-lanceolatis.
Cynanchum radice grandulosa, foliis anguſtis ſinuatis, floribus urceolatis miniatis. *Burm. afric.* 36. *t.* 15
β. Cynanchum linearibus foliis acutis, floribus urceolatis rubris. *Burm. afric.* 37. *t.* 16. *f.* 1.
Habitat in Cap. b. Spei *dunis.*

CYNANCHUM.

acutum. 1. CYNANCHUM caule volubili herbaceo, foliis cordato-oblongis glabris. *Hort. cliff.* 79. *Hort. upſ.* 54. *Roy. lugdb.* 409.
Scammoniæ monſpeliacæ affinis, foliis acutioribus. *Bauh. pin.* 294.
Apocynum 3 latifolium. *Cluſ. hiſt.* 1. *p.* 125.
Habitat in Sicilia, Hiſpania, Aſtracan. ♃

ſuberoſum. 2. CYNANCHUM caule volubili inferne ſuberoſo fiſſo, foliis cordatis acuminatis. *Hort. cliff.* 79. *Roy. lugdb.* 409. *Gron. virg.* 27.
Periploca caroliniensis, flore minore ſtellato. *Dill. elth.* 300. *t.* 229. *f.* 296.
Habitat in America *calidiore.*

hirtum. 3. CYNANCHUM caule volubili fruticoſo inferne ſuberoſo fiſſo, foliis ovato-cordatis. *Hort. cliff.* 79. * *Roy. lugdb.* 410.
Periploca ſcandens, folio citrei, fructu maximo. *Plum. ſpec.* 2.
Apocynum ſcandens virginianum rugoſum, pullis amplis floribus, capſulis alatis. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 611. *ſ.* 15. *t.* 3. *f.* 61.
Apocynum ſcandens fruticoſum, fungoſo cortice, ſurinamenſe. *Herm. par.* 53.
Habitat in America, ♄

monſpeliacum. 4. CYNANCHUM caule volubili herbaceo, foliis reniformi-cordatis acutis. *Hort. cliff.* 79. *Roy. lugdb.* 409. *Sauv. monſp.* 133.
Scammonea monſpeliaca, foliis rotundioribus. *Bauh. pin.* 294.
Apocynum IV latifolium: Scammonea valentina. *Cluſ. hiſt.* 1. *p.* 126.
Habitat in Hiſpania & Narbonæ *maritimis.* ♃

5. CY-

5. CYNANCHUM caule erecto divaricato, foliis cor- *erectum.*
datis glabris. *Hort. cliff.* 79. *Roy. lugdb.* 409. *Sauv. monſp.* 133.
Apocynum folio ſubrotundo. *Bauh. pin.* 302.
Apocynum 1. latifolium. *Cluſ. hiſt.* 1. *p.*124.
Habitat in Syria. ♃

APOCYNUM.

1. APOCYNUM caule rectiuſculo herbaceo, foliis o- *androſæmi-*
vatis utrinque glabris, cymis terminalibus. *folium.*
Apocynum caule erecto annuo, foliis ovatis. *Roy. lugdb.* 411.
Apocynum foliis ovatis. *Hort. cliff.* 80.
Apocynum canadenſe, foliis androſæmi majoris. *Bocc. ſic.* 35. *t.* 16. *f.* 3. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 609. *ſ.* 15. *t.* 3. *f.* 16.
Habitat in Virginia, Canada. ♃

2. APOCYNUM caule rectiuſculo herbaceo, foliis ob- *cannabinum.*
longis, cymis lateralibus.
Apocynum foliis ovatis acutis ſubtus tomentoſis. *Gron. virg.* 28.
Apocynum canadenſe ramoſum, flore e viridi albicante, ſiliqua tenuiſſima. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 609. *ſ.* 15. *t.* 3. *f.* 14.
Apocynum virginianum, flore herbaceo, ſiliqua longiſſima. *Moriſ. præl.* 232.
Apocynum canadenſe maximum, flore minimo herbaceo. *Pluk. alm.* 35. *t.* 13. *f.* 1.
Apocynum erectum virginianum ramoſum, caule ſubrubente, eſulæ raræ foliis, ſiliquis tenuiſſimis. *Pluk. alm.* 35. *t.* 260. *f.* 2.
Habitat in Canada, Virginia. ♃
Corollæ virides, nec pictæ ſunt.

3. APOCYNUM caule rectiuſculo herbaceo, foliis ova- *venetum.*
to-lanceolatis. *Roy. lugdb.* 411. *Sauv. monſp.* 133.
Apocynum foliis ovato-lanceolatis. *Hort. cliff.* 80.
Tithymalus maritimus, purpuraſcentibus floribus. *Bauh. pin.* 291.
Eſula rara e lio venetorum inſula. *Lob. hiſt.* 201.
Habitat in Adriatici *maris inſulis.* ♃

4. APOCYNUM caule erecto fruteſcente, foliis lanceo- *fruteſcens.*
lato-ovalibus, corollis acutis: fauce villoſis. *Fl. zeyl.* 114.

Apocynum caule erecto arboreo, foliis ovatis acutis. *Roy. lugdb.* 412.
Apocynum floribus faſciculatis. *Fl. zeyl.* 23. *t.* 12. *f.* 1.
Habitat in Zeylona. ♄

reticulatum. 5. APOCYNUM caule volubili perenni, foliis ovatis venoſis. *Roy. lugdb.* 412.
Habitat in India.

ASCLEPIAS.

* *foliis oppoſitis planis.*

undulata. 1. ASCLEPIAS foliis ſeſſilibus oblongis lanceolatis undulatis, petalis ciliatis.
Apocynum africanum, lapathi folio. *Comm. rar.* 16. *t.* 16.
Habitat in Africa. ♃

gigantea. 2. ASCLEPIAS foliis amplexicaulibus oblongo-ovalibus. *Fl. zeyl.* 112.
Apocynum erectum majus latifolium indicum. *Pluk. alm.* 35. *t.* 175. *f.* 3.
Beid el oſſar. *Alp. ægypt.* 85. *t.* 86.
Ericu. *Rheed. mal.* 2. *p.* 53. *t.* 31. *Seb. theſ.* 1. *p.* 41. *t.* 26. *f.* 1.
Habitat in India, Ægypto. ♃
Nectaria promunt non cornicula ſubulata, ſed laminas ſolidas conniventes.

ſyriaca. 3. ASCLEPIAS foliis ovalibus ſubtus tomentoſis, caule ſimpliciſſimo, umbellis nutantibus.
Aſclepias caule erecto ſimplici herbaceo, foliis ovalibus ſubtus tomentoſis, umbellis nutantibus. *Vir. cliff.* 20. *Hort. upſ.* 53. *Gron. virg.* 27. *Roy. lugdb.* 410.
Aſclepias caule erecto ſimplici annuo, foliis ovato-oblongis ſubtus incanis, umbella nutante. *Hort. cliff.* 78.
Apocynum majus ſyriacum rectum. *Corn. canad.* 90.
Apocynum ſyriacum. *Cluſ. hiſt.* 2. *p.* 87.
Habitat in Virginia. ♃

amœna. 4. ASCLEPIAS foliis ovatis ſubtus piloſiuſculis, caule ſimplici, umbellis nectariisque erectis.
Apocynum floribus amœne purpureis, corniculis ſurrectis. *Dill. elth.* 31. *t.* 27. *f.* 30.
Habitat in America *ſeptentrionali.* ♃

purpuraſcens. 5. ASCLEPIAS foliis ovatis ſubtus villoſis, caule ſimplici, umbellis erectis, nectariis reſupinatis.

A-

Aſclepias floribus obſolete purpureis, corniculis reſupinatis. *Dill. elth.* 32. *t.* 28. *f.* 31.

Apocynum erectum noveboracenſe, foliis minus incanis, flore ex obſoleto dilute purpuraſcente. *Herm. par.* 33.

Habitat in Carolina. ♃

6. ASCLEPIAS foliis ovatis rugoſis nudis, caule ſimplici, umbellis ſubſeſſilibus: pedicellis tomentoſis. *variegata.*

Apocynum americanum erectum, tuberoſa radice, non incanum, foliis rigidioribus latis ſubrotundis, floribus albis intus purpureis, ſummo caule corymbum magnum efformantibus. *Pluk. alm.* 34. *t.* 77. *f.* 1.

Apocynum vetus americanum, wiſank. *Dill. elth.* 32.

Habitat in America *boreali.* ♃

7. ASCLEPIAS foliis lanceolatis glabris, caule ſimplici, umbellis erectis lateralibus ſolitariis. *nivea.*

Aſclepias caule erecto ſimplici annuo, foliis lanceolato-ovatis glabris, pedunculis alternis, umbellis erectis. *Gron. virg.* 27.

Apocynum perſicariæ mitis folio, corniculis lacteis. *Dill. elth.* 33. *t.* 29. *f.* 32.

Apocynum americanum, foliis amygdali longioribus. *Plum. ſpec.* 2

Habitat in Virginia & America *calidiore.* ♂

8. ASCLEPIAS foliis lanceolatis, caule ſuperne diviſo, umbellis terminalibus congeſtis. *incarnata.*

Aſclepias caule erecto ramoſo annuo, foliis lanceolatis, umbellis terminalibus erectis pluribus. *Vir. cliff.* 20. *Hort. cliff.* 78. *Roy. lugdb.* 411. *Gron. virg.* 27.

Apocynum minus rectum canadenſe. *Corn. canad.* 9 *t.* 93. *Barr. rar.* 8. *t.* 72. *Raj. hiſt.* 1089.

Habitat in Canada, Virginia. ♃

Caulis ubi dividitur folia e regione tria producit.

9. ASCLEPIAS foliis lanceolatis petiolatis glabris, caule ſimplici, umbellis erectis ſolitariis. *curaſſavica.*

Apocynum caule erecto ſimplici annuo, foliis lanceolatis, umbellis alternis erectis. *Hort. cliff.* 78. *Roy lugdb.* 411.

Apocynum radice fibroſa, petalis coccineis, corniculis croceis. *Dill. elth.* 34. *t.* 30. *f.* 33.

Apocynum curaſſavicum ſ. americanum, fibroſa radice, floribus aurantiis, chamænerii foliis latioribus. *Herm. par.* 36. *t.* 36.

Habitat in Curaſſao. ♃. ♄

10. A-

decumbens. 10. ASCLEPIAS foliis villoſis, caule decumbente.
Aſclepias caule decumbente hirſuto, foliis ovatis obtuſis villoſis ſubſeſſilibus. *Gron. virg.* 27.
Apocynum carolinianum aurantiacum piloſum. *Pet. ſicc.* 90.
Habitat in Virginia. ♃

lactifera. 11. ASCLEPIAS foliis ovatis, caule erecto, umbellis proliferis breviſſimis.
Aſclepias caule erecto ſimplici herbaceo, foliis ovatis acuminatis, corymbis compoſitis longitudine petiolorum. *Fl. zeyl.* 111. *
Habitat in Zeylona. ♃

Vincetoxicum. 12. ASCLEPIAS foliis ovatis baſi barbatis, caule erecto, umbellis proliferis.
Aſclepias caule erecto ſimpliciſſimo herbaceo, foliis cordato-lanceolatis, racemis conglomeratis alternis. *Fl. ſuec.* 200. *Mat. med.* 103. *Dalib. pariſ.* 76.
Aſclepias caule erecto annuo, foliis ovato-lanceolatis, floribus confertis. *Hort. cliff.* 78.
Aſclepias albo flore. *Bauh. pin.* 303.
Vincetoxicum. *Dod. pempt.* 407.
Habitat in Europæ *glareoſis.* ♃

nigra. 13. ASCLEPIAS foliis ovatis baſi barbatis, caule ſuperne ſubvolubili.
Aſclepias caule ſubvolubili herbaceo, foliis ovato-lanceolatis, floribus confertis patentiſſimis. *Roy. lugdb.* 410. *Hort. upſ.* 53. *Sauv. monſp.* 133.
Aſclepias nigro flore. *Bauh. pin.* 303.
Vincetoxicum flore nigro. *Cam. epit.* 560.
Habitat Monſpelii *in collibus.* ♃

** * foliis latere revolutis.*

fruticoſa. 14. ASCLEPIAS foliis revolutis lanceolatis, caule fruticoſo.
Aſclepias caule erecto fruticoſo, foliis lanceolatis, umbellis nutantibus, conceptaculis inflatis piloſis. *Hort. cliff.* 78. *Hort. upſ.* 54. *Vir. cliff.* 20. *Roy. lugdb.* 410.
Apocynum erectum africanum, villoſo fructu, ſalicis folio. *Herm. parad.* 23. *t.* 24.
Apocynum erectum elatius, ſalicis anguſto folio, folliculis piloſis. *Pluk. alm.* 36. *t.* 138. *f.* 2.
Habitat in Æthiopia. ♂

15. A-

15. ASCLEPIAS foliis revolutis lineari-lanceolatis oppoſitis ternatisque, caule decumbente. *ſibirica.*
Aſclepias montana humilis, radice longius proſerpente, lini foliis. *Amm. ruth.* 10.
Habitat in Sibiria. ♃

16. ASCLEPIAS foliis revolutis linearibus verticillatis, caule erecto. *verticillata.*
Aſclepias foliis verticillatis lineari-ſetaceis. *Gron. virg.* 26.
Apocynum marianum erectum, linariæ anguſtiſſimis foliis, umbellatum. *Pluk. mant.* 17.
Apocynum marianum, foliis anguſtiſſimis ſtellatis. *Pet. muſ.* 609.
Habitat in Virginia.

* * * *foliis alternis.*

17. ASCLEPIAS foliis alternis ovatis, umbellis ex eodem pedunculo communi pluribus. *rubra.*
Apocynum caule erecto ſimplici annuo, foliis ovatis acuminatis alternis, pluribus in pedunculo umbellis. *Gron. virg.* 27.
Habitat in Virginia.

18. ASCLEPIAS foliis alternis lanceolatis, caule divaricato piloſo. *tuberoſa.*
Aſclepias caule erecto divaricato villoſo, foliis lanceolatis, umbellis ſimplicibus ſubterminalibus, *Hort. cliff.* 78. *Roy. lugdb.* 411.
Apocynum novæ angliæ hirſutum, tuberoſa radice, floribus aurantiis. *Herm. lugdb.* 646. *t.* 647. *Dill. elth.* 35. *t.* 30. *f.* 34.
Habitat in America *boreali.* ♃

STAPELIA.

1. STAPELIA denticulis ramorum patentibus. *Vir. cliff.* 20. *Roy. lugdb.* 409. *variegata.*
Stapelia denticulis ramorum extrorſum prominulis. *Hort. cliff.* 77. *Hort. upſ.* 53.
Apocynum humile aizoides, ſiliquis erectis, africanum, *Herm. lugdb.* 52. *t.* 53. *Stiſſ. bot.* 32.
Habitat ad Cap. b. Spei. ♄

2. STAPELIA denticulis ramorum erectis. *Hort. cliff.* 77. *Roy. lugdb.* 409. *hirſuta.*

Aſclepias africana aizoides, flore pulchre fimbriato. *Comm. rar.* 19. *t.* 19.
Habitat ad Cap. b. Spei. ♄

HERNIARIA.

glabra. 1. HERNIARIA glabra. *Bauh. hiſt.* 3. *p.* 378.
Herniaria calycibus bractea nudis. *Hort. cliff.* 41. *Fl. ſuec.* 207. *Mat. med.* 104. *Roy. lugdb.* 215. *Hall. helv.* 182. *Dalib. pariſ.* 76.
Polygonum minus ſ. Millagrana major. *Bauh. pin.* 281.
Habitat in Europæ *apricis, glareoſis, ſiccis.* ☉

hirſuta. 2. HERNIARIA hirſuta. *Bauh. hiſt.* 3. *p.* 379.
Habitat in Angliæ, Hiſpaniæ, Italiæ *agris.*

lenticulata. 3. HERNIARIA? quæ Polygonum lenticulatum.
Polygonum minus tenuifolium. *Bauh. pin.* 281.
Polygonum minus lentifolium. *Bauh. prodr.* 131.
Habitat in Hiſpaniæ *montibus Eſcurial, Monspelii.*
Flores non vidi; ut excitem Botanicos ad hujus generis forte diſtinctiſſimi examen, hic plantam adjeci; Habitus proximus herniariæ, ſed molliſſimus.

CHENOPODIUM.

* *foliis anguloſis.*

Bonus Henricus 1. CHENOPODIUM foliis triangulari-ſagittatis integerrimis. *Hort. cliff.* 84. *Fl. ſuec.* 208. *Mat. med.* 106. *Roy. lugdb.* 278. *Hall. helv.* 174. *Dalib. pariſ.* 79.
Lapathum unctuoſum. *Bauh pin.* 115
Bonus Henricus. *Bauh. hiſt.* 2. *p.* 965.
Habitat in Europæ *ruderatis.* ♃

urbicum 2. CHENOPODIUM foliis triangularibus ſubdentatis, racemis confertis ſtrictiſſimis cauli approximatis longiſſimis. *Fl. ſuec.* 209.
Chenopodium latifolium minus ramoſum, petiolis longiſſimis ex foliorum alis confertim naſcentibus. *Buxb. hall.* 69. *t.* 1.
Habitat in Europæ *borealis plateis.* ☉

rubrum. 3. CHENOPODIUM foliis cordato-triangularibus obtuſiuſculis dentatis, racemis erectis compoſitis ſubnudis caule brevioribus. *Fl. ſuec.* 210. *Mat. med.* 107. *Dalib. pariſ.* 78.
Chenopodium erectum, foliis ſubtriangularibus antice ſinuato-dentatis, racemis erectis folioſis lateralibus. *Hort. cliff.* 85. *Roy. lugdb.* 219.

A-

Atriplex ſylveſtris latifolia. *Bauh. pin.* 119
Pes anſerinus. *Dalech. hiſt.* 542. *t.* 542
Habitat in Europæ *cultis, ruderatis.* ☉

4. CHENOPODIUM foliis ovatis acutis dentatis, racemis ramoſis nudis. *Fl. ſuec.* 211. *Dalib. pariſ.* 211. *murale.*
Chenopodium erectum ramoſiſſimum, foliis triangularibus dentatis, racemis ramoſis caulem ſuperantibus. *Hort cliff.* 85. *Lech. ſcan.* 16.
Habitat in Europæ *muris aggeribusque.* ☉

5. CHENOPODIUM foliis rhomboideo-triangularibus eroſis poſtice integris: ſummis oblongis, racemis erectis. *Fl. ſuec.* 212. *Dalib. pariſ.* 80. *album.*
Chenopodium foliis inferioribus ovatis acutis antrorſum dentatis: ſummis lanceolatis. *Vir. cliff.* 22. *Hort cliff.* 85. *Gron. virg.* 145 *Roy. lugdb.* 219. *Hall helv.* 175
Habitat in agris Europæ. ☉

6. CHENOPODIUM foliis rhomboideis dentato-ſinuatis, racemis ramoſis ſubnudis. *Fl. ſuec.* 213. *Dalib. pariſ.* 78. *viride.*
Chenopodium ſylveſtre, opuli folio. *Vaill. pariſ.* 36. *t.* 7. *f.* 1.
Chenopodium folio oblongo integro. *Dill. app.* 62
Habitat in Europæ *cultis oleraceis.*

7. CHENOPODIUM foliis cordatis angulato-acuminatis, racemis ramoſis nudis. *Fl. ſuec.* 214. *Dalib. pariſ.* 79. *hybridum.*
Chenopodium foliis triangulari-ſagittatis: infra medium ſinuato-dentatis, racemis longiſſimis. *Hort. cliff.* 84. *Roy. lugdb.* 219.
Chenopodium ſtramonii folio. *Vaill. pariſ.* 36. *t.* 7. *f.* 2
Atriplex ſylveſtris latifolia, acutiore folio. *Bauh. pin* 119.
Habitat in Europæ *cultis.* ☉

CHENOPODIUM foliis oblongis ſinuatis, racemis nudis multifidis. *Hort. cliff* 84. *Hort upſ* 55. *Mat med.* 109. *Roy. lugdb.* 219. *Sauv. monſp.* 273. *Botrys.*
Botrys ambroſioides vulgaris. *Bauh. pin.* 138
Botrys. *Dod. pempt.* 34.
Habitat in Europæ *auſtralis arenoſis.* ☉

9 CHENOPODIUM foliis lanceolatis dentatis, racemis *ambroſioides.*

mis foliatis ſimplicibus. *Hort. cliff.* 84. *Hort. upſ.* 56. *Roy. lugdb.* 219.
Botrys ambroſioides mexicana. *Bauh. pin.* 138. 516.
Botrys odorata ſuaveolens americana mexicanave. *Moriſ. hiſt.* 2. *p.* 605. *ſ.* 5. *t.* 35. *f.* 8.
Habitat in Mexico, Luſitania. ☉

multifidum. 10. CHENOPODIUM foliis multifidis: ſegmentis linearibus, floribus axillaribus ſeſſilibus.
Chenopodium ſempervirens, foliis tenuiter laciniatis. *Dill. elth.* 78. *t.* 66. *f.* 77.
Habitat in Bonaria. ♄

anthelminticum. 11. CHENOPODIUM foliis ovato-oblongis dentatis, racemis aphyllis.
Chenopodium, lycopi folio, perenne. *Dill. elth.* 77. *t.* 66. *f.* 76.
Habitat in Penſylvania, Bonaria. ♃

glaucum. 12. CHENOPODIUM foliis ovato-oblongis repandis, racemis nudis ſimplicibus glomeratis *Fl. ſuec.* 215. *Dalib. pariſ.* 77.
Chenopodium foliis ovato oblongis repande ſinuatis, florum racemis glomeratis ex ala ſolitariis. *Vir. cliff.* 22. *Hort. cliff.* 85. *Roy. lugdb.* 219.
Chenopodium anguſtifolium laciniatum minus. *Tournef. inſt.* 506.
Habitat ad Europæ *fimeta.* ☉

* * *foliis integris.*

Vulvaria. 13. CHENOPODIUM foliis integerrimis rhombeo-ovatis, floribus conglomeratis. *Fl. ſuec.* 216. *Mat. med.* 108. *Dalib. pariſ.* 77.
Chenopodium foliis triangulari-ovatis. *Hort. cliff.* 84. *Roy. lugdb.* 218.
Atriplex fœtida. *Bauh. pin.* 119.
Vulvaria. *Dalech. hiſt.* 543.
Habitat in Europæ *cultis oleraceis,* ☉

polyſpermum 14. CHENOPODIUM foliis integerrimis ovatis, caule decumbente, cymis dichotomis.
Chenopodium foliis ovatis integerrimis, caule decumbente. *Vir. cliff.* 21. *Fl. ſuec.* 217. *Roy. lugdb.* 218. *Dalib. pariſ.* 77.
Blitum foliis ovatis. *Hort. cliff.* 28.
Blitum polyſpermum. *Bauh. pin.* 118.
Polyſporon caſſiani, baſſil, anguillare. *Lob. hiſt.* 128
Habitat in Europæ *cultis.* ☉

15. CHE

15. CHENOPODIUM foliis lineari-lanceolatis planis integerrimis. *Hort. cliff.* 86. *Hort. upſ.* 55. *Roy. lugdb.* 220. *Scoparia.*
Linaria ſcoparia. *Bauh. pin.* 212.
Oſyris. *Dod. pempt.* 151.
Habitat in Græcia, Japonia. ⊙

16. CHENOPODIUM foliis ſubulatis ſemicylindricis. *maritimum.*
Chenopodium foliis ſubulatis; ſuperne planis, ſubtus convexis. *Hort. cliff.* 86. *Fl. ſuec.* 218. *Roy. lugdb.* 220.
Kali minus album, ſemine ſplendente. *Bauh. pin.* 289. *Moriſ. hiſt.* 2. *p.* 610. *ſ.* 5. *t.* 33. *f.* 3.
Habitat in Europæ *maritimis.*

17. CHENOPODIUM foliis linearibus teretibus carnoſis, caule fruticoſo. *Hort. cliff.* 86. *Roy. lugdb.* 220. *Guett. ſtamp.* 2. *p.* 425. *Sauv. monſp.* 7. *fruticoſum.*
Chenopodium, ſedi folio minimo, fruteſcens perenne. *Boerh. lugdb.* 2. *p.* 91.
Sedum minus arboreſcens. *Munt. hiſt. t.* 469.
Habitat in Galliæ, Hiſpaniæ *maritimis.* ♄

18. CHENOPODIUM foliis filiformibus acutiuſculis, caule erecto. *Hort. upſ.* 55. *altiſſimum.*
Chenopodium altiſſimum, foliis ſucculentis. *Buxb. cent.* 1. *p.* 21. *t.* 31. *f.* 2.
Kali gramineo folio. *Bauh. pin.* 289. *prodr.* 133. *Burſ. XVI:* 20.
β. Chenopodium foliis filiformibus inermibus mucronatis, caule ramoſiſſimo. *Hort. upſ.* 56.
Habitat ad Aſtracanum, *ad ſalinas* ſaxonicas *inque* Italia.

19. CHENOPODIUM foliis linearibus obtuſis: ſubtus convexis, caule ramoſo: ramis deflexis. *Hort. upſ.* 55. *ſalſum.*
Chenopodium maritimum, foliis ſedi teretibus. *Buxb. cent.* 1. *p.* 21. *t.* 31. *f.* 1.
Habitat ad Aſtracanum. ⊙

20. CHENOPODIUM foliis teretibus obtuſis tomentoſis alternis, caule herbaceo. *Sauv. monſp.* 7. *hirſutum.*
Kali minus villoſum. *Bauh. pin.* 289. *prodr.* 133.
Kali parvum hirſutum. *Bauh. hiſt.* 702.
Habitat Monſpelii *in maritimis.*

21. CHENOPODIUM foliis lanceolatis carnoſis, corymbis dichotomis ſpinoſis. *ariſtatum.*
Habitat in Sibiria. ⊙

Cau-

Caulis *ſpithamæus, inæqualis, ramoſo-patulus.* Folia *carnoſa, lanceolata, obtuſa.* Corymbi *axillares, dichotomi, folio longiores, terminati ſpinis inermibus.* Flores *ſeſſiles in divaricationibus.*

virginicum. 22. CHENOPODIUM foliis linearibus obtuſis ſubcanaliculatis, pedunculis axillaribus dichotomis muticis.
Habitat in Virginia? ⊙

BETA.

vulgaris. 1. BETA. *Hort. cliff.* 83. *Hort. upſ.* 56. *Mat. med.* 113. *Roy. lugdb.* 220.
perennis. Beta ſylveſtris maritima. *Bauh. pin.* 118.
rubra. β. Beta rubra vulgaris. *Bauh. pin.* 118.
γ. Beta rubra major. *Bauh. pin.* 118.
δ. Beta rubra, radice rapæ. *Bauh. pin.* 118.
ε. Beta lutea major. *Bauh. pin.* 118.
ζ. Beta pallide virens major. *Bauh. pin.* 118.
Cicla. η. Beta alba vel palleſcens, quæ Cicla officinarum. *Bauh. pin.* 118.
θ. Beta communis viridis. *Bauh. pin.* 118.
Habitat in Angliæ & Belgii *litoribus maris.* ♂

SALSOLA.

kali. 1. SALSOLA herbacea, foliis ſubulatis mucronatis, calycibus ovatis axillaribus.
Salſola foliis pungentibus. *Hort. cliff.* 86. *Fl. ſuec.* 206. *Roy. lugdb.* 220. *Gron. virg.* 28.
Kali ſpinoſum cochleatum. *Bauh. pin.* 289.
Kali ſpinoſo affinis. *Bauh. pin.* 289. *Moriſ. hiſt.* 2. *ſ.* 5. *t.* 33. *f.* 11.
Habitat in Europæ *litoribus maris.* ⊙

roſacea. 2. SALSOLA herbacea, foliis ſubulatis mucronatis, calycibus explanatis.
Salſola foliis conico-ſubulatis mucronatis, calycibus corolliformibus obtuſis coloratis crenatis. *Hort. upſ.* 56.
Kali humile, alis purpureis florem roſaceum mentientibus. *Buxb. cent.* 1. *p.* 9. *t.* 14. *f.* 2.
Habitat ad Aſiæ *ſeptentrionalis ſalinas.* ⊙

proſtrata. 3. SALSOLA fruteſcens, foliis linearibus piloſis inermibus. *Amœn. acad.* 2. *p.* 346. *
Habitat in Aſia *boreali*, Virginia. ♄

4. SAL.

4. SALSOLA fruteſcens, foliis ovatis acutis carnoſis. *vermiculata.*
Kali fruticoſum, ericæ folio. *Buxb. cent.* 1. *p.* 8. *t.* 14. *f.* 1?
Kali vermiculatum hiſpanicum incanum fruticans. *Barr. rar.* 504. *t.* 205.
Kali fruticoſum hiſpanicum, tamariſci folio. *Tournef. inſt.* 247.
Habitat in Hiſpania. ♄

5. SALSOLA herbacea, foliis inermibus. *Guett. ſtamp.* 426. *Sauv. monſp.* 7. *Soda*
Kali majus, cochleato ſemine. *Bauh. pin.* 287.
Kali. *Dod. pempt.* 81
Soda, Kali magnum, ſedi medii folio. *Lob. ic.* 394.
Habitat in Europæ *auſtralis ſalſis.* ⊙

ANABASIS.

1. ANABASIS aphylla: articulis emarginatis. *Amœn. acad.* 2. *p.* 347. * *aphylla*
Kali bacciferum, ſalicorniæ facie. *Buxb. cent.* 1. *p.* 11. *t.* 18.
Habitat ad maris Caſpii *litora.* ♄

2. ANABASIS foliis ſubclavatis. *Amœn. acad.* 2. *p.* 347. *folioſa*
Kali bacciferum, foliis clavatis. *Buxb. cent.* 1. *p.* 12 *t.* 12. *f.* 1.
Habitat ad maris Caſpii *litora.* ⊙

CRESSA.

1. CRESSA *Amœn. acad.* 1. *p.* 395. *Sauv. monſp.* 92. *cretica*
Anthyllis. *Alp. exot.* 157. *t.* 156. *Raj. hiſt.* 215. *Magn. char.* 212.
Quamoclit minima humifuſa paluſtris, herniariæ folio. *Tournef. cor.* 4.
Lyſimachiæ ſpicatæ purpureæ affinis, floſculis in cacumine caulis, pluribus quaſi in nodos junctis. *Pluk. alm.* 236. *t.* 43. *f.* 6.
Polygonum creticum, thymi folio. *Bauh. pin.* 281?
Habitat in Cretæ *litoribus ſalſis.*

TRIANTHEMA.

1. TRIANTHEMA. *Sauv. meth.* 127. *Portulacaſtrum*
Portulaca curaſſavica procumbens, capparidis folio, flore muſcoſo, capſula bifurca. *Herm. par.* 213. *t.* 213 *Raj. ſuppl.* 506.
Portulacæ affinis, folio ſubrotundo, flore pentapetalo dilute

lute purpureo. *Sloan. jam.* 89. *hiſt.* 1. *p.* 205. *Raj. ſuppl.* 506.

Kali curaſſavicum procumbens, foliis ſubrotundis. *Pluk. alm.* 202. *t.* 95. *f.* 4.

Habitat in Jamaica, Curaſſao.

GOMPHRENA.

* *floribus terminalibus, caule erecto.*

globoſa. 1. GOMPHRENA caule erecto, foliis ovato-lanceolatis, capitulis ſolitariis, pedunculis diphyllis. *Hort. cliff.* 86. *Hort. upſ.* 57. *Fl. zeyl.* 115. *Vir. cliff.* 22. *Roy. lugdb.* 418.

Amarantho affinis indiæ orientalis, floribus conglomeratis, ocymaſtri folio. *Breyn. cent.* 109. *t.* 51. *Comm. hort.* 1. *p.* 85. *t.* 45.

Habitat in India. ☉

perennis. 2. GOMPHRENA foliis lanceolatis, capitulis diphyllis, floſculis perianthio proprio diſtinctis.

Amaranthoides perenne, floribus ſtramineis radiatis. *Dill. elth.* 24. *t.* 20. *f.* 22.

Habitat in Bonaria. ♃

ſerrata 3. GOMPHRENA caule erecto brachiato, capitulis ſolitariis terminalibus ſeſſilibus, calycibus ſerratis.

Habitat in America.

interrupta. 4. GOMPHRENA caule erecto, ſpica interrupta. *Roy. lugdb.* 419.

Habitat in America.

* * *floribus lateralibus, caule diffuſo.*

flava. 5. GOMPHRENA pedunculis oppoſitis bifidis tricapitatis, capitulo intermedio ſeſſili.

Gomphrena pedunculis ad alas geminatis tricapitatis. *Hort. cliff.* 87.

Habitat in Vera Cruce.

vermicularis 6. GOMPHRENA foliis carnoſis obtuſis, capitulis oblongis terminalibus.

Caraxeron humile, cepeæ foliis, capitulis albis. *Vaill. act.* 1722. *p.* 264.

Amaranthoides humile curaſſavicum, cepeæ foliis lucidis, capitulis albis. *Herm. parad.* 15. *t.* 15. *f.* 4. *Pluk. alm.* 27. *t.* 75. *f.* 9.

Amarantho affinis aizoides ſ. Amaranthoides minor ameri-

mericana procumbens, ſedi teretifolii foliis & facie, flore oblongo niveo. *Breyn. prod.* 2.

Trifolii ſpica Crithmum maritimum non ſpinoſum braſilienſe. *Raj. hiſt.* 1331.

Habitat in Braſilia, Curaſſao.

7. GOMPHRENA caule repente, foliis lanceolatis ſubſeſſilibus, capitulis oblongis ſeſſilibus axillaribus. *Fl. zeyl.* 116. * *ſeſſilis.*

Amaranthus humilis, foliis oppoſitis, floſculis ex alis glomeratis. *Burm. zeyl.* 17. *t.* 4. *f.* 2.

Coluppa. *Rheed. mal.* 10. *p.* 21. *t.* 9.

Habitat in India.

8. GOMPHRENA caule repente, capitulis rotundis ſeſſilibus, foliis lanceolato-ovatis. *Ficoidea.*

Gomphrena caule diffuſo repente, capitulis ſeſſilibus. *Roy. lugdb.* 418.

Amaranthoides marina repens, polygoni folio, capitulis argenteis. *Plum. ſpec.* 20.

Habitat in America *meridionali.*

9. GOMPHRENA foliis lanceolato-ſubulatis, caule dichotomo villoſo, capitulis axillaribus pedunculatis. *polygonoides.*

Amaranthoides humile curaſſavicum, foliis polygoni. *Herm. prodr.* 17. *t.* 17. *f.* 1. *Sloan. jam.* 48. *hiſt.* 1. *p.* 141. *t.* 86. *f.* 2. *Raj. ſuppl.* 126.

Habitat in America *meridionali.*

BOSEA.

1. BOSEA. *Hort. cliff.* 84. *Roy. lugdb.* 223. *yervamora.*

Tilia forte arbor racemoſa, folio longiore ſubtus albicante nervis purpureis inſignito, flore pentapetalo purpureo. *Sloan. jam.* 135. *hiſt.* 2. *p.* 19. *t.* 158. *f.* 3. *Raj. dendr.* 88.

Frutex peregrinus horto boſiano yervamora dictus. *Walth. hort.* 24. *t.* 10.

Habitat in Canariis *inſulis.* ♄

ULMUS.

1. ULMUS foliis duplicato-ſerratis, baſi inæqualibus. *campeſtris.*

Ulmus fructu membranaceo. *Hort. cliff.* 83. *Fl. ſuec.* 219. *Mat. med.* 105. *Roy. lugdb.* 223. *Dalib. pariſ.* 82.

Ulmus campeſtris & theophraſti *Bauh. pin.* 246.

Ulmus. *Dod. pempt.* 837.

Habitat in Europa *ad pagos.* ♄

P

2. UL-

americana. 2. ULMUS foliis æqualiter ſerratis: baſi inæqualibus.
Ulmus fructu membranaceo, foliis ſimpliciſſime ſerratis. *Gron. virg.* 145. *
Habitat in Virginia. ♄

pumila. 3. ULMUS foliis æqualiter ſerratis: baſi æqualibus.
Ulmus humilis. *Amm. ruth.* 260.
Ulmus pumila, foliis parvis glabra, cortice fungoſo. *Pluk. alm* 293.
Habitat in Sibiria. ♄

NAMA.

Zeylanica. 1. NAMA. *Amœn. acad* 1. *p.* 395. *Fl. zeyl.* 117. *
Alſine veronicæ affinis, gratiolæ foliis, maderaſpatana. *Pluk. alm.* 22. *t.* 130. *f.* 2.
Habitat in India. ☉

HEUCHERA.

americana. 1. HEUCHERA. *Hort. cliff.* 82. *Gron. virg.* 29. *Roy. lugdb.* 437.
Cortuſa americana, flore ſqualide purpureo. *Herm. parad.* 131. *t.* 131.
Sanicula ſ. Cortuſa americana ſpicata, floribus ſqualide purpureis. *Pluk. alm.* 332. *t.* 58. *f.* 3.
Habitat in Virginia. ♃

SWERTIA.

perennis. 1. SWERTIA corollis quinquefidis, foliis radicalibus ovalibus.
Swertia. *Hort. cliff.* 53. *Roy. lugdb.* 433.
Gentiana paluſtris latifolia. *Bauh. pin.* 188.
Gentiana XII, punctato flore. *Cluſ. hiſt.* 1. *p.* 316.
Habitat in Helvetia, Bavaria. ♃

difformis. 2. SWERTIA corollis quinquefidis: terminali ſexfida, pedunculis longiſſimis, foliis linearibus.
Gentiana foliis linearibus acuminatis, pedunculis longiſſimis nudis unifloris oppoſitis. *Gron. virg.* 30.
Habitat in Virginia.

rotata. 3. SWERTIA corollis quinquefidis, foliis lanceolato-linearibus.
Habitat in Sibiria. *D. Gmelin.* ☉
Planta ſpithamæa. Folia *lanceolato-linearia*; Rami *alterni*, *pedunculis unifloris*; Corollæ *planæ*.

4. SWER-

4. SWERTIA corollis quadrifidis quadricornibus. *Amœn. acad.* 2. *p.* 344. * *corniculata.*
Habitat in Sibiria, *Gmelin*; Canada, *Kalm.* ⊙

5. SWERTIA corollis quadrifidis ecornibus. *Amœn.* *dichotoma.*
acad. 2. *p.* 345. *
Habitat in Sibiria *D. Gmelin.* ⊙

GENTIANA.

* *Corollis quinquefidis ſubcampaniformibus.*

1. GENTIANA corollis quinquefidis rotatis verticillatis, calycibus ſpathaceis. *Hall. helv.* 479. *lutea.*
Gentiana floribus lateralibus confertis pedunculatis, corollis rotatis. *Hort. cliff.* 80. *Fl. ſuec.* 201. *Mat. med.* 110. *Roy. lugdb.* 432. *Sauv. monſp.* 136.
Gentiana major lutea. *Bauh. pin.* 187. *Fl. lapp.* 96.
Gentiana. *Cam. epit.* 415.
Aſterias. *Reneal. ſpec.* 64. *t.* 63.
Habitat in alpibus Norvegicis, Helveticis, Apenninis, Pyrenæis, Tridentinis. ♃

2. GENTIANA corollis quinquefidis campaniformibus verticillatis, calycibus ſubſpathaceis. *purpurea.*
Gentiana corollis campaniformibus verticillatis, foliis imis petiolatis ellipticis. *Hall. helv.* 479.
Gentiana major purpurea. *Bauh. pin.* 187.
Gentiana major alia. *Cam. epit.* 416.
Coilantha. *Reneal. ſpec.* 65.
Habitat in alpibus Helveticis. ♃
Planta, quam ſub nomine Gentianæ majoris luteæ, floribus punctis carentibus campanulæ forma C. B. 187 *meminit, hujus ſpecies erat, lecta a Burſero.*

3. GENTIANA corollis quinquefidis campanulatis punctatis, calycibus quinquedentatis. *punctata.*
Gentiana major, flore punctato. *Bauh. pin.* 187.
Habitat in Helvetia, Sibiria. ♃
Hujus varietatem legit Cl. Gmelinus in Sibiria foliis lineari-lanceolatis, Floribus terminalibus ternis, pedunculis propriis, corollis flavis punctis ſparſis purpuraſcentibus.

4. GENTIANA corollis quinquefidis campanulatis oppoſitis ſeſſilibus, foliis amplexicaulibus. *aſclepiadea.*
Gentiana foliis ovato-lanceolatis, floribus campanulatis in alis ſeſſilibus. *Hall. helv.* 478.

Gentiana floribus lateralibus ſolitariis ſeſſilibus, corollis erectis. *Hort. cliff.* 80. *Roy. lugdb.* 432.
Gentiana aſclepiadis folio. *Bauh. pin.* 187.
Daſyſtephana. *Reneal. ſpec.* 67. *t.* 68.
Habitat in alpibus Helvetiæ, Pannoniæ, Mauritaniæ. ♃

Pneumonanthe. 5. GENTIANA corollis quinquefidis campanulatis oppoſitis pedunculatis, foliis linearibus.
Gentiana floribus terminalibus raris, corollis erectis plicatis, foliis linearibus. *Hort. cliff.* 80. *Fl. ſuec.* 202. *Roy. lugdb.* 432. *Dalib. pariſ.* 81.
Gentiana anguſtifolia autumnalis major. *Bauh. pin.* 188.
Gentiana paluſtris anguſtifolia. *Bauh. pin.* 188.
Cyana. *Reneal. ſpec.* 69. *t.* 68.
Habitat in Europæ *paſcuis humidiuſculis.* ♃

ſaponaria. 6. GENTIANA corollis quinquefidis campanulatis ventricoſis verticillatis, foliis trinerviis.
Gentiana floribus ventricoſis campanulatis erectis quinquefidis, foliis ovato-lanceolatis. *Gron. virg.* 29.
Gentiana virginiana, ſaponariæ folio, flore cæruleo longiore. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 484. *ſ.* 12. *t.* 5. *f.* 4. *Cateſb. car.* 1. *p.* 70. *t.* 70.
Habitat in Virginia. ♃

villoſa. 7. GENTIANA corollis quinquefidis campanulatis ventricoſis, foliis villoſis.
Gentiana floribus ventricoſis campanulatis erectis quinquefidis, foliis oblongis acuminatis leviter villoſis. *Gron. virg.* 145.
Habitat in Virginia. ♃

acaulis. 8. GENTIANA corolla quinquefida campanulata caulem excedente.
Gentiana corolla campanulata caulem longitudine excedente. *Hort. cliff.* 81. *Roy. lugdb.* 432. *Hall. helv.* 477. *Sauv. monſp.* 136.
Gentiana alpina latifolia, magno flore. *Bauh. pin.* 187. *prodr.* 97.
β. Gentiana alpina anguſtifolia, magno flore. *Bauh. pin.* 187.
Thylacitis. *Reneal. ſpec.* 70. *t.* 68.
Habitat in alpibus Helveticis, Auſtriacis, Pyrenaicis. ♃

* * *Corollis quinquefidis infundibuliformibus.*

verna. 9. GENTIANA corolla quinquefida infundibuliformi caulem excedente, foliis radicalibus confertis majoribus.
Gen-

Gentiana flore unico tubuloſo, foliis ad terram conge-ſtis acutis. *Hall. helv.* 476.
Gentiana alpina verna major. *Bauh. pin.* 188.
Gentianella verna minor. *Cluſ. hiſt.* 315.
Ericoila. *Reneal. ſpec.* 75. *t.* 68.
Habitat in alpibus Helvetiæ. ♃

10. GENTIANA corolla quinquefida infundibuliformi, foliis obtuſis. *bavarica.*
Gentiana foliis ovatis, caule unifloro. *Hall. helv.* 476.
Gentiana caule unifloro, flore hypocrateriformi quinquefido: laciniis ſubrotundis crenatis. *Hort. cliff.* 81.
Gentianella elegantiſſima bavarica. *Cam. hort.* 65. *t.* 15. *f.* 2.
Habitat in alpibus Helvetiæ, Bavaria.

11. GENTIANA corollis quinquefidis infundibuliformibus, ramis unifloris alternis. *nivalis.*
Gentiana corollis infundibuliformibus quinquedentatis, ramis alternis unifloris. *Fl. ſuec.* 204.
Gentiana corolla infundibuliformi: denticulo laciniis interpoſito. *Fl. lapp.* 95. *
Gentiana humillima, caule ramoſo, tubo floris longiſſimo. *Hall. helv.* 475. *t.* 7. *f.* 5.
Gentiana alpina æſtiva, centaureæ minoris folio. *Bauh. pin.* 188.
Habitat in Lapponiæ, Helvetiæ *ſummis alpibus.* ⊙

12. GENTIANA corollis quinquefidis infundibuliformibus terminalibus ſeſſilibus, foliis margine membranaceis. *aquatica.*
Gentiana foliis margine membranaceis baſi coadunatis. *Amœn. acad.* 2. *p.* 343.
Gentiana humilis aquatica verna. *Amm. ruth.* 4. *t.* 1.
Habitat in Sibiria. *D. Amman.* ⊙

13. GENTIANA corollis quinquefidis hypocrateriformibus, calycibus inflatis plicatis. *utriculoſa.*
Gentiana utriculis ventricoſis. *Bauh. pin.* 188.
Gentianella cærulea cordata. *Columm. ecphr.* 220. *t.* 221.
Gentianella annua, azureo flore. *Barr. rar.* 18. *t.* 48.
Habitat in Alpibus Helvetiæ, Italiæ. ⊙

14. GENTIANA corollis quinquefidis infundibuliformibus, caule dichotomo. *Centaurium.*
Gentiana foliis lineari-lanceolatis, caule dichotomo, corol-

rollis infundibuliformibus quinquefidis. *Hort. cliff.* 81. *Fl. ſuec.* 205. *Mat. med.* 112. ſtylis ſimplicibus. *Vir. cliff.* 21. *Roy. lugdb.* 7. *Dalib. pariſ.* 81.
Centaurium minus. *Bauh. pin.* 278.
Erithræa. *Renealm. ſpec.* 77. *t.* 76.
β. Centaurium minus pumilum ramoſiſſimum. *It. œl.* 157. *Roſen. ſcan.* 10.
Centaurium minus paluſtre ramoſiſſimum, flore purpureo. *Vaill. pariſ.* 32. *t.* 6. *f.* 1.
γ. Centaurium paluſtre minimum, flore inaperto. *Vaill. pariſ.* 32. *t.* 6. *f.* 2.
Habitat in Europæ *apricis, præſertim maritimis.* ⊙

ſpicata. 15. GENTIANA corollis quinquefidis infundibuliformibus, floribus alternis ſeſſilibus.
Gentiana corollis infundibuliformibus quinquefidis laxe ſpicatis, foliis lanceolatis. *Sauv. monſp.* 132.
Centaurium minus ſpicatum album. *Bauh. pin.* 278. *prodr.* 130. *t.* 130. *Bauh. hiſt.* 3. *p.* 353.
Centaurium minus album. *Tabern. ic.* 780.
Habitat in montibus Euganeis & Monſpelii. ⊙

quinquefolia. 16. GENTIANA corollis quinquefidis infundibuliformibus, caule acutangulo, foliis ovatis amplexicaulibus.
Habitat in Penſylvania. *Kalm.*
Planta *magnitudine & ſtatura ſequentis.* Caulis *indiviſus, tetragonus angulis membranaceis.* Folia *ovata, ſeſſilia, amplexicaulia, trinervia, acuta.* Pedunculi *oppoſiti, apice ferentes* Flores *quinque, ſubpedicellatos.* Calyces *breviſſimi, anguſti,* Corollæ *infundibuliformes, ſubcæruleæ: limbo parvo, fauce pervia.*

Amarella. 17. GENTIANA corollis quinquefidis hypocrateriformibus fauce barbatis.
Gentiana corollis hypocrateriformibus fauce barbatis. *Hort. cliff.* 81. *Fl. ſuec.* 203. *α. Roy. lugdb.* 432. *Dalib. pariſ.* 81. *Mat. med.* 111.
Gentiana floribus confertis faucibus membranula laciniata clauſis, foliis ovato-acuminatis. *Guett. ſtamp.* 303.
Gentiana pratenſis, flore lanuginoſo. *Bauh. pin.* 188.
Gentiana autumnalis ramoſa. *Bauh. pin.* 188.
Omantha. *Reneal. ſpec.* 71.
Habitat in Europæ *pratis.* ⊙

* * * *Co-*

* * * *Corollis non quinquefidis.*

18. GENTIANA corollis quadrifidis fauce barbatis. *campeſtris.*
Gentiana corolla hypocrateriformi tubo villis clauſo, calycis foliis alternis majoribus. *Fl. lapp.* 94. *Fl. ſuec.* 203. β.
Gentiana purpurea minima. *Columm. ecphr.* 1. *p.* 223. *t.* 221. *Barr. ic.* 97. *f.* 2.
Gentianella alpina verna minor. *Bauh. pin.* 188.
Eyrythalia. *Renealm. ſpec.* 72.
Habitat in Europæ *pratis ſiccis.* ⊙
Præcedenti nimis affinis & fere varietas aut hybrida.

19. GENTIANA corollis quadrifidis margine ciliatis. *ciliata.*
Gentiana corollis hypocrateriformibus laciniis margine barbatis. *Hort. cliff.* 81.
Gentiana anguſtifolia autumnalis minor, floribus ad latera piloſis. *Bauh. pin.* 188.
Gentianella cærulea oris piloſis. *Bauh. pin.* 108.
Gentianella cærulea fimbriata anguſtifolia autumnalis. *Columm. ecphr.* 1. *p.* 222. *t.* 221. *f.* 1.
Habitat in Helvetiæ, Italiæ, Canadæ *montibus.*

20. GENTIANA corollis quadrifidis imberbibus verticillatis ſeſſilibus. *Cruciat.*
Gentiana floribus confertis terminalibus, corollis quadrifidis imberbibus interjecto denticulo. *Hort. cliff.* 81. *Roy. lugdb.* 432. *Dalib. pariſ.* 80.
Gentiana cruciata. *Bauh. pin.* 188.
Gentiana minor. *Cam. epit.* 417.
Tretorrhiza. *Renealm. ſpec.* 74. *t.* 73.
Habitat in Pannoniæ, Apenninorum, Helvetiæ *montoſis apricis.* ♃

21. GENTIANA corollis quadrifidis, floribus acaulibus, foliis ovatis. *ſeſſilis.*
Gentianoides flore luteo. *Fewill. peruw.* 3. *p.* 20. *t.* 14.
Habitat in Chilli.

22. GENTIANA corollis quadrifidis imberbibus, caule dichotomo filiformi. *filiformis.*
Gentiana corollis infundibuliformibus quadrifidis, pedunculis ternis, foliis linearibus. *Sauv. monſp.* 132.
Gentiana caule dichotomo, foliis lineari lanceolatis, floribus infundibuliformibus quadrifidis longiſſime pedunculatis. *Guett. ſtamp.* 1. *p.* 305. *Dalib. pariſ.* 82.

Centaurium paluſtre luteum minimum. *Raj. hiſt.* 1092. *Vaill. pariſ.* 32. *t.* 6. *f.* 3.
Habitat in Gallia. ☉

perfoliata. 23. GENTIANA corollis octofidis, foliis perfoliatis.
Gentiana caule dichotomo foliis connatis, corollis octifidis. *Hort. cliff.* 81. & 496. *Roy. lugdb.* 433. *Dalib. pariſ.* 82. *Sauv. monſp.* 136.
Centaurium luteum perfoliatum. *Baub. pin.* 278. *Moriſ. hiſt.* 2. *p.* 565. *ſ.* 5. *t.* 26. *f.* 1. 2.
Centaurium parvum, flore luteo. *Cluſ. hiſt.* 2. *p.* 180.
Chlora. *Reneal. ſpec.* 80. *t.* 76.
Habitat in Gallia, Anglia, Hiſpania. ☉

PHYLLIS.

nobla. 1. PHYLLIS ſtipulis dentatis. *Roy. lugdb.* 92.
Phyllis. *Hort. cliff.* 87. *Hort. upſ.* 57.
Valerianella canarienſis fruteſcens Simpla nobla dicta. *Dill. elth.* 405. *t.* 299. *f.* 386.
Bupleuroides quæ Arbor umbellifera. *Waltb. hort.* 11. *t.* 6.
Habitat in Canariis. ♄

indica. 2. PHYLLIS ſtipulis integerrimis. *Roy. lugdb.* 92. †
Habitat in India. ♄
Flores hujus mihi ignoti ſunt.

ERYNGIUM.

fœtidum. 1. ERYNGIUM foliis gladiatis ſerrato-ſpinoſis: floralibus multifidis.
Eryngium foliis gladiatis utrinque laxe ferratis: denticulis ſubulatis. *Hort. cliff.* 88. *Gron. virg.* 30. *Roy. lugdb.* 529.
Eryngium, foliis anguſtis ſerratis, fœtidum. *Sloan. jam.* 127. *hiſt.* 1. *p.* 264. *t.* 156. *f.* 3. 4.
Eryngium americanum, yuccæ folio, ſpinis ad oras molliuſculis. *Pluk. alm.* 13. *t.* 175. *f.* 4. *Raj. ſuppl.* 239. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 167.
Scorpii ſpina *Hern. mex.* 222.
Habitat in Virginia, Jamaica, Mexico, Canada. ♃

aquaticum. 2. ERYNGIUM foliis gladiatis ſerrato-ſpinoſis: floralibus indiviſis.
Eryngium foliis gladiatis utrinque laxe ferratis: ſummis tantum dentatis ſubulatis. *Gron. virg.* 146.

β Eryn-

β. Eryngium lacuſtre virginianum, floribus ex albido cæruleis, caule & foliis ranunculi flammei minoris. *Pluk. alm.* 137.
Habitat in Virginia ♃

3. ERYNGIUM foliis radicalibus ovalibus planis crenatis, capitulis pedunculatis. *Hort. cliff.* 87. *Hort. upſ.* 37. *Roy. lugdb.* 92. *Dalib. pariſ.* 83. *planum.*
Eryngium latifolium planum. *Bauh. pin.* 87.
Eryngium pannonicum latifolium. *Cluſ. hiſt.* 2. *p.* 158.
Habitat in Ruſſia, Polonia, Auſtria, Helvetia. ♃

4. ERYNGIUM foliis radicalibus oblongis inciſis, caule dichotomo. capitulis ſeſſilibus. *Hort. cliff.* 87. *Roy. lugdb.* 93. *puſillum.*
Eryngium planum minus. *Bauh. pin.* 386.
Eryngium puſillum planum montoni. *Cluſ. hiſt.* 2. *p.* 158.
Habitat in Hiſpania.

5. ERYNGIUM foliis radicalibus ſubrotundis plicatis ſpinoſis, capitulis pedunculatis. *Hort. cliff.* 87. *Fl. ſuec.* 220. *Roy. lugdb.* 93. *maritimum.*
Eryngium maritimum. *Bauh. pin.* 386.
Eryngium marinum. *Cluſ. hiſt.* 2. *p.* 169. *Cam. epit.* 448.
Habitat ad Europæ *littora arenoſa maritima*

6. ERYNGIUM foliis radicalibus cordatis oblongis, caulinis pinnatifidis, capitulo ſubcylindrico. *alpinum.*
Eryngium alpinum cæruleum, capitulis dipſaci. *Bauh. pin.* 386.
Eryngium cæruleum genevenſe. *Lob. ic.* 2. *p.* 23.
Habitat in alpibus Helvetiæ, Italiæ. ♃

7. ERYNGIUM foliis radicalibus pinnatis tripartitis *Hort. cliff.* 87. *Mat. med.* 114. *Roy. lugdb.* 93. *campeſtre.*
Eryngium vulgare. *Bauh. pin.* 386.
Eryngium campeſtre vulgare. *Cluſ. hiſt.* 2. *p.* 157
Habitat in Germaniæ, Galliæ, Hiſpaniæ, Italiæ *incultis.* ♃

8. ERYNGIUM foliis radicalibus digitato-multifidis. *amethyſtinum.*
Eryngium montanum amethyſtinum. *Bauh. pin.* 386. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 165. *ſ.* 7. *t.* 35. *f.* 2
Eryngium totum cæruleum. *Beſl. eyſt.* o. 11. *t.* 8. *f.* 4.
Habitat in Styriæ *montibus.* ♃
Habet multa affinia cum præcedenti

P 5 HY-

HYDROCOTYLE.

vulgaris. 1. HYDROCOTYLE foliis peltatis, umbellis quinquefloris.

Hydrocotyle foliis peltatis orbiculatis undique emarginatis. *Hort. cliff.* 88. *Fl. ſuec.* 221. *Roy. lugdb.* 93. *Hall. helv.* 425. *Dalib. pariſ.* 83.

Ranunculus aquaticus, cotyledonis folio. *Bauh. pin.* 180.

Cotyledon aquatica. *Lob. ic.* 387.

Habitat in Europæ *inundatis.*

umbellata. 2. HYDROCOTYLE foliis peltatis, umbellis multifloris.

Hydrocotyle repens, flore alba, cotyledonis folio. *Gron. virg.* 30.

Hydrocotyle maxima, folio umbilicato, floribus in umbellam naſcentibus. *Plum. ſpec.* 7. ?

Erva de capitaon. *Marcgr. braſ.* 27.

Acaricoba. *Piſ. braſ.* 90.

Habitat in America.

Planta ſimillima præcedenti, hinc cum ea mixta; differt ſcapo foliis duplo longiore, floſculis non 5, ſed pluribus quam viginti in umbellam ſimplicem digeſtis.

americana. 3. HYDROCOTYLE foliis reniformibus ſublobatis crenatis.

Habitat in America *ſeptentrionali. Kalm.*

Plantæ *facies primæ & magnitudo.* Folia *antice ſinu vix hiante ad centrum usque diſſecta, margine in 9 lobos obſoletos diviſa, quorum ſinguli tribus crenis minoribus notata. Umbella quinqueflora.*

aſiatica. 4. HYDROCOTYLE foliis reniformibus æqualiter crenatis. *Hort. cliff.* 88. *Fl. zeyl.* 118. *Roy. lugdb.* 94.

Valerianella zeylanica paluſtris repens, hederæ terreſtris folio. *Herm. par.* 238. *t.* 238.

Ranunculo affinis umbelliferis accedens, chelidonii minoris folio, zeylanica minor. *Pluk. alm.* 314. *t.* 106. *f.* 2.

Codagam. *Rheed. mal.* 10. *p.* 91. *t.* 46.

Habitat in India.

Differt a præcedente marginis denticulis, ſ. crenis æqualibus, conſiſtentia foliorum duplo craſſiore & fere incana; petiolis pluribus ad genicula caulis, cum in præcedente folia ſolitaria.

chinenſis. 5. HYDROCOTYLE foliis linearibus, umbellis multifloris.

He-

Habitat in China.

Magnitudo præcedentium; Caulis repens. Folia *linearia, lævia, obtuſa, plana, ſæpius bina ad articulos. Scapi longitudine folii. Umbella multiflora.*

SANICULA.

1. SANICULA foliis radicalibus ſimplicibus, floſculis omnibus ſeſſilibus. *Fl. ſuec.* 222. *Mat. med.* 115. *europæa.*
   Sanicula floſculis omnibus ſeſſilibus. *Gron. virg.* 147.
   Sanicula. *Hort. cliff.* 88. *Roy. lugdb.* 93.
   Sanicula officinarum. *Bauh. pin.* 319.
   Diapenſia. *Cam. epit.* 763.
   Habitat in Europæ *ſylvis montoſis.* ♃

2. SANICULA foliis radicalibus compoſitis, foliolis ovatis. *Gron. virg.* 146. *canadenſis.*
   Sanicula canadenſis, ampliſſimo laciniato folio. *Tournef. inſt.* 326.
   Habitat in Virginia. ♃
   Structura *ita præcedentis, ut vix differentia, ſed planta decuplo ſæpe omnibus partibus major.*

3. SANICULA floſculis maſculis pedunculatis, hermaphroditis ſeſſilibus. *Gron. virg.* 31. *marilandica.*
   Sanicula foliis ſeptilobatis inæqualibus, floſculis maſculis pedunculatis. *Hort. upſ.* 57.
   Sanicula marilandica, caule & ramulis dichotomis, echinis minimis in eodem communi pediculo ternis. *Raj. ſuppl.* 260.
   Habitat in Marilandia, Virginia. ♃

ASTRANTIA.

1. ASTRANTIA foliis quinquelobis: lobis trifidis. *Hall. helv.* 439. *major.*
   Aſtrantia. *Hort. cliff.* 88.
   Helleborus niger, ſaniculæ folio. *Bauh. pin.* 186.
   Veratrum nigrum. *Dod. pempt.* 387.
   Habitat in alpibus Helvetiæ, Hetruriæ, Pyrenæis. ♃

2. ASTRANTIA foliis digitatis ſerratis. *minor*
   Aſtrantia foliis digitatis ſeptenis integris dentatis. *Hall. helv.* 440.
   Helleborus, ſaniculæ folio, minor. *Bauh. pin.* 186. *prodr.* 97. *Raj. hiſt.* 475.
   Habitat in alpibus Helvetiæ. ♃

BU-

BUPLEURUM.

* *Herbacea.*

rotundifolium. 1. BUPLEURUM involucris univerſalibus nullis, foliis perfoliatis. *Hort. upſ.* 64.
Bupleurum foliis ovatis perfoliatis. *Hort. cliff.* 104. *Roy. lugdb.* 109. *Hall. helv.* 437.
Perfoliata vulgatiſſima arvenſis. *Bauh. pin*, 277.
Perfoliata. *Dod. pempt.* 104.
β. Perfoliata minor, ramis inflexis. *Bauh. pin.* 277. *prodr.* 130.
Perfoliata flore multiplici. *Bauh. pin.* 277.
Perfoliata criſpa ſ. muſcoſa. *Cam. hort.* *t.* 37.
Habitat inter Europæ *auſtralis ſegetes.* ⊙

ſtellatum. 2. BUPLEURUM involucellis coadunatis, univerſali triphyllo.
Bupleurum alpinum, anguſtis nervoſis foliis, calyce univerſali leviter inciſo. *Hall. helv.* 438. *t.* 10.
Perfoliata alpina anguſtifolia media. *Bauh. pin.* 277. *prodr.* 129. *Burſ. VI*: 5.
Habitat in alpibus Helveticis.
Folia *radicalia linearia*; *ſumma ovata, lanceolata, ſeſſilia*; involucri *univerſalis foliola ovata, æqualia*: partialis 5, *coalita ultra medium.*

petræum. 3. BUPLEURUM involucellis coadunatis, univerſali pentaphyllo.
Bupleurum foliis auguſtis & nervoſis, umbella univerſali quinquefolia, peculiari ſexfida ſtellata. *Hall. helv.* 438.
Perfoliata alpina, gramineo folio. *Bauh. pin.* 277.
Sedum petræum, bupleuri folio. *Pon. bald.* 247.
Habitat in alpibus Helvetiæ, Baldi. ♃
Folia *linearia, ſeſſilia.* Involucri *univerſalis foliola* 5, *æqualia, latiora*; *partialium* 5, *coalita ad medium.*

anguloſum. 4. BUPLEURUM involucellis pentaphyllis orbiculatis, univerſali triphyllo ovato, foliis amplexicaulibus cordato-lanceolatis.
Perfoliata alpina anguſtifolia major, folio anguloſo. *Bauh. pin.* 277. *prodr.* 129. *Burſ. VI*: 4.
β. Perfoliata alpina anguſtifolia minor. *Bauh. pin.* 277. *prodr.* 129. *Burſ. VI*: 6.
Habitat in Pyrenæis. β. *in* Valleſiæ *alpibus.* ♃
Planta *affinis maxime* 2, *uti patuit ex Burſeri collectione, licet involucri partialis foliola in hac diſtincta. In varietate* β. *folia anguſtiſſima ſtriata, in* α. *vero lanceolata nec nervoſo-ſtriata.*

5. PU-

5. BUPLEURUM involucellis pentaphyllis ovatis: univerſali ſubpentaphyllo, foliis amplexicaulibus. *longifolium.*

Bupleurum foliis imis petiolatis, ſuperioribus ovatis perfoliatis. *Hall. helv.* 437.
Perfoliata montana latifolia. *Bauh. pin.* 277.
Perfoliata montana. *Cam. hort.* 120. *t.* 38.
Habitat Góttingæ, *inque monte Jura* Helvetiæ.
Folia *ovata, profunde amplexicaulia: radicalia petiolata; Involucr. univerſ.* 3. *vel quinquephyllum; partiale quinquephyllum, longitudine floſculorum.*

6. BUPLEURUM involucellis pentaphyllis acutis, univerſali diphyllo, foliis lanceolatis obtuſis petiolatis. *falcatum.*

Bupleurum foliis radicalibus pedunculatis: ſummo ſubrotundo, caulinis linearibus ſeſſilibus. *Guett. ſtamp.* 59.
Bupleurum foliis petiolatis falcato-ellipticis acutis. *Hall. helv.* 439.
Bupleurum folio ſubrotundo ſ. vulgatiſſimum. *Bauh. pin.* 278.
Bupleurum. *Riv. pent.* 44.
Iſophyllum. *Cord. hiſt.* 69.
Habitat in Miſniæ, Valleſiæ *ſepibus.* ♃
Folia *ovali-oblonga petiolis foliaceis*; Involucrum *univerſale diphyllum, inæquale; partiale quinquephyllum, mucronatum.*

7. BUPLEURUM involucellis pentaphyllis acutis: univerſali triphyllo, floſculo centrali altiore, ramis divaricatis. *odontites.*

Bupleurum foliis gramineis, calyce peculiari quinquefido ariſtato rigido. *Hall. helv.* 438.
Perfoliata minor anguſtifolia, bupleuri folio. *Bauh. pin.* 277.
Perfoliata minima, bupleuri folio. *Columu. ecphr.* 1. *p.* 84. *t.* 247.
Habitat in alpibus Valleſiæ. ☉
Folia *lineari-lanceolata.* Caulis *ramoſiſſimus, divaricatus*; involucr. *univerſ. ſubpentaphyllum foliolis latioribus rigidis acutis*; partiale *pentaphyllum ſimile*; floſculi 9, *intermedii petiolus duplo altior.*

8. BUPLEURUM involucellis pentaphyllis lanceolatis longioribus: univerſali triphyllo, foliis caulinis lanceolatis. *ranunculoides.*

Bupleurum foliis amplexicaulibus: inferioribus linearibus, ſum-

ſummo cordato-oblongo. *Hort cliff.* 104. *Hall. helv.* 437. *Roy. lugdb.* 110.
Perfoliata alpina anguſtifolia minima. *Bauh. pin.* 277. *prodr.* 130. *Burſ. XVI*: 8.
Perfoliatum gramineum helveticum alpinum pumilum facie ranunculi. *Lob. illuſtr.* 137. *Park. theatr.* 335. *t.* 338.
Habitat in Helvetia, & Pyrenæis.

rigidum. 9. BUPLEURUM caule dichotomo ſubnudo, involucris minimis acutis.
Bupleurum foliis lanceolatis rigidis: radicalibus obtuſis, caulinis acutis. *Roy. lugdb.* 110. *Sauv. monſp.* 76.
Bupleurum folio rigido. *Bauh. pin.* 278.
Bupleurum alterum latifolium. *Dod. pempt.* 633.
Habitat Monſpelii. ♃

tenuiſſimum. 10. BUPLEURUM umbellis ſimplicibus alternis pentaphyllis ſubtrifloris.
Bupleurum foliis linearibus acutis ſeſſilibus. *Hort. cliff.* 104. *Roy. lugdb.* 110.
Bupleurum tertium minimum. *Columm. ecphr.* 1. *p.* 85. *t.* 247. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 300. *ſ.* 9. *t.* 14. *f.* 4.
Bupleurum anguſtiſſimo folio. *Bauh. pin.* 278.
Habitat in Germania, Anglia, Gallia, Italia. ☉

* * *Fruteſcentia.*

villoſum. 11. BUPLEURUM fruteſcens, foliis amplexicaulibus dentatis ſubtus villoſis.
Perfoliata foliis oblongis ſinuoſis ſubtus incanis. *Burm. afr.* 196. *t.* 71. *f.* 2.
Habitat in Æthiopia. ♄

fruticoſum. 12. BUPLEURUM fruteſcens, foliis obovatis integerrimis.
Bupleurum, foliis obverſe ovatis in petiolum attenuatis, *Hort. cliff.* 104. *Roy. lugdb.* 109. *Sauv. monſp.* 60.
Seſeli æthiopicum, ſalicis folio. *Bauh. pin.* 161.
Seſeli æthiopicum frutex. *Dod. pempt.* 312.
Habitat in Galliæ *auſtralis ſaxoſis maritimis.* ♄

difforme. 13. BUPLEURUM fruteſcens, foliis vernalibus decompoſitis planis inciſis, æſtivalibus filiformibus angulatis trifidis.
Bupleurum foliis radicalibus pinnato inciſis, caulinis faſciculatis tetragonis. *Roy. lugdb.* 110.

Eu-

Bupleurum fruteſcens, foliis ex uno puncto plurimis junceis tetragonis. *Burm. afr.* 195. *t.* 71. *f.* 1?
Habitat in Æthiopia (mea aliunde) ♄
Flores *nondum apud nos protulit. De genere itaque hæſito.* Folia *hyemalia Petroſelini, æſtivalia Spartii.*

ECHINOPHORA

1. ECHINOPHORA foliolis ſubulato-ſpinoſis integerrimis. *ſpinoſa.*
Echinophora foliis decompoſitis. *Wach. ultr.* 200.
Caucalis caule lignoſo, foliolis ſubulato-ſpinoſis integerrimis. *Roy. lugdb.* 96. *Sauv. monſp.* 258.
Crithmum maritimum ſpinoſum. *Bauh. pin.* 288.
Crithmum ſpinoſum. *Dod. pempt.* 705.
Habitat ad litora maris præſertim mediterranei. ♃

2. ECHINOPHORA foliolis inciſis inermibus. *tenuifolia.*
Echinophora foliis ſupradecompoſitis. *Wach. ultr.* 200.
Caucalis caule lignoſo, foliis inciſis. *Roy. lugdb.* 96.
Paſtinacha ſylveſtris anguſtifolia, fructu echinato. *Bauh. pin.* 151.
Paſtinaca echinophora apula. *Columm. ecphr.* 1. *p.* 98. *t.* 101.
Habitat in Apuliæ *maritimis apricis, ſalſis.* ♃

TORDYLIUM.

1. TORDYLIUM involucris umbella longioribus. *Hort. cliff.* 90. *Hort. upſ.* 58. *Roy. lugdb.* 95. *Sauv. meth.* 230. *ſyriacum.*
Tordylium ſyriacum humilius, ſemine granulato majore. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 317. *ſ.* 9. *t.* 16. *f.* 7.
Gingidium foliis paſtinacæ latifoliæ. *Bauh. pin.* 151.
Habitat in Syria. ☉

2. TORDYLIUM involucris partialibus longitudine petalorum, foliolis ovatis laciniatis. *Hort. cliff.* 90. *Hort. upſ.* 58. *Roy. lugdb.* 95. *Mat. med.* 145. *Sauv. monſp.* 230. *officinale.*
Seſeli creticum minus. *Bauh. pin.* 161.
Seſeli creticum. *Dod. pempt.* 314.
Habitat in Narbona, Italia, Sicilia. ☉

3. TORDYLIUM umbellulis remotis, foliis pinnatis: pinnis ſubrotundis laciniatis. *Hort. cliff.* 90. *Roy. lugdb.* 94. *apulum.*

Tor-

Tordylium apulum minimum. *Columu. ecphr.* 1. *p* 122. *t.* 124.
Seſeli creticum minimum. *Bauh. pin.* 161.
Habitat in Italiæ, Apuliæ *incultis.*
Umbellulæ ſingulæ floſculi marginales tres majores ſ. radiati.

maximum. 4. TORDYLIUM umbella conferta radiata, foliolis lanceolatis inciſo-ſerratis. *Hort. cliff.* 90. *Roy. lugdb.* 94. *Sauv. monſp.* 230. 259.
Tordylium. *Riv. pent.* 1.
Caucalis maxima, ſphondylii aculeato ſemine. *Bauh. pin.* 152.
Seſeli creticum majus. *Bauh. pin.* 161.
Habitat in Italiæ *ruderatis ſepibus.*

latifolium. 5. TORDYLIUM umbella conferta nudiuſcula, foliis pinnatis: foliolis lanceolatis inciſo-ſerratis.
Caucalis umbella univerſali trifida: partialibus pentaſpermis, foliis pinnatis ſerratis. *Hort. cliff.* 91. *Roy. lugdb.* 95. *Dalib. pariſ.* 84. *Sauv. monſp.* 236.
Caucalis arvenſis echinata latifolia. *Bauh. pin.* 152.
Lappula canaria latifolia. *Bauh. pin.* 3. *p.* 81.
Habitat in Gallia, Italia. ⊙

Anthriſcus. 6. TORDYLIUM umbella, conferta, foliolis ovato-lanceolatis pinnatifidis. *Hort. cliff.* 90. *Fl. ſuec.* 224. *Roy. lugdb.* 94.
Caucalis umbella conferta, foliolis ovato-lanceolatis pinnatifidis. *Guett. ſtamp.* 1. *p.* 81.
Caucalis ſemine aſpero, floſculis rubentibus. *Bauh. pin.* 152. *prodr.* 80.
Caucalis minor, flore rubente. *Moriſ hiſt.* 3. *p.* 308. *ſ.* 9. *t.* 14. *f.* 8.
Habitat in Europæ *ſeptentrionalis arvis ruderatis.* ♂

nodoſum. 7. TORDYLIUM umbellis ſimplicibus ſeſſilibus, ſeminibus exterioribus hiſpidis.
Caucalis umbellis ſeſſilibus ſimplicibus. *Hort. upſ.* 58. *Hort. cliff.* 91. *Roy. lugdb.* 95. *Dalib. pariſ.* 85.
Caucalis nodoſa, echinato ſemine. *Bauh. pin.* 153. *prodr.* 80. *Bauh. hiſt.* 3. *p.* 83.
Habitat in Gallia, Italia *ad vias.* ⊙

CAUCALIS.

grandiflora. 1. CAUCALIS involucris ſingulis pentaphyllis: folio-

lo

lo unico duplo majore. *Hort. cliff.* 91. *Roy. lugdb.* 95 *Sauv. monſp.* 258.

Caucalis involucro univerſali pinnatifido, partialibus indiviſis, umbella multifida. *Fl. ſuec.* 225. *Dalib. pariſ.* 84.

Caucalis arvenſis echinata, magno flore. *Bauh. pin.* 152.

Echinophora flore magno. *Riv. pent.* 25.

Echinophora pycnocarpos. *Columm. ecphr.* 1. *p.* 91. *t.* 94.

Habitat in Europa *auſtraliori inter ſegetes.*

2. CAUCALIS involucro univerſali longitudine umbellæ lanceolato. *daucoides.*

Caucalis dauci ſylveſtris folio, echinato magno fructu. *Magn. monſp.* 292.

Habitat Monſpelii *D. Sauvages.*

Folia *ſupradecompoſita Dauci vulgaris.* Involucrum *univerſale pentaphyllum: foliolis lanceolatis, longitudine totius umbellæ, acuminatis.* Involucra *partialia lato-lanceolata, lateribus membranacea, acuta.* Floſculi *copioſi albi: hermaphroditi* 3 *in radio; floſculis diſci, ſ. maſculis parvis, æqualibus; radii floſculis petalis maximis bipartitis albis. In præcedente involucrum umbella dimidio brevius & radii petala rotundiora.*

3. CAUCALIS involucro univerſali monophyllo, partialibus triphyllis. *Mœhr. E. N. C.* 1742. *vol.* 6. *p.* 401. *mauritanica.*

Caucalis mauritanica vulgari ſimilis, ſed ſemine majore. *Waltp. hort.* 127.

Habitat in Mauritania.

4. CAUCALIS umbella trifida, umbellulis triſpermis, involucris triphyllis. *Hort. cliff.* 91. *Hort. upſ.* 58. *Roy. lugdb.* 95. *Sauv. monſp.* 258. *platycarpos.*

Caucalis monſpelica echinata, magno fructu. *Bauh. pin.* 153.

Echinophora altera aſperior platycarpos. *Col. ecphr.* 1. *p.* 95. *t.* 94.

Habitat in Italia, Monſpelii. ☉

5. CAUCALIS umbellis patentibus, foliolis partialibus ſupradecompoſitis laciniatis: laciniis linearibus. *Roy. lugdb.* 95. *orientalis.*

Caucalis orientalis altiſſima, folio ferulæ. *Tournef. cor.* 23.

Habitat in Oriente. ♂

Q 6. CAU-

leptophylla. 6. CAUCALIS ſeminum aculeis triglochidibus uncinatis: pilis verticillatis hiſpidis. *Guett. ſtamp.* 80. *Dalib. pariſ.* 85.
Caucalis arvenſis echinata, parvo flore & fructu. *Bauh. pin.* 152.
Echinophora tertia leptophyllon purpurea. *Column. ecphr.* 1. *p.* 96. *t.* 97.
Habitat in Gallia, Italia.

ARTEDIA.

ſquamata. 1. ARTEDIA ſeminibus ſquamatis. *Hort. cliff.* 89. *Hort. upſ.* 58. *Roy. lugdb.* 96.
Thapſia orientalis, anethi folio, ſemine eleganter crenato. *Tournef. cor.* 22. *itin.* 3. *p.* 298. *
Gingidium fœniculi folio. *Bauh. pin.* 151.
Gingidium rauwolfii. *Cam. hort.* 67. *t.* 16.
Habitat in Libano. ⊙

muricata. 2. ARTEDIA ſeminibus aculeatis. *Hort. cliff.* 89. *Roy. lugdb.* 96. *Berg. viadr.* 81.
Cauculis major daucoides tingitana. *Moriſ. hiſt.* 3. *p* 308. *ſ.* 9. *t.* 14. *f.* 4.
Echinophora tingitana. *Riv. pent.* 27.
Habitat in Mauritania.

DAUCUS.

Carota 1. DAUCUS ſeminibus hiſpidis. *Hort. cliff.* 89. *Hort. upſ.* 59. *Fl. ſuec.* 223. *Mat. med.* 142. *Roy. lugdb.* 97. *Gron. virg.* 31. *Dalib. pariſ.* 85.
Daucus vulgaris. *Cluſ. hiſt.* 2. *p.* 198.
Paſtinaca tenuifolia ſylveſtris dioſcoridis. *Bauh. pin.* 151.
β. Paſtinaca tenuifolia ſativa radice lutea. *Bauh. pin.* 151.
γ. Daucus ſativus radice atrorubente. *Tournef. inſt.* 307.
Habitat in Europæ *campis exaridis.* ♂

Viſnaga 2. DAUCUS ſeminibus nudis. *Hort. cliff.* 89. *Roy. lugdb.* 97. *Sauv. monſp.* 257.
Gingidium umbella oblonga. *Bauh. pin.* 151.
Gingidium alterum. *Dod. pempt.* 792.
Habitat in Europa *auſtrali.*

Gingidium. 3. DAUCUS radiis involucri planis: laciniis recurvis. *Roy. lugdb.* 97.
Gingidium folio chærophylli. *Bauh. pin.* 151.
Gingidium *Matth. comm.* 372. *t.* 373.

Pa-

Paſtinaca tenuifolia marina, foliis obſcure virentibus & quaſi lucidis. *Magn. monſp.* 199.
Paſtinaca folio œnanthes. *Bocc. ſic.* 74.
Habitat Monſpelii.

AMMI.

1. AMMI foliis inferioribus pinnatis lanceolatis ſerratis, ſuperioribus multifidis linearibus. *Hort. upſ.* 59. *majus.*
Ammi laciniis foliorum caulis lanceolatis. *Hort. cliff.* 89. *Roy. lugdb.* 96. *Sauv. monſp.* 232.
Ammi majus. *Bauh. pin.* 159.
Ammi vulgare. *Dod. pempt.* 415.
Habitat in Europa *auſtrali.* ☉

2. AMMI foliorum omnium laciniis lanceolatis. *Guett. ſtamp.* 2. *p.* 433. * † *glaucifolium*
Ammi petræum glaucifolium perenne. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 295.
Daucus petræus glaucifolius. *Bauh. hiſt.* 3. *p.* 58.
Habitat in Gallia. ♃

BUNIUM.

1. BUNIUM. *Hort. cliff.* 91. *Roy. lugdb.* 107. *Bulbocaſtanum.*
Bunium bulbo globoſo. *Sauv. monſp.* 256.
Bulbocaſtanum majus, folio apii. *Bauh. pin.* 162.
Nucula terreſtris. *Lob. hiſt.* 429.
Habitat in Germania, Anglia Gallia.

CONIUM.

1. CONIUM ſeminibus ſtriatis. *Hort. upſ.* 92. *Fl. ſuec.* 226. *Roy. lugdb.* 107. *maculatum.*
Cicuta major. *Bauh. pin.* 160.
Cicutaria major vulgaris. *Cluſ. hiſt.* 2. *p.* 200.
Habitat in Europæ *cultis, agris, ruderatis.* ♂

2. CONIUM ſeminibus aculeatis. *Hort. cliff.* 92. * *Roy. lugdb.* 107. *africanum.*
Caucalis africana, folio minore rutæ. *Boerh. lugdb.* 1. *p.* 63. *t.* 63.
Habitat in Africa.

3. CONIUM ſeminibus radiato ſpinoſis. *Roy. lugdb* 107. *Royeni.*
Habitat - - - - -

SELINUM.

ſylveſtre. 1. SELINUM radice fuſiformi multiplici. *Hort. cliff.* 93. *Hort. upſ.* 59. *Roy. lugdb.* 106.
Apium ſylveſtre, lacteo ſucco turgens. *Bauh. pin.* 153
Tyſſelinum plinii. *Lob. hiſt.* 409. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 319. *ſ.* 9. *t.* 17. *f.* 2.
Habitat in Harcynia, Gallia. ♃

paluſtre. 2. SELINUM ſublacteſcens, radice unica. *Hall. helv.* 443.
Selinum foliolis & lacinulis oblongo-linearibus. *Guett. ſtamp.* 2. *p.* 70.
Tyſſelinum paluſtre lacteſcens. *Fl. lapp.* 110. *Fl ſuec.* 227. *Hort. cliff.* 92. *Roy. lugdb.* 116.
Seſeli paluſtre lacteſcens. *Bauh. pin.* 162. *prodr.* 85.
Habitat in Europæ *ſeptentrionalis paludibus.* ♃

ATHAMANTA.

Libanotis. 1. ATHAMANTA foliis bipinnatis planis, umbella hemiſphærica, ſeminibus hirſutis. *Fl. ſuec.* 226.
Libanotis pinnulis circa coſtam decuſſatis. *Hall. helv.* 451.
Libanotis minor, apii folio. *Bauh. pin.* 157.
Daucus montanus, apii folio. *Bauh pin.* 150. *prodr.* 77.
Daucus montanus, pimpinellæ ſaxifragæ hircinæ folio. *Pluk. alm.* 129. *t.* 173. *f.* 1.
Habitat in SuecIæ, Germaniæ *pratis ſiccis apricis.* ♃

ſibirica. 2. ATHAMANTA foliis pinnatis inciſo-angulatis.
Selinum foliis ſimpliciter pinnatis inciſo-angulatis. *Hort. upſ.* 60. *
Habitat in Sibiria. ♃

Oreoſelinum 3. ATHAMANTA foliolis divaricatis.
Selinum foliolis ovato-acutis acute ſerratis & inciſis. *Hort. cliff.* 92. *Roy. lugdb.* 106.
Selinum foliolis lacinulisque oblongo-linearibus. *Guett. ſtamp.* 1. *p.* 70.
Selinum pinnis ad angulos obtuſos pinnatis: pinnulis inciſis non ſerratis. *Hall. helv.* 444.
Apium montanum, folio ampliore. *Bauh. pin.* 153.
Oreoſelinum. *Cluſ. hiſt.* 2. *p.* 195. *Riv. pent.* 8.
Habitat in Germaniæ, Galliæ, Angliæ *collibus apricis* ♃

ſicula. 4. ATHAMANTA foliis inferioribus nitidis, umbellis primordialibus ſubſeſſilibus, ſeminibus piloſis. *Hort upſ.* 60.

Atha-

Athamanta foliolis multifidis planis, ſeminibus villoſis. *Hort. cliff.* 93. *Roy. lugdb.* 97.
Daucus ſecundus ſiculus, ſophiæ folio. *Zan. hiſt.* 80.
Habitat in Sibiria. ♃

5. ATHAMANTA foliolis linearibus planis hirſutis, petalis bipartitis, ſeminibus oblongis hirſutis. *Mat. med.* 143. *cretenſis.*
Athamanta foliis capillaribus, ſeminibus hirſutis. *Hort.* 93. *Roy. lugdb.* 97.
Daucus foliis fœniculi tenuiſſimis. *Bauh. pin.* 150.
Daucus creticus. *Cam. epit.* 536.
Habitat in Helvetia.

6. ATHAMANTA foliis multipartitis: laciniis linearibus teretiuſculis acuminatis. *Roy. lugdb.* 98. *annua.*
Myrrhis annua, ſemine ſtriato villoſo, incana. *Moriſ. umb.* 67.
Myrrhis tenuifolia annua cretica, ſemine lanugine alba pubeſcente. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 302.
Habitat in Creta. ☉

7. ATHAMANTA ſeminibus membranaceo-ſtriatis, foliis ſupradecompoſitis lævibus multifidis. *chinenſis.*
Habitat - - - Chinenſem dixit Barthram, qui ſemina miſit ex Virginia.
Caulis *angulatus, lævis, erectus, parum flexuoſus.* Folia *Chærophylli, lævia.* Umbella *minus expanſa, alba.* Semina *ſingula 5 alis longitudinalibus parvis; involucrum duplex.*

8. ATHAMANTHA foliolis capillaribus, ſeminibus glabris ſtriatis. *Hort. cliff.* 93. *Hort. upſ.* 60. *Mat. med.* 144. *Roy. lugdb.* 97. *Sauv. monſp.* 256. *Meum.*
Meum foliis anethi. *Bauh. pin.* 148.
Meum. *Dod. pempt.* 305.
Habitat in Alpibus Italiæ, Hiſpaniæ, Helvetiæ. ♃

PEUCEDANUM.

1. PEUCEDANUM foliis quinquies tripartitis filiformibus linearibus. *officinale.*
Peucedanum foliis quinquies tripartitis lineari-ſubulatis integerrimis. *Hort. cliff.* 93. *Hort. upſ.* 60. *Mat. med.* 126. *Roy. lugdb.* 98. *Sauv. monſp.* 182. 257.
Peucedanum. *Bauh. hiſt.* 3. *p.* 36. *Raj. hiſt.* 416.
α. Peucedanum germanicum. *Bauh. pin.* 149.

β Peucedanum majus italicum. *Bauh. pin.* 149.
Habitat in Europæ *auſtralioris pratis pinguibus*; ♃

alpeſtre. 2. PEUCEDANUM foliolis linearibus ramoſis. *Hort. cliff.* 94. *Roy. lugdb.* 98.
Ferula, foliis ſibanotidis brevioribus, alpeſtris, umbellis ampliſſimis. *Bœrh. lugdb.* 1. *p.* 65.
Habitat - - - -

Silaus. 3. PEUCEDANUM foliolis pinnatifidis: laciniis oppoſitis. *Hort. cliff.* 94. *Roy. lugdb.* 98. *Sauv. monſp.* 257.
Seſeli pratenſe. *Bauh. pin.* 162.
Siler alterum pratenſe. *Dod. pempt.* 310.
Habitat in Helvetia, Narbona.

nodoſum. 4. PEUCEDANUM foliolis alternatim multifidis. *Hort. cliff.* 94. *Roy. lugdb.* 98.
Silaum (quod Liguſticum creticum, folio fœniculi, caule nodoſo. *Tourneſ. cor.* 23.) *Bœrh. lugdb.* 1. *p.* 51.
Habitat in Creta.

CRITHMUM.

maritimum. 1. CRITHMUM foliolis lanceolatis carnoſis. *Hort. cliff. Hort. upſ.* 61. *Roy. lugdb.* 98. *Sauv. monſp.* 258.
Crithmum ſ. Fœniculum maritimum minus. *Bauh. pin.* 288.
Fœniculum marinum ſ. Empetrum ſ. Calcifraga. *Lob. ic.* 392.
Habitat ad oceani Europæi *litora* ♃

pyrenaicum. 2. CRITHMUM foliolis lateralibus bis trifidis. *Hort. cliff.* 98. *Roy. lugdb.* 58.
Apium pyrenaicum, thapſiæ facie. *Tourneſ. inſt.* 305.
Habitat in pyrenæis.

CACHRYS.

Libanotis. 1. CACHRYS foliis pinnatis: foliolis acutis multifidis. *Hort. cliff.* 94. *Roy. lugdb.* 99. *Sauv. monſp.* 105.
Cachrys ſemine fungoſo ſulcato plano minore, foliis peucedani anguſtis. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 267. *ſ.* 9. *t.* 1. *f.* 5. 6.
Libanotis ferulæ folio, ſemine anguloſo. *Bauh. pin.* 158.
Habitat in Sicilia, Monſpelii. ♃

FERULA.

communis. 1. FERULA foliolis linearibus longiſſimis ſimplicibus *Hort.*

Hort. cliff. 95. *Hort. upſ.* 61. *Roy. lugdb.* 99. *Sauv. monſp.* 257.
Ferula femina plinii. *Bauh. pin.* 148.
Ferula. *Dod. pempt.* 321.
Habitat in Europa *auſtrali.* ♃

2. FERULA foliolis multipartitis: laciniis linearibus planis. *Hort. cliff.* 95. *Roy. lugdb.* 99. *glauca.*
Ferula folio glauco, ſemine lato oblongo. *Bauh. hiſt.* 3. *p.* 45.
Habitat in Sicilia, Italia. ♃

3. FERULA foliolis laciniatis: lacinulis tridentatis inæqualibus. *Hort. cliff.* 95. *Hort. upſ.* 61. *Roy. lugdb.* 99. *tingitana.*
Ferula tingitana, folio latiſſimo lucido. *Herm. par.* 165. t. 165.
Habitat in Hiſpania, Barbaria. ♃

4. FERULA foliis pinnatifidis: pinnis linearibus planis trifidis. *Hort. cliff.* 95. *Roy. lugdb.* 99. *Ferulago.*
Ferula latiore folio. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 309. *ſ.* 9. *t.* 15. *f.* 1.
Ferulago latiore folio. *Bauh. pin.* 148.
Habitat in Sicilia.

5. FERULA foliorum pinnis baſi nudis, foliolis ſetaceis. *Hort. cliff.* 95. *Roy. lugdb.* 100. *orientalis.*
Ferula orientalis, folio & facie cachryos. *Tournef. cor.* 22. *itin.* 3. *p.* 239. *t.* 239.
Habitat in Oriente.

6. FERULA foliorum pinnis utrinque baſi auctis: foliolis ſetaceis. *Hort. cliff.* 95. *Roy. lugdb.* 100. *meoides.*
Laſerpitium orientale, folio mei, flore luteo. *Tournef. cor.* 23.
Habitat in Oriente.

7. FERULA foliolis appendiculatis, umbellis ſubſesſilibus. *nodiflora.*
Ferula foliorum alis utrinque auctis: foliolis linearibus integerrimis, umbellis terminatricibus ſubſeſſilibus. *Roy. lugdb.* 100. *Hort. upſ.* 61.
Libanotis ferulæ folio & ſemine. *Bauh. pin.* 158.
Panax aſclepium ferulæ facie. *Lob. ic.* 783.
Habitat in Europa *auſtrali*, Iſtria. ♃

8. FERULA lucida canadenſis *Gron. virg.* 147. *Hort. upſ.* 61. *canadenſis.*
Habitat in Virginia. ♃

Aſſa fœtida. 9. FERULA foliolis alternatim ſinuatis obtuſis. *Mat. med.* 118.
Aſſa fœtida diſgunenſis umbellifera liguſtico affinis. *Kæmpf. amœn.* 535. *t.* 536.
Habitat in Perſia. ♃

LASERPITIUM

latifolium. 1. LASERPITIUM foliolis cordatis inciſo-ſerratis. *Hort. cliff.* 96. *Fl. ſuec.* 230. *Mat. med.* 123. *Roy. lugdb.* 101. *Hall. helv.* 440.
Libanotis latifolia altera ſ. vulgatior. *Bauh. pin.* 157.
Libanotis latifolia major. *Bauh. pin.* 159.
Seſeli æthiopicum herba. *Dod. pempt.* 312.
Habitat in Europæ *nemoribus ſiccis* ♃

trilobum. 2. LASERPITIUM foliolis trilobis inciſis.
Libanotis latifolia, aquilegiæ folio. *Bauh. pin.* 157. *prodr.* 83.
Angelica foliolis tripartitis; lobis ſuperne inciſis obtuſis. *Roy. lugdb.* 104.
Habitat in Gorgano *monte.* ♃

gallicum. 3. LASERPITIUM foliolis cuneiformibus furcatis.
Laſerpitium foliolis ramuloſis ſeſſilibus. *Roy. lugdb.* 101.
Laſerpitium foliolis quinquelobis. *Hort. cliff.* 96.
Laſerpitium gallicum. *Bauh. pin.* 150.
Laſerpitium e regione maſſiliæ allatum. *Bauh. hiſt.* 3. *p.* 137.
Habitat in Europa *auſtrali.*

anguſtifolium. 4. LASERPITIUM foliolis lanceolatis integerrimis ſeſſilibus. *Hort. cliff.* 96. *Roy. lugdb.* 102.
Laſerpitium anguſtifolium majus, ſegmentis longioribus & indiviſis. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 321. *ſ.* 9. *t.* 19. *f.* 9.
Laſerpitium foliis longioribus dilute virentibus conjugatim poſitis. *Pluk. alm.* 207. *t.* 198. *f.* 4.
Habitat in Europa *auſtrali.* ♃

prutenicum. 5. LASERPITIUM foliolis lanceolatis integerrimis: extimis coalitis. *Hort. cliff.* 96. *Bœhm. lipſ.* 208.
Laſerpitium foliis radicalibus patentiſſimis. *Roy. lugdb.* 103.
Laſerpitium daucoides prutenicum, viſcoſo ſemine. *Breyn. cent.* 167. *t.* 84.
Habitat in Boruſſia, Lipſiæ. ♃

6. LA-

6. LASERPITIUM foliolis lanceolatis integerrimis pe- *Siler.*
tiolatis. *Hort. cliff.* 96. *Mat. med.* 124.
Liguſticum quod Seſeli officinarum. *Bauh. pin.* 162.
Siler montanum. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 276. *ſ.* 9. *t.* 13. *f.* 1.
Habitat in Auſtria, Helvetia, Gallia. ♃

7. LASERPITIUM foliolis oblique cordatis, petiolis *Chironium.*
hirſutis.
Panax Heracleum. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 315. *ſ.* 9. *t.* 17. *f.* 1.
Panax paſtinacæ folio. *Bauh. pin.* 156.
Panaces peregrinum. *Dod. pempt.* 309.
Habitat Monſpelii. ♃
Folia *integra, cordata, lobo ſuperiore breviore, crenata, obtuſa.* Petioli *valde hirſuti.* Involucrum *parvum, tam univerſale, quam partiale; hinc diverſa a Paſtinaca Coſtina.*

HERACLEUM

1. HERACLEUM foliolis pinnatifidis. *Hort. cliff.* 103. *Sphondylium.*
Fl. ſuec. 231. *Roy. lugdb.* 113.
Sphondylium vulgare hirſutum. *Bauh. pin.* 157.
β. Sphondylium hirſutum, foliis anguſtioribus. *Bauh. pin.* 157. *prodr.* 83.
Habitat in Europæ *nemoroſis.* ♂

2. HERACLEUM foliis pinnatis: foliolis quinis: in- *ſibiricum.*
termediis ſeſſilibus, corollulis uniformibus. *Hort. upſ.* 65. *
Habitat in Sibiria. ♂
Flores huius viridi-lutei, at prioris albi.

3. HERACLEUM foliis pinnatis; foliolis quinis: in- *Panaces.*
termediis ſeſſilibus, floribus radiatis. *Hort. upſ.* 65. *
Heracleum foliolis palmatis ſerratis. *Hort. cliff.* 103.
Roy. lugdb. 113.
Panax ſphondylii folio ſ. Heracleum. *Bauh. pin.* 157.
Habitat in Apenninis, Sibiria. ♂

4. HERACLEUM foliis pinnatis utrinque ſcabris, flo- *auſtriacum.*
ribus radiatis.
Sphondylium alpinum parvum. *Bauh. pin.* 157.
Habitat in Alpibus Auſtriæ.
Planta *pedalis.* Folia *pinnata: foliolis* 5, *ovato-oblongis, ſeſſilibus, ſerratis, utrinque ſcabris, parum inciſis, petiolis inferne membranaceis.* Umbella *alba, radiata.* Differt *a* 3 *parvitate, foliis non ſubtus tomentoſis, nec extimis coadunatis; foliolis demum magis integris.*

5. HE-

alpinum. 5. HERACLEUM foliis ſimplicibus, floribus radiatis. Sphondylium alpinum glabrum. *Bauh. pin.* 157. *prodr.* 83. *t.* 83.
Sphondylium montanum glabrum, albo flore. *Barr. ic.* 55.
Habitat in Helvetiæ *Alpibus.*

LIGUSTICUM.

Leviſticum. 1. LIGUSTICUM foliis multiplicibus: foliolis ſuperne inciſis. *Hort. cliff.* 97. *Hort. upſ.* 62. *Mat. med.* 119. *Roy. lugdb.* 104. *Sauv. monſp.* 261.
Liguſticum vulgare. *Bauh. pin.* 157.
Leviſticum vulgare. *Morij hiſt.* 3. *p.* 275. *ſ.* 9. *t.* 3. *f.* 1.
Habitat in Apenninis Liguriæ. ♃

ſcothicum. 2. LIGUSTICUM foliis biternatis.
Liguſticum foliis duplicato-ternatis. *Hort. cliff.* 97. *Fl. ſuec.* 232. *Roy. lugdb.* 104. *Gron. virg.* 31.
Liguſticum humilius ſcothicum. *Pluk. alm.* 217. *t.* 96. *f.* 2.
Apium maritimum. *Fl. lapp.* 107.
Seſeli maritimum ſcothicum. *Herm. par.* 227. *t.* 227.
Habitat ad litora Maris in Anglia, Suecia.

peleponneſiacum. 3. LIGUSTICUM foliis multiplicato-pinnatis: foliolis pinnatim inciſis. *Hort. cliff.* 97. *Roy. lugdb.* 104. *Sauv. monſp.* 259.
Cicutaria latifolia fœtida. *Bauh. pin.* 161.
Seſeli peleponneſiacum. *Cam. epit.* 514.
Habitat in Peleponeſiacis & Rheticis *montibus nemoroſis.* ♂

auſtriacum. 4. LIGUSTICUM foliis bipinnatis: foliolis confluentibus inciſis integerrimis.
Seſeli montanum, cicutæ folio, glabrum. *Bauh. pin.* 161.
Seſeli 1. montanum pannonicum. *Cluſ. hiſt.* 2. *p.* 193.
Habitat in Auſtriæ *alpinis.*

ANGELICA.

Archangelica. 1. ANGELICA foliorum impari lobato. *Fl. lapp.* 101. *Fl. ſuec.* 233. *Mat. med.* 120. *Hort. cliff.* 97. *Roy. lugdb.* 103.
Angelica ſativa. *Bauh. pin.* 155.
Angelica major. *Dod. pempt.* 318.

β Ar-

β. Archangelica *Cluſ. hiſt.* 2. *p.* 295.
Habitat in Alpibus Lapponiæ, *ad rivulos.* ♂

2. ANGELICA foliis æqualibus ovato-lanceolatis ſerratis. *Hort. cliff.* 97. *Fl. ſuec.* 234. *Mat. med.* 121. *Gron. virg.* 31. *Hall. helv.* 444. *Roy. lugdb.* 103. *ſylveſtris.*
Angelica ſylveſtris major. *Bauh. pin.* 155.
Angelica ſylveſtris *Dod. pempt.* 318. *Fl. lapp.* 102.
Habitat in Europæ *frigidioris ſubhumidis ſylvaticis.* ♃

3. ANGELICA extimo foliorum pari coadunato: folio terminali petiolato. *Roy. lugdb.* 103. *atropurpurea.*
Angelica canadenſis atropurpurea. *Corn. canad.* 198. *t.* 199.
Habitat in Canada.

4. ANGELICA foliolis æqualibus ovatis inciſo-ſerratis. *Hort. cliff.* 97. *Hort. upſ.* 62. *Roy. lugdb.* 103. *lucida.*
Angelica lucida canadenſis. *Corn. canad.* 196. *t.* 197. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 281. *ſ.* 9. *t.* 3. *f.* 8.
Habitat in Canada. ♂

SIUM.

1. SIUM foliis pinnatis, umbella terminali. *Hort. cliff.* 98. *Fl. ſuec.* 235. *Roy. lugdb.* 104, *Hall. helv.* 435. *latifolium.*
Sium latifolium. *Bauh. pin.* 154.
Sium. *Riv. pent.* 78.
Habitat in Europæ *rivulis & ad ripas paludoſas.* ♃

2. SIUM foliis pinnatis, umbellis axillaribus ſeſſilibus. *Hort. cliff.* 98. *Roy. lugdb.* 105. *Sauv. monſp.* 231. *nodiflorum.*
Sium aquaticum procumbens, ad alas floridum. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 283. *ſ.* 9. *t.* 5. *f.* 3.
Habitat in Europa *ad ripas fluviorum.*

3. SIUM foliis pinnatis, floralibus ternatis. *Hort. cliff.* 98. *Hort. upſ.* 62. *Roy. lugdb.* 104. *Siſarum.*
Siſarum germanorum. *Bauh. pin.* 155.
Siſarum. *Dod. pempt.* 681.
Habitat in China.? ♃

4. SIUM foliis ſerratis pinnatis rameis ternatis. *vide Mat. med.* 117. † *Ninſi.*
Siſarum montanum coræenſe, radice non tuberoſa. *Kæmpf. amœn.* 817. *t.* 818.
Habitat in China. ♃

5. SIUM foliis pinnatis, foliolis lanceolatis ſubintegerrimis. *rigidius.*

Pim-

Pimpinella foliolis lanceolatis glabris acuminatis ſæpius integerrimis, rarius ſerratura notatis. *Gron. virg.* 32.
Oenanthe maxima virginiana, pæoniæ feminæ foliis. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 288. *ſ.* 11. *t.* 7. *f.* 1.
Habitat in Virginia. ♃

Falcaria. 6. SIUM foliolis linearibus decurrentibus connatis. *Hort. cliff.* 98. *Roy. lugdb.* 105. *Sauv. monſp.* 232.
Eryngium arvenſe, foliis ſerratis. *Bauh. pin.* 386.
Ammi perenne repens, *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 294. *ſ.* 9. *t.* 8. *f.* 1.
Habitat in Flandria, Helvetia, Bohemia, Alſatia, Gallia. ♃

græcum. 7. SIUM foliis bipinnatis. *Hort. cliff.* 98. * *Roy. lugdb.* 105.
Liguſticum græcum, folio apii, *Tournef. cor.* 23.
Habitat in Græcia.

ſiculum. 8. SIUM foliis radicalibus ternatis, caulinis bipinnatis. *Roy. lugdb.* 105.
Myrrhis foliis paſtinacæ læte virentibus. *Tournef. cor.* 22.
Daucus, paſtinacæ folio, ſiculus, *Zan. hiſt.* 78. *t.* 30.
Habitat in Sicilia.

SISON.

Amomum. 1. SISON foliis pinnatis, umbellis erectis. *Roy. lugdb.* 105. *Sauv. monſp.* 232.
Siſon foliis pinnatis. *Hort. cliff.* 98.
Siſon quod Amomum officinis noſtris. *Bauh. pin.* 154.
Petroſelinum macedonicum fuchſii. *Dod. pempt.* 697.
Habitat in Angliæ *humectis lutoſis.*

ſegetum. 2. SISON foliis pinnatis, umbellis cernuis. *Roy. lugdb.* 105. *Hort. upſ.* 63.
Sium terreſtre, umbellis rarioribus. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 283. *ſ.* 6. *t.* 5. *f.* 6.
Habitat in Angliæ *agris inter ſegetes.* ♂

canadenſe. 3. SISON foliis ternatis. *Hort. cliff.* 99. *Gron. virg.* 147. *Roy. lugdb.* 106.
Myrrhis canadenſis trilobata. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 301. *ſ.* 9. *t.* 11. *f.* 4.
Habitat in Ameriaca *ſeptentrionali.* ♃

Ammi. 4. SISON foliolis caulinis ſubcapillaribus. *Hort. upſ.* 63. *Mat. med.* 140.

Am-

Ammi lacinulis foliorum caulis capillaribus. *Hort. cliff.* 89. *Roy. lugdb.* 96.
Ammi parvum, foliis fœniculi. *Bauh. pin.* 159.
Ammi. *Cam. epit.* 522.
Habitat in Apulia, Ægypto. ☉

5. SISON repens, umbellis bifidis. *It. ſcan.* 397. * *inundatum.*
Sium foliis ſubmerſis capillaribus, emerſis pinnatis. *Roy. lugdb.* 105. *Sauv. meth.* 232.
Sium minimum, foliis imis ferulaceis. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 223. *ſ.* 9. *t.* 9. *f.* 5.
Sium minimum umbellatum, folio varians. *Pluk. phyt.* 61. *f.* 3.
Habitat in Europæ *inundatis.*

6. SISON foliolis verticillatis capillaribus. *verticillatum.*
Carum foliolis ſetaceis verticillatis, radice napiformi. *Sauv. monſp.* 168.
Bunium bulbis oblongis. *Sauv. monſp.* 256.
Oenanthe foliis pinnatis: foliolis lineariter laciniatis. *Dalib. pariſ.* 90.
Daucus pratenſis, millefolii paluſtris folio. *Bauh. pin.* 150.
Daucus pratenſis. *Dalech. hiſt.* 718.
Carvi foliis tenuiſſimis, aſphodeli radice. *Tourneſ. inſt.* 90.
Habitat in Gallia, Pyrenæis. ♃
Involucrum *huic univerſale & partiale.*

BUBON.

1. BUBON foliolis rhombeo-ovatis crenatis, umbellis numeroſiſſimis. *Hort. cliff.* 95. *Hort. upſ.* 62. *Mat. med.* 133. *Roy. lugdb.* 100. *macedonicum.*
Apium macedonicum. *Bauh. pin.* 154.
Petroſelinum macedonicum. *Lob. ic.* 708.
Habitat in Macedonia. ♂

2. BUBON foliolis rhombeis ſerratis glabris, umbellis paucis. *Hort. cliff.* 96. *Mat. med.* 132. *Roy. lugdb.* 100. *Galbanum.*
Aniſum africanum fruticeſcens, folio aniſi, galbaniferum. *Pluk. alm.* 31. *t.* 12. *f.* 2.
Ferula africana galbanifera, folio & facie liguſtici. *Herm. par.* 163. *t.* 163.
Habitat in Æthiopia. ♄

3. DU-

gummiferum. 3. BUBON foliolis glabris: inferioribus rhombeis ſerratis; ſuperioribus pinnatifidis tridentatis. *Roy. lugdb.* 100.
Ferula africana galbanifera, folio myrrhidis. *Comm. hort* 2. *p.* 115. *t.* 58.
Habitat in Æthiopia. ♄

rigidum. 4. BUBON foliolis linearibus *Hort. cliff.* 95. *Roy lugdb.* 100.
Ferula durior ſ. rigidis & breviſſimis foliis. *Bocc muſ.* 2. *p.* 84. *t.* 76. *Barr. rar.* 61. *t.* 77.
Habitat in Sicilia. ♃

CUMINUM.

Cuminum. 1. CUMINUM. *Mat. med.* 139.
Cuminum ſemine longiore. *Bauh. pin.* 146.
Cuminum ſativum. *Cam. epit.* 518.
Habitat in Ægypto, Æthiopia. ☉

OENANTHE.

fiſtuloſa. 1. OENANTHE ſtolonifera, foliis caulinis pinnatis filiformibus fiſtuloſis.
Oenanthe foliis caulinis fiſtuloſis teretibus. *Hort. cliff.* 99. *Fl. ſuec.* 236. *Roy. lugdb.* 108. *Hall. helv.* 432.
Oenanthe aquatica. *Bauh. pin.* 162. *It. ſcan.* 243.
Oenanthe. *Riv. pent.* 66.
Habitat in Europæ *foſſis, paludibus.* ♃

crocata. 2. OENANTHE foliis omnibus multifidis obtuſis ſubæqualibus. *Hort. cliff.* 99. *Fl. ſuec.* 237. *Roy. lugdb.* 107.
Oenanthe chærophylli foliis. *Bauh. pin.* 162.
Oenanthe cicutæ facie, ſucco viroſo crocante. *Lob. adv.* 326. *Act. angl.* 1747. *n.* 480. *p.* 235. *t.* 3.
Habitat in Europæ *paludibus.* ♃

prolifera. 3. OENANTHE umbellularum pedunculis marginalibus longioribus ramoſis maſculis. *Hort. upſ.* 63.
Oenanthe floſculis diſci ſeſſilibus radii pedunculo ramoſo elevatis. *Vir. cliff.* 24. *Roy. lugdb.* 108.
Oenanthe floſculis radiantibus umbellarum proliferis. *Hort. cliff.* 99.
Oenanthe prolifera apula. *Bauh. pin.* 163. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 289. *ſ.* 9. *t.* 7. *f.* 5.
Habitat in Sicilia, Apulia. ♃

4. OE-

4. OENANTHE fructibus globoſis. *Hort. cliff.* 99. *Roy. lugdb.* 108. *globuloſa.*
Oenanthe luſitanica, ſemine craſſiore globoſo. *Tournef. inſt.* 313.
Habitat in Luſitania.

5. OENANTHE foliolis radicalibus ovatis inciſis, caulinis integris linearibus longiſſimis ſimplicioribus. *Hort. cliff.* 99. *Roy. lugdb.* 108. *Sauv. monſp.* 259. *pimpinelloides.*
Oenanthe apii folio. *Bauh. pin.* 162.
Oenanthe paſtinacæ ſylveſtris folio, ſemine atriplicis. *Bauh. pin.* 162.
Oenanthe aquatica pimpinellæ ſaxifragæ diviſura. *Pluk. alm.* 268. *t.* 49. *f.* 4.
Habitat Monſpelii & *in* Europa *auſtrali.*

PHELLANDRIUM.

1. PHELLANDRIUM foliorum ramificationibus divaricatis. *aquaticum.*
Phellandrium. *Hort. cliff.* 100. *Fl. ſuec.* 238. *Roy. lugdb.* 108. *Dod. pempt.* 591
Cicutaria paluſtris tenuifolia. *Bauh. pin.* 161.
Habitat in Europæ *foſſis.* ♂

2. PHELLANDRIUM caule ſubnudo, foliis pinnatis. *Mutellina.*
Meum alpinum, umbella purpuraſcente. *Bauh. pin.* 148.
Mutellina. *Bauh. hiſt.* 3. *p.* 66. *Cam. epit.* 8.
Habitat in Helvetia. ♃

CICUTA.

1. CICUTA umbellis folio oppoſitis, petiolis marginatis obtuſis. *viroſa.*
Cicuta. *Hort. cliff.* 100. *Mat. med.* 129. *Fl. ſuec.* 239. *Roy. lugdb.* 109.
Cicuta aquatica. *Fl. lapp.* 103.
Sium erucæ folio. *Bauh. pin.* 154.
Habitat in paludibus Europæ *ſterilibus.* ♃

2. CICUTA ramis bulbiferis. *bulbifera.*
Ammi foliorum lacinulis capillaribus, caule angulato. *Gron. virg.* 31.
Umbellifera aquatica, foliis in minutiſſima & plane capillaria ſegmenta diviſis. *Raj. ſuppl.* 260.
Habitat in Virginia, Canada.

maculata. 3. CICUTA foliorum ſerraturis mucronatis, petiolis membranaceis apice bilobis.
Ægopodium foliolis lanceolatis acuminatis ſerratis. *Gron. virg.* 32.
Angelica caribæarum elatior, oluſatri folio, flore albo, ſeminibus luteis ſtriatis, cumini odore & ſapore. *Pluk. alm.* 31. *t.* 76. *f.* 1.
Angelica virginiana, foliis acutioribus, ſemine ſtriato minore, cumini ſapore & odore. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 281.
Habitat in Virginiæ *aquoſis.*

ÆTHUSA.

Cynapium. 1. ÆTHUSA. *Hort. cliff.* 100. *Fl. ſuec.* 240. *Roy. lugdb.* 109. *Hall. helv.* 433.
Cicuta minor, petroſelino ſimilis. *Bauh. pin.* 160.
Cicutaria fatua. *Lob. ic.* 280.
Habitat inter Europæ *olera.* ☉

CORIANDRUM.

ſativum. 1. CORIANDRUM fructibus globoſis. *Hort. cliff.* 100. *Hort. upſ.* 65. *Mat. med.* 135. *Roy. lugdb.* 109. *Sauv. monſp.* 260.
Coriandrum majus. *Bauh. pin.* 158.
Coriandrum. *Cam. epit.* 523.
Habitat in Italiæ *agris.* ☉

teſticulatum. 2. CORIANDRUM fructibus didymis. *Hort. cliff.* 100. *Roy. lugdb.* 109. *Sauv. monſp.* 260.
Coriandrum minus teſticulatum. *Bauh. pin.* 158. *Pluk. alm.* 120. *t.* 169. *f.* 2.
Coriandrum minus odorum. *Bauh. hiſt.* 3. *p.* 91.
Habitat in Europæ *auſtralis agris.* ☉

SCANDIX.

odorata. 1. SCANDIX ſeminibus ſulcatis angulatis. *Hort. cliff.* 101. *Hort. upſ.* 64. *Roy. lugdb.* 111. umbellarum diſco maſculo.
Myrrhis major, Cicutaria odorata. *Bauh. pin.* 160.
Myrrhis. *Dod. pempt.* 701.
Habitat in alpibus Alvarniæ. ♃

Pecten. ☿ 2. SCANDIX ſeminibus lævibus roſtro longiſſimo. *Hort. cliff.* 101. *Hort. upſ.* 64. *Roy. lugdb.* 111.
Scandix, ſemine roſtrato, vulgaris. *Bauh. pin.* 152.
Pe-

Pecten veneris. *Cam. epit.* 302.
Habitat inter Germaniæ *&* Europæ *auſtralioris ſegetes.* ⊙

3 SCANDIX ſeminibus nitidis ovato-ſubulatis. *Hort. cliff.* 110. *Fl. ſuec.* 242. *Mat. med.* 137. *Gron. virg.* 32. *Roy. lugdb.* 111. *Cerefolium.*
Chærophyllum ſeminibus lævibus, umbellis ad nodos ſeſſilibus. *Bœhm. lipſ.* 492.
Chærophyllum ſativum. *Bauh. pin.* 152
Chærefolium. *Dod. pempt.* 700.
Habitat in apris & arvis Europæ *auſtralioris* ⊙

SCANDIX ſeminibus ovatis hiſpidis, corollis uniformibus, caule lævi. *Anthriſcus.*
Scandix ſeminibus hiſpidis. *Hort. cliff.* 101. *Fl. ſuec.* 241. *Roy. lugdb.* 111.
Myrrhis ſylveſtris, ſeminibus aſperis. *Bauh. pin.* 160.
Myrthis ſylveſtris æquicolorum. *Column. ecphr.* 1. *p.* 110. *t.* 112.
Habitat in Europæ *aggeribus terrenis.* ⊙

5. SCANDIX ſeminibus ſubulatis hiſpidis, floribus radiatis, caulibus lævibus *auſtralis.*
Scandix ſeminibus roſtratis patulis pedunculo brevioribus. *Sauv. monſp.* 260.
Scandix cretica minor. *Bauh. pin.* 152.
Scandix, ſemine roſtrato, italica. *Bauh. prodr.* 78.
Aniſomarathrum. *Col. ecphr.* 1. *p.* 89. *t.* 90.
Habitat in G. Narbonenſi, Italia, Creta. ⊙

6. SCANDIX ſeminibus ſubcylindricis hiſpidis, caule hiſpido, geniculis tumidis. *nodoſa*
Chærophyllum articulis tumidis, umbella univerſali trifida. *Hort. cliff.* 102. *Roy. lugdb.* 112.
Cerefolium annuum nodoſum, ſemine aſpero majore. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 303. *ſ.* 9. *t.* 10. *f.* 4.
Myrrhis nodoſa annua, ſemine aſpero. *Moriſ. blæſ.* 288.
Habitat in Sicilia. ⊙

7. SCANDIX ſeminibus pedunculo villoſo brevioribus. *Roy. lugdb.* 111. *grandiflora.*
Scandix orientalis, flore maximo. *Tournef. cor.* 23
Habitat in Oriente.

8. SCANDIX ſeminibus nitidis ovato-ſubulatis, foliis decompoſitis. *Gron. virg.* 147. *procumbens*

R Cere-

Cerefolium virginianum procumbens, fumariæ foliis. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 303. *ſ.* 11. *t.* 11. *f. ult.*
Habitat in Virginia.

CHÆROPHYLLUM.

* *Floribus omnibus hermaphroditis.*

ſylveſtre. 1. CHÆROPHYLLUM floſculis omnibus fertilibus, caule æquali.
Chærophyllum ſeminibus lævibus nitidis, petiolis rameis æqualibus. *Hort. cliff.* 101. *Fl. ſuec.* 243. *Roy lugdb.* 112. *Mat. med.* 143.
Chærophyllum ſylveſtre perenne, cicutæ folio. *Tournef. inſt.* 314. *Fl. lapp.* 104.
Myrrhis ſylveſtris, ſeminibus lævibus. *Bauh. pin.* 160
Cicutaria vulgaris. *Dod. pempt.* 701.
Habitat in Europæ *pomariis & cultis.* ♃

bulboſum. 2. CHÆROPHYLLUM caule lævi: geniculis tumidis.
Chærophyllum foliis ſupradecompoſitis: caulinis articulis lævibus ſuperne incraſſatis. *Hort. upſ.* 64.
Chærophyllum radice turbinata carnoſa. *Hort. cliff.* 102. *Roy. lugdb.* 112.
Cicutaria bulboſa. *Bauh. pin.* 161.
Myrrhis fœtens. *Riv. pent.* 49.
Habitat in Alſatia, Hungaria, Helvetia. ♂

* *Floribus diſci maſculis.*

temulum. 3. CHÆROPHYLLUM caule ſcabro: geniculis tumidis.
Chærophyllum caule maculato: geniculis tumidis. *Hort. cliff.* 102. *Fl. ſuec.* 244. *Roy. lugdb.* 112. *Gort. gelr.* 59.
Chærophyllum ſylveſtre. *Bauh. pin.* 152.
Myrrhis annua vulgaris, caule fuſco. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 302. *ſ.* 9. *t.* 10. *f.* 7.
Habitat ad Europæ *arvos, vias & ſepes.* ♂

hirſutum. 4. CHÆROPHYLLUM caule æquali, foliolis inciſis acutis.
Chærophyllum foliolis diſſectis, petiolis ramiferis umverſalibus utrinque membrana auctis. *Hort. cliff.* 101 *Roy. lugdb.* 111. *Sauv. monſp.* 262.
Cerefolium latifolium hirſutum album & rubrum. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 304. *ſ.* 9. *t.* 10. *f.* 6.

Cicu

Cicutaria paluſtris latifolia alba. *Bauh. pin.* 161.
Cicutaria paluſtris latifolia rubra. *Bauh. pin.* 161.
Myrrhis perennis alba minor, foliis hirſutis, ſemine aureo. *M. Hall. jen.* 282. *t.* 5.
Myrrhis broccenbergenſis. *Bauh. pin.* 160.
Seſeli montanum, cicutæ folio, ſubhirſutum. *Bauh. pin.* 161. *prodr.* 85.
Habitat in Alpibus Helvetiæ. ♃

5. CHÆROPHYLLUM caule æquali, foliolis ſerratis integris. *aromaticum*
Chærophyllum foliolis lanceolato-ovatis ſerratis integris. *Hort. cliff.* 102. *Roy. lugdb.* 112.
Cerefolium, rugoſo angelicæ folio, aromaticum. *Bocc. muſ.* 2. *p.* 29. *t.* 19.
Angelica ſylveſtris hirſuta inodora. *Bauh. pin.* 156. *prodr.* 82.
Habitat in Luſatia, Miſnia. ♃

6. CHÆROPHYLLUM fruticoſum. *arboreſcens.*
Cicuta arbor virginiana. *Pluk. mant.* 49.
Cicutaria arbor viginiana. *Raj. ſuppl.* 257.
Habitat in Virginia. ♄
Caulis *fruteſcens*. Folia *chærophylli, ampla, ſupradecompoſita, pinnis patentiſſimis, lævia, inciſo-ſerrata*. Umbellæ *tenues albæ involucro partiali*, floſculi *omnes fertiles*.

SESELI.

1. SESELI caule declinato, umbellis ante floreſcentiam nutantibus. *Pimpinelloides.*
Habitat in Europa *auſtraliore.* ♃
Radix *perennis*, Folia *pinnata, pinnis multifidis, ſegmentis alternis: hæ etiam alternatim ſectæ, ſegmentis linearibus, planis, extrorſum verſis*. Caulis *pedalis, teres, ante floreſcentiam decumbens, ſub floreſcentia ferme erectus foliolo uno alterove: petiolo membranaceo, ſpathiformi, oblongo; e quo pedunculus ſimplex*. Umbellæ *ante floreſcentiam nutantes et in* Pimpinella *ſaxifraga: involucro univerſali nullo; partiali lineari anguſto, longitudine fere umbellulæ*. Semina *ovalia ſtriis* 3. *elevatis*.

2. SESELI petiolis ramiferis membranaceis oblongis integris, foliis caulinis anguſtiſſimis. *Hort. cliff.* 102. *Roy. lugdb.* 112. *Dalib. pariſ.* 92. *Sauv. monſp.* 256. *montanum.*
Meum latifolium adulterinum. *Bauh. pin.* 148

Saxifraga montana minor italica, foliis in breviores partes diviſis. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 272. *ſ.* 9. *t.* 2. *f.* 1.
Habitat in Galliæ, Italiæ *collibus.* ♃

glaucum. 3. SESELI petiolis ramiferis membranaceis oblongis integris: foliolis ſingularibus binatisque. *Guett. ſtamp.* 64.
Fœniculum ſylveſtre, glauco folio. *Tournef. inſt.* 311.
Daucus, glauco folio, ſimilis fœniculo tortuoſo. *Bauh. hiſt.* 3. *p.* 16.
Saxifraga montana minor glauca & rigidior. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 273.
Habitat in Gallia. ♃
Involucellorum foliola ſæpius coadunata ſunt.

elatum. 4. SESELI petiolis rameis membranaceis oblongis integris, foliolis binatis ternatisque. *Guett. ſtamp.* 1. *p.* 64. *Dalib. pariſ.* 92.
Fœniculum ſylveſtre elatius, ferulæ folio longiore. *Tournef. inſt.* 311. *Vaill. pariſ.* 54. *Sauv. monſp.* 256.
Apium montanum, folio tenuiore. *Bauh. pin.* 153.
Habitat in Gallia. ♃

annuum. 5. SESELI petiolis rameis membranaceis ventricoſis emarginatis. *Hort. cliff.* 103. *Roy. lugdb.* 112. *Sauv. monſp.* 256.
Fœniculum ſylveſtre annuum, tragoſelini odore, umbella alba. *Vaill. pariſ.* 54. *t.* 9. *f.* 4.
Libanotis tenuifolia germanica. *Bauh. pin.* 158. *Burſ.*
Habitat in Pannonia, Gallia. ⊙

Ammoides. 6. SESELI petiolis membrana deſtitutis. *Roy. lugdb.* 112.
Fœniculum luſitanicum minimum acre. *Tournef. inſt.* 312.
Ammoides. *Bauh. pin.* 159.
Habitat in Luſitania. ⊙

tortuoſum. 7. SESELI caule alto rigido, foliolis linearibus faſciculatis.
Oenanthe ſtriata rigida. *Hort. cliff.* 99. *Sauv. monſp.* 257.
Seſeli maſſilienſe, fœniculi folio. *Bauh. pin.* 161.
Fœniculum tortuoſum. *Bauh. hiſt.* 3. *p.* 16.
Habitat in Europa *auſtrali.* ♃
Caulis *rigidus, quaſi lignoſus, foliis multoties altior.* Foliola *partialia non duo tantum oppoſita, ſed ſæpius quatuor interioribus minoribus, unde faſciculata.*

Carvifolia. 8. SESELI foliis bipinnatis ſublinearibus, petiolis baſi membranaceis, ſeminibus ovalibus.

Carvi-

Carvifolia. *Bauh. pin.* 158. *Bauh. hiſt.* 3. *p.* 171. *Vaill. pariſ.* *t.* 5. *f.* 2.
Angelica tenuifolia. *Riv. pent.* 18.
Habitat in Helvetia, Germannia, Anglia. ♃

9. SESELI foliis duplicato-pinnatis; foliolis inciſis acutis, involucris ſetaceis umbellula longioribus. *pyrenæum.*
Carvi alpinum. *Bauh. pin.* 158. *prodr.* 84. *Burſ. VIII*: 36.
Habitat in Pyrenæis.
Caulis *pedalis*, *teres*, *ſtriatus*. Folia *radicalia duplicato-pinnata*, *laxa*, *parum divaricata*: *Foliolis pinnatis*, *longitudinaliter inciſis*, *acuminatis*, *cuneiformibus*; *Folium in caule ſæpe unicum*, *ex cujus ala exit ramus*; *petioli radicales ſimplices*; *caulinus lato-membranaceus*. Umbella univerſalis *nuda*, *oblonga*, *pedunculis circiter octo*; partialis *conferta*, *breviſſima*, *uniformis*: involucro *polyphyllo*, *ſetaceo*, *longiore umbellulis*.

10. SESELI caule filiformi divaricato, foliis duplicato-ternatis linearibus, umbellis ſubſexfidis. *ſaxifragum.*
Pimpinella ſaxifraga tenuifolia. *Bauh. pin.* 160. *prodr.* 84. *Burſ. VIII*: 5.
Habitat ad Lacum Genevenſem.
Planta *pedalis*. Caulis *filiformis*, *ramoſus & ſubramoſus*, *divaricatus*, *teres*, *tenuis*. Folia *parva*, *duplicato-ternata*, *linearia*, *raro lobata*. Umbellæ *nudæ*, *pedunculis ſex ſæpius*; umbellulæ *involucratæ floſculis ſex ad octo*.

THAPSIA.

1. THAPSIA foliolis dentatis baſi coadunatis. *Hort. cliff.* 105. *Roy. lugdb.* 113. *villoſa*
Thapſia latifolia villoſa. *Bauh. pin.* 148.
Thapſia 1. *Cluſ. hiſt.* 2 *p.* 192.
Habitat in Hiſpania, Luſitania. ♃

2. THAPSIA foliolis multifidis baſi anguſtatis. *Hort. cliff.* 105. *Roy. lugdb.* 113. *fœtida.*
Thapſia carotæ effigie *Bauh. hiſt.* 3. *p.* 187. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 319. *ſ.* 9. *t.* 18. *f.* 7.
Habitat in Hiſpania. ♃

3. THAPSIA foliolis multifidis [illegible]aceis. *Hort. cliff.* 106. *Roy. lugdb.* 113. *Aſclepium.*

Thapſia tenuifolia, petiolis radiatis. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 319 *ſ.* 9. *t.* 18. *f.* 9.
Panax Aſclepium, ſemine folioſo. *Bauh. pin.* 158.
Panax Aſclepium apuum. *Column. ecphr.* 1. *p.* 87. *t.* 86.
Habitat in Apulia.

trifoliata. 4. THAPSIA foliis ternatis ovatis.
Sium folio infimo cordato, caulinis ternatis; omnibus crenatis. *Gron. virg.* 31.
Habitat in Virginia.
Semina ſingula gaudent alis 5, longitudinalibus, membranaceis, & involucra nulla ſunt uti in præcedente, cum qua genere conjungo, quamvis facie diverſa.

PASTINACA.

ſativa. 1. PASTINACA foliis ſimpliciter pinnatis. *Hort. cliff.* 105. *Hort. upſ.* 66. *Mat. med.* 130. *Roy. lugdb.* 114. *Gort. gelr.* 60.
Paſtinaca ſylveſtris latifolia. *Bauh. pin.* 155.
β. Paſtinaca ſativa latifolia. *Bauh. pin.* 155.
Habitat in Europæ *auſtralioris ruderatis & paſcuis.*

Opopanax. 2. PASTINACA foliis decompoſitis pinnatis. *Hort. cliff.* 105. *Mat. med.* 131. *Roy. lugdb.* 114.
Panax Coſtinum. *Bauh. pin.* 156.
Panax Heracleum. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 315. *ſ.* 9. *t.* 17. *f.* 2.
Habitat in Italia, Sicilia.

SMYRNIUM.

perfoliatum. 1. SMYRNIUM foliis caulinis ſimplicibus amplexicaulibus. *Hort. cliff.* 104. *Hort. upſ.* 66. *Roy. lugdb.* 114.
Smyrnium peregrinum ſ. rotundo ſ. oblongo folio. *Bauh. pin.* 158. *prodr.* 82.
Smyrnium amani montis. *Dod. pempt.* 698.
Habitat in Italia, Creta. ♂

Oluſatrum. 2. SMYRNIUM foliis caulinis ternatis petiolatis ſerratis. *Hort. cliff.* 105. *Roy. lugdb.* 114. *Sauv. monſp.* 262.
Hippoſelinum theophraſti ſ. Smyrnium dioſcoridis. *Bauh. pin.* 154.
Hippoſelinum. *Dod. pempt.* 698.
Habitat in Scotia, Wallia, Gallia. ♂

aureum. 3. SMYRNIUM foliis pinnatis, poſticis ternatis, floſculis omnibus fertilibus.

Ægo

Ægopodium foliis caulinis ſummis novenis. *Hort. cliff.* 107. *Roy. lugdb.* 115.
Angelica acadienſis, flore luteo. *Dod. act.* 55. *Raj. hiſt.* 1368.
Angelica humilior & minor, flore luteo. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 281.
β. Smyrnium foliis caulinis decompoſitis acuminatis. *Gron. virg.* 148.
Smyrnium aureum, lobis ternis quinisve, marianum. *Pluk. mant.* 173.
Habitat in America *boreali.*

4. SMYRNIUM foliis caulinis duplicato ternatis integerrimis. *integerrimum.*
Smyrnium foliis caulinis ternatis petiolatis: foliolis oblongo-ovatis integerrimis. *Gron. virg.* 148.
Habitat in Virginia.

ANETHUM.

1. ANETHUM fructibus compreſſis. *Hort. cliff.* 106. *Hort. upſ.* 66. *Mat. med.* 146. *Roy. lugdb.* 116. *graveolens.*
Anethum hortenſe. *Bauh. pin.* 147.
Habitat inter Luſitaniæ & Hiſpaniæ *ſegetes.* ⊙

2. ANETHUM fructibus ovatis. *Hort. cliff.* 106. *Hort. upſ.* 66. *Mat. med.* 147. *Roy. lugdb.* 116. *Fœniculum.*
Fœniculum dulce. *Bauh. pin.* 147.
Fœniculum vulgare germanicum. *Bauh. pin.* 147.
Fœniculum ſylveſtre. *Bauh. pin.* 147.
Habitat in Narbonæ, Aremoriæ, Maderæ *rupibus cretaceis.* ♂

CARUM.

1. CARUM. *Dod. pempt.* 299. *Fl. lapp.* 105. *Fl. ſuec.* 245. *Mat. med.* 138. *Hort. cliff.* 106. *Roy. lugdb.* 116. *Hall. helv.* 428. *Carvi.*
Carum pratenſe, Carvi officinarum. *Bauh. pin.* 158.
Habitat in Europæ *borealis pratis.* ♂

PIMPINELLA.

1. PIMPINELLA foliis pinnatis: foliolis radicalibus ſubrotundis; ſummis linearibus. *ſaxifraga.*
Pimpinella foliolis ſubrotundis. *Fl. ſuec.* 246. *Mat. med.* 125.
Pimpinella. *Hort. cliff.* 106. *Roy. lugdb.* 115.

Pimpinella ſaxifraga minor. *Bauh. pin.* 160.
β. Pimpinella ſaxifraga major altera. *Bauh. pin.* 159.
major. γ. Pimpinella ſaxifraga major, umbella candida. *Bauh. pin.* 159.
δ. Pimpinella ſaxifraga major, umbella rubente. *Bauh. pin.* 159.
Habitat in Europæ *paſcuis ſiccis.* ♃
Has inter α — δ limites non reperi; β enim ſata in ſolo latiori produxit γ.

glauca. 2. PIMPINELLA foliis ſupradecompoſitis, caule angulato ramoſiſſimo.
Tragoſelinum foliis tenuiſſime diviſis: pinnulis ultimis tripartitis. *Hall. helv.* 430. *
Seſeli petiolis ramiferis membranaceis oblongis integris foliolis binatis ternatiſque. *Guett. ſtamp.* 1. *p.* 34.
Habitat in Helvetia, Gallia.
Differt a Dauco montano multifido brevique folio C. B. *involucro partiali nullo, ceterum ſat ſimilis.*

peregrina. 3. PIMPINELLA foliis radicalibus pinnatis crenatis, ſummis cuneiformibus inciſis.
Aniſum foliis radicalibus pinnatis. *Hort. cliff.* 107. *Hort. upſ.* 67. *Roy. lugdb.* 115. *Sauv. meth.* 231.
Apium peregrinum, foliis ſubrotundis. *Bauh. pin.* 153.
Daucus tertius dioſcoridis. *Columm. ecphr.* 1. *p.* 108. *t.* 109.
Habitat in Italiæ *paſcuis ſterilibus.* ♃

Aniſum 4. PIMPINELLA foliis radicalibus trifidis inciſis.
Aniſum foliis radicalibus ſimplicibus. *Hort. cliff.* 107. *Hort. upſ.* 67. *Mat. med.* 141. *Roy. lugdb.* 116.
Aniſum herbariis. *Bauh. pin.* 159.
Aniſum vulgare. *Cluſ. hiſt.* 2. *p.* 202.
Habitat in Ægypto. ☉

APIUM.

Petroſelinum 1. APIUM foliolis caulinis linearibus. *Hort. cliff.* 108. *Hort. upſ.* 67. *Mat. med.* 127. *Roy. lugdb.* 116.
Apium hortenſe Petroſelinum vulgo. *Bauh. pin.* 153.
Apium hortenſe. *Dod. pempt.* 694.
β. Apium vel Petroſelinum criſpum. *Bauh. pin.* 153.
Habitat in Sardinia *juxta ſcaturigines.* ♂

graveolens. 2. APIUM foliolis caulinis cuneiformibus. *Hort. cliff.* 107. *Fl. ſuec.* 248. *Mat. med.* 128. *Roy. lugdb.* 115.
Apium paluſtre ſ. Apium officinarum. *Bauh. pin.* 154.

β. Api-

β. Apium dulce, Celleri italorum. *Tournef. inſt.* 305.
Habitat in Europæ *humectis, præſertim maritimis.* ♂

ÆGOPODIUM.

1. ÆGOPODIUM foliis caulinis ſummis ternatis. *Hort. cliff.* 107. *Fl. ſuec.* 247. *Roy. lugdb.* 115. *Podagraria.*
Angelica ſylveſtris minor. ſ. erratica. *Bauh. pin.* 155.
Herba gerardi. *Dod. pempt.* 320.
Habitat in Europa *ad ſepes inque pomariis.* ♃.

TRIGYNIA.

RHUS.

1. RHUS foliis pinnatis obtuſiuſcule ſerratis ovalibus ſubtus villoſis. *Mat. med.* 150. *Coriaria.*
Rhus foliis pinnatis ſerratis. *Hort. cliff.* 110. *Hort. upſ.* 68. *Roy. lugdb.* 243. *Sauv. monſp.* 227.
Rhus folio ulmi. *Bauh. pin.* 414.
Rhus coriaria *Dod. pempt.* 779.
Habitat in Europa *auſtrali.* ♄

2. RHUS foliis pinnatis ovatis acuminatis ſerratis, ſubtus tomentoſis. *Javanica.*
Habitat in Java. *Osbeck.*

3. RHUS foliis pinnatis ſerratis lanceolatis utrinque nudis. *glabra*
Rhus foliis pinnatis ſerratis. *Gron. virg.* 148. *Cold. noveb.* 63.
Rhus virginicum, panicula ſparſa, ramis patulis glabris *Dill. elth.* 323. *t.* 243. *f.* 314.
Rhus anguſtifolium. *Bauh. pin.* 414.
Sumach anguſtifolium. *Bauh. prodr.* 158 *Burſ. XXII.* 77.
Habitat in America *ſeptentrionali.*

4. RHUS foliis pinnatis integerrimis, petiolo integro. *Mat. med.* 151. *Vernix.*
Rhus foliis pinnatis integerrimis. *Hort. cliff.* 110. *Hort. upſ.* 68. *Gron. virg.* 148. *Roy. lugdb.* 244. *Cold noveb.* 64.
Toxicodendron foliis alatis, fructu rhomboide *Dill elth.* 390. *t.* 292. *f.* 377.
Arbor americana, alatis foliis, ſucco lacteo venenata *Plук. alm.* 45. *t.* 145. *f.* 1.

Arbor Poyſon-wood-Tree. *Act. angl. n* 367. *p* 145
Sitz ſ. Sitz-dſiu. *Kæmpf. amœn.* 791. *t.* 792.
Habitat in America *ſeptentrionali*, Iaponia. ♄

Copallinum. 5. RHUS foliis pinnatis integerrimis, petiolo membranaceo articulato. *Roy. lugdb.* 24. *Mat. med.* 152.
Rhus elatior, foliis impari pinnatis, petiolis membranaceis articulatis. *Gron. virg.* 149.
Rhus obſoniorum ſimilis americana, gummi candidum fundens non ſerrata, foliorum rachi medio alata. *Pluk. alm.* 318. *t.* 56. *f.* 1.
Habitat in America *ſeptentrionali.* ♄

radicans. 6. RHUS foliis ternatis: foliolis petiolatis ovatis nudis integerrimis, caule radicante. *Hort. cliff.* 110. *Gron virg.* 33. *Roy. lugdb.* 244.
Hedera trifolia canadenſis. *Corn. canad.* 96. *t.* 97. *Barr. ic.* 228.
β. Toxicodendron amplexicaule, foliis minoribus glabris. *Dill. elth.* 390.
γ. Toxicodendron rectum, foliis minoribus glabris. *Dill elth.* 389. *t.* 291. *f.* 375.
Habitat in Virginia, Canada. ♄

Toxicodendr. 7. RHUS foliis ternatis: foliolis petiolatis angulatis pubeſcentibus.
Rhus foliis ternatis: foliolis petiolatis ovatis acutis pubeſcentibus: nunc integris, nunc ſinuatis. *Gron. virg.* 149.
Toxicodendron triphyllum, folio ſinuato pubeſcente. *Tournef. inſt.* 611.
Arbor trifolia venenata virginiana, folio hirſuto. *Raj. hiſt.* 1799.
Habitat in Virginia, Canada. ♄

tomentoſum. 8. RHUS foliis ternatis: foliolis ſubpetiolatis rhombeis angulatis ſubtus tomentoſis.
Rhus foliis ternatis: foliolis ovatis utrinque acutis dentatis: lateralibus petiolatis. *Hort. cliff.* 111.
Rhus foliis ternatis: foliolis petiolatis ovatis acutis dentatis. *Vir. cliff.* 25. *Roy. lugdb.* 244.
Rhus africanum trifoliatum majus, foliis obtuſis & inciſis hirſutis pubeſcentibus. *Pluk. alm.* 319. *t.* 219. *f.* 7.
Vitex trifolia minor indica ſerrata. *Comm. hort.* 1. *p.* 179. *t.* 92.
Habitat ad Cap. b. Spei. ♄

9. RHUS

9. RHUS foliis ternatis: foliolis ovatis acuminatis ſerratis, pedunculis tomentoſis. *Cobbe.*
Rhois trifoliatæ frutex ialwaccenſis, floribus juliformibus. *Pet. muſ.* 678. *Raj. dendr.* 58.
Kobbæ. *Fl. zeyl.* 441.
Habitat in Zeylona.

10. RHUS foliis ternatis: foliolis petiolatis lineari-lanceolatis integerrimis ſubtus tomentoſis. *Hort. cliff.* 111. *Roy. lugdb.* 244. *anguſtifolium.*
Rhus africanum trifoliatum majus, foliis ſubtus argenteis acutis & margine inciſis. *Pluk. alm.* 319. *t.* 219. *f.* 6.
Rhus fruticoſum, foliis trifidis linearibus acuminatis. *Burm. afric.* 251. *t.* 91. *f.* 1.
Habitat in Æthiopia. ♄

11. RHUS foliis ternatis: foliolis ſeſſilibus cuneiformibus lævibus. *Vir. cliff.* 25. *Hort. cliff.* 111. *Hort. upſ.* 68. *Roy. lugdb.* 243. *lucidum.*
Rhus africanum trifoliatum minus glabrum, ſplendente folio ſubrotundo integro. *Pluk. alm.* 319. *t.* 219. *f.* 9.
Rhus arboreum trifoliatum latifolium. *Burm. afr.* 252. *t.* 91. *f.* 2.
Vitex trifolia minor indica rotundifolia. *Comm. hort.* 2. *p.* 181. *f.* 93.
Habitat ad Cap. b. Spei. ♄

12. RHUS foliis ſimplicibus obovatis. *Cotinus.*
Cotinus foliis obverſe ovatis. *Hort. cliff.* 111. *Roy lugdb.* 243.
Cotinus coriaria. *Dod. pempt.* 780.
Coccomilea ſ. Coccygria. *Bauh. pin.* 415.
Habitat in Lombardia Italiæ & *ad radices* Apenninorum. ♄

VIBURNUM.

1. VIBURNUM foliis integerrimis ovatis: ramificationibus ſubtus villoſo-glanduloſis. *Tinus.*
Viburnum foliis ovatis integerrimis. *Hort. upſ.* 69. *Sauv. monſp.* 136.
Tinus. *Hort. cliff.* 109.
Tinus 1. 2. 3. *Cluſ. hiſt.* 1. *p.* 49.
Laurus Tinus ſ. ſylveſtris: trium generum. *Bauh. hiſt.* 3. *p.* 418.
Laurus ſylveſtris, corni feminæ foliis ſubhirſutis. *Bauh. pin.* 461.

β. Lau-




IMAGE EVALUATION
TEST TARGET (MT-3)

6″

Photographic
Sciences
Corporation

23 WEST MAIN STREET
WEBSTER, N.Y. 14580
(716) 872-4503

β. Laurus ſylveſtris, foliis venoſis. *Bauh. pin.* 461.
γ Laurus ſylveſtris, folio minore. *Bauh. pin.* 461.
Habitat in Luſitania, Hiſpania, Italia. ♄

nudum. 2. VIBURNUM foliis integerrimis lanceolato-ovatis.
Tinus foliis ovatis in petiolos terminatis integerrimis *Gron. virg.* 33.
Habitat in Virginia. ♄
Cymæ in hac nudæ, in præcedenti involucratæ.

prunifolium. 3. VIBURNUM foliis ſubrotundis crenato ſerratis glabris. *Gron. virg.* 33.
Viburnum canadenſe glabrum. *Vaill. act.* 1722. *p.* 200.
Meſpilus, prunifolia virginiana non ſpinoſa, fructu nigricante. *Pluk. alm.* 249. *t.* 46. *f.* 2.
Habitat in Virginia, Canada. ♄

dentatum. 4. VIBURNUM foliis ovatis dentato-ſerratis ovatis.
Habitat in Virginia. ♄

Lantana. 5. VIBURNUM foliis cordatis ſerratis venoſis ſubtus tomentoſis. *Vir. cliff.* 25. *Hort. upſ.* 68. *Roy. lugdb.* 242. *Sauv. monſp.* 136.
Viburnum. *Hort. cliff.* 107.
Viburnum vulgo. *Bauh. pin.* 242.
Lantana. *Dod. pempt* 701.
Habitat in Europæ *auſtralioris ſepibus argilloſis.* ♄

acerifolium. 6. VIBURNUM foliis lobatis, petiolis lævibus.
Opulus. *Gron. virg.* 149.
Habitat in Virginia. ♄

Opulus 7. VIBURNUM foliis lobatis, petiolis glanduloſis.
Opulus. *Hort. cliff.* 109. *Fl. ſuec.* 249. *Roy. lugdb.* 243.
Sambucus aquatica, flore ſimplici. *Bauh. pin.* 456.
Sambucus paluſtris. *Dod. pempt.* 846.
roſeum. β. Sambucus aquatica, flore globoſo pleno. *Bauh. pin.* 456.
Habitat in Europæ *pratis humidiuſculis.* ♄

Lentago. 8. VIBURNUM foliis ſerrulatis ovatis acuminatis glabris, petiolis glanduloſis.
Habitat in Canada. *Kalm.* ♄
Folia *craſſa Tini, glabra, denticulis minimis ſerrulata petiolis longitudinaliter glanduloſis.*

CASSINE.

Peragua. 1. CASSINE foliis oblongis ſerratis.

Caſ

Caſſine. *Hort. cliff.* 72. *Mat. med.* 153. *Roy. lugdb* 242.

Phillyrea capenſis, folio celaſtri. *Dill. elth.* 315. *t.* 236. *f.* 305.

Ceraſus Sebeſtenæ domeſticæ foliis aliquatenus accedens *Pluk. alm.* 94. *t.* 97. *f.* 8.

Frutex æthiopicus, alaterni foliis. *Seb. theſ.* 1. *p.* 46. *t.* 29. *f.* 5.

Habitat in Æthiopia, Carolina. ♄

2. CASSINE foliis ſubovatis integerrimis. *Maurocenia.*

Maurocenia. *Hort. cliff.* 108.

Frangula ſempervirens, folio rigido ſubrotundo. *Dill. elth.* 146. *t.* 121. *f.* 147.

Ceraſus capenſis, fructu rubro, folio fere obtuſo. *Pet gaz.* *t.* 57. *f.* 4.

Ceraſus africana, foliis plerumque in ſummo ſinuatis, fructu rubro. *Pluk. alm.* 49. *t.* 158. *f.* 2.

Habitat in Æthiopia. ♄

SAMBUCUS.

1. SAMBUCUS cymis tripartitis, ſtipulis ſoliaceis. *Ebulus.*

Sambucus caule herbaceo ſimplici. *Vir. cliff.* 25. *Fl. ſuec.* 251. *Mat. med.* 149. *Hort. cliff.* 110. *Roy. lugdb.* 245.

Sambucus humilis ſ. Ebulus. *Bauh. pin.* 456.

Ebulus. *Fuchſ. hiſt.* 65.

β. Sambucus humilis ſ. Ebulus folio laciniato. *Bauh. pin.* 456.

Habitat. in Europa. ♃

2. SAMBUCUS cymis quinquepartitis, foliis ſub-bipinnatis. *canadenſis.*

Habitat in Canada. *D. Kalm.* ♃

Media inter S. Ebulum & nigram, habitus S. nigræ, at folia pinnata; foliolis inferioribus ternatis, omnibus magis ovatis; fruticat, ſed plerumque perit ſupra terram hyeme. Cymæ *ſtructura uti in nigra.* Stipulæ *filiformes, truncatæ, ut in S. nigra; nec in foliola expanſa, ut in Ebulo.*

3. SAMBUCUS cymis quinquepartitis, caule arboreo. *nigra.*

Sambucus caule arboreo ramoſo, floribus umbellatis. *Roy. lugdb.* 243. *Fl. ſuec.* 250. *Mat. med.* 148.

Sambucus caule perenni ramoſo. *Hort. cliff.* 109.

Sambucus fructu in umbella nigro. *Bauh. pin.* 456.

Sam-

Sambucus, *Dod. pempt.* 845.
β. Sambucus fructu in umbella viridi. *Bauh. pin.* 456.
laciniata. γ. Sambucus laciniato folio. *Bauh. pin.* 456. *Dod. pempt.* 845.
Habitat in Germania. ♄

racemoſa. 4. SAMBUCUS racemis compoſitis ovatis, caule arboreo
Sambucus caule arboreo ramoſo, floribus racemoſis. *Roy lugdb.* 243. *Sauv. monſp.* 222.
Sambucus racemoſa rubra. *Bauh. pin.* 456.
Sambucus racemoſa, acinis rubris. *Bauh. hiſt.* 1. *p.* 549.
Habitat in Europæ *auſtralis montoſis.* ♄

ZANTHOXYLUM.

Clava herculis. 1. ZANTHOXYLUM foliis pinnatis.
Zanthoxylum. *Hort. cliff.* 487.
Zanthoxylon ſpinoſum, lentiſci longioribus foliis, evonymi fructu capſulari. *Cateſb. car.* 1. *p.* 26. *t.* 26.
Habitat in Jamaica, Carolina, Virginia ♄

trifoliatum. 2. ZANTHOXYLUM foliis ternatis.
Habitat in China. *Osbeck.*
Frutex *Aculeo recurvo, ſub baſi & apice ſinguli petioli.* Folia *ternata, ſolitaria, ad flores terna: foliolis ovatis obtuſis.* Pedunculi *umbellulam gerunt ſimplicem, hemiſphæricam.* Stylus *trifidus eſt, ut nequeat Araliis ſociari.*

STAPHYLEA.

pinnata. 1. STAPHYLEA foliis pinnatis. *Hort. cliff.* 112. *Hort. upſ.* 69. *Roy. lugdb.* 436.
Staphylodendron. *Dalech. hiſt.* 102.
Piſtacia ſylveſtris. *Bauh. pin.* 401.
Habitat in Europæ *auſtralioris ſucculentis.*

trifolia. 2. STAPHYLEA foliis ternatis: *Hort. cliff.* 112. *Roy. lugdb.* 437. *Cold. noveb.* 62.
Saphylodendron triphyllum, vaſculo tripartito. *Gron. virg.* 34.
Staphylodendron virginianum trifoliatum. *Herm. lugdb.* 230.
Piſtachia virginica ſylveſtris trifolia. *Moriſ. blæſ.* 295.
Habitat in Virginia. ♄

TAMARIX.

gallica. 1. TAMARIX floribus pentandris. *Hort. cliff.* 111. *Roy. lugdb.* 436. *Sauv. monſp.* 45. Ta-

Tamarix pedunculis nudis, floribus pentandris. *Hort. upſ.* 69. *Mat. med.* 154.
Tamarix altera, folio tenuiore, ſ. gallica. *Bauh. pin.* 485.
Tamariſcus narbonenſis. *Lob. ic.* 218.
Habitat in Gallia, Hiſpania, Italia. ♄

2. TAMARIX floribus decandris. *Hort. cliff.* 111. *Roy. lugdb.* 436. *germanica.*
Tamarix fruticoſa, folio craſſiore, ſ. germanica. *Bauh. pin.* 485.
Tamariſcus germanica. *Lob. ic.* 218.
Habitat in Germaniæ *locis inundatis.* ♄

TURNERA.

1. TURNERA foliis ſerratis, petiolis floriferis. *Vir. cliff.* 20. *Hort. cliff.* 112. *t.* 10. *Roy. lugdb.* 434. *ulmifolia.*
Turnera fruteſcens ulmifolia. *Plum. gen.* 15. *Mart. cent.* 49. *t.* 49.
Ciſtus urticæ folio, flore luteo, vaſculis trigonis: *Sloan. jam.* 86. *hiſt.* 1. *p.* 202. *t.* 127. *f.* 4. 5. *Raj. dendr.* 492.
Helianthemoides. *Bauh. lugdb.* 2. *p.* 260.
β. Turnera fruteſcens, folio longiore & mucronato. *Mart. cent.* 49. *t.* 49.
Habitat in Jamaica, *& in* America *calidiore.* ♂

TELEPHIUM.

1. TELEPHIUM. *Hort. upſ.* 70. *Imperati.*
Telephium foliis oblongo-ovatis, racemis ſecundis terminalibus. *Vir. cliff.* 20. *Hort. cliff.* 73. *Roy. lugdb.* 434.
Telephium repens, folio non deciduo. *Bauh. pin.* 287.
Telephium legitimum. *Cluſ. hiſt.* 2. *p.* 67.
Ciſtus folio majoranæ. *Bauh. pin.* 465.
Habitat in Gallo-provincia. ♃

CORRIGIOLA.

1. CORRIGIOLA. *Hort. upſ.* 70. *litoralis.*
Corrigiola caule faſciculis florum terminato. *Hort. cliff.* 112. *Roy. lugdb.* 420. *Hall. helv.* 391.
Polygonum litoreum minus, floſculis ſpadiceo albicantibus. *Bauh. pin.* 281. *prodr.* 131. *Moriſ. hiſt.* 2. *p.* 593. *ſ.* 5. *t.* 29. *f.* 1.
Habitat in Galliæ, Germaniæ *litoribus arenoſis.* ⊙

1. PHAR-

PHARNACEUM.

Cerviana. 1. PHARNACEUM glabrum, pedicellis folia æquantibus. *Phil. bot.* 258. *
Cerviana. *Minuart. monogr.* 1
Alſine pumila, gallii facie, foliis glaucis. *Amm ruth.* 84.
Spergula purpurea minima. *Buxb. cent.* 3. *p.* 33. *t.* 62. *f.* 2.
Habitat Roſtockii, *in* Ruſſia, Hiſpania ☉

incanum. 2. PHARNACEUM pedunculis communibus longiſſimis. *Hort. cliff.* 492. * *Roy. lugdb.* 221.
Habitat in Africa.
Figura forte habetur in Pluk. phyt. 304. *f.* 4.

ALSINE.

media. 1. ALSINE petalis bipartitis, foliis ovato-cordatis. *Fl. lapp.* 186. *Fl. ſuec.* 369. *Hort. cliff.* 173. *Gron. virg.* 161. *Roy. lugdb.* 449.
Alſine media. *Bauh. pin.* 250.
Alſine minor. *Dod. pempt.* 29.
Habitat in Europæ *cultis.* ☉

ſegetalis. 2. ALSINE petalis integris, foliis ſubulatis.
Spergula foliis filiformibus unum latus ſpectantibus ſtipulis membranaceis vaginantibus, pedunculis umbellatis. *Guett. ſtamp.* 299. *Dalib. pariſ.* 133.
Alſine ſegetalis, gramineis foliis unum latus ſpectantibus *Vaill. pariſ.* 8. *t.* 3. *f.* 3.
Habitat Pariſiis. ☉

BASELLA.

rubra. 1. BASELLA foliis planis.
Baſella. *Rheed. mal.* 7. *p.* 45. *t.* 24. *Fl. zeyl.* 119
Cuſcuta foliis ſubcordatis. *Hort. cliff.* 39.
Habitat in India. ♂

alba. 2. BASELLA foliis undatis.
Baſella flore albo & caulibus viridibus *Thran. carol.* 11.
Habitat in Syria? ☉

SAROTHRA.

Gentianoides. 1. SAROTHRA. *Gen. nov.* 1075.
Gentiana caule ramiſque ramoſiſſimis, foliis ſubulatis minimis. *Gron. virg.* 29.
Centaurium minus ſpicatum, anguſtiſſimo folio, ſ. ſcoparium marilandicum novum. *Pluk. mant.* 43. *t.* 342. *f.* 4.
Habitat in Virginiæ, Penſylvaniæ *apricis glareoſis.*

TETRAGYNIA.

PARNASSIA.

1. PARNASSIA. *Fl. lapp.* 108. *Fl. ſuec.* 252. *Hort. cliff.* 113. *Roy. lugdb.* 420. *Hall. helv.* 316. *Dalib. pariſ.* 96. *paluſtris.*
Gramen parnaſſi albo ſimplici flore. *Bauh. pin.* 309.
Hepatica alba. *Cord. hiſt.* 53.
Pyrola rotundifolia paluſtris, flore unico ampliore. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 505. *ſ.* 12. *t.* 10. *f.* 3.
Habitat in Europæ *uliginoſis.* ♃

PENTAGYNIA.

ARALIA.

1. ARALIA arboreſcens, caule foliolisque aculeata. *Vir. cliff.* 26. *Gron. virg.* 34. *ſpinoſa.*
Aralia caule aculeato. *Hort. cliff.* 113. *Roy. lugdb.* 92.
Angelica arboreſcens ſpinoſa ſ. Arbor indica fraxini folio, cortice ſpinoſo. *Comm. hort.* 1. *p.* 89. *t.* 47.
Chriſtophoriana arbor aculeata virginienſis. *Pluk. alm.* 98. *t.* 20.
Habitat in Virginia. ♄

2. ARALIA caule petiolisque aculeatis, foliolis inermibus villoſis. *chinenſis.*
Habitat in China. *Osbeck.*
Caulis *ſimplex, aculeis ſpinoſiſſimus, nudus, in ſummitate tantum folioſus.* Petioli *compoſiti, tripartiti, aculeati, villoſi.* Folia *partialia pinnata & inſuper foliola 2 ad ramificationes petioli.* Foliola *ſ. pinnæ ovatæ, ſerratæ, ſubtus præſertim villoſæ, duplo majores, quam in præcedente. Panicula ramoſa umbellulis numeroſis. Differt itaque a præcedenti, quod nulli aculei in foliolis per diſcum ſecundum venas adſperſi; quod folia non glabra ſed duplo majora.* Habitus *etjam diverſus.*

3. ARALIA caule folioſo herbaceo lævi. *Hort. upſ.* 70. *Cold. noveb.* 67. *racemoſa.*
Aralia racemis umbelliferis lateralibus. *Vir. cliff.* 26.
Aralia ex alis florifera. *Hort. cliff.* 113. *Roy. lugdb.* 92.

S Pana-

Panaces carpimon ſ. racemoſa canadenſis. *Corn. canad.* 74. *t.* 75. *Barr. ic.* 705.

Chriſtophoriana canadenſis racemoſa & ramoſa. *Moriſ. hiſt.* 1. *p.* 9. *ſ.* 1. *t.* 2. *f.* 9.

Habitat in Canada. ♃

nudicaulis. 4. ARALIA caule nudo. *Hort. cliff.* 113. *Gron. virg.* 34. *Roy. lugdb.* 94.

Aralia caule nudo, radice repente. *Cold. noveb.* 66.

Chriſtophoriana virginiana, zarzæ radicibus ſurculoſis & fungoſis. *Pluk. alm.* 98. *t.* 238. *f.* 5.

Habitat in Virginia, *ſimillima* (*forte eadem*) *in* Iava. ♃

BARRERIA.

capenſis. 1. BARRERIA.

Erica capitata ſ. nodiflora, corios foliis rectis, æthiopica. *Pluk. mant.* 69. *t.* 346. *f.* 7.

Habitat in Æthiopia. ♄

Frutex; *Rami per ſpatia determinata conferti, erecti, rufeſcentes, adſperſi pilis albis.* Folia *alterna, approximata, ovato-lanceolata, integerrima, pilis albis velut ciliata*; Capitula *florum terminalia*; *Simillima eſt habitu Dioſmæ ciliatæ.*

STATICE.

Armeria. 1. STATICE caule nudo ſimplici capitato. *Hort. cliff.* 115. *Fl. ſuec.* 253. *Gron. virg.* 150. *Roy. lugdb.* 194.

Limonium aphyllocaulon gramineum globoſum. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 601. *ſ.* 15. *t.* 1. *f.* 29.

Caryophyllus montanus major, flore globoſo. *Bauh. pin.* 211.

β. Caryophyllus montanus minor. *Bauh. pin.* 211.

Habitat in Europæ & Americæ *ſeptentrionalis campis.* ♃

Limonium. 2. STATICE caule nudo paniculato tereti, foliis lævibus.

Statice caule nudo ramoſo. *Hort. cliff.* 115. *Fl. ſuec.* 254. *Gron. virg.* 150. *Roy. lugdb.* 192.

Limonium maritimum majus. *Bauh. pin.* 192.

β. Limonium maritimum minus, oleæ folio. *Bauh. pin.* 192.

γ. Statice foliis obverſe-ovatis glabris, caule nudo ramoſo. *Sauv. monſp.* 15.

Limonium parvum, bellidis minoris folio. *Bauh. pin.* 192.

δ. Limo-

δ Limonium maritimum minimum. *Bauh. pin.* 192. *prodr.* 99. *Bocc. ſic.* 25. *t.* 19.
Habitat in Europæ & Virginiæ *maritimis.* ♃

3. STATICE caule nudo paniculato foliis ſpathulatis retuſis. *Sauv. monſp.* 15. † *cordata*
Limonium maritimum minus, foliis cordatis. *Bauh. pin.* 192. *prodr.* 99.
Limonium minimum cordatum ſ. folio retuſo. *Barr. ic.* 805.
Habitat ad maris Mediterranei *litora.* ♃

4. STATICE caule nudo paniculato tereti, foliis tuberculatis. *echioides.*
Statice foliis obverſe-ovatis verrucoſis, caule ramoſo nudo. *Sauv. monſp.* 15.
Limonium minus annuum bullatis foliis: *Magn. monſp.* 157. *t.* 156.
Habitat Monſpelii. ⊙

5. STATICE caule ſubnudo paniculato proſtrato, ramis ſterilibus retroflexis nudis, foliis cuneiformibus. *reticulata.*
Statice foliis obverſe-ovatis, ramis nudis humifuſis, intricatis. *Sauv. monſp.* 15.
Limonium minus, virgulis retiformiter ſe invicem implicatis. *Pluk. alm.* 221. *t.* 42. *f.* 4.
Limonium reticulatum. *Raj. hiſt.* 396. *Bocc. ſic.* 82. t. 44.
Habitat in Melita.

6. STATICE caule ſubnudo dichotomo ancipiti, foliis lanceolatis mucronatis, floribus aggregatis. *ſpecioſa.*
Limonium foliis lanceolatis mucronatis radicalibus, caule ancipiti dichotomo, ſtipulis ſimplicibus. *Hort. upſ.* 71. *Gmel. ſibir.* 2. *p.* 221. *t.* 91. *f.* 1.
Limonium floribus elegantiſſimis. *Raj. hiſt.* 397.
Limonium elatius, plantaginis foliis procumbentibus in aculeum terminatis, floribus albis in capitula congeſtis. *Amm. ruth.* 129.
Habitat in Tataria. ♂

7. STATICE caule ſubnudo dichotomo, foliis lanceolatis mucronatis, floribus alternis diſtantibus. *Gmel. ſibir.* 2. *p.* 223. *t.* 92. *tatarica.*
Limonium orientale, plantaginis folio, floribus umbellatis. *Tournef. cor.* 25. *Boerh. lugdb.* 1. *p.* 76. *t.* 76.
Limonium elatius, plantaginis foliis procumbentibus in

 acu-

aculeum terminatis, floribus albis ſpicatis. *Amm. ruth.* 130.
Habitat in Tataria. ♂

Echinus. 8. STATICE caule nudo paniculato, foliis ſubulatis mucronatis.
Limonium foliis caulinis ſubulatis pungentibus. *Roy. lugdb.* 192.
Limonium orientale fruteſcens, caryophylli folio in aculeum rigidiſſimum abeunte. *Tournef. cor.* 25.
Limonium ceſpitoſum, foliis aculeatis. *Buxb. cent.* 2. *p.* 18. *t.* 10.
β. Limonium græcum, juniperi folio. *Tournef. cor.* 25.
Echinus ſ. Tragacantha altera. *Alp. exot.* 57. *t.* 56.
Habitat in Græciæ & Mediæ *deſertis.*

flexuoſa. 9. STATICE caule nudo ramoſo flexuoſo, corymbis terminalibus, foliis nervoſis. *Gmel.*
Statice foliis ovalibus muticis nervoſis, caule nudo alternatim ramoſo flexuoſo, corymbis terminantibus. *Gmel. ſibir.* 2. *p.* 217. *t.* 89. *f.* 1.
Habitat in Sibiria.

ſuffruticoſa. 10. STATICE caule fruticoſo: ſuperne nudo ramoſo, capitulis ſeſſilibus, foliis lanceolatis vaginantibus.
Statice foliis e lanceolato-linearibus caulinis baſi vaginantibus, capitulis alternis ſeſſilibus. *Gmel. ſibir.* 2. *p.* 216. *t.* 88. *f.* 2. 3.
Habitat in Sibiria. *D. Gmelin.* ♄

monopetala. 11. STATICE caule fruticoſo folioſo, floribus ſolitariis, foliis lanceolatis vaginantibus.
Statice foliis caulinis lanceolato-linearibus. *Hort. cliff.* 116. *Roy. lugdb.* 192.
Limonium lignoſum. *Bocc. ſic.* 34. 35. *t.* 16. 17.
Habitat in Sicilia.

aurea. 12. STATICE caule fruticoſo folioſo ramoſo, foliis ſubulatis.
Statice caulibus fruticoſis teretiuſculis, foliis ſubulatis caulinis, floribus ex corymboſo faſciculatis. *Gmel. ſibir.* 2. *p.* 218.
Limonium maritimum humile, ephedræ facie, calycibus florum aureis. *Amm. ruth.* 132. *t.* 18. *f.* 2.
Habitat in Dauriæ *campis montoſis.*

ſinuata. 13. STATICE foliis radicalibus alternatim pinnato-ſinuatis:

atis: caulinis ternis triquetris ſubulatis decurrentibus. *Hort. upſ.* 71.
Statice foliis caulinis decurrentibus. *Hort. cliff.* 116.
Limonium peregrinum, foliis aſplenii. *Bauh. pin.* 192.
Limonii ſpecies. *Rauw. itin.* 313. *t.* 314.
Limonium rauvolfianum. *Cluſ. cur.* 33. *t.* 33.
β. Limonium africanum, caule elato, foliis integris hirſutis, petalo pallide flavo, calyce amœne purpureo. *Mart. cent.* 48. *t.* 48.
Habitat in Sicilia, Palæſtina, Africa. ♄

LINUM.

* *Foliis alternis.*

1\. LINUM calycibus capſulisque mucronatis, petalis crenatis, foliis lanceolatis alternis, caule ſubſolitario. *uſitatiſſimum*
Linum ramis foliiſque alternis lineari-lanceolatis, radice annua. *Hort. cliff.* 114. *Roy. lugdb.* 433.
Linum foliis alternis lanceolatis integerrimis, calycibus acuminatis angulatis, capſulis mucronatis. *Hort. upſ.* 71. *Mat. med.* 156.
Linum arvenſe. *Bauh. pin.* 214. *Raj. hiſt.* 1073.
β. Linum ſativum. *Bauh. pin.* 214.
γ. Linum ſativum humilius, flore majore. *Boerh. lugdb.* 1. *p.* 284.
ζ. Linum ſativum latifolium africanum, fructu majore. *Tournef. inſt.* 339.
Habitat hodie inter ſegetes Europæ *auſtralis.* ☉

2\. LINUM calycibus capſulisque obtuſis, foliis alternis lanceolatis integerrimis. *perenne.*
Linum foliis alternis lanceolatis integerrimis, calycibus apice obtuſis, capſulis muticis. *Hort. upſ.* 72.
Linum perenne, ramis foliiſque alternis lineari-lanceolatis. *Hort. cliff.* 114. *Roy. lugdb.* 434. *Sauv. monſp.* 53.
Linum perenne majus cæruleum, capitulo majore. *Moriſ. hiſt.* 2. *p.* 573.
Linum ſylveſtre cæruleum perenne erectius, flore & capitulo majore. *Raj. angl.* 3. *p.* 362.
Habitat in Sibiria *et* Cantabrigiæ ♃

3\. LINUM calycibus hirſutis acuminatis ſeſſilibus alternis, caule corymboſo. *hirſutum.*
Linum ſylveſtre latifolium hirſutum cæruleum. *Bauh. pin.* 339. *Moriſ. hiſt.* 2. *p.* 573. *ſ.* 5. *t.* 26. *f.* 5. *Raj. hiſt.* 1073.

Linum ſylveſtre latifolium. *Cluſ. hiſt.* 1. *p.* 317.
Habitat in Auſtriæ, Tatariæ *editis graminoſis.*

narbonenſe. 4. LINUM calycibus acuminatis, foliis lanceolatis ſparſis ſtrictis ſcabris acuminatis, caule tereti baſi ramoſo.
Linum ſylveſtre cæruleum, folio acuto. *Bauh. pin.* 214. *prodr.* 107. *Raj. hiſt.* 1073.
Linum ſylveſtre anguſtifolium, cæruleo amplo flore. *Magn. monſp.* 161. *Sauv. monſp.* 54.
Habitat in Galloprovincia, Monſpelii, *unde Burſerus attulit C. Bauhino.* ♃

tenuifolium. 5. LINUM calycibus acuminatis, foliis ſparſis lineari-ſetaceis retrorſum ſcabris.
Linum perenne, foliis anguſtioribus, calyce ariſtato. *Hall. helv.* 371.
Linum ſylveſtre anguſtifolium, flore magno. *Bauh. pin.* 214.
Linum ſylveſtre V. anguſtifolium. *Cluſ. hiſt.* 1. *p.* 318.
β. Linum ſylveſtre anguſtifolium, flore magno intenſe cæruleo. *Tournef. inſt.* 340.
γ. Linum ſylveſtre anguſtifolium, flore magno violaceo. *Tournef. inſt.* 340.
δ. Linum ſylveſtre anguſtifolium, flore magno lineis purpureis diſtincto. *Tournef. inſt.* 340.
ε. Linum ſylveſtre anguſtifolium, flore magno cæruleo & velut cinereo. *Tournef. inſt.* 340.
Lini ſylveſtris V. anguſtifolii aliud genus. *Cluſ. hiſt.* 1. *p.* 318.
ζ. Linum ſylveſtre anguſtifolium, floribus dilute purpuraſcentibus vel carneis. *Bauh. pin.* 214.
Linum ſylveſtre VI. anguſtifolium. *Cluſ. hiſt.* 1. *p.* 318.
Linum oxyphyllum multicaule *Bocc. muſ.* 2. *p.* 169. *t.* 125.
η. Linaria, capillaceo folio, altera. *Bauh. pin.* 213.
θ. Linum anguſtifolium album, ramuſculis per terram ſparſis. *Tournef. inſt.* 340.
Habitat in Galliæ, Helvetiæ *aridis herboſis.* ♃

auſtriacum. 6. LINUM calycibus rotundatis obtuſis, foliis linearibus acutis.
Linum ſylveſtre anguſtifolium, foliis rarioribus. *Bauh. pin.* 214.
Linum ſylveſtre II. *Tabern. ic.* 822.
Habitat in Auſtria *inferiore.*

7. LI-

7. LINUM calycibus acutis alternis, capſulis muticis, paniculâ filiformi, foliis alternis lanceolatis, radicalibus ovatis. *virginianum*

Linum ramis foliiſque alternis lanceolatis ſeſſilibus nervo longitudinali inſtructis. *Gron. virg.* 35.
Habitat in Virginia. Penſylvania.
Caulis *filiformis, pedalis, paniculatus*. Folia radicalia *ovalia, integerrima, lævia*; caulina *alterna, lanceolata.* Flores *alterni: pedunculis breviſſimis*. Calyces *acuti*. Capſulæ *globoſæ, muticæ*; Corollæ *luteæ*.

8. LINUM calycibus acutis, foliis lineari-lanceolatis alternis, paniculæ pedunculis bifloris. *trigynum.*

Linum foliis lineari-lanceolatis, pedunculis bifidis, floribus luteis. *Sauv. monſp.* 53.
Linum ſylveſtre minus, flore luteo. *Bauh. pin.* 214.
Habitat in Monſpelii. D. *Sauvages*.
Planta *ſpithamea*. Caules *ad baſin ſæpe ramos duos oppoſitos exſerunt*. Corolla *flava, rotata, tubo ſupra baſin cohærente longitudine calycis*. Piſtilla *in hoc ſæpius* 3 *obſervavit Ill. Sauvages*.

9. LINUM calycibus ſubſerrato-ſcabris lanceolatis ſubſeſſilibus, panicula ramis dichotomis. *flavum.*

Linum ſylveſtre latifolium luteum. *Bauh. pin.* 214.
Linum latifolium luteum. *Bauh. hiſt.* 3. *p.* 454.
Linum ſylveſtre III. latifolium. *Cluſ. hiſt.* 1. *p.* 317.
Habitat in Auſtria.

10. LINUM calycibus foliiſque lanceolatis ſtrictis mucronatis: margine ſcabris. *ſtrictum.*

Linum foliis aſperis umbellatum luteum. *Magn. monſp.* 164. *Raj. hiſt.* 1076. *Sauv. monſp.* 53.
Lithoſpermum, linariæ folio, monſpelienſium. *Bauh. pin.* 259.
Paſſerina lobelii. *Bauh. hiſt.* 3. *p.* 454.
Habitat in Monſpelii, Hiſpaniæ, Siciliæ *ſqualidis*. ⊙

11. LINUM foliis linearibus acutis ſcabris, caulibus ſuffruticoſis. *ſuffruticoſum.*

Linum anguſtifolium fruticoſum valentinum, foliis rigidis & aculeatis. *Tournef. inſt.* 340.
Habitat in Regno Valentino.

12. LINUM foliis cuneiformibus, caulibus arboreſcentibus. *arboreum.*

Linum arboreum. *Alp. exot.* 19. *t.* 13.
Habitat in Creta. ♄

campanulatum. 13. LINUM foliorum baſi utrinque puncto glanduloſo.
Linum foliis imis ſpathulatis, floribus luteis. *Sauv. monſp.* 76.
Linum ſylveſtre luteum, foliis ſubrotundis. *Bauh. pin.* 212. *Tournef. inſt.* 340. *Magn. char.* 261.
Campanula lutea linifolia montis lupi, flore volubilis. *Lob. ic.* 414.
Campanula linifolia lutea. *Bauh. hiſt.* 2. *p.* 817.
Habitat in Galloprovinciæ *montibus*, Monſpelii *in monte lupi.* ♃
Facies a Lino diverſa, ſtamina unita baſi reddunt plantam dubiam, quam accuratius examinent, qui vivam adire queunt.

maritimum. 14. LINUM calycibus ovatis acutis muticis, foliis lanceolatis: inferioribus oppoſitis.
Linum caule ſimplici, ramis foliiſque inferioribus oppoſitis lineari-lanceolatis. *Hort. cliff.* 114. * *Roy. lugdb.* 434. *Sauv. monſp.* 147.
Linum foliis ovatis, floribus racemoſis. *Guett. ſtamp.* 2. *p.* 499.
Linum maritimum luteum. *Bauh. pin.* 214.
Linum luteum narbonenſe. *Bauh. hiſt.* 3. *p.* 454. *Raj. hiſt.* 1074.
Linum ſylveſtre. *Dod. pempt.* 534.
Habitat in Auſtria *ad Thermas badenſes*, Monſpelii.

* * *Foliis oppoſitis.*

africanum. 15. LINUM foliis oppoſitis lineari-lanceolatis, floribus terminalibus pedunculatis. *Roy. lugdb.* 434.
Linum africanum luteum, foliis conjugatis. *Boerh. lugdb.* 1. *p.* 284.
Habitat in Africa.

nodiflorum. 16. LINUM foliis oppoſitis lanceolatis, floribus alternis ſeſſilibus, caule ſimplici. *Hort. cliff.* 114.
Linum luteum ad ſingula genicula floridum. *Bauh. pin.* 214. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 574. *ſ.* 5. *t.* 26. *f.* 11. *Raj. hiſt.* 1026.
Linum luteum ſylveſtre latifolium. *Columm. ecphr.* 2. *p.* 79. *t.* 80.
Habitat in Italiæ *pratis argilloſis.*

17. LI-

17. LINUM foliis oppoſitis ovato-lanceolatis, caule dichotomo, corollis acutis. *Hort. cliff.* 372. *Fl. ſuec.* 255. *Mat. med.* 157. *Roy. lugdb.* 434. *catharticum.*
Linum pratenſe, floſculis exiguis. *Bauh. pin.* 214.
Spergula bifolia, lini capitulis. *Loeſ. pruſſ.* 261. *t.* 86.
Habitat in Europæ *ſeptentrionalis paſcuis ſucculentis.* ☉

18. LINUM foliis oppoſitis, caule dichotomo, floribus tetrandris tetragynis. *Hort. cliff.* 114. *Fl. ſuec.* 256. *Roy. lugdb.* 434. *Radiola.*
ChamæLinum vulgare. *Vaill. pariſ.* 33. *t.* 4. *f.* 6.
Linocarpum, ſerpilli folio, multicaule & multiflorum. *Mich. gen.* 23. *t.* 21.
Radiola vulgaris ſerpillifolia. *Raj. angl.* 3. *p.* 161. *t.* 15. *f.* 3.
Polygonum minimum ſ. Millegrana minima. *Bauh. pin.* 282.
Habitat in Europæ *ſabulo inundato.* ☉

19. LINUM foliis quaternis. *quadrifolium.*
Linum africanum, rubiæ foliis quaternis ſtellatis. *Raj. ſuppl.* 525.
Habitat in Æthiopia.

20. LINUM foliis verticillatis. *verticillatum.*
Linum ſylveſtre, flore cæſio, foliis verticillatis. *Bocc. muſ.* 2. *p.* 49. *t.* 42. *Raj. ſuppl.* 524. *Barr. rar.* 685. *t.* 1226.
Habitat in Italia. ☉
Calyces & folia ſuperiora villoſa.

ALDROVANDA.

1. ALDROVANDA. *Mont. act. bonon.* 2. *p.* 3. *p.* 404. *t.* 12. *veſiculoſa.*
Lenticula paluſtris indica, foliis ſubrotundis binis capillamentis ad imum barbatis. *Pluk. alm.* 211. *t.* 41. *f.* 6.
Habitat in Italiæ & Indiæ *paludoſis. D. Monti.*

DROSERA.

1. DROSERA ſcapis radicatis, foliis orbiculatis. *Fl. lapp.* 109. *Fl. ſuec.* 257. *Mat. med.* 158. *Fl. zeyl.* 120. *Gron. virg.* 35. *Roy. lugdb.* 120. *rotundifolia.*
Ros ſolis folio rotundo. *Bauh. pin.* 357.
Salſirora ſ. Ros ſolis. *Thal. herc. t.* 9. *f.* 1.
Habitat in Europæ, Aſiæ, Americæ *paludibus.*

longifolia. 2. DROSERA ſcapis radicatis, foliis oblongis. *Fl. lapp.* 110. *Fl. ſuec.* 258. *Roy. lugdb.* 417.
Ros ſolis folio oblongo. *Bauh. pin* 357.
Salſirora ſ. Sponſa ſolis ſ. Ros ſolis ſ. Rorella. *Tabl. herc.* 116. *t.* 9. *f.* 2.
Habitat in Europa *ubique cum præcedente; an itaque ſatis diverſa ſpecies?*

luſitanica. 3. DROSERA ſcapis radicatis, foliis ſubulatis ſubtus convexis.
Ros ſolis luſitanicus, foliis aſphodeli minoris. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 620. *ſ.* 15. *t.* 4. *f.* 4. *Pluk. alm.* 323. *t.* 117. *f.* 2. *Raj. ſuppl* 551.
Habitat in Luſitania.

capenſis. 4. DROSERA ſcapis radicatis, foliis lanceolatis.
Droſera foliis ad radicem longiſſimis, floribus ſpicatis. *Burm. afr.* 209. *t.* 75, *f.* 1.
Ros ſolis africanus, foliis prælongis, caule nudo altiſſimo. *Raj. ſuppl.* 515.
Ros ſolis africanus, folio lato & longo. *Herm. afric* 19.
Habitat in Æthiopia.

indica. 5. DROSERA caule ramoſo folioſo, foliis linearibus. *Fl. zeyl.* 121.
Ros ſolis ramoſus, caule folioſo. *Burm. zeyl* 207. *t.* 94. *f.* 1.
Araca-puda. *Rheed. mal.* 10. *p.* - - *t.* 20.
Habitat in India.

CRASSULA.

coccinea. 1. CRASSULA foliis planis cartilagineo-ciliatis baſi connato-vaginantibus. *Vir. cliff.* 26. *Hort. cliff.* 116. *Roy. lugdb.* 454.
Cotyledon africana fruteſcens, flore umbellato coccineo. *Comm. rar.* 24. *t.* 24.
Habitat in Æthiopia. ♄

perfoliata. 2. CRASSULA foliis lanceolato-ſubulatis ſeſſilibus connatis canaliculatis: ſubtus convexis. *Hort. cliff.* 116. *Roy. lugdb.* 455.
Craſſula altiſſima perfoliata. *Dill. elth.* 114. *t.* 96. *f.* 113.
Aloë africana cauleſcens perfoliata glauca & non ſpinoſa. *Comm. præl.* 74. *t.* 23.
Habitat in Æthiopia. ♄

3. CRAS-

3. CRASSULA foliis ſubulatis obſolete tetragonis. *Hort.* *tetragona.*
cliff. 116. * *Roy. lugdb.* 455.
Habitat in Æthiopia. ♄

4. CRASSULA foliis oppoſitis obtuſe ovatis integerri- *cultrata.*
mis; hinc anguſtioribus. *Hort. cliff.* 496. *Roy. lugdb.* 455.
Craſſula anacampſerotis folio. *Dill. elth.* 115. *t.* 97. *f.* 114.
Habitat in Æthiopia. ♄

5. CRASSULA foliis oppoſitis oblongis planiuſculis di- *ciliata.*
ſtinctis ciliatis. *Hort. cliff.* 496. *Roy. lugdb.* 455.
Craſſula caulescens, foliis ſempervivi cruciatis. *Dill. elth.* 116. *t.* 98. *f.* 116.
Habitat in Æthiopia. ♃

6. CRASSULA foliis oppoſitis patentibus ſcabris. *ſcabra.*
Craſſula meſembryanthemi facie, foliis longioribus aſperis. *Dill. elth.* 117. *t.* 99. *f.* 117.
Cotyledon africana fruteſcens, foliis aſperis anguſtis acuminatis, flore vireſcente. *Mart. cent.* 24. *t.* 24.
Habitat in Africa?

7. CRASSULA foliis ſerrato-dentatis planis alternis, *alternifolia.*
caule ſimpliciſſimo, floribus pendulis. *Hort. cliff.* 497. * *Roy. lugdb.* 455.
Cotyledon, flore luteo, media. *Herm. lugdb.* 191.
Habitat - - - - -

8. CRASSULA foliis ſubulatis radicatis, caule nudo. *nudicaulis.*
Hort. cliff. 116. *Roy. lugdb.* 455.
Craſſula ceſpoſa longifolia. *Dill. elth.* 116. *t.* 98. *f.* 115.
Habitat in Æthiopia. ♃

9. CRASSULA caule flaccido prolifero determinate-fo- *orbicularis.*
lioſo, foliis patentiſſimis imbricatis. *Hort. cliff.* 496. *Roy. lugdb.* 455.
Craſſula orbicularis repens, foliis ſempervivi. *Dill. elth.* 119. *t.* 100. *f.* 118.
Habitat in Æthiopia. ♃

10. CRASSULA caule flaccido repente, foliis oppoſitis. *pellucida.*
Craſſula, portulacæ facie, repens. *Dill. elth.* 119. *t.* 100. *f.* 119.
Habitat in Æthiopia.

SU-

SURIANA.

maritima. 1. SURIANA. *Hort. cliff.* 492.
Suriana foliis portulacæ anguſtis. *Plum. gen.* 37.
Thymelææ facie frutex maritimus tetraſpermos, flore tetrapetalo. *Sloan. jam.* 138. *hiſt.* 2. *p.* 29. *t.* 162. *f.* 4. *Raj. dendr.* 96.
Arbor americana, ſalicis folio, frondoſa bermudienſis. *Pluk. alm.* 44. *t.* 241. *f.* 5.
Habitat ad littora maris in Bermudis, Jamaica. ♄

SIBBALDIA.

procumbens. 1. SIBBALDIA foliolis tridentatis. *Fl. lapp.* 111. *Fl. ſuec.* 260. *Hall. helv.* 342. *Roy. lugd.* 276.
Fragariæ affinis ſericea incana. *Bauh. pin.* 327. *prodr.* 139.
Fragariæ ſylveſtri affinis planta, flore luteo. *Sibb. ſcot.* 2. *p.* 25. *t.* 6. *f.* 1.
Pentaphylloides fruticoſum minimum procumbens, flore luteo. *Pluk. alm.* 284. *t.* 212. *f.* 3.
Habitat in Alpibus Lapponiæ, Helvetiæ, Scothiæ. ♃

erecta. 2. SIBBALDIA foliolis linearibus multifidis.
Pentaphylloides foliis tenuiſſime laciniatis, floſculis carneis. *Amm. ruth.* 112. *t.* 15.
Habitat in Sibira *D. Gmelin.*

POLYGYNIA.

MYOSURUS

minimus. 1. MYOSURUS.
Myoſurus foliis integerrimis. *Hort. cliff.* 117. *Fl. ſuec.* 261. *Roy. lugdb.* 492.
Holoſteo affinis Cauda muris. *Bauh. pin.* 190.
Cauda muris. *Dod. pempt* 112.
Habitat in Europæ *collibus apricis aridis.* ⊙

Claſ-

Claſſis VI.

HEXANDRIA

MONOGYNIA.

BROMELIA.

1. BROMELIA foliis ciliato-ſpinoſis mucronatis, ſpica comoſa. *Ananas.*
Bromelia foliis ſpinoſis, fructibus connatis caulem cingentibus. *Hort. cliff.* 127. *Hort. upſ.* 73. *Roy. lugdb.* 24.
Carduus braſilianus, foliis aloës. *Bauh. pin.* 384.
Ananas acoſtæ. *Comm. hort.* 1. *p.* 109. *t.* 57.
Tappa-Tſiakka. *Rheed. mal.* 11. *p.* 1. *t.* 1.
β. Ananas aculeatus, fructu pyramidato; carne aurea. *Tournef. inſt.* 653.
γ. Ananas aculeatus, fructu conico carne aurea. *Pluk. ſpec.* 20.
δ. Ananas lucide virens, folio vix ſerrato. *Dill. elth.* 25. *t.* 21. *f.* 22.
Ananas non aculeatus Pitta dictus. *Plum. ſpec.* 20.
Habitat in nova Hiſpania, Surinamo. ♃

2. BROMELIA foliis ciliato-ſpinoſis mucronatis, racemo terminali. *Pinguin.*
Bromelia foliis aculeatis, racemo laxo terminali. *Hort. cliff.* 129. *Roy. lugdb.* 25.
Ananas americana ſylveſtris altera minor. *Pluk. mant.* 29. *t.* 258. *f.* 4.
Pinguin. *Dill. elth.* 320. *t.* 240. *f.* 311.
Habitat in Jamaica, Barbados. ♃

3. BROMELIA foliis ciliato-ſpinoſis mucronatis, panicula diffuſa. *Karatas.*
Bromelia foliis ſpinoſis oblique recurvis, fructibus diſpermis racemoſis. *Hort. upſ.* 73.
Karatas foliis altiſſimis anguſtiſſimis & aculeatis. *Plum. gen.* 10?
Habitat in America meridionali. ♃

4. BROMELIA foliis ſerrato-ſpinoſis obtuſis, ſpicis alternis. *lingulata.*

Bro-

Bromelia ramoſa & racemoſa, foliis arundinaceis ſerratis. *Plum. gen.* 26.
Habitat in America *meridionali.* ♃

nudicaulis. 5. BROMELIA foliis radicalibus dentato-ſpinoſis, caulinis integerrimis.
Bromelia pyramidata, aculeis nigris. *Plum. gen.* 46.
Habitat in America *meridionali.* ♃

TILLANDSIA.

utriculata. 1. TILLANDSIA culmo paniculato.
Tillandſia foliis baſi conniventibus in utriculum. *Hort. cliff.* 129.
Viſcum caryophylloides maximum, flore tripetalo pallide luteo, ſemine filamentoſo. *Sloan. jam.* 76. *hiſt.* 1. *p.* 188. *Raj. ſuppl.* 405.
Viſci modo arboribus indicis adnaſcens. *Bauh. pin.* 423.
Caraguata multiplici ſpica, flore albo. *Plum. gen.* 10.
Habitat in Americæ *meridionalis arboribus.*

ſerrata. 2. TILLANDSIA foliis ſuperne dentato-ſpinoſis.
Caraguata clavata & ſpicata, foliis ſerratis. *Plum. gen.* 10.
Habitat in America *meridionali.*

lingulata. 3. TILLANDSIA foliis lineari-lingulatis integerrimis: baſi ventricoſis.
Caraguata latifolia & clavata. *Plum. gen.* 10.
Viſcum caryophylloides maximum, capitulis in ſummitate conglomeratis. *Sloan. jam.* 77. *hiſt.* 1. *p.* 189. *t.* 120. *Raj. ſuppl.* 405.
Habitat in Americæ *meridionalis arboribus vetuſtis.*

tenuifolia. 4. TILLANDSIA foliis lineari-ſubulatis integerrimis imbricatis, ſpica ſimplici laxa. *Roy. lugdb.* 25.
Caraguata tenuifolia, paucioribus ſpicis. *Plum. gen.* 10.
Habitat in Americæ *meridionalis arboribus.*

RENEALMIA.

paniculata. 1. RENEALMIA foliis radicalibus breviſſimis, caule ſubnudo, ramis ſubdiviſis adſcendentibus.
Renealmia ramoſiſſima, foliis variegatis & circinatis. *Plum. gen.* 27.
Habitat in America meridionali.

polyſtachia. 2. RENEALMIA ſcapo ſpicis imbricatis lateralibus.
Viſcum caryophylloides anguſtifolium, floribus cæruleis. *Cateſb. car.* 2. *p.* 89. *t.* 89.?

Rene

Renealmia ſpica multiplici, flore albo. *Plum. gen.* 37.
β. Renealmia, ſpica multiplici, alia anguſtifolia. *Plum. gen.* 37.
Habitat in America *calidiore.*

3. RENEALMIA foliis linearibus reclinatis, ſcapo ſimplici imbricato, ſpica ſimplici. *monoſtachia.*
Renealmia non ramoſa ſquamata, & floribus niveis. *Plum. gen.* 37.
Habitat in America *meridionali.*

4. RENEALMIA foliis ſubulatis ſcabris, pedunculis unifloris. *Roy. lugdb.* 25. *recurvata.*
Viſcum caryophylloides minus, foliis pruinæ inſtar candicantibus, flore tripetalo purpureo, ſemine filamentoſo. *Sloan. jam.* 77. *hiſt.* 1. *p.* 190. *t.* 120. *f.* 1. *Raj. ſuppl.* 406.
β. Viſcum caryophylloides minus, foliorum imis viridibus apicibus ſubrubicundis, flore tripetalo purpureo, ſemine filamentoſo. *Sloan. jam.* 77. *hiſt.* 1. *p.* 190. *t.* 122.
Habitat in Jamaicæ *arboribus.*

5. RENEALMIA filiformis intorta. *Hort. cliff.* 129. *Gron. virg.* 36. *Barr. æquin.* 99. *Roy. lugdb.* 25. *uſneoides.*
Viſcum caryophylloides tenuiſſimum e ramis arborum muſci in modum dependens, foliis pruinæ inſtar candicantibus, flore tripetalo, ſemine filamentoſo. *Sloan. jam.* 77. *hiſt.* 1. *p.* 191. *t.* 122. *f.* 2. 3. *Raj. ſuppl.* 406.
Cuſcuta, ramis arborum innaſcens, caroliniana, filamentis lanugine tectis. *Pluk. alm.* 126. *t.* 26. *f.* 5.
Camanbaya. *Marcgr. braſ.* 46. *Pet. gaz. t.* 62. *f.* 12.
Habitat in Virginiæ, Jamaicæ, Braſiliæ *arboribus.*

BURMANNIA.

1. BURMANNIA ſpica gemina. *Burm. zeyl.* 50. *t.* 20. *f.* 1. *Fl. zeyl* 128. *diſticha.*
Burmannia ſpica duplici. *Hort. cliff.* 128. *Roy. lugdb.* 125.
Habitat in Zeylonæ *paludoſis*

2. BURMANNIA flore gemmino. *biflora.*
Burmannia flore duplici. *Hort. cliff.* 128.
Burmannia ſcapo bifloro. *Gron. virg.* 36.
Habitat in Virginiæ *paludoſis.*

1. FRA-

TRADESCANTIA

virginiana. 1. TRADESCANTIA. *Hort. cliff.* 127. *Hort. upſ.* 73. *Gron. virg.* 36. *Roy. lugdb.* 37.
Ephemerum phalangoides tripetalum non repens virginianum gramineum. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 606. *ſ.* 15. *t.* 2. *f.* 4.
Allium ſ. Moly virginianum. *Bauh. pin.* 506.
Habitat in Virginia. ♃

PONTEDERIA

ovata. 1. PONTEDERIA foliis ovatis, floribus capitatis.
Narukila. *Rheed. mal.* 11. *p.* 67. *t.* 34. *Raj. ſuppl.* 573.
Habitat in Malabariæ *aquoſis.* ♃

cordata. 2. PONTEDERIA foliis cordatis, floribus ſpicatis.
Pontederia floribus ſpicatis. *Hort. cliff.* 133. *Gron. virg.* 37. *Roy. lugdb.* 37. *Cold. noveb.* 69.
Gladiolus lacuſtris virginianus cæruleus, ſagittæ folio, *Pet. gaz.* 1. *t.* 1. *f.* 12.
Sagittæ ſimilis planta paluſtris virginiana, ſpica florum cærulea, *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 618. *ſ.* 15. *t.* 4. *f.* -
Plantagini aquaticæ quodammodo accedens, floribus cæruleis hyacinthi ſpicatis. *Pluk. mant.* 152. *t.* 349. *f. ult.*
Habitat in Virginiæ *aquoſis.* ♃

haſtata. 3. PONTEDERIA foliis haſtatis, floribus umbellatis.
Pontederia floribus umbellatis. *Fl. zeyl.* 129.
Sagittæ quodammodo ſimilis planta maderaſpatana, floribus medio caule quaſi ex utriculo prodeuntibus. *Pluk. alm.* 326. *t.* 220. *f.* 8. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 618. *ſ.* 15. *t.* 4. *f.* 7.
Carimgola. *Rheed. mal.* 1 *p.* 91. *t.* 44.
Habitat in India. ♃

GALANTHUS.

nivalis. 1. GALANTHUS. *Hort. cliff.* 134. *Hort. upſ.* 73. *Roy. lugdb.* 35.
Leucojum bulboſum trifolium minus. *Bauh. pin.* 56.
Erangelia. *Reneal. ſpec.* 97. *t.* 96.
Habitat ad radices Alpium Veronæ, Tridenti, Viennæ. ♃

LEU-

LEUCOJUM.

LEUCOJUM ſpatha uniflora, ſtylo clavato. *cernuum.*
Leucojum. *Hort. cliff.* 13. *Hort. upſ.* 74. *Roy. lugdb.* 35.
Leucojum bulboſum vulgare. *Bauh. pin.* 55.
Oliganthemum. *Reneal. ſpec.* 99. *t.* 100.
Habitat in Germaniæ, Helvetiæ, Italiæ *umbroſis pratis, ad rivulos.*

2. LEUCOJUM ſpatha multiflora, ſtylo filiformi. *Læfl.* *autumnale.*
Leucojum bulboſum autumnale. *Bauh. pin.* 56.
Leucojum bulboſum autumnale tenuifolium. *Cluſ. hiſt.* 1. *p.* 170.
Leucojum bulboſum majus ſ. multiflorum. *Bauh. pin* 55.
Habitat in Luſitania. ♃

NARCISSUS.

1. NARCISSUS ſpatha uniflora, nectarii limbo rotato breviſſimo. *Hort. upſ.* 74. *poëticus.*
Narciſſus foliis enſiformibus, floris nectario rotato breviſſimo. *Hort. cliff.* 134. *Roy. lugdb.* 35. *Sauv. monſp.* 17.
Narciſſus albus, circulo purpureo. *Bauh pin.* 48.
Narciſſus medio purpureus. *Dod. pempt.* 223.
β. Narciſſus medio purpureus multiplex. *Bauh. pin.* 52.
Habitat in Gallia Narbonenſi, Italia. ♃

2. NARCISSUS ſpatha uniflora, nectarii limbo campanulato erecto petalo æquale. *Pſeudo Narciſſus.*
Narciſſus foliis enſiformibus, florum nectario longitudine petalorum. *Hort. cliff.* 134. *Hort. upſ.* 74. *Roy. lugdb.* 35. *Sauv. monſp.* 17.
Narciſſus ſylveſtris pallidus, calyce luteo. *Bauh. pin.* 52.
Narciſſus luteus ſylveſtris. *Dod. pempt.* 227. *f.* 12.
Habitat in Angliæ, Hiſpaniæ, Italiæ *nemoribus.* ♃

3. NARCISSUS ſpatha uniflora, nectario turbinato maximo, genitalibus declinatis. *Bulbocodium.*
Narciſſus foliis ſubulatis, nectario maximo patulo, genitalibus declinatis. *Hort. cliff.* 134. *Roy. lugdb.* 35.
Narciſſus montanus alter, flore fimbriato. *Bauh. pin.* 53.
Narciſſus montanus juncifolius, calyce aureo. *Bauh. pin.* 53.

Pſeudo-Narciſſus juncifolius 2, flavo flore. *Cluſ. hiſt.* 1. *p.* 166.
Habitat inter Ulyſſiponem & Hiſpalim. ♃

ſerotinus. 4. NARCISSUS ſpatha uniflora, nectario breviſſimo ſexpartito. *Loefl.*
Narciſſus albus autumnalis minimus. *Bauh. pin.* 51. *Rudb. elyſ.* 2. *p.* 64. *f.* 8.
Narciſſus ſerotinus. *Cluſ. hiſt.* 1. *p.* 162.
Narciſſus autumnalis minor. *Cluſ. hiſp.* 251. *t.* 252.
Habitat in Hiſpania. ♃

Jonquilla. 5. NARCISSUS ſpatha multiflora, nectario campanulato brevi, foliis ſubulatis. *Hort. upſ.* 75.
Narciſſus foliis ſubulatis, florum nectario breviſſimo *Hort. cliff.* 134. *Roy. lugdb.* 35. *Sauv. monſp.* 19.
Narciſſus juncifolius luteus minor. *Bauh. pin.* 51.
Narciſſus juncifolius, oblongo calyce, luteus major. *Bauh. pin.* 51.
Narciſſus juncifolius minor & 2. *Cluſ. hiſt.* 1. *p.* 60.
Habitat inter Hiſpalim & Gades *inter* Guadalopam & Toletum *in uliginoſis.* ♃

Tazetta. 6. NARCISSUS ſpatha multiflora, nectario campanulato, foliis planis. *Hort. upſ.* 74.
Narciſſus foliis enſiformibus, florum nectario campanulato erecto petalis longe breviore. *Hort. cliff.* 134. *Roy. lugdb.* 35.
Narciſſus medio-luteus, copioſo flore: odore gravi. *Bauh. pin.* 50.
Narciſſus luteus polyanthos luſitanicus. *Bauh. pin.* 50.
Narciſſus flore pleno, 1. 2. *Cluſ. hiſt.* 1. *p.* 50.
Habitat in Galliæ Narbonenſis, Luſitaniæ, Hiſpaniæ *maritimis.* ♃

PANCRATIUM.

zeylanicum. 1. PANCRATIUM ſpatha uniflora, petalis reflexis. *Fl. zeyl.* 126.
Narciſſus zeylanicus, flore albo hexagono odorato. *Herm. lugdb.* 691. *t.* 693. *Comm. hort.* 1. *p.* 75. *t.* 38.
Catulli-pola. *Rheed. mal.* 11. *p.* - *t.* 40.
Habitat in India. ♃

maritimum. 2. PANCRATIUM ſpatha biflora. *Hort. cliff.* 135. *Roy. lugdb.* 34.

Pan-

Pancratium mexicanum, flore gemello candido. *Dill. elth.* 299. *t.* 222. *f.* 289.
Habitat in Mexico. ♃

3. PANCRATIUM ſpatha multiflora, foliis lanceolatis. *Hort. cliff.* 133. *caribæum*
Narciſſus americanus, flore multiplici albo hexagono odorato. *Comm. hort.* 2. *p.* 173. *t.* 87.
Narciſſus totus albus latifolius polyanthos major odoratus. *Sloan. jam.* 115. *hiſt.* 1. *p.* 244. *Mart. cent.* 27. *t.* 27.
Habitat in Jamaica, Caribæis. ♃

4. PANCRATIUM ſpatha multiflora, petalis planis, foliis lingulatis. *maritimum*
Narciſſus maritimus. *Bauh. pin.* 54.
Lilio-Narciſſus albus maritimus minor. *Moriſ. hiſt.* 2. *p.* 365. *ſ.* 4. *t.* 10. *f.* 28. *
Hemerocallis valentina. *Cluſ. hiſt.* 1. *p.* 167.
Habitat in Hiſpaniæ *maritimis circa* Valentiam & *infra* Monſpelium. ♃

5. PANCRATIUM ſpatha multiflora, foliis linearibus, ſtaminibus nectarii longitudine. *Carolinianum.*
LilioNarciſſus polyanthos, flore albo. *Catesb. car.* 3. *p.* 5. *t.* 5.
Habitat in Jamaica, Carolina ♃

6. PANCRATIUM ſpatha multiflora, foliis enſiformibus, ſtaminibus nectario longioribus. *Roy. lugdb.* 34. *illyricum,*
Narciſſus illyricus liliaceus. *Bauh. pin.* 55. *Seb. theſ.* 1. *p.* 17. *t.* 8. *f.* 1.
Lilionarciſſus hemerocallidis facie. *Beſl. eyſt. vern.* 3. *t.* 16. *f.* 1.
Habitat in Illyria? ♃

7. PANCRATIUM ſpatha multiflora, foliis ovatis nervoſis. *amboinenſe.*
Narciſſus amboinenſis, folio latiſſimo ſubrotundo. *Comm. hort.* 1. *p.* 77. *t.* 39.
Habitat in Amboina. ♃

CRINUM.

1. CRINUM foliis ovato-lanceolatis acuminatis ſeſſilibus planis. *latifolium.*
Sjovanna-pola-tali. *Rheed. mal.* 11. *p.* 77. *t.* 39.
Habitat in Aſiæ *arenoſis.* ♃

T 2 Fo-

Folia. 3. ſ. 4. *digitos transverſos lata, a baſi ſenſim attenuata* Antheræ *filiformes, lineares, incumbentes, longitudine dimidii filamenti ſ. corollæ.*

aſiaticum. 2. CRINUM foliis carinatis. *Fl. zeyl.* 127.
Lilium zeylanicum bulbiferum & umbelliferum. *Herm lugdb.* 682. *t.* 683.
Tanghekolli. *Rheed. mal.* 11. *p.* 75. *t.* 38.
Habitat in Malabaria, Zeylona. ♃

americanum 3. CRINUM corollarum apicibus introrſum ungviculatis
Crinum. *Hort. cliff.* 127. *Hort. upſ.* 76. *Roy. lugdb.* 37.
LilioAſphodelus americanus ſempervirens maximus polyanthus albus. *Comm. rar.* 14. *t.* 14. *Dill. elth.* 194. *t.* 160. *f.* 195.
β. LilioAſphodelus americanus ſempervirens minor albus. *Comm. rar.* 15. *t.* 15.
Habitat in America. ♃

africanum. 4. CRINUM foliis ſublanceolatis planis, corollis obtuſis.
Polianthes floribus umbellatis. *Vir. cliff.* 29. *Hort. cliff.* 126. *Roy. lugdb.* 27.
Hyacinthus africanus tuberoſus, flore cæruleo umbellato. *Breyn. prodr.* 1. *p.* 39. *icon.* 23. *t.* 10. *Comm. hort.* 1. *p.* 133. *t.* 67. *Seb. theſ.* 1. *p.* 29. *t.* 19. *f.* 4.
Hyacintho affinis, tuberoſa radice, africana, umbella cærulea inodora. *Pluk. alm.* 187. *t.* 195. *f.* 1.
Habitat in Æthiopia.

AMARYLLIS.

lutea. 1. AMARYLLIS ſpatha uniflora, corolla æquali, ſtaminibus declinatis. *Hort. cliff.* 135. *Roy. lugdb.* 36.
Narciſſus autumnalis major. *Cluſ. hiſt.* 1. *p.* 164.
Colchicum luteum 1. majus. *Baub. pin.* 69.
Habitat in Hiſpania, Italia, Thracia. ♃

Atamaſca, 2. AMARYLLIS ſpatha uniflora, corolla æquali, piſtillo declinato. *Hort. cliff.* 135. *Gron. virg.* 36. *Roy. lugdb.* 36.
LilioNarciſſus virginienſis. *Catesb. car.* 3. *p.* 12. *t.* 12.
LilioNarciſſus liliflorus carolinianus, flore albo ſingulari cum rubedine diluto. *Pluk. alm.* 220. *t.* 43. *f.* 3.
LilioNarciſſus indicus pumilus monanthos albus. *Moriſ. hiſt.* 2. *p.* 266. *ſ.* 4. *t.* 24. *f.* 4.
Habitat in Virginia. ♃

3. AMA-

3. AMARYLLIS ſpatha uniflora, corolla inæquali, genitalibus declinatis. *Hort. cliff.* 135. *Hort. upſ.* 75. *Act. ſtockh.* 1742. *p.* 93. *t.* 6. *Roy. lugdb.* 36. *formoſiſſima.*
LilioNarciſſus jacobæus, flore ſangvineo nutante. *Dill. elth.* 195. *t.* 162. *f.* 196.
Narciſſus jacobæus major. *Rudb. elyſ.* 2. *p.* 89. *f.* 10.
Habitat in America *meridionali.* ♃

4. AMARYLLIS ſpatha multiflora, corollis campanulatis æqualibus, genitalibus declinatis. *Hort. cliff.* 135. *Roy. lugdb.* 36. *Bella donna.*
LilioNarciſſus polyanthos, flore incarnato: fundo ex luteo albeſcente. *Sloan. jam.* 115. *hiſt.* 1. *p.* 244. *Seb. theſ.* 1. *p.* 25. *t.* 17. *f.* 1.
Lilium rubrum. *Merian. ſurin.* 22. *t.* 22.
Habitat in Caribæis, Barbados, Surinama. ♃

5. AMARYLLIS ſpatha multiflora, corollis revolutis, genitalibus ſtrictis. *Hort. upſ.* 75. *ſarnienſis.*
Amaryllis ſpatha mutiflora, corollis æqualibus patentiſſimis revolutis, genitalibus longiſſimis. *Hort. cliff.* 131. *Roy. lugdb.* 36.
Narciſſus japonicus, rutilo flore. *Corn. canad.* 157. *t.* 158. *Rudb. elyſ.* 2. *p.* 23. *f.* 14.
Lilium ſarnienſe. *Dugl. monogr. t.* 1. 2.
Habitat in Japonia, *nunc in* Sarniæ *inſula Angliæ.* ♃

6. AMARYLLIS ſpatha multiflora, corollis campanulatis æqualibus, ſcapo tereti ancipiti. *Roy. lugdb.* 36. *zeylanica.*
LilioNarciſſus zeylanicus latifolius, flore niveo externe linea purpurea ſtriato. *Comm. hort.* 1. *p.* 73. *t.* 73.
β. LilioNarciſſus africanus, ſcillæ foliis, flore niveo linea purpurea ſtriato. *Ehret. pict.* 5. *f.* 2.?
Habitat in Zeylona. ♃

7. AMARYLLIS ſpatha multiflora, corollis campanulatis æqualibus, ſcapo compreſſo longitudine umbellæ. *Roy. lugdb.* 36. *longifolia.*
Lilium africanum humile, longiſſimis foliis, polyanthos ſaturato colore purpuraſcens. *Herm. parad.* 195. *t.* 195.
Habitat in Æthiopia. ♃

8. AMARYLLIS ſpatha multiflora, corollis inæqualibus, foliis lingviformibus. *Büttn. cunon.* 215. *orientalis.*
Amaryllis ſpatha multiflora, foliis ovato-oblongis obtuſis. *Roy. lugdb.* 37.

LilioNarciſſus indicus maximus ſphæricus, floribus plurimis rubris liliaceis. *Moriſ. hiſt.* 2. *p.* 568. *ſ.* 4. *t.* 10. *f.* 35.
Narciſſus indicus orientalis. *Swert. flor.* 31. *f.* 1.
Habitat in India. ♃

guttata. 9. AMARYLLIS ſpatha multiflora, foliis ciliatis.
LilioNarciſſus ſphæricus æthiopicus, foliis guttatis & cilii inſtar piloſis. *Pluk. alm.* 220.
Lilium africanum ſphæricum, floribus obſolete puniceis minoribus, foliis guttatis ad margines cilii inſtar piloſis, bulbo longo. *Herm. lugdb.* 375.
Habitat in Æthiopia.

BULBOCODIUM.

vernum. 1. BULBOCODIUM foliis lanceolatis. *Roy. lugdb.* 41.
Bulbocodium. *Hort. cliff.* 133.
Colchicum vernum hiſpanicum. *Bauh. pin.* 69. *Rudb. elyſ.* 2. *p.* 128. *f.* 2.
Colchicum vernum. *Cluſ. hiſt.* 2. *app.* 203.
Habitat in Hiſpania. ♃

ſerotinum. 2. BULBOCODIUM foliis ſubulato-linearibus. *Roy. lugdb.* 41.
Bulbocodium alpinum juncifolium, flore unico: intus albo extus ſqualide rubente. *Raj. angl.* 3. *p.* 374. *t.* 17. *f.* 1.
Pſeudo-Narciſſus gramineo folio. *Bauh. pin.* 51. *prodr.* 27. *Rudb. elyſ.* 2. *p.* 64. *f.* 9.
Habitat in Alpibus Helvetiæ, Angliæ. ♃

APHYLLANTHES.

monſpelienſis 1. APHYLLANTHES. *Hort. cliff.* 493. *Sauv. monſp.* 8.
Aphyllanthes monſpelienſium. *Lob. adv.* 190. *Bauh. hiſt.* 3. *p.* 336.
Caryophyllus cæruleus monſpelienſium. *Bauh. pin.* 209. *Moriſ. hiſt.* 2. *p.* 562. *ſ.* 5. *t.* 25. *f.* 12.
Habitat Monſpelii *prope Caſtelneuf locis montoſis ſaxoſis ſterilibus.*

ALLIUM.

* *Foliis caulinis planis.*

Ampeloprasum. 1. ALLIUM caule planifolio umbellifero, umbella globoſa, ſtaminibus tricuſpidatis, radice laterali.
Allium ſtaminibus alterne trifidis, foliis gramineis, floribus ſphærice congeſtis, radice laterali ſolida. *Hall. all.* 5.
Por-

Porrum radice laterali ſolida, foliis linearibus, caule erecto, umbella ſubgloboſa. *Roy. lugdb.* 40.
Allium ſphærico capite, folio latiore ſ. Scorodopraſum alterum. *Bauh. pin.* 74. *Rudb. elyſ.* 2. *p.* 151. *
Habitat in Oriente, *inque inſula* Holms *Angliæ*.

2. ALLIUM caule planifolio umbellifero, ſtaminibus tricuſpidatis, radice tunicata. *Hort. upſ.* 77. *Mat. med.* 165. ***Porrum.***
Allium ſtaminibus alterne trifidis, foliis gramineis, floribus ſphærice congeſtis, radice tunicata cauli circumnata. *Hall. all.* 5.
Porrum radice ambiente tunicata oblonga ſolitaria. *Hort. cliff.* 136. *Roy. lugdb.* 40.
Porrum commune capitatum. *Bauh. pin.* 72.
Porrum ſativum latifolium. *Bauh. pin.* 72.
Habitat - - - -

3. ALLIUM caule planifolio umbellifero, umbella globoſa, ſtaminibus tricuſpidatis corolla longioribus. ***lineare.***
Porrum caule tereti folioſo, foliis linearibus planis, umbella globoſa, ſtaminibus corolla longioribus. *Gmel. ſibir.* 1. *p.* 56. *t.* 13. & 14. *f.* 1.
Habitat in Sibiria.

4. ALLIUM caule planifolio umbellifero, umbella globoſa, ſtaminibus lanceolatis corolla longioribus. *Mat. med.* 163. ***Victorialis.***
Allium foliis caulinis lanceolatis, floribus umbellatis. *Roy. lugdb.* 39.
Allium radice oblonga reticulo obducta. *Hall. all.* 17
Allium montanum latifolium maculatum. *Bauh. pin.* 74.
Allium anguinum. *Cam. epit.* 329.
Habitat in Alpibus Helvetiæ, Italiæ.

5. ALLIUM caule planifolio umbellifero, foliis inferioribus hirſutis, ſtaminibus ſubulatis. ***ſubhirſutum.***
Allium foliis radicalibus ſubhirſutis, caulinis glabris, floribus umbellatis. *Hall. all.* 15.
Allium foliis lanceolato-linearibus, florum umbella faſtigiata. *Roy. lugdb.* 39.
Moly anguſtifolium umbellatum. *Bauh. pin.* 75.
Moly dioſcoridis. *Cluſ. hiſt.* 1. *p.* 192.
Habitat in Africa, Italia, Hiſpania.

6. ALLIUM caule planifolio umbellifero, ramulo bulbifero, ſtaminibus ſimplicibus.

Allium caule tereti, propagine ex ala *Hort. cliff.* 137. *Roy. lugdb.* 39. *Sauv. monſp.* 18.

Allium foliis caulinis lanceolatis, floribus umbellatis, ex ala bulbiferum. *Hall. all.* 19.

Moly latifolium liliflorum. *Bauh. pin.* 75.

Moly indicum, flore purpureo. *Swert. Fl.* 61.

Habitat - - - - -

obliquum. 7. ALLIUM caule planifolio umbellifero, ſtaminibus filiformibus flore triplo longioribus, foliis obliquis.

Allium radice tunicata, foliis planis linearibus caulinis, capitulo umbellato. *Gmel. ſibir.* 1. *p.* 49. *t.* 9.

Habitat in Sibiria.

Caulis *bipedalis, teres.* Folia *alterna, plano-canaliculata, obliqua. Vaginis teretibus.* Umbella *globoſa*; Spatha *globoſa, acuminata.* Petala *ovata, erecta, concava, flava carina viridi.* Filamenta *albida, corolla duplo longiora. Antheræ luteæ.* Germen *ſubgloboſum.*

ramoſum. 8. ALLIUM caule ſubplanifolio umbellifero, ſtaminibus ſubulatis longioribus; umbella globoſa, foliis linearibus ſubconvexis.

Allium ſcapo nudo tereti farcto, foliis ſemicylindricis, ſtaminibus corolla longioribus. *Gmel. ſib.* 1. *p.* 52. *t.* 9. *f.* 1.

Habitat in Sibiria. *G. Demidoff*

Caulis *ferme bipedalis, teres.* Folia *alterna, planiuſcula, canaliculata, ſubtus convexa, margine obtuſa.* Umbella *globoſa.* Petala *ovata, purpuraſcentia carina ſaturatiore.* Filamenta *purpurea, corolla parum longiora. Antheræ violaceæ.* Germen *ſubrotundum: maculis* 3, *viridibus & medio caule ex ala folio oppoſita.* Ramus *nudus, longitudine caulis.*

roſeum. 9. ALLIUM caule planifolio umbellifero, umbella faſtigiata, ſtaminibus corollam æquantibus, foliis lævibus. †

Allium foliis enſiformibus, radice bulbillis ſtipata, floribus amplis umbellatis. *Sauv. monſp.* 42.

Allium ſylveſtre f. Moly minus, roſeo amplo flore. *Magn. monſp.* 11. *t.* 10.

Habitat Monſpelii *in vineis*

ſativum. 10. ALLIUM caule planifolio bulbifero, radice compoſita, ſtaminibus tricuſpidatis. *Hort. upſ.* 76. *Mat. med.* 164.

Al-

Allium radicis bulbo multipartito, capitulo bulbifero, foliis linearibus. *Hort. cliff.* 137. *Roy. lugdb.* 39.
Allium ſtaminibus alterne trifidis, foliis gramineis, capite bulbifero, radicibus in unum bulbum congruentibus. *Hall. all.* 1.
Allium ſativum. *Bauh. pin.* 73.
Allium. *Cam. epit.* 328.
Habitat in Sicilia.

11. ALLIUM caule planifolio bulbifero, foliis crenulatis: vaginis ancipitibus, ſtaminibus tricuſpidatis. *Hort. upſ.* 77. *Scorodoprasum.*
Allium capitulo bulboſo erecto, foliis planis ſubcrenatis, vaginis ancipitibus. *Fl. ſuec.* 266. *It. œl.* 60.
Allium ſtaminibus alterne trifidis, capite bulbifero, foliis gramineis læviter ſerratis. *Hall. all.* 3.
Allium montanum bicorne latifolium, flore dilute purpuraſcente. *Bauh. pin.* 74. *Rudb. elyſ.* 2. *p.* 155.*
β. Allium ſtaminibus alterne trifidis, capite bulbifero, ſcapo ante maturitatem contorto, *Hall. all.* 2.
Allium ſativum alterum ſ. Allioprasum caulis ſummo circumvoluto. *Bauh. pin.* 73.
Allii genus Ophioſcorodon dictum quibusdam. *Bauh. hiſt.* 2. *p.* 559.
Porrum radice laterali cordata ſolida, pedunculo revoluto, capite bulbifero. *Hort. cliff.* 136.
Habitat in Oelandia, Dania, Pannonia.

12. ALLIUM caule planifolio bulbifero, vaginis teretibus, ſpatha mutica, ſtaminibus tricuſpidatis. *It. ſca.* 227. *arenarium.*
Porrum planifolium, ſtaminibus alterne trifidis, umbella bulbifera. *Rupp. hall.* 154. *t.* 2. *f.* 2.
Habitat in Thuringia; *in Falſtria* Scaniæ.

13. ALLIUM caule planifolio bulbifero, ſtaminibus ſubulatis. *carinatum.*
Allium umbella bulbifera, vagina bicormi, foliis carinatis. *Hall. all.* 24. *t.* 1. *f.* 2.
Ampeloprasum proliferum. *Lob. ic.* 156. *
β. Allium montanum bicorne anguſtifolium, flore dilute purpuraſcente. *Bauh. pin.* 74.
Allium ſ. Moly montanum 2. *Cluſ. hiſt.* 1. *p.* 195.
Habitat in Germania.

* *Foliis caulinis teretibus.*

14. ALLIUM caule teretifolio umbellifero, foliis ſemiteretibus, ſtaminibus tricuſpidatis corolla longioribus. *ſphærocephalon.*

Allium ſtaminibus alterne trifidis, foliis gramineis, radice multiplici, floribus ſphærice congeſtis. *Hall. all.* 7.

Porrum caule tereti folioſo, foliis linearibus planis, umbella globoſa, ſtaminibus corolla longioribus. *Gmel. ſib.* 1. *p.* 56. *t.* 13. & 14. *f.* 1

Allium montanum, capite rotundo *Baub. pin.* 75. *Rudb. elyſ.* 1. *p.* 157. *f.* 7.

Allium ſ. Moly montanum, purpureo flore. *Cluſ. hiſt.* 1. p. 195.

Allii genus forte Scorodopraſum alterum. *Baub. hiſt.* 2. *p.* 564.

Scorodopraſum montanum juncifolium, capite-rotundo dilute janthino, floribus paucis. *Mich. gen.* 25. *t.* 24. *f.* 2.

Habitat in Italia, Sibiria, Helvetia.

deſcendens. 15. ALLIUM caule ſubteretifolio umbellifero, pedunculis exterioribus brevioribus, ſtaminibus tricuſpidatis. *Hort. upſ.* 78.

Allium ſtaminibus alterne trifidis, foliis fiſtuloſis, capite ſvave rubente ſphærico non bulbifero, radice laterali. *Hall. all.* 8.

Allium ſtaminibus alterne trifidis, foliis fiſtuloſis, capite ſphærico non bulbifero atropurpureo. *Hall. all.* 9. *t.* 1. *f.* 1.

Allium ſ. Moly latifolium, capite ſphærico, flore purpureo. *Rudb. elyſ.* 2. *p.* 160. *f.* 20.

Moly atropurpureum. *Rudb. elyſ.* 2. *p.* 165. *f.* 13.

Habitat in Helvetia.

moſchatum. 16. ALLIUM caule teretifolio ſubnudo umbellifero, umbella faſtigiata. petalis truncatis, ſtaminibus tricuſpidatis. *Lœfl.*

Allium foliis teretibus caulinis, floribus umbellatis. *Hall. all.* 14.

Moly moſchatum, capillaceo folio. *Baub. pin.* 76. *prodr.* 28. *t.* 28. *Rudb. elyſ.* 2. *p.* 166. *f.* 14.* *Sauv. monſp.* 10.

Habitat in GalloProvinciæ, Narbonæ, Hiſpaniæ *apricis clevatis.*

flavum. 17. ALLIUM caule teretifolio umbellifero, umbella globoſa, ſtaminibus ſubulatis.

Allium umbella non bulbifera lutea, vagina bicorni, foliis teretibus. *Hall. all.* 21.

Allium montanum bicorne, flore pallido odore. *Baub. pin.* 75.

Al-

Allium ſ. Moly montanum 4. *Cluſ. hiſt.* 1. *p.* 216.
Habitat in Pannonia.

18. ALLIUM caule teretifolio bulbifero, ſtaminibus tricuſpidatis. *vineale*
Allium ſtaminibus alterne trifidis, foliis fiſtuloſis, capite bulbifero, radice multiplici. *Hall. all.* 4.
Allium ſylveſtre campeſtre purpuraſcens. *Bauh. pin.* 74.
Allium campeſtre juncifolium capitatum purpuraſcens majus. *Bauh. pin.* 74.
Porrum ſylveſtre vinearum. *Bauh. pin.* 72.
Porrum ſylveſtre, gemino capite. *Bauh. pin.* 72.
Habitat in Germania.

19. ALLIUM caule teretifolio bulbifero, foliis ſcabris ſemiteretibus ſubtus ſulcatis. *oleraceum.*
Allium umbella bulbifera, vagina bicorni, foliis teretibus. *Hall. all.* 23. *f.* 4.
Cepa capitulo bulboſo prolifero, foliis ſemiteretibus novemangularibus ſcabris fiſtuloſis. *Fl. ſuec.* 265. *
Porrum radice ſolida, caule erecto, capitulo bulbifero. *Roy. lugdb.* 40. *Gort. gelr.* 69.
Allium montanum bicorne, flore exalbido. *Bauh. pin.* 75.
Habitat in Suecia, Germania.

* *Foliis radicalibus, ſcapo nudo.*

20. ALLIUM ſcapo nudo ancipiti, foliis linearibus planis, ſtaminibus tricuſpidatis. *Hort. upſ.* 80. *nutans.*
Porrum ſcapo nudo ancipiti, antequam floruerit nutante, foliis enſiformibus: hinc paullo convexioribus. *Gmel. ſibir.* 1. *p.* 55. *t.* 18.
Habitat in Sibiria.

21. ALLIUM ſcapo nudo ancipiti, foliis linearibus ſubtus convexis lævibus, umbella ſubrotunda, ſtaminibus ſubulatis. *Hort. upſ.* 79. *ſeneſcens.*
Allium caule ancipiti teretiuſculo, foliis enſiformibus: hinc paullo convexioribus. *Gmel. ſibir.* 1. *p.* 53. *t.* 11. *f.* 2.
Allium foliis linearibus, florum umbella ſubgloboſa. *Roy. lugdb.* 39.
Allium radice bulboſa, foliis gramineis, umbella erecta non bulbifera, vaginis breviſſimis. *Hall. helv.* 297. *all.* 16. *n.* 2.
Allium montanum, foliis narciſſi, majus. *Bauh. pin.* 75.

Habi-

Habitat in Sibiria, Sicilia.

Petala *erecta, a ſe invicem dehiſcentia ſ diſtantia, canaliculata, inflexa.*

angulosum. 22. ALLIUM ſcapo nudo ancipiti, foliis linearibus canaliculatis ſubtus ſubangulatis, umbella faſtigiata. *Hort. upſ.* 79. *

Cepa ſcapo nudo ſubangulato farcto, foliis linearibus ſubtus anguloſis, ſtaminibus corolla brevioribus. *Gmel. ſibir.* 1. *p.* 58. *t.* 14. *f.* 2.

Allium radice ſeneſcente lignoſa tranſverſa, umbella erecta. *Hall. all.* 16.

Allium petræum umbelliferum. *Bauh. hiſt.* 2. *p.* 564. *t.* 564.

Allium montanum, foliis narciſſi, minus. *Bauh. pin.* 75.

Habitat in Sibiriæ *humidiuſculis.*

Folia *interdum ſubtus vix angulata, at* Scapus *ſuperne parum angulato-ſtriatus;* Petala *interiora apice patentia, omnia lateribus conniventia.*

Confer Allium ſylveſtre ſ. Moly minus, violaceo amplo flore. *Magn. monſp.*

urſinum. 23. ALLIUM ſcapo nudo ſemicylindrico, foliis lanceolatis petiolatis, umbella faſtigiata.

Allium foliis lanceolatis, ſcapo nudo ſemicylindraceo, bulbo ſetis obvallato. *Fl. ſuec.* 263. *It. gotl.* 169.

Allium foliis radicalibus petiolatis, floribus umbellatis. *Roy. lugdb.* 39. *Hall. all.* 18. *Gmel. ſib.* 1. *p.* 49.

Allium foliis lanceolatis, umbella laxa. *Hort. cliff.* 27.

Allium ſylveſtre latifolium. *Bauh. pin.* 74.

Allium urſinum. *Fuchſ. hiſt.* 739. *Cam. epit.* 330.

Habitat in Europæ *ſeptentrionalioris nemoroſis.*

triquetrum. 24. ALLIUM ſcapo nudo triquetro.

Allium caule triangulo. *Tourneſ. inſt.* 385. *Roy. lugdb.* 39.

Moly parvum, caule triangulo. *Bauh. pin.* 75.

Moly caule & foliis triangularibus. *Park. par.* 142. *t.* 143. *f.* 4.

Habitat in Hiſpania.

Cepa. 25. ALLIUM ſcapo nudo inferne ventricoſo longiore foliis teretibus. *Hort. upſ.* 77. *Mat. med.* 166.

Allium ſtaminibus alterne trifidis, caule ad terram ventricoſo. *Hall. all.* 10.

Cepa ſcapo nudo ventricoſo foliis longiore, radice depreſſa. *Hort. cliff.* 137. *Roy. lugdb.* 40.

Ce-

Cepa vulgaris. *Bauh. pin.* 71.
Cepa. *Cam. epit.* 324.
Habitat - - - -

26. ALLIUM ſcapo nudo ſubcylindrico, foliis lanceolatis ſeſſilibus, umbella faſtigiata. *Hort. upſ.* 76. *Moly.*
Allium foliis radicalibus ſeſſilibus lanceolatis, floribus umbellatis. *Roy. lugdb.* 38. *Hall. all.* 20.
Allium foliis lanceolatis, umbella laxa. *Hort. cliff.* 27.
Moly latifolium luteum, odore allii. *Bauh. pin.* 75.
Moly flavo flore. *Swert. flor.* 1. *t.* 60. *f.* 2.
Moly montanum latifolium, flavo flore. *Cluſ. app. alt.*
Habitat in Hungaria, Baldo, Monſpelii.
Petala *patentia, tria exteriora magis patentia, interiora erecta.*

27. ALLIUM ſcapo nudo folia adæquante, foliis teretibus ventricoſis. *Hort. upſ.* 78. *fiſtuloſum.*
Allium ſtaminibus ſimplicibus, caule medio ventricoſo. *Hall. all.* 11
Cepa ſcapo longitudine foliorum, foliis ventricoſis, radice oblonga. *Hort cliff.* 136. *Roy. lugdb.* 40.
Cepa oblonga. *Bauh. pin.* 71. *Dod. pempt.* 687.
Habitat in - - - -

28. ALLIUM ſcapo nudo adæquante folia teretia ſubulato-filiformia. *Hort. upſ.* 48. *Schœnopraſum.*
Allium ſtaminibus ſimplicibus, foliis radicalibus teretibus ſcapi longitudine. *Hall. all.* 12.
Cepa ſcapis foliiſque ſubulatis teretibus fiſtuloſis æqualibus, ſpathis globoſis. *Fl. ſuec.* 264. *It. œl.* 54. 64.
Cepa ſcapo longitudine figuraque foliorum, foliis ſubulatis filiformibus, ſpathis globoſis. *Hort. cliff.* 136.
Porrum ſectivum juncifolium. *Bauh. pin.* 72.
Schœnopraſum. *Dod. pempt.* 689.
β. Cepa ſcapis foliiſque teretibus, capitulis pyramidatis. *Gmel. ſibir.* 1. *p.* 59. *t.* 15. *f.* 1.
Cepa paluſtris altiſſima. *Buxb. cent.* 4. *p.* 27. *t.* 45.
Habitat in alpeſtribus Sibiriæ, Oelandiæ *locis rupeſtribus.*

29. ALLIUM ſcapo nudo tereti inani, foliis ſubulatis filiformibus, capitulis laxis paucifloris. *Gmel. ſibir.* 1. *p.* 61. *t.* 15. *f.* 2. 3. *tenuiſſimum.*
Habitat in Sibiria.

30. ALLIUM ſcapo nudo ſubnullo, foliis linearibus. *ChamæMoly.*
Moly humile, folio gramineo. *Bauh. pin.* 75.

Cha-

ChamæMoly, an Moly dioſcoridis. *Columm. ecphr.* 325 *t.* 326.

Habitat in Italia.

LILIUM.

candidum. 1. LILIUM foliis ſparſis, corollis campanulatis: intus glabris. *Hort. cliff.* 120. *Hort. upſ.* 80. *Mat. med.* 173. *Roy. lugdb.* 30.

Lilium album, flore erecto, vulgare. *Bauh. pin.* 76.

Lilium candidum. *Dod. pempt.* 197.

β. Lilium album, floribus dependentibus, ſ. peregrinum. *Bauh. pin.* 76.

Habitat in Palæſtina, Syria. ♃

bulbiferum. 2. LILIUM foliis ſparſis, corollis campanulatis erectis intus ſcabris. *Hort. cliff.* 120. *Hort. upſ.* 80. *Roy. lugdb.* 31. *Gmel. ſibir.* 1. *p.* 41.

Lilium purpureo-croceum majus. *Bauh. pin.* 76.

β. Lilium purpureo-croceum, flore pleno.

γ. Lilium purpureo-croceum minus. *Bauh. pin.* 77.

δ. Lilium phœniceum. *Bauh. pin.* 77.

ε. Lilium bulbiferum latifolium majus. *Bauh. pin.* 7[illegible]

ζ. Lilium bulbiferum anguſtifolium. *Bauh. pin.* 77

η. Lilium bulbiferum minus. *Bauh. pin.* 77.

θ. Lilium bulbiferum incanum. *Bauh. pin.* 77.

Habitat in Italia, Auſtria, Sibiria. ♃

pomponium 3. LILIUM foliis ſparſis ſubulatis, floribus reflexis, corollis revolutis. *Hort. cliff.* 120. *Hort. upſ.* 81. *Roy. lugdb.* 31.

Lilium radice tunicata, foliis ſparſis, floribus reflexis, corollis revolutis. *Gmel. ſibir.* 1. *p.* 42.

Lilium, floribus [illegible], anguſtifolium. *Bauh. pin.* 78.

Lilium rubrum [illegible] *[illegible]ſ. hiſt.* 1. *p.* 133.

β. Lilium miniatum [illegible]ium. *Bauh. pin.* 79.

γ. Lilium brevi & gra[illegible]o. *Bauh. pin.* 79.

Habitat in Pyrenæis, [illegible] ♃

Folia *linearia, acuta, triquetra, canaliculata, ſparſa.* Nectarii *rima valde dentata.*

chalcedonicum. 4. LILIUM foliis ſparſis lanceolatis, floribus reflexis, corollis revolutis. *Hort. cliff.* 120. *Hort. upſ.* 81. *Roy. lugdb.* 31.

Lilium byzantinum miniatum. *Bauh. pin.* 78.

Lilium rubrum ſ. miniatum byzantinum. *Cluſ. hiſt.* 1 *p.* 131.

β Li-

β. Lilium byzantinum miniatum polyanthos. *Bauh. pin.* 78.
γ. Lilium purpuro-ſangvineum, flore reflexo. *Bauh. pin.* 78.
Hemerocallis calcedonica. *Lob. ic.* 169.
Habitat in Perſia. ♃
Racemus *ante floreſcentiam vix incurvatus ut in* 3. 5. *et* Caulis *usque ad apicem* Foliis *veſtitus confertis.*

5. LILIUM foliis verticillatis, floribus reflexis, corollis revolutis. *Hort. cliff.* 120. *Hort. upſ.* 81. *Gmel. ſibir.* 1. *p.* 44. *Roy. lugdb.* 31. *Martagon.*
Lilium, floribus reflexis, latifolium. *Bauh. pin.* 77.
Lilium ſylveſtre. *Dod. pempt.* 201.
β. Lilium, floribus reflexis, alterum hirſutum. *Bauh. pin.* 78.
Habitat in Hungaria, Helvetia, Sibiria, Lipſiæ.

6. LILIUM foliis verticillatis, floribus reflexis, corollis campanulatis. *canadenſe.*
Lilium anguſtifolium, flore flavo maculis nigris diſtincto. *Tournef. inſt.* 371. *Barr. rar.* 778. *t.* 125.
Lilium Martagon canadenſe maculatum. *Moriſ. hiſt.* 2. *p.* 408. *ſ.* 4. *t* 20. *f.* 9.
Lilium ſ. Martagon canadenſe, floribus magnis flavis non reflexis. *Catesb. car.* 3. *p.* 11. *t.* 11.
Habitat in Canada. ♃

7. LILIUM foliis verticillatis, flore erecto, corolla campanulata. *Amœn. acad.* 2 *p.* 348. * *camſchatcenſe.*
Habitat in Canada, Camſchatca.
e Camſchatca planta petalis ovatis ſeſſilibus, ſtigmatibus tribus absque ſtylo; e Canada petalis lanceolatis unguiculatis cum ſtylo; varietates tamen ſuere.

FRITILLARIA.

1. FRITILLARIA racemo comoſo inferne nudo, foliis integerrimis. *Hort. upſ.* 82. *imperialis.*
Petilium foliis caulinis. *Hort. cliff.* 119. *Roy. lugdb.* 30.
Lilium ſ. Corona imperialis: genus. *Bauh. pin.* 79.
Tuſai. *Cluſ. hiſt.* 1. *p.* 127. 128.
Habitat in Perſia? *e Conſtantinopoli venit in Europam circa* 1570. ♃

2. FRITILLARIA racemo comoſo inferne nudo, foliis crenatis. *regia.*
Corona regalis, lilii folio crenato. *Dill. elth.* 110. *t.* 93. *f.* 109.
Habitat ad Cap. b. Spei.

FRI-

perſica. 3. FRITILLARIA racemo nudiuſculo, foliis obliquis. *Hort. upſ.* 82.
Fritillaria racemo nudo terminali. *Hort. cliff.* 119.
Fritillaria radice rotunda. *Roy. lugdb.* 30.
Lilium perſicum. *Bauh. pin.* 79.
Lilium ſuſianum. *Cluſ. hiſt.* 1. *p.* 130.
Habitat in Perſia? *e Suſis venit in Europam* 1573. ♃

pyrenaica. 4. FRITILLARIA foliis infimis oppoſitis. *Hort. cliff.* 81.
Fritillaria flore minore. *Bauh. pin.* 64.
Fritillaria pyrenæa. *Cluſ. hiſt.* 1. *p* 256. *poſth.* 10.
Habitat in Pyrenæis. ♃

Meleagris. 5. FRITILLARIA foliis omnibus alternis. *Hort. upſ.* 81.
Fritillaria e foliorum alis florens. *Hort. cliff.* 119
Fritillaria radice depreſſa. *Roy. lugdb.* 30.
Fritillaria præcox purpurea variegata. *Bauh. pin.* 64.
Meleagris. *Reneal. ſpec.* 147. *t.* 146.
β. Fritillaria alba variegata. *Bauh. pin.* 64.
γ. Fritillaria alba præcox. *Bauh. pin.* 64.
δ. Fritillaria ſerotina atropurpurea. *Bauh. pin.* 64.
Habitat in Gallia, Italia. ♃

UVULARIA.

amplexifolia 1. UVULARIA foliis amplexicaulibus.
Uvularia foliis cordato-oblongis. *Roy. lugdb.* 29.
Smilax perfoliata ramoſa, flore albo. *Barr. rar.* 58, *t.* 720.
Polygonatum latifolium ramoſum. *Bauh. pin.* 302. *Bauh. hiſt.* 3. *p.* 531. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 537. *ſ.* 13. *t.* 4. *f.* 11. *Raj. hiſt.* 665.
Polygonatum latifolium 4 ramoſum. *Cluſ. hiſt.* 1. *p.* 276.
Laurus alexandrina. *Cam. epit.* 936
Habitat in Bohemiæ, Sileſiæ, Saxoniæ, Delphinatus *montibus.* ♃

perfoliata. 2. UVULARIA foliis perfoliatis. *Amœn. acad.* 2. *p.* 337
Uvularia caule perfoliato. *Gron. virg.* 37. *Cold. noveb.* 74.
Uvularia folio integerrimo. *Roy. lugdb.* 29.
Uvularia. *Hort. cliff.* 121.
Polygonum ramoſum, flore luteo, majus. *Corn. canad.* 38. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 538. *ſ.* 13. *t.* 4. *f.* 12.

Poly-

Polygonatum latifolium perfoliatum braſilianum. *Bauh. pin.* 303. *prodr.* 139. *Burſ. XVII.* 61.
Habitat in Virginia, Canada. *plantæ* Burſeri *ex Toupinambault Braſiliæ a pharmacopæo allatæ, & C.B. communicatæ videntur mihi omnes ex Canada fuiſſe.*

3. UVULARIA foliis ſeſſilibus. *ſeſſilifolia.*
Uvularia foliis ſeſſilibus, flore unico. *Cold. noveb.* 73.
Habitat in Canada. *Kalm.*
Habitus *præcedentis*; Caulis *bifidus, uniflorus.* Folia *lanceolato-ovata, alterna, at ubi Flos ex altero ramo exit, folia bina adſunt. Pedunculus nudus.*

GLORIOSA.

1. GLORIOSA. *Hort. cliff.* 121. *Fl. zeyl.* 122. *Roy. lugdb.* 29. *ſuperba.*
Methonica malabarorum. *Herm. lugdb.* 688. *t.* 689. *Pluk. alm.* 249. *t.* 116. *f.* 3.
Lilium zeylanicum ſuperbum. *Comm. hort.* 1. *p* 69. *t.* 31.
Mendoni. *Rheed. mal.* 7. *t.* 107. *f.* 57.
Habitat in Malabaria. ♃

ERYTHRONIUM.

1. ERYTHRONIUM. *Hort. cliff.* 119. *Gmel. ſib.* 1. *p.* 39. *t.* 7. *Roy. lugdb.* 30. *Dens canis.*
Dens canis latiore rotundioreque folio. *Bauh. pin.* 87.
Dens caninus. *Dod. pempt.* 203.
β. Dens canis anguſtiore longioreque folio. *Bauh. pin.* 87.
γ. Erythronium foliis ovato-oblongis glabris nigro maculatis. *Gron. virg.* 151. *flore flavo.*
Habitat in Liguria, Allobrogibus, *Auguſta* Taurinorum, Sibiria, Virginia. ♃

TULIPA.

1. TULIPA flore ſubnutante, foliis lanceolatis. *ſylveſtris.*
Tulipa minor lutea italica. *Bauh. pin.* 63.
Tulipa minor lutea gallica. *Bauh. pin.* 63. *Sauv. monſp.* 306.
Habitat Monſpelii, *inque* Apenninis, Lundini. ♃
Diſtinguitur *a ſequente*: Caule *altiore*, Foliis *anguſtioribus*, Floris *colore luteo ſubtus vireſcente*, petalis *acutioribus*, Scapo *verſus florem inflexo & ante floreſcentiam nutante. Sed præprimis ſtaminum* filamentis *baſi valde attenuatis, & ſupra baſin hirſutis.*

geſneriana. 2. TULIPA flore erecto, foliis ovato-lanceolatis.
Tulipa ſcapo triphyllo, foliis ovato-lanceolatis. *Hort. upſ.* 82.
Tulipa. *Hort. cliff.* 118. *Roy. lugdb.* 31. *Fl. ſuec.* 262.
Tulipa (genus fere totum) *Bauh. pin.* 57.
Tulipa turcarum. *Cord. hiſt.* 213.
Habitat in Cappadocia, *unde in Europam* 1559. ♃

breyniana. 3. TULIPA caule polyphyllo, foliis linearibus.
Siſyrinchium, ex phœniceo ſuaverubente flore, æthiopicum. *Breyn. cent. t.* 36. *Rudb. elyſ.* 2. *p.* 13. *f.* 11.
Habitat in Æthiopia. ♃

ORNITHOGALUM.

luteum. 1. ORNITHOGALUM ſcapo anguloſo diphyllo, pedunculis umbellatis ſimplicibus. *Fl. ſuec.* 270.
Ornithogalum ſcapo diphyllo, pedunculis ſimplicibus terminalibus, filamentis omnibus ſubulatis. *Hort. cliff.* 124. *Roy. lugdb.* 31.
Ornithogalum luteum. *Bauh. pin.* 71.
Pyrrochiton. *Reneal. ſpec.* 91. *t.* 90.
Habitat in Europæ *cultis macellis.* ♃

minimum. 2. ORNITHOGALUM ſcapo angulato diphyllo, pedunculis umbellatis ramoſis. *Fl. ſuec.* 271. *
Ornithogalum luteum minus. *Bauh. pin.* 71.
Hypoxis. *Reneal. ſpec.* 92.
Habitat in Europæ *cultis oleraceis.*

hirſutum. 3. ORNITHOGALUM ſcapo angulato, pedunculis umbellatis villoſis.
Ornithogalum ſcapo bifloro. *Roy. lugdb.* 31.
Ornithogalum virginianum luteum. *Pet. gaz.* 1. *t.* 1. *f.* 3.
Ornithogalum luteum parvum virginianum, foliis gramineis hirſutis. *Pluk. alm.* 272. *t.* 350. *f.* 12.
Ornithogalum vernum luteum, foliis anguſtis hirſutis. *Gron. virg.* 37.
Habitat in Virginia, Canada.
Spec 1. 2. 3. *maxime affines ſunt.*

bivalve. 4. ORNITHOGALUM floribus umbellatis, ſpatha bivalvi. *Gron. virg.* 37. †
Habitat in Virginia.

pyrenaicum. 5. ORNITHOGALUM racemo longiſſimo, filamen-
tis

tis lanceolatis, pedunculis floriferis patentibus æqualibus: fructiferis ſcapo approximatis.

Ornithogalum racemo longiſſimo, filamentis dilatato-linearibus, capſulis erectis. *It. ſcan.* 220.

Ornithogalum ſpica longiſſima, filamentis triangularibus. *Hall. helv.* 294.

Ornithogalum anguſtifolium majus, floribus ex albo vireſcentibus. *Bauh. pin.* 70. *Rudb. elyſ.* 2. *p.* 134. *f.* 5.

Ornithogalum majus. *Cluſ. hiſt.* 1. *p.* 187.

Ornithogalum pyrenaicum. *Cluſ. cur.* 21.

Stachyoides. *Reneal. ſpec.* 93. *t.* 90.

Habitat in Alpibus Helveticis, Genevenſibus, Pyrenaicis. ♃

6. ORNITHOGALUM racemo longiſſimo, foliis lanceolato-enſiformibus. *latifolium.*

Ornithogalum latifolium & maximum. *Bauh. pin.* 70.

Ornithogalum vel Lilium alexandrinum, floribus albis innummerabilibus. *Swert. floril.* 58.

Habitat in Arabia, Ægypto.

Folia *pedalia plus quam duos pollices lata.* ♃

7. ORNITHOGALUM racemo conico, floribus numeroſis adſcendentibus. *Roy. lugdb.* 32. *pyramidale.*

Ornithogalum anguſtifolium ſpicatum maximum. *Bauh. pin.* 70. *Rudb. elyſ.* 2. *p.* 134. *f.* 4.

Ornithogalum lacteum maximum. *Beſl. eyſt. vern.* 5. *t.* 14. *f.* 2.

Habitat in collibus Luſitaniæ. ♃

* *Staminibus alternis emarginatis.*

8. ORNITHOGALUM floribus corymboſis, pedunculis ſcapo humilioribus, filamentis emarginatis. *Roy. lugdb.* 32. *arabicum.*

Ornithogalum umbellatum maximum. *Bauh. pin.* 69.

Ornithogalum arabicum. *Cluſ. hiſt.* 1. *p.* 186. *Beſl. eyſt. vern.* 5. *t.* 12. *f.* 1.

Melanomphale. *Reneal. ſpec.* 89. *t.* 90.

Habitat juxta Alexandriam Ægypti. ♃

9. ORNITHOGALUM floribus corymboſis, pedunculis ſcapo altioribus, filamentis emarginatis. *Hort. cliff.* 124. *Hort. upſ.* 84. *Roy. lugdb.* 32. *umbellatum.*

Ornithogalum umbellatum medium anguſtifolium. *Bauh. pin.* 70.

Eliocarmos. *Reneal. ſpec.* 88. *t.* 87.

Habitat in Germannia, Gallia. ♃

nutans. 10. ORNITHOGALUM floribus ſecundis pendulis, nectario ſtamineo campaniformi.
Ornithogalum floribus ſecundis pendulis, filamentis latis emarginatis. *Hort. cliff.* 124. *Hort. upſ.* 84. *Roy. lugdb.* 32.
Ornithogalum exoticum, magno flore minori innato. *Bauh. pin.* 70. *Rudb. elyſ.* 1. *p.* 137. *f.* 12.
Ornithogalum neapolitanum. *Cluſ. app.* 2. *p.* 9. *t.* 9.
Habitat in Italia *Neapoli.* ♃

capenſe. 11. ORNITHOGALUM foliis cordato-ovatis. *Roy. lugdb.* 31.
Ornithogalum africanum, plantaginis roſeæ folio, radice tuberoſa. *Comm. hort.* 2. *p.* 175. *t.* 88.
Ornithogalo affinis radice tuberoſa, cyclaminis folio, flore pallide cæruleo. *Breyn. cent.* *t.* 41. *Rudb. elyſ.* 1. *p.* 138. *f.* 14.
Habitat ad Cap. b. Spei. ♃

canadenſe. 12. ORNITHOGALUM petalis alternis patentibus: interioribus erectis.
Ornithogalum luteo-virens indicum. *Corn. canad.* 160. *Rudb. elyſ.* 2. *p.* 140. *f.* 7. *Raj. hiſt.* 1154.
β. Ornithogalum africanum, flore viridi: altero alteri innato. *Herm. par.* 209. *t.* 209.
Habitat in Africa. ♃

SCILLA.

maritima. 1. SCILLA radice tunicata. *Hort. cliff.* 123. *Hort. upſ.* 89. *Mat. med.* 162. *Roy. lugdb.* 32.
Scilla vulgaris, radice rubra. *Bauh. pin.* 73.
Scilla hiſpanica. *Cluſ. hiſt.* 1. *p.* 171.
β. Scilla radice alba. *Bauh. pin.* 73.
Habitat ad Hiſpaniæ, Siciliæ, Syriæ *littoria arenoſa.* ♃

Lilio Hyacinthus. 2. SCILLA radice ſquamata. *Hort. cliff. Roy. lugdb.* 32.
Hyacinthus ſtellaris, folio & radice lilii. *Bauh. pin* 46.
Hyacinthus ſtellatus, lilii folio. *Bauh. pin.* 46.
Habitat in Biſcaria, Aquitania, Hiſpania, Pyrenæis. ♃

italica. 3. SCILLA radice ſolida, corymbo conferto hemiſphærico.
Scilla radice ſolida, floribus corymboſis confertiſſimis. *Hort. cliff.* 123. *Roy. lugdb.* 32.
Hyacinthus ſtellaris ſpicatus cinereus. *Bauh. pin.* 461.
Hyacinthus ſtellaris italicus. *Beſl. eyſt. vern.* 42. *f.* 1.
Hya-

Hyacinthus ſtellatus cinerei coloris. *Cluſ. hiſt.* 1. *p.* 184.
Habitat. - - - - ♃

4. SCILLA radice ſolida, corymbo conferto conico. *peruviana.*
Hyacinthus indicus bulboſus ſtellatus. *Bauh. pin.* 47. *Rudb. elyſ.* 1. *p.* 37. *f.* 1.
Hyacinthus ſtellatus peruanus. *Cluſ. hiſt.* 1. *p.* 182.
Habitat in Luſitania. ♃

5. SCILLA radice ſolida, floribus lateralibus alternis ſubnutantibus. *Hort. cliff.* 123. *Roy. lugdb.* 33. *amœna.*
Hyacinthus ſtellaris cæruleus amœnus. *Bauh. pin.* 46. *Rudb. elyſ.* 2. *p.* 34. *t.* 7.
Hyacinthus ſtellaris bizantinus. *Beſl. eyſt. vern.* 43. *f.* 3.
Habitat forte Bizantii, *unde venit in Europam* 1590. ♃

6. SCILLA radice ſolida, floribus erectiuſculis paucioribus. *Hort. cliff.* 123. *Roy. lugdb.* 33. *Sauv. monſp* 18. *bifolia.*
Hyacinthus ſtellaris bifolius germanicus. *Bauh. pin.* 45.
Hyacinthus cæruleus mas minor. *Fuchſ. hiſt.* 837.
Habitat in Gallia, Germania. ♃

7. SCILLA radice ſolida, foliis filiformibus linearibus, floribus corymboſis, pedunculis nudis adſcendentibus longitudine floris. *autumnalis.*
Scilla radice ſolida, foliis ſetaceis, floribus faſtigiatis, pedunculis arcuatis ex ala tuberculi mammillaris. *Guett. ſtamp.* 131. *Dalib. pariſ.* 102.
Scilla radice ſolida, ſcapo multifloro, floribus capitatis. *Sauv. monſp.* 19.
Hyacinthus ſtellaris autumnalis minor. *Bauh. pin.* 47.
Hyacinthus autumnalis minor. *Cluſ. hiſt.* 1. *p.* 185.
Habitat in Hiſpania, Gallia, Verona *ſolo glareoſo.* ♃

8. SCILLA folio teretiuſculo, latere ſubſpicato. *unifolia.*
Bulbus monophyllus, flore albo. *Bauh. hiſt.* 2. *p.* 622.
Habitat in Luſitania.

ASPHODELUS

1. ASPHODELUS caule folioſo, foliis triquetris fiſtuloſis. *Hort. cliff.* 127. *Hort. upſ.* 83. *Roy. lugdb.* 33. *luteus.*
Aſphodelus luteus flore & radice. *Bauh. pin.* 28.
Aſphodelus femina. *Cam. epit.* 372.
Habitat in Sicilia. ♂

2. ASPHODELUS caule nudo, foliis ſtrictis ſubulatis ſtriatis ſubfiſtuloſis. *Hort. cliff.* 83. * *fiſtuloſus.*

Aſphodelus caule nudo, foliis ſtrictis. *Roy. lugdb.* 34.
Aſphodelus foliis fiſtuloſis. *Bauh. pin.* 29.
Aſphodelus minor. *Cluſ. hiſt.* 1. *p.* 197.
Habitat in Gallo-Provincia, Hiſpania, Creta. ♃

ramoſus. 3. ASPHODELUS caule nudo, foliis enſiformibus carinatis lævibus. *Mat. med.* 172.
Aſphodelus caule nudo, foliis laxis. *Hort. cliff.* 127. *Roy. lugdb.* 24. *Sauv. monſp.* 20.
Aſphodelus albus ramoſus mas. *Bauh. pin.* 28.
Aſphodelus albus non ramoſus. *Bauh. pin.* 28.
Aſphodelus 1. 2. *Cluſ. hiſt.* 1. *p.* 197.
Habitat in Narbona, Luſitania, Hiſpania, Italia. ♃

ANTHERICUM.

* *Phalangium foliis canaliculatis.*

revolutum. 1. ANTHERICUM foliis planis, ſcapo ramoſo, corollis revolutis.
Aſphodelus foliis compreſſis aſperis, caule patulo. *Tournef. inſt.* 343.
Habitat - - - - ♃

ramoſum. 2. ANTHERICUM foliis planis, ſcapo ramoſo, corollis planis.
Anthericum foliis planis, corollis planis deciduis. *It. gotl.* 178. * *Fl. ſuec.* 267.
Anthericum caulibus ramoſis, foliis planis. *Guett. ſtamp. p.* 129.
Phalangium, parvo flore, ramoſum. *Bauh. pin.* 29.
Phalangium majus. *Cam. epit.* 580.
Habitat in Europæ *auſtralioris rupibus calcareis.* ♃

Liliago. 3. ANTHERICUM foliis planis, ſcapo ſimpliciſſimo. *Hort. upſ.* 83. *It. ſcan.*
Anthericum caulibus non ramoſis, foliis planis. *Guett. ſtamp.* 1. *p.* 128.
Phalangium, parvo flore, non ramoſum. *Bauh. pin.* 29. *Moriſ. hiſt.* 2. *p.* 333. *ſ.* 4. *t.* 1. *f.* 10.
Phalangium non ramoſum. *Lob. ic.* 48.
Habitat in Helvetia, Germania, Gallia.

* *Bulbine foliis carnoſis.*

fruteſcens. 4. ANTHERICUM foliis carnoſis teretibus, caule fruticoſo.
Anthericum cauleſcens, foliis pulpoſis teretibus ſubulatis ſupine convexo-planis. *Wæch. ultr.* 305.

Bul-

Bulbine caulefcens. *Hort. cliff.* 122. *Roy. lugdb.* 122.
Phalangium capenſe caulefcens, foliis cepitiis ſuccoſis. *Dill. elth.* 310. *t.* 231. *f.* 298.
Habitat ad Cap. b. Spei. ♄

5. ANTHERICUM foliis carnoſis ſubulatis planiuſculis. *Hort. upſ.* 83. *aloeides.*
Anthericum foliis pulpoſis lanceolato-ſubulatis ſupine excavatis. *Wach. ultr.* 304.
Bulbine acaulis. *Hort. cliff.* 123. *Roy. lugdb.* 33.
Phalangium capenſe ſeſſile, foliis aloeformibus pulpoſis. *Dill. elth.* 312. *t.* 232. *f.* 300.
Habitat ad Cap. b. Spei. ♃

6. ANTHERICUM foliis carnoſis ſubulatis ſemiteretibus ſtrictis. *Hort. upſ.* 83. *Aſphodeloides.*
Anthericum acaule, foliis pulpoſis teretibus ſubulatis ſupine convexo planis. *Wach. ultr.* 305.
Habitat in Æthiopia. ♃
Folia *vix ſtriata, ſed ſtricta, margine aſpera, dorſo verſus alterum latus gibboſiora.*

7. ANTHERICUM foliis carnoſis ſubulatis teretibus. *Hort. upſ.* 83. * *annuum.*
Anthericum acaule, foliis ſetaceis caule anguſtioribus. *Wach. ultr.* 305.
Habitat in Æthiopia. ☉

* *Narthecium foliis enſiformibus.*

8. ANTHERICUM foliis enſiformibus, filamentis lanatis. *Fl. ſuec.* 268. *Gmel. ſibir.* 1. *p.* 73. *t.* 18. *f.* 2. *oſſifragum.*
Anthericum ſcapo folioſo laxe ſpicato, filamentis villoſis. *Fl. lapp.* 136 *Roy. lugdb.* 45.
Narthecium. *Mœhr. E. N. C.* 1742. *p.* 389. *t.* 5. *f.* 1. *Wach. ultr.* 303. *Gort. gelr.* 69.
Pſeudo-Aſphodelus paluſtris anglicus. *Bauh. pin.* 29.
Aſphodelus luteus paluſtris. *Dod. pempt.* 208.
Habitat in Europæ *borealis uliginoſis.* ♃

9. ANTHERICUM foliis enſiformibus, perianthiis trilobis, filamentis glabris. *Fl ſuec.* 269. *It. gotl.* 194. 221. *calyculatum.*
Anthericum filamentis lævibus, perianthio trifido. *Hort. cliff.* 140. *Gron. virg.* 39
Anthericum ſcapo nudo capitato, filamentis glabris. *Fl. lapp.* 139. *t* 10. *f.* 3.

 Pha-

Phalangium alpinum paluſtre, iridis folio. *T. Segu. ver.* 2. *p.* 61. *t.* 14

PſeudoAſphodelus alpinus. *Bauh. pin.* 29.

Habitat in alpibus Helvetiæ, Lapponiæ, Sibiriæ. ♃

Genus *nullum in tota claſſe Liliacea difficilius determinatur:* 8 oſſifragum & 9 calyculatum *habitu toto ita uniuntur, ut demta fructificatione vix diſtinguantur, at Species 9 gerit Stamina glabra, Pericarpium ſubgloboſum, Stigmata tria ſine ſtylis & Perianthium trivalve.* Species 8 *annectitur ſpeciebus* 4. 5. 6. 7. *Staminibus hirſutis, at differt Germine pyramidato, Seminibus paleaceis, Corolla perſiſtente.* Species 1. 2. 3. *differunt a ſpeciebus* 4. 5. 6. 7, *Staminibus glabris, habitu Aſphodeli, adeoque vel ſub uno eodemque genere tradendæ, vel etiam ſub quatuor diſtinctis:* α. 1. 2. 3. β. 4. 5. 6. 7; γ. 8; δ. 9. *proponendæ; hoc dum fieret difficillime character ſpecierum α obtineretur.*

LEONTICE.

Chryſogonum. 1. LEONTICE foliis pinnatis: petiolo communi ſimplici. *Hort. cliff.* 122.

Leontopetalon foliis coſtæ ſimplici innaſcentibus. *Tournef. cor.* 49.

Leontopetalo affinis, foliis quernis. *Bauh. pin.* 324. *Moriſ. hiſt.* 2. *p.* 285. *ſ.* 3. *t.* 5. *f.* 3.

Chryſogonum dioſcoridis. *Rauv. itin.* 119. *Raj hiſt.* 1326.

Habitat inter Græciæ *ſegetes.* ♃

Leontopetalum. 2. LEONTICE foliis decompoſitis: petiolo communi trifido. *Hort. cliff.* 122.

Leontopetalon foliis coſtæ ramoſæ innaſcentibus. *Tournef. cor.* 49.

Leontopetalon. *Bauh. pin.* 324. *Cam. epit.* 565. *Moriſ. hiſt.* 2. *p.* 285. *ſ.* 3. *t.* 15. *f.* 6. *Raj. hiſt.* 1326.

Habitat in Apulia, Hetruria, Creta. ♃

Thalictroides. 3. LEONTICE folio caulino triternato (27), florali biternato (9).

Leontice foliis ſupradecompoſitis. *Gron. virg.* 151. * *Cold. noveb.* 75.

Habitat in Virginia. ♃

Modus creſcendi Epimedii. Caulis *nudus, terminatus* Foliis *tribus, patentibus, petiolatis:* Petiolus *ſingulus trifidus, adnatis novem foliolis, quorum lateralia duo, ſeſſilia, biloba; intermedium petiolatum, trilobum;* infra

infra diviſuram primam caulis exerit e latere ſolium Petiolis tribus: ſingulis ſimplicibus triphyllis, infra quos Racemus ſimplex cum duobus lateralibus.

4. LEONTICE foliis ſimplicibus tripartito-multifidis, corollis monopetalis calyculatis. † *Leontopetaloides.*
Leontopetaloides. *Amm. act.* 8. *p.* 211. *t.* 113.
Habitat in India.
Habitus *hujus generis, at flos videtur ſatis diverſus, an ſufficienter pro diſtincto genere determinent autoptæ.*

ASPARAGUS.

1. ASPARAGUS caule herbaceo erecto, foliis ſetaceis, ſtipulis paribus. *Fl. ſuec.* 272. *Mat. med.* 169. *Hort. cliff.* 121. *Roy. lugdb.* 28. *officinalis.*
α. Aſparagus maritimus, craſſiore folio. *Bauh. pin.* 490. maritimus.
β. Aſparagus ſylveſtris, tenuiſſimo folio. *Bauh. pin.* 490.
γ. Aſparagus ſativa. *Bauh. pin.* 489. altilis.
Aſparagus. *Cam. epit.* 259.
Habitat in Europæ *arenoſis.* ♃

2. ASPARAGUS caule inermi, ramis declinatis, foliis ſetaceis. *Roy. lugdb.* 29. *declinatus.*
Habitat in Africa.

3. ASPARAGUS aculeis ſolitariis, foliis enſiformibus falcatis. *Fl. zeyl.* 123. * *falcatus.*
Aſparagus foliis falcatis ex uno puncto numeroſis. *Burm. zeyl.* 36. *t.* 13. *f.* 2.
Habitat in Zeylona. ♄

4. ASPARAGUS aculeis ſolitariis, ramis reflexis retrofractiſque, foliis faſciculatis. *retrofractus.*
Aſparagus fruteſcens, foliis faſciculatis ſetaceis terminalibus, ramis reflexis retroflexis. *Hort. cliff.* 121. * *Roy. lugdb.* 28.
Aſparagus africanus tenuifolius, viminalibus virgis, foliis laricis ad inſtar ex uno puncto numeroſis ſtellatim poſitis. *Pluk. amalth.* 40. *t.* 375. *f.* 3.
Habitat in Africa. ♄

5. ASPARAGUS aculeis ſolitariis, caule erecto, foliis faſciculatis, ramis filiformibus. *aſiaticus.*
Aſparagus aculeis alternis, ramis ſolitariis filiformibus, foliis ſetaceis faſciculatis lateralibus. *Hort. cliff.* 122. * *Roy. lugdb.* 28.
Habitat in Aſia.

albus. 6. ASPARAGUS aculeis ſolitariis, ramis flexuoſis, foliis faſciculatis angulatis muticis deciduis.
Aſparagus aculeis ſolitariis, ramulis flexuoſis binis oppoſitis ſpinoſis folioſis, foliis faſciculatis. *Roy. lugdb.* 29.
Aſparagus aculeatus, ſpinis horridus. *Bauh. pin.* 490.
Corduba tertia. *Cluſ. hiſt.* 2. *p.* 178.
Habitat in Luſitania, Hiſpania. ♄

acutifolius. 7. ASPARAGUS caule inermi fruticoſo, foliis aciformibus perennantibus mucronatis ternis æqualibus.
Aſparagus foliis aciformibus pungentibus, caule fruticoſo inermi. *Sauv. monſp.* 45.
Aſparagus foliis acutis. *Bauh. pin.* 490.
Aſparagus ſylveſtris. *Cam. epit.* 260.
Habitat in Luſitania, Hiſpania. ♄

aphyllus. 8. ASPARAGUS aphyllus, ſpinis faſciculatis inæqualibus divergentibus. *Hort. cliff.* 122. *Roy. lugdb.* 29.
Aſparagus aculeatus alter, tribus aut quatuor ſpinis ad eundem exortum. *Bauh. pin.* 490.
Corduba altera. *Cluſ. hiſt.* 2. *p.* 178.
β. Aſparagus creticus fruticoſus, craſſioribus & brevioribus aculeis, magno fructu. *Tournef. itin.* 91. *t.* 15.
Habitat in Sicilia, Hiſpania, Luſitania. ♄

capenſis. 9. ASPARAGUS ſpinis lateralibus terminalibusque, ramis aggregatis, foliis faſciculatis.
Aſparagus foliis quinis ſetaceis, ſpinis terminalibus lateralibusque, ramulis ternis quaterniſque. *Hort. cliff.* 121.
Aſparagus aculeatus, triplici ſpina, ſurrectus. *Pluk. alm.* 54. *t.* 15. *f.* 4.
Habitat ad Caput b. Spei. ♄

ſarmentoſus. 10. ASPARAGUS foliis ſolitariis lineari lanceolatis, caule flexuoſo, aculeis recurvis. *Fl. zeyl.* 124. *
Aſparagus aculeatus zeylanicus maximus ſarmentoſus. *Herm. lugdb.* 62. *t.* 650. 63.
Habitat in Zeylona. ♄

CONVALLARIA.

* Lil. conv. *T. corollis campanulatis.*

majalis. 1. CONVALLARIA ſcapo nudo. *Fl. lapp.* 113. *Fl. ſuec.* 273. *Mat. med.* 167. *Hort. cliff.* 124. *Roy. lugdb.* 26. *Gmel. ſibir.* 1. *p.* 34.

Li-

Lilium convallium album. *Bauh. pin.* 304.
Lilium Convallium alpinum. *Bauh. pin.* 304.
Lilium convallium latifolium. *Bauh. pin.* 304.
Habitat in Europa *ſeptentrionali.* ♃

* * Polygonata *T. corollis infundibuliformibus.*

2. CONVALLARIA foliis verticillatis. *Fl. lapp.* 114. *Fl. ſuec.* 215. *Hort. cliff.* 125. *Roy. lugdb.* 26. *verticillata.*
Polygonatum anguſtifolium non ramoſum. *Bauh. pin.* 303
Polygonatum alterum. *Dod. pempt.* 345.
β. Polygonatum anguſtifolium ramoſum. *Bauh. pin.* 304.
Habitat in Europæ *ſeptentrionalis ſaltibus, præcipitiis.* ♃

3. CONVALLARIA foliis alternis amplexicaulibus, caule ancipiti, pedunculis axillaribus unifloris. *Mat. med.* 168. *Gmel. ſibir.* 1. *p.* 34. *Phil. bot.* 218. *Polygonatum.*
Convallaria foliis alternis, floribus axillaribus. *Fl. ſuec.* 274. *Hort. cliff.* 124. *Gron. virg.* 37. *Roy. lugdb.* 26.
Convallaria foliis alternis, pedunculis pendulis unifloris. *Sauv. monſp.* 42.
Polygonatum latifolium vulgare. *Bauh. pin.* 305.
β. Polygonatum floribus ex ſingularibus pedunculis. *Bauh. hiſt.* 3. *p.* 530.
Polygonatum latifolium, flore majore odoro. *Bauh. pin.* 303.
Habitat in Europæ *ſeptentrionalis præcipitiis rupibusque.* ♃

4. CONVALLARIA foliis amplexicaulibus, caule tereti, pedunculis axillaribus multifloris. *Phil. bot.* 218. *multiflora.*
Convallaria foliis alternis, pedunculis pendulis multifloris. *Sauv. monſp.* 42.
Polygonatum latifolium maximum. *Bauh. pin.* 303.
Polygonatum latifolium 1. *Cluſ. hiſt.* 1. *p.* 275.
Habitat in Europæ *ſeptentrionalis præcipitiis, rupibus.* ♃

* * Smilaces *T. corollis rotatis.*

5. CONVALLARIA foliis ſeſſilibus, racemo terminali compoſito. *racemoſa.*
Convallaria racemo compoſito. *Roy. lugdb.* 26.
Convallaria foliis alternis, racemo terminali. *Hort. cliff.* 125. *Gron. virg.* 38.
Polygonatum racemoſum. *Corn. canad.* 36. *t.* 37.
Polygonatum ramoſum & racemoſum ſpicatum. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 537. *ſ.* 13. *t.* 4. *f.* 9.

Po-

Polygonatum racemoſum amer canum, ellebori albi foliis ampliſſimis. *Pluk. alm.* 301. *t.* 311. *f.* 2.
Habitat in Virginia, Canada. ♃

ſtellata. 6. CONVALLARIA foliis amplexicaulibus plurimis, racemo terminali ſimplici.
Polygonatum virginianum erectum ſpicatum, flore ſtellato. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 536. *ſ.* 13. *t.* 4. *f.* 7.
Polygonatum canadenſe ſpicatum fertile. *Corn. canad.* 33. *t.* 33.
Habitat in Canada. ♃

trifolia. 7. CONVALLARIA foliis amplexicaulibus ternis, racemo terminali ſimplici.
Convallaria floribus racemoſis, foliis ovatis oblongis caulinis. *Gmel. ſibir.* 1. *p.* 36. *t.* 4.
Phalangium veratri foliis. *Amm. ruth.* 137.
Habitat in Sibiriæ *ſylvis.* ♃

bifolia. 8. CONVALLARIA foliis cordatis. *Fl. lapp.* 113. *Fl. ſuec.* 276. *Hort. cliff.* 125. *Roy. lugdb.* 26. *Gmel. ſibir.* 1. *p.* 35.
Lilium convallium minus. *Bauh. pin.* 304.
Gramen parnaſſi. *Cam. epit.* 744.
Habitat in Europæ *borealis pratis depreſſis aſperis.* ♃

POLIANTHES.

tuberoſa. 1. POLIANTHES.
Polianthes floribus alternis. *Hort. cliff.* 127. *Hort. upſ.* 76. *Fl. zeyl.* 225.
Hyacinthus indicus tuberoſus, flore narciſſi. *Bauh. pin.* 47. *Rudb. elyſ.* 2. *p.* 39. *f.* 4.
β. Hyacinthus indicus tuberoſus, flore hyacinthi orientalis. *Bauh. pin.* 47. *Rudb. elyſ.* 2. *p.* 38. *f.* 2.
Hyacinthus indicus, tuberoſa radice. *Cluſ. hiſt.* 1. *p.* 176.
Habitat in India. ♃

HYACINTHUS.

non ſcriptus. 1. HYACINTHUS corollis campanulatis ſexpartitis apice revolutis. *Hort. cliff.* 125. *Roy. lugd.* 27. *Sauv. monſp.* 17.
Hyacinthus, oblongo flore cœruleus major. *Bauh. pin.* 43.
Habitat in Anglia, Gallia, Hiſpania, Italia. ♃

Bra-

Bracteæ *ſunt ſæpius floribus longiores*, *&* *binæ*. Petala *apice revoluta*. Stigma *guttula madidum*.

2. HYACINTHUS corollis campanulatis ſexpartitis, racemo cernuo. *cernuus.*
Hyacinthus hiſpanicus. *Cluſ. hiſt.* 1. *p.* 177.
Hyacinthus, oblongo flore ſuaviter rubente, minor. *Bauh. pin.* 44.?
Habitat in Hiſpania. ♃
Convenit cum H. non ſcripto *habitu & facie, quamvis minor; differt vero Foliis magis linearibus, minus lanceolatis, erectioribus, Racemo magis nutante; Corollis incarnatis nec cæruleis, teretioribus, cum petalorum lateribus ad baſin minus plano patentibus nec dorſo linea elevata notatis, minusque revolutis (quamvis reflexa) quam in illo*; Piſtillum *demum* ſtaminibus *brevius eſt*. Bracteæ *binæ*, *ſaturatius incarnatæ*.

3. HYACINTHUS corollarum exterioribus petalis diſtinctis, interioribus coadunatis. *ſerotinus.*
Hyacinthus obſoleto flore. *Bauh. pin.* 44.
Hyacinthus, obſoleti coloris, hiſpanicus ſerotinus. *Cluſ. hiſt.* 1. *p.* 177.
Habitat in Hiſpania, Mauritania. ♃

4. HYACINTHUS corollis campanulatis ſemiſexfidis baſi cylindricis. *Hort. upſ.* 85. *amethyſtinus*
Hyacinthus, oblongo cæruleo flore, minor. *Bauh. pin.* 44. *Rudb. elyſ.* 2. *p.* 27. *f.* 8.
Hyacinthus minor hiſpanicus anguſtifolius. *Bauh. hiſt.* 2 *p.* 587.
Habitat in Hiſpania? ♃

5. HYACINTHUS corollis infundibuliformibus ſemiſexfidis baſi ventricoſis. *Hort. upſ.* 85. *Hort. cliff.* 125. *Roy. lugdb.* 27. *orientalis.*
Hyacinthus orientalis, (ſpec. 1 — 15) & plenus (1 — 3) *Bauh. pin.* 44.
Hyacinthus orientalis major & minor. *Dod. pempt.* 216.
Habitat in Aſia, Africa. ♃

6. HYACINTHUS corollis ovatis. *Hort. cliff.* 126. *Hort. upſ.* 85. *Roy. lugdb.* 28. *Muſcari*
Hyacinthus racemoſus moſchatus. *Bauh. pin.* 43.
Muſcari obſoletiore flore. *Cluſ. hiſt.* 1. *p.* 178.
Habitat in Aſia *ultra Boſphorum, inde in Europam ante* 1554. ♃

7. HYA-

monſtroſus. 7. HYACINTHUS corollis ſubovatis. *Vir. cliff.* 28. *Roy. lugdb.* 28.

β. Hyacinthus floribus paniculatis monſtroſis. *Hort. cliff.* 126.

Hyacinthus panicula cærulea. *Bauh. pin.* 42.

Hyacinthus ſanneſius, panicula comoſa. *Col. ecphr.* 2. *p.* 10. *t.* 12,

Habitat - - - primum inventa in agro Papienſi, & juxta Boran Galliæ. ♃

An ſequentis ſola varietas?

comoſus. 8. HYACINTHUS corollis angulato-cylindricis: ſummis ſterilibus longius pedicellatis.

Hyacinthus corollis globoſis: ſummis pedunculatis, foliis enſiformibus. *Sauv. monſp.* 17.

Hyacinthus comoſus major purpureus. *Bauh. pin.* 42.

Hyacinthus. *Cam. epit.* 798.

Habitat in Galliæ & Europæ *auſtralis agris.* ♃

botryoides. 9. HYACINTHUS corollis globoſis uniformibus, foliis canaliculato-cylindricis.

Hyacinthus corollis globoſis. *Hort. cliff.* 126. *Hort. upſ.* 85. *Roy. lugdb.* 28.

Hyacinthus corollis globoſis, foliis in cylindrum convolutis. *Sauv. monſp.* 19.

Hyacinthus racemoſus cæruleus minor juncifolius. *Bauh. pin.* 43.

Hyacinthus botryoides vulgaris. *Lob. ic.* 107.

Habitat in Italia.

racemoſus. 10. HYACINTHUS corollis ovatis: ſummis ſeſſilibus, foliis enſiformibus. *Sauv. monſp.* 17.

Hyacinthus racemoſus cæruleus minor latifolius. *Bauh. pin.* 43,

Hyacenthus botryoides 1. *Cluſ. hiſt.* 1. *p.* 181.

Habitat in Europa *auſtrali.* ♃

Orchioides. 11. HYACINTHUS corollis irregularibus ſexpartitis.

Hyacinthus orchioides africanus major bifolius maculatus, flore ſulphureo obſoleto majore. *Breyn. prodr.* 3. *p.* 24. *t.* 11. *f.* 2.

Habitat in Æthiopia. ♃

lanatus. 12. HYACINTHUS corollis lanatis, caule ramoſo. *Roy. lugdb.* 27.

Habitat - - - -

ALE-

ALETRIS.

1. ALETRIS. *Gen. nov.* 1076 *farinoſa.*
Hyacinthus caule nudo, foliis lingviformibus acuminatis dentatis. *Gron. virg.* 38.
Hyacinthus floridanus ſpicatus. *Pluk. amalth.* 119. *t.* 437. *f.* 3.
Habitat in America *ſeptentrionali.* ♃

YUCCA.

1. YUCCA foliis integerrimis. *Vir. cliff.* 29. *glorioſa.*
Yucca foliis margine integerrimis. *Hort. cliff.* 130. *Hort. upſ.* 88. *Roy. lugdb.* 29.
Yucca foliis aloës. *Bauh. pin.* 91.
Yucca indica, foliis aloës. *Barr. rar.* 70. *t.* 1194.
Cordyline foliis pungentibus integerrimis. *Roy. lugdb.* 22.
Habitat in Canada, Peru. ♄

2. YUCCA foliis crenulatis ſtrictis. *aloifolia.*
Yucca foliis crenulatis. *Vir. cliff.* 29.
Yucca foliorum margine crenulato. *Hort. cliff.* 130. *α.*
Yucca arboreſcens, foliis rigidioribus rectis ſerratis. *Dill. elth.* 435. *t.* 323. *f.* 416.
Aloë, yuccæ foliis, cauleſcens. *Pluk. alm.* 19. *t.* 256. *f.* 4.
Aloë americana, yuccæ folio, arboreſcens. *Comm. præl.* 64. *t.* 14.
Habitat in Jamaica, Vera Cruce. ♄

3. YUCCA foliis crenatis nutantibus. *draconis.*
Yucca foliorum margine crenulato. *Hort. cliff.* 130. *β.* *Hort. upſ.* 88.
Yucca draconis folio ſerrato. *Dill. elth.* 437. *t.* 324. *f.* 417. *Comm. præl.* 42. 67. *t.* 16.
Draconi arbori affinis americana. *Bauh. pin.* 506.
Cordyline foliis pungentibus crenatis. *Roy. lugdb.* 22.
Habitat in America. ♄

4. YUCCA foliis ſerrato-filamentoſis. *filamentoſa.*
Yucca foliis lanceolatis acuminatis integerrimis margine filamontoſis. *Gron. virg.* 152.
Yucca foliis filamentoſis. *Moriſ. hiſt.* 2. *p.* 419.
Yucca virginiana, foliis per marginem apprime filatis. *Pluk. alm.* 396.
Habitat in Virginia. ♄

ALOE.

1. ALOE floribus pedunculatis crenuis corymboſis ſub-cylindricis. *perfoliata.*

Aloë

Aloë foliis caulinis dentatis amplexicaulibus vaginantibus. *Hort. cliff.* 132. *Hort. upſ.* 86. *Roy. lugdb.* 23.

α. Aloë africana cauleſcens, foliis magis glaucis caulem amplectentibus & in mucronem obtuſiorem deſinentibus. *Comm. præl.* 68. *t.* 17. *rar.* 44. *t.* 44.

β. Aloë africana cauleſcens, foliis minus glaucis; dorſi parte ſuprema ſpinoſa. *Comm. præl.* 69. *t.* 18.

γ. Aloë africana cauleſcens, foliis glaucis latioribus & undique ſpinoſis. *Comm. præl.* 70. *t.* 19.

δ. Aloë africana cauleſcens, foliis glaucis breviſſimis, foliorum ſummitate interna & externa nonihil ſpinoſa. *Comm. præl.* 73. *t.* 22. *rar.* 45. *t.* 45.

ε. Aloë africana cauleſcens, foliis glaucis: dorſo integro ſpinoſo. *Comm. præl.* 71. *t.* 20.

ζ. Aloe africana caulescens, foliis glaucis brevioribus: foliorum parte interna & externa nonnihil ſpinoſa. *Comm. præl.* 71. *t.* 21.

η. Aloë africana cauleſcens, foliis glaucis caulem amplectentibus. *Comm. hort.* 2. *p.* 27. *t.* 14.

θ. Aloë africana caulescens, foliis ſpinoſis maculis ab utraque parte albicantibus notatis. *Comm. hort.* 2. *p.* 9. *t.* 5.

ι. Aloë africana caulescens perfoliata glauca & non ſpinoſa. *Comm. præl.* 74. *t.* 23.

κ. Aloë africana, foliis glaucis: margine & dorſi parte ſuperiore ſpinoſis, flore rubro. *Comm. præl.* 75. *t.* 24. *hort.* 2. *p.* 23. *t.* 12.

λ. Aloë africana maculata ſpinoſa major. *Dill. elth.* 17. *t.* 14. *f.* 15.

μ. Aloë africana maculata ſpinoſa minor. *Dill. elth.* 18. *t.* 14. *f.* 16.

ν. Aloë africana mitriformis ſpinoſa. *Dill. elth.* 21. *t.* 17. *f.* 19.

ξ. Aloë ſuccotrina anguſtifolia ſpinoſa, flore purpureo. *Comm. hort.* 1. *p.* 91. *t.* 48.

Aloë americana, ananæ floribus ſuave rubentibus. *Pluk. alm.* 19. *t.* 240. *f.* 4.

humilis. ο. Aloë foliis erectis ſubulatis radicatis undique inermi ſpinoſis. *Hort. cliff.* 131. *Roy. lugdb.* 24.

Aloë africana humilis, ſpinis inermibus & verrucoſis obſita. *Comm. præl.* 77. *t.* 26. *rar.* 46. *t.* 46.

Habitat in Æthiopia. ♄

Plantam ο ad hanc ſpeciem pertinere docuere flores, quamvis habitu videatur aliena.

vera. ✱ Aloe foliis ſpinoſis confertis dentatis vaginantibus planis

planis maculatis. *Hort. cliff.* 130. *Hort. upſ.* 86. *Mat. med.* 160. *Roy. lugdb.* 22.
Aloe vulgaris. *Bauh. pin.* 386.
Kadanaku ſ. Catevala. *Rheed. mal.* 11. *p.* 7. *t.* 3.
Habitat in Indiis. ♄
Flores nobis non viſi, ideoque non determino; facies tamen ita præcedentis eſt, ut eandem eſſe vix dubitarem.

2. ALOE floribus pedunculatis cernuis racemoſis priſmaticis: ore patulo æquali. *variegata.*
Aloe foliis canaliculatis trifariam imbricatis radicatis erectis: angulis cartilagineis ternis. *Hort. cliff.* 132. *Hort. upſ.* 87. *Roy. lugdb.* 24.
Aloe africana humilis, foliis ex albo viridi variegatis. *Comm. præl.* 79. *t.* 28. *rar.* 27. *t.* 27. *Till. piſ.* 7. *t.* 7.
Habitat in Æthiopiæ *argilloſis.* ♃

3. ALOE floribus pedunculatis, pedunculis ovato-cylindricis curvis. *diſticha.*
Aloe foliis linguiformibus patulis diſticis. *Hort. cliff.* 132. *Hort. upſ.* 86. *Roy. lugdb.* 23.
Aloe africana, flore rubro, folio maculis albicantibus ab utraque parte notato. *Comm. hort.* 2. *p.* 15. *t.* 8.
β. Aloe africana flore rubro, folio triangulari & verrucis albicantibus ab utraque parte notato. *Comm. hort.* 2. *p.* 17. *t.* 9.
Aloe africana ſeſſilis, foliis carinatis verrucoſis. *Dill. elth.* 22. *t.* 18. *f.* 20.
δ. Aloe africana, foliis planis conjugatis carinatis verrucoſis, caule & flore corallii colore. *Mart. cent.* 11. *t.* 11.
ε. Aloe africana arboreſcens montana non ſpinoſa, folio longiſſimo plicatili, flore rubro. *Comm. hort.* 2. *p.* 5. *t.* 3. *plicatilis.*
Habitat in Africæ *rupibus.* ♄

4. ALOE floribus ſeſſilibus horizontalibus infundibuliformibus æqualibus limbo revolutis. *hyacinthoides.*
Aloe foliis lanceolatis planis rectis radicatis. *Hort. cliff.* 32. *Hort. upſ.* 85. *Fl. zeyl.* 130. *Roy. lugdb.* 24.
α. Aloe zeylanica pumila, foliis variegatis. *Comm. hort.* 2. *p.* 41. *t.* 21. *Pluk. alm.* 19. *t.* 256. *f.* 5. *zeylanica.*
β. Aloe guineenſis, radice geniculata, foliis e viridi & atro undulatim variegatis. *Comm. hort.* 2. *p.* 39. *t.* 20. *præl.* 84. *t.* 23. *guineenſis.*

Habitat α *in* Zeylona, β. *in* Guinea. ♃
Plantæ β flores non vidi, dubiam emendent vel confirment autoptæ.

ſpiralis. 5. ALOE floribus ſeſſilibus ovatis crenatis: ſegmentis interioribus conniventibus.
Aloë foliis ovatis acuminatis caulinis quinquefariam imbricatis. *Hort. cliff.* 132. *Hort. upſ.* 87. *Roy. lugdb.* 23.
Aloë africana erecta rotunda, folio parvo & in acumen acutiſſimum exeunte. *Dill. elth.* 16. *t.* 13. *f.* 14. *Comm. præl.* 83. *t.* 32.
Habitat in Africæ *campeſtribus.* ♄

retuſa. 6. ALOE floribus ſeſſilibus triquetris bilabiatis: labio inferiore revoluto.
Aloë foliis rhomboidalibus ventricoſis quinquefariam poſitis radicatis triquetris plano exſtantibus. *Hort. cliff.* 132. *Hort. upſ.* 87. *Roy. lugdb.* 24.
Aloë africana, breviſſimo craſſiſſimoque folio, flore viridi. *Comm. hort.* 2. *p.* 2. *p.* 11. *t.* 6. *Till. piſ.* 6. *t.* 5.
Habitat in Africæ *argilloſis.* ♃

viſcoſa. 7. Aloë floribus ſeſſilibus infundibuliformibus bilabiatis: laciniis quinque revolutis: ſumma erecta.
Aloë foliis canaliculatis trifariam imbricatis: caulinis apice reflexo-patulis. *Hort. cliff.* 132. *Hort. upſ.* 87. *Roy. lugdb.* 23.
Aloë africana erecta triangularis & triangulari folio viſcoſo. *Comm. præl.* 82. *t.* 31. *Till. piſ.* 6. *t.* 5. *Dill. elth.* 15. *t.* 13. *f.* 13.
Habitat in Æthiopiæ *campeſtribus.* ♃

pumila. 8. ALOE floribus ſeſſilibus bilabiatis: labio ſuperiore erecto; inferiore patente.
margaritifera. α. Aloë foliis ovato-ſubulatis acuminatis tuberculis cratilagineis undique adſperſis. *Hort. cliff.* 131. *Roy. lugdb.* 24.
Aloë africana, folio in ſummitate triangulari, margaritifera, flore ſubviridi. *Comm. hort.* 2. *p.* 19. *t.* 10.
β. Aloë africana margaritifera minor. *Comm. hort.* 2. *p.* 21. *t.* 11. *Dill. elth.* 19. *t.* 16. *f.* 17.
γ. Aloë africana margaritifera minima. *Comm. præl.* 43. *Dill. elth.* 20. *t.* 16. *f.* 18.
arachnoidea. δ. Aloë africana humilis arachnoidea. *Comm. præl.* 72. *t.* 27.

ε. A-

8. Aloë foliis ovato-lanceolatis carnoſis apice triquetris: angulis inerme dentatis. *Hort. cliff.* 131. *Hort. upſ.* 86. *Roy. lugdb.* 24.
Aloë africana minima atroviridis, ſpinis herbaceis numeroſis ornata. *Boerh. lugdb.* 2. *p.* 131. *t.* 131.
Habitat in Æthiopiæ *campeſtribus.* ♃
Flores *in hoc genere ſpecierum certiſſimi indices conjungunt Margaritiferam & Arachnoideam.*

9. ALOE floribus ſeſſilibus reflexis imbricatis priſmaticis. *Uvaria.*
Aloë foliis linearibus radicalibus membranaceis. *Hort. cliff.* 133. *Roy. lugdb.* 23.
Aloë africana folio triangulari longiſſimo & anguſtiſſimo, floribus luteis fœtidis. *Comm. hort.* 2, *p.* 29. *t.* 15. *Seb. theſ.* 1. *p.* 29. *t.* 19. *f.* 3.
Habitat ad Cap. b. Spei. ♃

AGAVE.

1. AGAVE foliis dentato-ſpinoſis, ſcapo ramoſo. *Gen. nov.* 1102. *americana.*
Agave foliis ſpinoſo-dentatis mucronatisque. *Hort. upſ.* 81.
Aloë foliis lanceolatis dentatis ſpina terminatis radicalibus. *Hort. cliff.* 130. *Roy. lugdb.* 22.
Aloë folio in oblongum mucronem abeunte. *Baub. pin.* 286.
Habitat in America *calidiore.* ♄

2. AGAVE foliis dentatis, ſtaminibus corollam æquantibus. *vivipara.*
Aloë americana polygona. *Comm. rar.* 65. *t.* 65.
Habitat in America.
Confer. Aloe americana ſobolifera. *Herm. lugdb.* 16. *t.* 17.

3. AGAVE foliis dentato-ſpinoſis, ſcapo ſimpliciſſimo. *Gen. nov.* 1102. *virginica.*
Aloe foliis lanceolatis ſpina cartilaginea terminatis, floribus alternis ſeſſilibus. *Gron. virg.* 152.
Habitat in Virginia. ♃

4. AGAVE foliis integerrimis. *Gen. nov.* 1102. *fœtida.*
Aloe foliis integerrimis patentiuſculis aculeo-terminatis, radice cauleſcente. *Hort. cliff.* 132.
Aloe americana, viridi rigidiſſimo & fœtido folio, Piet dicta indigenis. *Comm. hort.* 2. *p.* 35. *t.* 18.

Aloe americana, radice tuberoſa, minor. *Pluk. alm.* 19. *t.* 258. *f.* 2.
Habitat in Curacao. ♄

HEMEROCALLIS.

Lilio Aſphodelus. 1. HEMEROCALLIS ſcapo ramoſo, corollis monopetalis. *Hort. upſ.* 88.
Hemerocallis radice tuberoſa, corollis monopetalis. *Hort. cliff.* 128. *Roy. lugdb.* 26.

flavus. α. Hemerocallis radice tuberoſa, corollis monopetalis luteis. *Gmel. ſib.* 1. *p.* 37.
LilioAſphodelus luteo flore. *Cluſ. hiſt.* 1. *p.* 137.
Lilium luteum, aſphodeli radice. *Bauh. pin.* 80.

fulvus. β. Lilium rubrum, aſphodeli radice. *Bauh. pin.* 80.
Lilio-aſphodelus puniceus. *Cluſ. hiſt.* 1. *p.* 137.
Habitat α *in* Hungariæ, Sibiriæ *campis uliginoſis, at* β. *Hybrida & conſtans, ex* India *Orientali.* ♃

Liliaſtrum. 2. HEMEROCALLIS ſcapo ſimplici, corollis hexapetalis campanulatis. *Hort. cliff.* 128. *Roy. lugdb.* 27. *Hall. helv.* 290.
Phalangium magno flore. *Bauh. pin.* 29.
Phalangium allobrogicum majus. *Cluſ. app. alt.*
Phalangium. *Dalech. hiſt.* 852.
Habitat in Alpibus Helveticis, Allobrogicis. ♃
Habitu conveniunt Hæc, Antherica 1. 2. 3, *Aſphodeli* 2. 3, *ſed quis character connecteret?*

ACORUS.

Calamus. 1. ACORUS. *Roy. lugdb.* 6. *Fl. ſuec.* 277. *Mat. med.* 16.

vulgaris. α. Acorus verus ſ. Calamus aromaticus officinarum. *Bauh. pin.* 34. *Hort. cliff.* 137.
Typha aromatica, clava rugoſa. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 246 *ſ.* 8. *t.* 13. *f.* 4.

verus. β. Acorus aſiaticus, radice tenuiore. *Herm. lugdb.* 9. *Fl. zeyl.* 132.
Waembu. *Rheed. mal.* 11. *p.* 99. *t.* 60.
Habitat α *in* Europæ, β. *in* Indiæ *foſſis paludoſis.* ♃

ORONTIUM.

aquaticum. 1. ORONTIUM. *Gen. nov.* 1086. *f.* 3. *
Arum folio enervi ovato. *Gron. virg.* 113.
Arum fluitans, pene nudo. *Baniſt. virg.* 1926.
Habitat in Virginiæ, Canadæ *paludibus, ſcaturiginibus.* ♃

HÆ-

HÆMANTHUS.

1. HÆMANTHUS foliis lingviformibus planis. *Roy. lugdb.* 42. *coccineus.*
   Hæmanthus foliis obtuſis baſi truncatis. *Hort. cliff.* 127.
   Hæmanthus africanus. *Comm. hort.* 2. *p.* 127. *t.* 64.
   Habitat ad Cap. b. Spei. ♃

2. HÆMANTHUS foliis lanceolatis undulatis. *Hort. cliff.* 127. *Hort. upſ.* 127. *Roy. lugdb.* 42. *puniceus.*
   Hæmanthus colchici foliis, perianthio herbaceo. *Dill. elth.* 167. *p.* 140. *t.* 2.
   Hyacintho affinis africana, bulboſa radice, caule elegantiſſime maculato. *Seb. theſ.* 1. *p.* 20. *t.* 12. *f.* 1. 2 3.
   Orchis ſ. Satyrium e Guinea. *Swert. flor.* 1. *p.* 62. *f.* 3.
   Habitat in Africa. ♃

CALAMUS.

1. CALAMUS. *Rotang.*
   Arundo zeylanica ſpinoſiſſima major, fructibus rotundis ſcabris acidis. *Burm. zeyl.* 36. *Fl. zeyl.* 468.
   Arundo nucifera Rotang dicta, fructu ſpadicei coloris ſtriis purpureis venuſte teſſulato. *Pluk. alm.* 53.
   Arundo Rotang dicta. *Piſ. mant.* 188.
   Fructus cannæ de Benghala. *Bauh. pin.* 405.
   Habitat in Indiæ *ſylvis juxta fluenta.* ♄

JUNCUS.

* *Culmis nudis.*

1. JUNCUS culmo ſubnudo tereti mucronato, panicula terminali, involucro diphyllo ſpinoſo. *acutus.*
   Juncus culmo pungente, panicula ex folii ſolitarii axilla. *Sauv. monſp.* 9.
   Juncus panicula univerſali culmo breviore infime coarctata, ſecundariis paululum laxis, capſulis triquetro-ſubovatis nitentibus. *Guett. ſtamp.* 2. *p.* 412.
   Juncus acutus, capitulis ſorghi. *Bauh. hiſt.* 2. *p.* 520. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 232. *ſ.* 8. *t.* 10. *f.* 15.
   β. Juncus panicula univerſali culmo longiore, ſecundariis laxis longe pedunculatis: media præcipue. *Guett. ſtamp.* 2. *p.* 412.
   Juncus acutus maritimus anglicus. *Raj. hiſt.* 1303. *Moriſ. ibid. f.* 14.
   Habitat in Angliæ, Galliæ, Italiæ *maritimis paludoſis.* ♃

conglomeratus. 2. JUNCUS culmo nudo ſtricto, capitulo laterali. *Roy. lugdb.* 44. *Fl. ſuec.* 278.
Juncus lævis, panicula non ſparſa. *Bauh. pin.* 12. *theatr.* 183.
Juncus lævis, panicula conglomerata. *Scheuch. gram.* 343.
Juncus. *Cam. epit.* 780.
Habitat in Europæ *borealis uliginoſis.* ♃

effuſus. 3. JUNCUS culmo nudo ſtricto: panicula laterali. *Roy. lugdb.* 44. *Fl. ſuec.* 279.
α. Juncus culmo nudo acuminato ad baſin ſquamato, floribus ſeſſilibus. *Fl. lapp.* 116. *Hall. helv.* 254.
Juncoides alpinum, floſculis junci glomeratis atrofuſcis. *Scheuch. hiſt.* 323.
β. Juncus culmo nudo acuminato ad baſin ſquamato, floribus pedunculatis. *Fl. lapp.* 117. *Gron. virg.* 38.
Juncus lævis, panicula ſparſa, major. *Bauh. pin.* 12. *theatr.* 182. *Scheuch. gram.* 341.
Juncus lævis. *Dod. pempt.* 606.
Habitat in Europæ *uliginoſis*, α *in alpibus.* ♃

inflexus. 4. JUNCUS culmo nudo: apice membranaceo incurvo, panicula laterali.
Juncus culmo nudo, paniculam arcuatim tegente. *Sauv. monſp.* 9.
Juncus, acumine reflexo, major. *Bauh. pin.* 12. *prodr.* 184. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 233. *ſ.* 8. *t.* 10. *f.* 25. *Barr. ic.* 204. *Hall. helv.* 252.
Juncus, acumine reflexo, alter. *Bauh. pin.* 12. *prodr.* 22. *Scheuch. gram.* 345.
γ. Juncus panicula univerſali laterali culmo longiore, ſecundariis ſparſis. *Guett. ſtamp.* 412.
Juncus acutus, panicula ſparſa. *Bauh. pin.* 412.
Habitat in Europa *auſtrali.* ♃

filiformis. 5. JUNCUS culmo nudo filiformi nutante, panicula laterali. *Roy. lugdb.* 44. *Gron. virg.* 152. *Fl. ſuec.* 280.
Juncus parvus, calamo ſupra paniculam longius producto. *Raj. angl.* 3. *p.* 432. *Fl. lapp.* 118.
Juncus lævis, panicula ſparſa, minor. *Bauh. pin.* 12. *theatr.* 183. *Scheuch. gram.* 347. *t.* 7. *f.* 1.
Habitat in Europæ *uliginoſo-paludoſis turfoſis.* ♃

trifidus. 6. JUNCUS culmo nudo, foliis floribusque tribus terminalibus. *Fl. lapp.* 119. *Fl. ſuec.* 281. *Roy. lugdb.* 43. *Hall. helv.* 253.

Jun-

Juncus, acumine reflexo, minor & trifidus. *Bauh.pin* 12. *prodr.* 22. *t.* 22. *theatr.* 186.
Juncoides alpinum trifidum. *Scheuch. gram.* 325.
Habitat in Alpibus Lapponicis, Helveticis, Pyrenæis. ♃

7. JUNCUS culmo nudo, foliis ſetaceis, capitulis glomeratis aphyllis. *Fl. ſuec.* 282. *ſquarroſus.*
Juncus foliis ſetaceis, culmo nudo, capitulis glomeratis terminalibus. *Roy. lugdb.* 44.
Juncus montanus paluſtris. *Raj. hiſt.* 1303. *Fl. lapp.* 121.
Gramen junceum, foliis & ſpica junci. *Bauh. pin.* 5.
Gramen junceum, ſemine acuminato. *Læſ. pruſſ.* 115. *t.* 29.
Habitat in Europæ *borealis ſeſpitoſis.* ♃

* *Culmis folioſis.*

8. JUNCUS foliis nodoſo-articulatis. *Fl. ſuec.* 285. *articulatus.*
Juncus foliis articuloſis, panicula inæquali, capitulis ſeſſilibus, capſulis ſubulatis triquetris. *Roy. lugdb.* 43.
Juncus foliis articuloſis, floribus umbellatis. *Tournef. inſt.* 247. *Fl. lapp.* 120.
Gramen junceum, folio articulato, aquaticum. *Bauh. pin.* 5. *prodr.* 12. *theatr.* 76. *Scheuch. gram.* 331.
β. Gramen Junceum, folio articoloſo, cum utriculis. *Bauh. prodr.* 12. *Scheuch. gram.* 333.
γ. Juncus alpinus, folio articuloſo. *Scheuch. gram.* 333.
Gramen junceum, folio articuloſo, ſylvaticum. *Bauh. pin.* 5. *theatr.* 75. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 227. *ſ.* 8. *t.* 9. *f.* 1. *Scheuch. gram.* 334.
δ. Junci folioſi, foliis per ſiccitatem nodoſis. *Mich. gen.* 38. *n.* 1.--- 13.
Habitat in Europæ *aquoſis.* ♃

9. JUNCUS foliis linearibus canaliculatis,, capſulis obtuſis. *Fl. ſuec.* 284. *bulboſus.*
Juncus foliis linearibus canaliculato-concavis, capſulis triangularibus. *Guett. ſtamp.* 134.
Juncus foliis angulatis, culmo ſubnudo, panicula terminali prolifera, capſulis ovatis. *Roy. lugdb.* 43.
Gramen junceum minimum, capſulis triangularibus. *Raj. hiſt.* 1307. *angl.* 3. *p.* 434. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 227. *ſ.* 8. *t.* 9. *f.* 3.
Juncus bulbifer, foliis teretibus non articuloſis. *Mich. gen.* 39. *n.* 1. 2. 3.
β Juncoides calycibus paleaceis glomeratis, folio varians. *Scheuch. gram.* 39.

Gra-

Gramen junceum aquaticum, paniculis cum foliis capillaribus ſimul ortis proliferum. *Pluk. alm.* 179. *t.* 32. *f.* 3. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 227. *ſ.* 8. *t.* 9. *f.* 4.

γ. Juncus folioſus minimus campeſtris & nemorenſis. *Gron. virg.* 15.

Gramen junceum elatius, pericarpiis ovatis, americanum. *Pluk. alm.* 179. *t.* 92. *f.* 9.

Gramen junceum virginianum, calyculis paleaceis, bicorne. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 228. *ſ.* 8. *t.* 9. *f.* 15.

Habitat in Europæ *paſcuis ſterilibus ſubhumidis, at γ in* Sibiria, Virginia.

bufonius. 10. JUNCUS culmo dichotomo, foliis angulatis, floribus ſolitariis ſeſſilibus. *Roy. lugdb.* 43. *Fl. ſuec.* 283. *Hall. helv.* 251.

Juncus paluſtris humilior, panicula laxiſſima. *Rupp. jen.* 130. *Fl. lapp.* 122.

Gramen nemoroſum, calyculis paleaceis, erectum. *Scheuch. gram.* 327.

Gramen nemoroſum, calyculis paleaceis. *Bauh. pin.* 7. *theatr.* 100.

Holoſteum. *Lob. ic.* 18.

β. Gramen nemoroſum, calyculis paleaceis, repens. *Scheuch. gram.* 329.

γ. Gramen nemoroſum, calyculis paleaceis, ſpecies altera procerior. *Scheuch. gram.* 328.

ζ. Gramen bufonium erectum anguſtifolium majus. *Barr. ic.* 264.

ε. Gramen holoſteum alpinum minimum. *Bauh. pin.* 7. *prodr.* 64. *theatr.* 101.

Gramen juncoides minimum anglo-britannicum. *Raj. angl.* 3. *p.* 434.

Habitat in Europæ *inundatis.* ☉

biglumis. 11. JUNCUS folio ſubulato, gluma biflora terminali. *Amœn. acad.* 2. *p.* 266. *t.* 3. *f.* 3. *

Habitat in Alpibus Lapponicis. *D. Montin.* ♃

Planta faciem gerit Schœni ferruginei.

triglumis. 12. JUNCUS foliis planis, gluma triflora terminali. *Fl. ſuec.* 286.

Juncus gluma triflora culmum terminante. *Fl. lapp.* 115. *t.* 10. *f.* 5.

Juncus exiguus montanus mucrone carens. *Bauh. pin.* 12. *prodr.* 22. *theatr.* 183. *Rudb. elyſ.* 1. *p.* 103. *f.* 8.

Habitat frequens in Alpibus Lapponicis, TauroRaſtadienſi. ♃

13. JUN-

13. JUNCUS foliis planis piloſis, corymbo ramoſo, *Fl. ſuec.* 287. *piloſus.*
Juncus foliis planis, panicula diffuſa, pedunculis proliferis: floſculis intermediis ſeſſilibus. *Roy. lugdb.* 43.
Gramen nemoroſum hirſutum latifolium majus. *Bauh. pin.* 7. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 225. *ſ.* 8. *t.* 9. *f.* 1. *
β. Gramen hirſutum anguſtifolium perenne, lini utriculis. *Barr. ic.* 740.
γ. Juncus foliis planis, culmo paniculato, floribus ſparſis. *Fl. lapp.* 124.
Gramen hirſutum nemoroſum anguſtifolium alpinum, paniculis obſcure rufeſcentibus. *Scheuch. gram.* 312. *t.* 6.
δ. Gramen nemoroſum hirſutum latifolium majus. *Scheuch. gram.* 317.
Gramen hirſutum latifolium maximum, juncea panicula. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 225. *ſ.* 8. *t.* 9. *f.* 2.
ε. Gramen hirſutum anguſtifolium majus. *Bauh. pin.* 7. *prodr.* 16. *theatr.* 105. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 225. *ſ.* 8. *t.* 9. *f.* 3. *Scheuch. gram.* 318.
ζ. Gramen hirſutum latifolium minus. *Bauh. theatr.* 102.
η. Juncoides montanum nemoroſum, flore niveo. *Scheuch. gram.* 320.
Gramen hirſutum anguſtifolium minus, paniculis albis. *Bauh. pin.* 7. *theatr.* 106,
Habitat in Europæ *ſylvis, at varietates* β. δ. ε. ζ. η. *in Europæ auſtralioribus,* γ. *in Alpibus.* ♃

14. JUNCUS foliis planis ſubpiloſis, ſpicis ſeſſili pedunculatiſque. *Fl. ſuec.* 288. *campeſtris.*
Juncus foliis planis, panicula rara, ſpicis ſeſſilibus pedunculatiſque. *Hort. cliff.* 137. *Roy. lugdb.* 42. *Gron. virg.* 38.
Juncus villoſus, capitulis pſyllii. *Tournef. inſt.* 246. *Fl. lapp.* 126.
Juncoides villoſum, capitulis pſyllii. *Scheuch. gram.* 310.
Gramen hirſutum, capitulis pſyllii. *Bauh. pin.* 7. *theatr.* 103.
β. Juncus foliis planis, culmo paniculato, ſpicis ovatis. *Fl. lapp.* 127. *t.* 10. *f.* 2.
γ. Juncoides hirſutum, capitulo glomerato. *Scheuch. gram.* 312.
Gramen hirſutum, capitulo globoſo. *Bauh. pin.* 7. *theatr.* 104.
δ. Juncus montanum nemoroſum villoſum latifolium elatius

larius, capitulis florum candidis & ſplendentibus. *Mich. gen.* 42.

ε. Juncoides latifolium alpinum glabrum, panicula ſublutea ſplendente. *Scheuch. gramen.* 314.

ζ. Gramen hirſutum elatius, panicula juncea compacta. *Raj. angl.* 3. *p.* 416.

η. Juncoides bohemicum, panicula minore nigricante, ſcapo ſuper eandem erecto & longius producto. *Mich. gen.* 42.

Habitat in Europæ *paſcuis ſiccioribus.* ♃

ſpicatus. 15. JUNCUS foliis planis, ſpica racemoſa nutante. *Fl. lapp.* 125. *t.* 10. *f.* 4. *Fl. ſuec.* 289.

Juncus alpinus latifolius, panicula racemoſa nigricante pendula. *Till. piſ.* 91.

Habitat in Lapponiæ *Alpibus.* ♃

RICHARDIA.

ſcabra. 1 RICHARDIA. *Houſt. mſſ.*

Habitat in Vera Cruce. ♃

Planta ex ſiccatis XLIV. Caulis *altus, brachiatus, ſubarticulatus, obſolete tetragonus, hiſpidus: Pilis rigidiuſculis, ſparſis, reflexis.* Folia *e lanceolato-ovata, alternatim nervoſa, integerrima, ſubpetiolata, ſcabra.* Flores *in capitula terminali a, paſſim etiam in verticillas congeſti; capitula terminalia, radiata Foliis* 4. *vel pluribus, ſcilicet alternis minoribus.* Corollulæ *ut in Aſperulis, tenues, longæ, ſed ſexfidæ & fructus ex* 3 *ſeminibus; ſic differt a Spermacoce numero & cæteris.*

PRINOS.

verticillatus 1. PRINOS foliis longitudinaliter ſerratis.

Prinos. *Gron. virg.* 39. *

Habitat in Virginia. ♄

glaber. 2. PRINOS foliis apice ſerratis.

Habitat in Canada. *Kalm.* ♄

Arbor. Foliis *alternis, petiolatis, oblongis, conſiſtentibus, glabris, verſus apicem ſerraturis utrinque ſæpius binis acutis, facie ferme Myricæ.* Pedunculi *axillares, parvi, ſæpius triflori.* Flores *non vidi.*

BERBERIS.

vulgaris. 1. BERBERIS pedunculis racemoſis. *Mat. med.* 290.

Ber

Berberis ſpinis triplicibus. *Hort. cliff.* 122. *Fl. ſuec.* 290. *Roy. lugdb.* 438. *Hall. helv.* 424.
Berberis dumetorum. *Bauh. pin.* 454.
Berberis vulgaris ſ. Creſpinus. *Cam. epit.* 86.
Habitat in Europæ *ſylvis.* ♄

2. BERBERIS pedunculis unifloris. *cretica.*
Berberis cretica, buxi folio. *Tournef. cor.* 42.
Berberis alpina cretica. *Bauh. pin.* 454.
Lycium creticum. *Alp. exot.* 21. *t.* 20.
Lycium e Candia. *Pon. ital.* 137.
Habitat in Creta. ♄

LORANTHUS.

1. LORANTHUS. *americanus.*
Loranthus racemoſus, flore coccineo, baccis nigris. *Vaill. act.* 1722. *p.* 274.
Lonicera flore coccineo, baccis nigris. *Plum. gen.* 17.
Habitat in America *calidiore.* ♄

FRANKENIA.

1. FRANKENIA foliis linearibus baſi ciliatis. *lævis.*
Frankenia foliis confertis. *Roy. lugdb.* 452.
Frankenia foliis aciformibus congeſtis *Sauv. monſp.* 46.
Franca floribus ſolitariis ſeſſilibus, foliis priſmaticis triangularibus. *Guett. ſtamp.* 2. *p.* 459.
Franca maritima ſupina ſaxatilis glauca ericoides ſempervirens, flore purpureo. *Mich. gen.* 23. *t.* 22. *f.* 1.
Lychnis ſupina maritima, ericæ facie. *Raj. angl.* 3. *p.* 38.
Anthyllis repens italica, thymi foliis, rubente flore, polygoni facie. *Till. piſ.* 46.
Cali ſ. Vermiculari marinæ non diſſimilis planta. *Bauh. hiſt.* 3. *p.* 703.
Polygonum fruticoſum ſupinum ericoides cinereum, thymi folio, hiſpanicum. *Barr. ic.* 714. *Bocc. muſ.* 1. *p.* 7. *t.* 11.
Polygonum maritimum minus, foliis ſerpylli. *Bauh. pin.* 281.
Habitat in Europæ *auſtralis maritimis.* ♃

2. FRANKENIA caulibus hirſutis, floribus faſciculatis terminalibus. *hirſuta.*
Franca maritima ſupina multiflora candida, caulibus hirſutis, foliis quaſi vermiculatis. *Mich. gen.* 23. *t.* 22. *f.* 2.

Poly-

Polygonum creticum, thymi folio. *Bauh. pin.* 281. *prodr.* 131.
Alſine cretica maritima ſupina, caule hirſuto, foliis quaſi vermiculatis. *Tournef. cor.* 45.
Habitat in Apulia, Creta.

pulverulenta 3. FRANKENIA foliis obovatis retuſis ſubtus pulveratis.
Frankenia foliis ovalibus. *Sauv. monſp.* 168.
Franka maritima quadrifolia ſupina, chamæſyces folio & facie. *Mich. gen.* 23.
Anthyllis valentina. *Cluſ. hiſt* 2. *p.* 186.
Anthyllis marina, chamæſyces ſimilis. *Bauh. pin.* 282.
Habitat in Suſexiæ, Narbonæ, Italiæ, Apuliæ *littoribus.* ☉
In ordine Naturali ad XL referatur.

PEPLIS.

Portula. 1. PEPLIS. *Fl. lapp.* 128. *Fl. ſuec.* 291. *Hall. helv.* 406.
Glaucoides paluſtre, portulacæ folio, flore purpureo. *Mich. gen.* 21. *t.* 18.
Glaux paluſtris, flore ſtriato clauſo, foliis portulacæ. T. *Petit. gen.* 43. *t.* 43.
Glaux aquatica, folio ſubrotundo. *Loeſ. pruſſ.* 106. *t.* 20.
Glaux altera, ſubrotundo folio. *Vaill. pariſ.* 80. *t.* 15. *f.* 5.
Alſine paluſtris minor ſerpillifolia. *Bauh. pin.* 251.
Habitat in Europæ *inundatis.* ☉

DIGYNIA.

VELEZIA.

rigida. 1. VELEZIA. *Lœfl.*
Silene foliis ſubulatis cauli appreſſis calycibus rigidis intermedio longioribus. *Sauv. monſp.* 145.
Lychnis ſylveſtris minima, exiguo flore. *Bauh. pin.* 206. *prodr.* 103.
Lychnis minima rigida cherleri. *Bauh. hiſt.* 3. *p.* 352. *Raj. hiſt.* 997.
Lychnis corniculata minor. *Barr. rar.* 665. *t.* 1018. 1017. *Bocc. muſ.* 2. *p.* 50. *t.* 43.
Habitat in Europa *auſtrali.* ☉
Stamina *tenuiſſima difficillime numerantur; in ſiccis ſpecimini-*

ciminibus 5 vidi; at in vivis *circiter 6 Lœfling. Si hujus ordo naturalis ſit n. XL, numerus naturalis erit ſtaminum ſex, ſi vero XLII, erit quinque.*

ORYZA.

1. ORYZA. *Bauh. pin.* 24. *theatr.* 479. *Cam. epit.* 192. *Dod. pempt.* 509. *Catesb. car.* 1. *p.* 14. *t.* 14. *Hort. cliff.* 137. *Mat. med.* 174. *Roy. lugdb.* 58. *ſativa.*
Habitat forte in Æthiopia, *colitur in* Indiæ *paludoſis.* ☉

ATRAPHAXIS.

1. ATRAPHAXIS ramis ſpinoſis. *Hort. cliff.* 138. *Roy. lugdb.* 409. *ſpinoſa.*
Atriplex orientalis, frutex aculeatus, flore pulchro. *Tournef. cor.* 38. *Buxb. cent.* 1. *p.* 19. *t.* 30. *Dill. elth.* 47. *t.* 40. *f.* 47.
Habitat in Media *ad urbem* Hanſen *locis glareoſis juxta fluvios.* ♄

2. ATRAPHAXIS inermis. *undulata.*
Atraphaxis inermis, foliis undulatis. *Hort. cliff.* 137. *Roy. lugdb.* 409.
Arbuſcula africana repens, folio ad latera criſpo, ad polygona relata. *Dill. elth.* 36. *t.* 32. *f.* 36.
Habitat in Æthiopia? ♄

TRIGYNIA.

FLAGELLARIA.

1. FLAGELLARIA. *Fl. zeyl.* 133. *Amœn. acad.* 1. *p.* 398. *indica.*
Panambu-valli. *Rheed. mal.* 7. *p.* 99. *t.* 53. *Raj. ſuppl.* 573.
Habitat in Java, Malabaria, Zeylona. ♄
Frutex *humanam altitudinem ſuperans.* Rami *diſtichi.*

RUMEX.

* *Hermaphroditi: valvulis floris granulo notatis.*

1. RUMEX floribus hermaphroditis: valvulis integerrimis: unica granifera, foliis cordatis. *Mat. med.* 178. *Patientia.*
Lapathum hortenſe, folio oblongo. *Bauh. pin.* 114.
Lapathum ſativum. *Dod. pempt.* 648.

Ha-

Habitat in Italia. ♃
Confer. Lapathum hortenſe latifolium. *Bauh. pin.* 115.

ſanguineus. 2. RUMEX floribus hermaphroditis: valvulis integerrimis: unica granifera, foliis cordato-lanceolatis. *Hort. cliff.* 138. *Hort. upſ.* 89. *Mat. med.* 528. *Roy. lugdb.* 220.
Lapathum folio acuto rubente. *Bauh. pin.* 115.
Lapathum rubens. *Dod. pempt.* 650. *Cam. epit.* 229.
Habitat in Virginia. ♃
Valvula exterior floris grano magno globoſo rubro notata, rarius & altera grano minimo.

alpinus. 3. RUMEX floribus hermaphroditis: valvulis integerrimis graniferis, foliis imis ellipticis. *Sauv. monſp.* 69.†
Rumex folio pedali cordato, radice repente. *Lemonier. Sauv. monſp.* 111.
Lapathum androgynum obtuſifolium, ſpica confertiſſima. *Hall. helv.* 170.
Lapathum hortenſe rotundifolium ſ. montanum. *Bauh. pin.* 115.
Lapathum rotundifolium. *Cluſ. hiſt.* 2. *p.* 69.
Habitat in Helvetia, Monſpelii. ♃

verticillatus. 4. RUMEX floribus hermaphroditis: valvulis integerrimis: omnibus graniferis foliis lanceolatis: vaginis cylindricis.
Lapathum aquaticum, foliis longis anguſtis acutis, floribus ad genicula verticillatim congeſtis. *Gron. virg.* 39.
Habitat in Virginia. ♃

Britannica. 5. RUMEX floribus hermaphroditis: valvulis integerrimis: omnibus graniferis, foliis lanceolatis: vaginis obſoletis. *Mat. med.* 17.
Rumex aquatica, calycis foliolis omnibus æqualibus, radice externus nigra vel flava. *Cold. noveb.* 83.
Lapathum foliis longis latis vix acuminatis coſtis caulibusque rubentibus, radice intus crocea. *Gron. virg.* 39.
Habitat in Virginia. ♃
In præcedenti ſtipula cylindrica membranacea fere ad dimidium vaginans internodium, in hac vero non item, ſed ut in Europæis. Pedicelli in priori craſſiores in hac capillares; prior magis ſpicata; hæc magis paniculata. Plantam Gron. in Fl. virginica habui a Cl. Autore, quæ non rubra erat caule aut coſtis.

6. RU-

6. RUMEX floribus hermaphroditis: valvulis trifido-ſetaceis: unica granifera. *Hort. upſ.* 89. *ægyptiacus.*
Rumex floribus hermaphroditis, foliis oblongis, valvulis dentato-ſetaceis longiſſimis. *Wach. ultr.* 391.
Lapathum ægypticum, capſula ſeminis alba & crenata. *Dill. elth.* 191. *t.* 158. *f.* 191.
Lapathum ægyptiacum annuum, parietariæ foliis, capſula ſeminis longius barbata. *Till. piſ.* 43. *t.* 37. *f.* 1.
Habitat in Ægypto. ⊙

7. RUMEX floribus hermaphroditis: valvulis dentatis: omnibus graniferis, foliis lanceolatis. *perſicarioides.*
Habitat in Virginia. ⊙
Planta *ſpithamæa, ramoſiſſima.* Folia *lanceolata, petiolata, lævia, undata, integra:* Floris *valvulæ dentibus utrinque tribus longis, omnes tectæ granis pallidis magnis.*

8. RUMEX floribus hermaphroditis: valvulis dentatis graniferis, foliis linearibus. *Loeb. ſcan.* 26. *It. ſcan.* 248. *maritimus.*
Lapathum aquaticum, luteolæ folio. *Tournef. inſt.* 504.
Lapathum aquaticum, anguſtiſſimo acuminato folio *Bocc. muſ.* 2. *p.* 142. *t.* 104.
Habitat in Europæ *litoribus maritimis.*

9. RUMEX floribus hermaphroditis: valvulis integris graniferis, foliis lanceolatis undulatis acutis. *criſpus.*
Rumex floribus hermphroditis: valvulis integerrimis planis, foliis cordato-oblongis. *Fl. ſuec.* 292. *Hort. cliff.* 138. *Roy. lugdb.* 229.
Rumex foliis cordato-oblongis acuminatis integris. *Fl. lapp.* 129.
Lapathum folio acuto criſpo. *Bauh. pin.* 115.
Lapathum acutum criſpum. *Tabern. ic.* 436.
Habitat in Europæ *ſuculentis.* ♃

10. RUMEX floribus hermaphroditis: valvulis dentatis graniferis, foliis cordato-oblongis. *Hort. cliff.* 138. *Mat. med.* 176. *Fl. ſuec.* 293. *Roy. lugdb.* 229. *acutus.*
Lapathum acutum ſ. Oxylapathum. *Bauh. hiſt.* 2. *p.* 983. *Lob. ic.* 284.
Lapathum acutum. *Raj. hiſt.* 175.
Habitat in Europæ *ſucculentis.* ♃

11. RUMEX floribus hermaphroditis: valvulis dentatis, foliis cordato-oblongis obtuſiuſculis crenulatis. † *obtuſifolius.*

La-

...RARY
...CAL SURVEY
...ANADA

Lapathum involucro ſeminis dentato, foliis obtuſis ora criſpula. *Hall. helv.* 172.
Lapathum ſylveſtre, folio ſubrotundo, ſeminis involucris dentatis. *Moriſ. hiſt.* 2. *p.* 580.
Lapathum folio minus acuto. *Bauh. pin.* 111.
Lapathum vulgare, folio obtuſo. I. B. *Raj. hiſt.* 175.
Lapathum. *Cam. epit.* 228.
Habitat in Germania, Helvetia, Gallia, Anglia. ♃

* *Hermaphroditi: valvulis granulo deſtitutis ſ. nudis.*

pulcher. 12. RUMEX floribus hermaphroditis, foliis lyratis. *Guett. ſtamp.* 1. *p.* 7.
Lapathum ramis procumbentibus, ſeminis involucro dentato, foliis inferioribus inſtar fidium. *Moriſ. hiſt.* 2. *p.* 580.
Lapathum pulchrum bononienſe ſinuatum. *Bauh. hiſt.* 2. *p.* 988. *Raj. hiſt.* 1. *p.* 174.
Habitat in Gallia, Italia, Veronæ.

bucephalophorus. 13. RUMEX floribus hermaphroditis; valvulis dentatis nudis planis reflexis. *Hort. upſ.* 90.
Rumex fructibus dentatis calyce reflexis, caput bovinum referentibus. *Hort. cliff.* 139.
Acetoſa, ocymi folio, neapolitana. *Bauh. pin.* 114.
Acetoſa, ocymi folio, bucephalophoros. *Col. ecphr.* 1. *p.* 151. *t.* 150.
Habitat in Italia. ⊙

aquaticus. 14. RUMEX floribus hermaphroditis: valvulis integerrimis nudis, foliis cordatis.
Lapathum aquaticum, folio cubitali. *Bauh. pin.* 116.
Lapathum paluſtre. *Tabern. ic.* 437.
Hippolapathum. *Dalech. hiſt.* 604. *Cam. epit.* 232.
Herba britannica. *Munt. brit. t.* 1.
Habitat in Europa *ad ripas fluviorum & paludum.* ♃

Lunaria. 15. RUMEX floribus hermaphroditis: valvulis lævibus, caule arboreo, foliis ſubcordatis. *Vir. cliff.* 32. *Hort. cliff.* 139. *Roy. lugdb.* 320.
Acetoſa arboreſcens, ſubrotundo folio. *Pluk. alm.* 8. *t.* 252. *f.* 3.
Lunaria magorum arabum. *Bauh. hiſt.* 2. *p.* 994?
Habitat in Canariis. ♄

veſicarius. 16. RUMEX floribus hermaphroditis geminatis: valvularum alis maximis membranaceis reflexis, foliis indiviſis. *Hort. cliff.* 130. *Hort. upſ.* 90. *Roy. lugdb.* 230.

Ace-

Acetoſa americana. foliis longiſſimis pediculis donatis. *Bauh. pin.* 114. *prodr.* 54. *Moriſ. hiſt.* 2. *p.* 583. *ſ.* 5. *t.* 28. *f.* 7.
Habitat in Africa. ☉

17. RUMEX floribus hermaphroditis diſtinctis, valvularum alis maximis membranaceis, foliis eroſis. *Roy. lugdb.* 230. *roſeo.*
Acetoſa ægyptia, roſeo ſeminis involucro. *Bauh. afr.* 5. *f.* 5.
Habitat in Ægypto. ☉

18. RUMEX floribus hermaphroditis, foliis cordato-haſtatis. *Vir. cliff.* 32. *Hort. cliff.* 138. *Hort. upſ.* 89. *Roy. lugdb.* 230. *ſcutatus*
Acetoſa rotundifolia hortenſis. *Bauh. pin.* 114. *Moriſ. hiſt.* 2. *p.* 583. *ſ.* 5. *t.* 28. *f.* 9.
Lapathum androgynum acetoſum, foliis ſagittatis, ramis divergentibus. *Hall. helv.* 170.
Oxalis rotundifolia. *Dod. pempt.* 649.
β. Acetoſa ſcutata repens. *Bauh. pin.* 114. *prodr.* 55.
Habitat in Helvetia, Galloprovincia, *inter acervos lapidum.* ♃

19. RUMEX floribus hermaphroditis digynis. *Hort. cliff.* 138. *Fl. ſuec.* 294. *Roy. lugdb.* 230. *digynus*
Rumex foliis orbiculatis emarginatis. *Fl. lapp.* 132.
Acetoſa rotundifolia alpina. *Bauh. pin.* 55. *prodr.* 114.
Acetoſa repens veſtmorlandica, cochleariæ foliis nonnihil ſinuatis. *Pluk. alm.* 8. *t.* 252. *f.* 2.
Acetoſa britannica rotundifolia, fructu compreſſo. *Blair. obſ.* 67. *t.* 67.
Habitat in Alpibus Lapponicis, Helveticis, Wallicis.

* * * *Floribus diclinis.*

20. RUMEX floribus androgynis: calycibus femineis monophyllis: valvulis exterioribus reflexo-uncinatis. *Hort. upſ.* 89. *ſpinoſa.*
Rumex floribus androgynis, calycibus fructus uncinatis. *Hort. cliff.* 139. *Roy. lugdb.* 230.
Beta cretica, ſemine aculeato. *Bauh. pin.* 118. *prodr.* 57.
Beta cretica, ſemine ſpinoſo. *Bauh. hiſt.* 2. *p.* 962.
Habitat in Creta. ☉

21. RUMEX floribus dioicis, foliis oblongis ſagittatis. *Vir. cliff.* 32. *Hort. cliff.* 139. *Hort. upſ.* 89. *Fl. ſuec.* 295. *Fl. lapp.* 130. *Mat. med.* 529. *Roy. lugdb.* 231. *Acetoſa.*

Acetoſa pratenſis. *Bauh. pin.* 14.
β. Acetoſa pratenſis, flore albo. *Tournef. inſt.* 502.
γ. Oxalis criſpa. *Bauh. hiſt.* 2. *p.* 990. *Tabern. ic.* 440.
δ. Acetoſa montana maxima. *Bauh. pin.* 114. *Scheuch. alp.* 129.
ε. Acetoſa montana, lato ari folio rotundo. *Bocc. muſ.* 165. *t.* 125.
Habitat in Europæ *paſcuis.* δ *in Alpibus.* ♃

Acetoſella. 22. RUMEX floribus dioicis, foliis lanceolato-haſtatis. *Vir. cliff.* 32. *Hort. cliff.* 139. *Fl. lapp.* 131. *Fl. ſuec.* 296. *Roy. lugdb.* 231. *Gron. virg.* 153.
Acetoſa arvenſis lanceolata. *Bauh. pin.* 114.
Oxalis ovina. *Tabern. ic.* 440.
β. Acetoſa lanceolata anguſtifolia repens. *Bauh. pin.* 114. *prodr.* 55.
γ. Acetoſa arvenſis minima non lanceolata. *Bauh. pin.* 114.
δ. Acetoſa minor erecta, lobis multifidis. *Bocc. muſ.* 164. *t.* 126.
Habitat in Europæ *paſcuis & arvis arenoſis.* ♃

SCHEUCHZERIA.

paluſtris. 1. SCHEUCHZERIA. *Fl. lapp.* 133. *t.* 10. *f.* 1. *Fl. ſuec.* 297. *Roy. lugdb.* 45. *Hall. helv.* 258. *Gmel. ſib.* 1. *p.* 73. *Berg. viadr.* 67.
Juncus floridus minor. *Bauh. pin.* 12. *prodr.* 43. *theatr.* 190. *Rudb. elyſ.* 1. *p.* 110. *f.* 2.
Juncoidi affinis paluſtris. *Scheuch. gram.* 336.
Gramen junceum aquaticum, ſemine racemoſo. *Læſ. pruſſ.* 114. *t.* 28.
Habitat in Lapponiæ, Helvetiæ. Boruſſiæ, Sueciæ *paludoſis.* ♃

TRIGLOCHIN.

paluſtre. 1. TRIGLOCHIN capſulis trilocularibus ſublinearibus. *Fl. ſuec.* 298. *Act. ſtockh.* 1742. *p.* 147. *t.* 6. *f.* 1. 2. 3.
Triglochin fructu tenui. *Fl. lapp.* 134. *Roy. lugdb.* 44. *Hall. helv.* 258.
Gramen junceum ſpicatum ſ. Triglochin. *Bauh. pin.* 6. *theatr.* 80.
Calamagroſtis IV. *Dalech. hiſt.* 1006.
β. Juncago maritima perennis, bulboſa radice. *Mich. gen.* 44.

Jun

Juncago maritima. *Barr. rar.* 55. *t.* 271.
Habitat in Europæ *inundatis uliginoſis.* ♂

2. TRIGLOCHIN capſulis ſexlocularibus ovatis. *Fl. ſuec.* 299. *Act. ſtockh.* 1742. *p.* 147. *t.* 6. *f.* 4. 5. *maritimum.*
Triglochin fructu ſubrotundo. *Fl. lapp.* 135. *Roy. lugdb.* 45. *Gort. gelr.* 76.
Juncago paluſtris & maritima pesennis, fructu breviore quinquecapſulari. *Mich. gen.* 44.
Gramen ſpicatum alternum. *Bauh. pin.* 6. *theatr.* 82.
Habitat in Europæ *maritimis.* ♃

MELANTHIUM.

1. MELANTHIUM petalis ungviculatis. *virginicum.*
Melanthium foliis linearibus integerrimis longiſſimis, floribus paniculatis. *Gron. virg.* 59.
Habitat in Virginia. ♃

2. MELANTHIUM petalis ſeſſilibus. *Amœn. acad.* 2. *p.* 349. *t.* 11.* *ſibiricum.*
Ornithogalum ſpicis florum longiſſimis ramoſis. *Gmel. ſib.* 1. *p.* 45. *t.* 8.
Habitat in Sibiria. ♃

MEDEOLA.

1. MEDEOLA foliis verticillatis, ramis aculeatis. *aculeata.*
Fruticulus foliis ruſci ſtellatis. *Dill. elth.* 148. *t.* 123. *f.* 149.
Habitat in America *calidiore.* ♄

2. MEDEOLA foliis verticillatis, ramis inermibus. *virginiana.*
Medeola foliis ſtellatis lanceolatis, fructu baccato. *Gron. virg.* 39.*
Lilium ſ. Martagon puſillum, floribus minutiſſime herbaceis. *Plut. alm.* 401. *t.* 328. *f.* 4.
Habitat in Virginia. ♄

3. MEDEOLA foliis alternis.
Aſparagus foliis ovato-lanceolatis ſolitariis. *Hort. cliff.* 122. *Roy. lugdb.* 29. *aſparagoides.*
Aſparagus africanus ſcandens, myrti folio. *Till. piſ.* 16. *t.* 12. *f.* 1. 2.
Habitat in Æthiopia. ♄

TRILLIUM.

1. TRILLIUM flore pedunculato cernuo. *cernuum.*

Y Paris

Paris foliis ternis, flore pedunculato nutante. *Cola. noveb.* 81.
Solanum triphyllum, flore hexapetalo carneo. *Cateſb. carol.* 1. *p.* 45.
Habitat in Carolina. ♃

erectum. 2. TRILLIUM flore pedunculato erecto.
Paris foliis ternis, flore pedunculato erecto. *Amœn. acad.* 1. *p.* 154. *
Solanum triphyllum braſilianum. *Bauh. pin.* 167. *prodr.* 91. *Burſ. IX*: 12.
Solanum triphyllum canadenſe. *Corn. canad.* 166. *t.* 167
Solano congener triphyllum canadenſe. *Moriſ. hiſt.* 3 *p.* 532. *ſ.* 13. *t.* 3. *f.* 7.
Habitat in Virginia.

ſeſſile. 3. TRILLIUM flore ſeſſili erecto.
Paris foliis ternatis, flore ſeſſili erecto. *Gron. virg.* 44.
Solanum virginianum triphyllum, flore tripetalo atropurpureo in foliorum ſinu, abſque pediculo, ſeſſili. *Pluk. alm.* 352. *t.* 111. *f.* 6.
Solanum triphyllum, flore hexapetalo: tribus petalis purpureis, cæteris viridibus reflexis. *Cateſb. car.* 1. *p.* 50. *t.* 50.
Habitat in Virginia, Carolina. ♃

MENISPERMUM

canadenſe. 1. MENISPERMUM foliis peltatis ſubrotundis angulatis. *Hort. cliff.* 140. *Hort. upſ.* 91. *Gron. virg.* 153.
Meniſpermum canadenſe ſcandens, umbilicato folio, *Tournef. act.* 1705. *p.* 311.
Hedera monophyllos virginiana, convolvuli foliis. *Pluk. alm.* 181. *t.* 36. *f.* 2.
Habitat in Virginia, Canada. ♃

virginicum. 2. MENISPERMUM foliis cordatis peltatis lobatis. *Gron. virg.* 40.
Meniſpermum folio hederaceo. *Dill. elth.* 223. *t.* 178. *f.* 219.
Habitat in Virginiæ & Carolinæ *maritimis.* ♃

carolinum. 3. MENISPERMUM foliis cordatis ſubtus villoſis.
Habitat in Carolina.

Cocculus. 4. MENISPERMUM foliis cordatis retuſis mucronatis. *Mat. med.* 175.

Ar-

Arbor, ariſtolochiæ foliis, maderaſpatana, fructu parvo medicæ ad inſtar convoluto. *Pluk. alm.* 43. *t.* 13 *f.* 2.

Cocculus officinarum. *Bauh. pin.* 511. *Pluk. mant* 52. *t.* 345. *f.* 2.

Natſialam. *Rheed. mal.* 7. *p* 1. *t.* 1. *an?*

Habitat in India. ♄

5. MENISPERMUM foliis orbiculatis ſubtus villoſis. *orbiculatum.*
Cocculi orientalis frutex convolvulaceus, orbiculatis foliis prona parte villoſis. *Pluk. amalth.* 61. *t.* 384. *f.* 6.
Habitat in inſula Crocodilorum Aſiæ.

6. MENISPERMUM foliis lanceolato-ovatis villoſis. *hirſutum.*
Cocculi indici altera ſpecies minor ſcandens, vincæ pervincæ foliis villoſis. *Pluk. amalth.* 61. *t.* 384. *f.* 7.
Habitat in India.

7. MENISPERMUM foliis lineari-lanceolatis hirſutis. *myoſotoides.*
Cocculi indici ſpecies minima, myoſotidis hirſutis foliis & facie. *Pluk. phyt.* 384. *f.* 3.
Habitat in India.

SAURURUS.

1. SAURURUS foliis cordatis petiolatis, ſpicis ſolitariis recurvis. *Hort. upſ.* 91. *cernuus.*
Saururus foliis profunde cordatis ovato-lanceolatis, ſpicis ſolitariis propendentibus folio brevioribus. *Roy. lugdb.* 8.
Saururus foliis profunde cordatis ovato-lanceolatis, ſpicis ſolitariis folio longioribus. *Hort. cliff.* 139. *Gron. virg.* 40.
Serpentaria repens, floribus ſtamineis ſpicatis, bryoniæ nigræ folio ampliore pingui, virginienſis. *Pluk. alm.* 343. *t.* 117. *f.* 4.
Habitat in Marilandia, Virginia. ♃

COLCHICUM.

1. COLCHICUM foliis planis lanceolatis erectis. *Hort. cliff.* 140. *Hort. upſ.* 90. *Roy. lugdb.* 41. *Sauv. monſp.* 18. *Boehm. lipſ.* 29. *autumnale*
Colchicum commune. *Bauh. pin.* 67.
Colchicum. *Fuch. hiſt.* 356. 357.
β. Colchicum flore pleno. *Bauh. pin.* 67.
Habitat in Europæ *auſtralioris ſucculentis.* ♃

montanum. 2. COLCHICUM foliis linearibus patentiſſimis. *Lœfl.*
Colchicum montanum anguſtifolium. *Bauh. pin.* 68.
Colchicum montanum. *Cluſ. hiſp.* 266. *t.* 267. *hiſt.* 1. *p.* 200.
Habitat in Hiſpania, Helvetia. ♃
Folia *una cum floribus autumno erumpunt.*

variegatum. 3. COLCHICUM foliis undulatis patentibus. *Hort. cliff.* 140. *Roy. lugdb.* 42.
Colchicum chionenſe, floribus fritillariæ inſtar teſſulatis, foliis undulatis. *Moriſ. hiſt.* 2. *p.* 341. *ſ.* 4. *t.* 3. *f.* 7.
Habitat in Chio *inſula.* ♃

HELONIAS.

bullata. 1. HELONIAS. *Gen. nov.* 1077. *f.* 1. *
Ephemerum phalangoides virginianum, floſculis arboreis bullatis in ſpicam diſpoſitis. *Pluk. alm.* 135. *t.* 174. *f.* 5. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 606. *ſ.* 15. *t.* 2. *f.* 1.
Habitat in Penſylvaniæ *paludoſis.* ♃

TETRAGYNIA.

PETIVERIA.

alliacea. 1. PETIVERIA. *Hort. cliff.* 141. *Hort. upſ.* 91. *Act. ſtockh.* 1744. *p.* 287. *t.* 7.
Petiveria ſolani foliis, loculis ſpinoſis. *Plum. gen.* 50.
Verbenæ aut Scorodoniæ affinis anomala, flore albido, calyce aſpero, allii odore. *Sloan. jam.* 64. *hiſt.* 1. *p.* 172. *Raj. ſuppl.* 287.
Habitat in Jamaicæ *nemoroſis.* ♄

POLYGYNIA.

ALISMA.

Plantago. △ 1. ALISMA foliis ovatis acutis, fructibus obtuſe trigonis.
Aliſma fructu obtuſo trigono. *Fl. lapp.* 138. *Fl. ſuec.* 300. *Hort. cliff.* 141. *Roy. lugdb.* 46.
Plantago aquatica latifolia. *Bauh. pin.* 190.
Plantago aquatica. *Cam. epit.* 264.
Habitat in Europæ *aquoſis & ad ripas fluviorum, lacuum.* ♃

2. AL-

2 ALISMA foliis ovatis acutis, fructibus globoſis. *flava.*
Damaſonium maximum, plantaginis folio, flore flaveſcente, fructu globoſo. *Plum. ſpec.* 7.
Habitat in America *meridionali.* ♃

3. ALISMA foliis cordato-oblongis, floribus hexagynis. *Damaſonium.*
Aliſma fructu ſexcorni. *Hort. cliff.* 141. *Roy. lugdb.* 46. *Sauv. monſp.* 14.
Plantago aquatica ſtellata. *Bauh. pin.* 190.
Plantago aquatica minor altera. *Lob. ic.* 301.
Damaſonium ſtellatum. *Dalech. hiſt.* 1058.
Habitat in Angliæ, Galliæ *aquoſis.*

4. ALISMA foliis cordatis obtuſis. † *cordifolia.*
Damaſonium ramoſum, folio cordiformi. *Vaill. act.* 1719. *p.* 28.
Sagittaria virginiana, obtuſiore lato folio, floribus minoribus albis. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 618. *ſ.* 15. *t.* 4. *f.* 6.
Habitat in Virginia. ♃

5. ALISMA foliis ovatis obtuſis, pedunculis ſolitariis. *natans.*
Damaſonium repens, potamogetonis rotundifolii folio. *Vaill. act.* 1719. *p.* 29. *t.* 4. *f.* 8.
Damaſonium radiculas emittens ex geniculis. *Vaill. pariſ.* 46.
Ranunculus paluſtris foliis gramineis & ſubrotundis. *Petit. gen.* 47.
Habitat in Galliæ, Sueciæ *foſſis.*

6. ALISMA foliis lineari-lanceolatis, fructibus globoſo-ſquarroſis. *Ranunculoides.*
Aliſma fructu globoſo undique echinato. *Hort. cliff.* 141. *It. gotl.* 298. *Fl. ſuec.* 301. *Roy. lugdb.* 46. *Gort. gelr.* 77. *Sauv. monſp.* 14.
Damaſonium anguſtiſſimo plantaginis folio. *Vaill. act.* 1719. *p.* 35.
Plantago aquatica humilis anguſtifolia. *Bauh. hiſt.* 3. *p.* 738. *Lob. ic.* 300.
Ranunculus aquaticus, plantaginis folio anguſtiſſimo. *T. Pet. gaz.* 41. *t.* 26. *f.* 12.
Habitat in Gotlandiæ, Belgii, Angliæ, Galliæ *foſſis.*

1. ALISMA foliis ſubulatis. *Gron. virg.* 153. *ſubulata.*
Habitat in Virginia.

Claſſis VII.

HEPTANDRIA
MONOGYNIA.

TRIENTALIS.

europæa. 1. TRIENTALIS foliis lanceolatis integerrimis.
Trientalis. *Fl. lapp.* 139. *Fl. ſuec.* 302. *Roy. lugdb.* 438.
Alſine alpina. *Swenckf. ſileſ.* 117.
Pyrola alſines flore europæa. *Bauh. pin.* 191. *prodr.* 101.
Pyrola alſines flore minor braſiliana. *Bauh. prodr.* 101. *t.* (*ſub Hermodactyli nomine*) 99. *Burſ. X.* 107.
Habitat in Europæ *borealis ſylvis & juniperetis.* ♃

capenſis. 2. TRIENTALIS foliis ſubrotundis crenatis. *Roy. lugdb.* 538. †
Habitat ad Cap. b. Spei.
Plantam hanc non vidi, ex auctoritate Clariſſ. D. Royeni adpoſui.

ÆSCULUS.

Hippo Caſtanum. 1. ÆSCULUS floribus heptandris, *Hort. upſ.* 92.
Æſculus. *Hort. cliff.* 142. *Roy. lugdb.* 463.
Caſtanea folio multifido. *Cluſ. hiſt.* 1. *p.* 7.
Habitat in Aſia *ſeptentrionaliore*, unde *in* *Europam*, 1550. ♄

Pavia. 2. ÆSCULUS floribus octandris.
Pavia. *Boerh. lugdb.* 2. *p.* 260. *t.* 260. *Hort. angl.* 54. *t.* 19. *Hort. cliff.* 143. *Roy. lugdb.* 463.
Saamouna piſonis f. ſiliquifera braſilienſis arbor, digitatis foliis ſerratis, floribus teucrii purpureis. *Pluk. alm.* 326. *t.* 50. *f.* 4.
Habitat in Carolina. Braſilia. ♄

Clas-

Claſſis VIII.

OCTANDRIA

MONOGYNIA.

TROPÆOLUM.

1. TROPÆOLUM foliis integris, petalis acuminato ſetaceis. *Hort. upſ.* 93. *majus.*
Tropæolum foliis peltatis orbiculatis. *Hort. cliff.* 145.
Cardamindum minus & vulgare T. *Fewill. peruv.* 3. *p.* 14. *t.* 8.
Naſturtium indicum majus. *Bauh. pin.* 306.
Naſturtium indicum. *Lob. ic.* 166. *f.* 2. 1.
Habitat in Peru, Lima. ⊙ ♃.

2. TROPÆOLUM foliis ſubquinquelobis, petalis obtuſis. *Hort. upſ.* 93. *minus.*
Tropæolum foliis peltatis orbiculatis. *Hort. cliff.* 143.
Cardamindum ampliori folio & majori flore. T. *Few. peruv.* 3. *p.* 14. *t.* 8.
Acriviola maxima odorata. *Boerh. lugdb.* 1. *p.* 244.
Viola inodora ſcandens, naſturii ſapore, maxima odorata. *Herm. lugdb.* 628. *t.* 629.
Habitat in Peru, *unde in Europam venit* 1684 *cura Bewerningii.* ⊙ ♃

3. TROPÆOLUM foliis palmatis, petalis multifidis. *peregrinum.*
Cardamindum quinquefolii folio, vulgo Malla. *Few. peruv.* 2. *p.* 756. *t.* 42.
Habitat in Peru, *nondum mihi viſa in Europa.* ⊙.

OSBECKIA.

1. OSBECKIA. *chinenſis.*
Echinophora maderaſpatana, ſideritis non ſerratis nervoſis foliis, fructu capſulari caucalidis æmulo. *Pluk. alm.* 132. *t.* 173. *f.* 4.
Kadali maderaſpatanum minus, capſulis piloſis. *Raj. ſuppl. app.* 236.
Habitat in India; *in honorem* Petr. Osbeck, *Sveci, qui* 1751. *plantas* Chinæ & Javæ *periculoſo itinere adiit, legit, examinavit, deſcripſit, communicavit.*
Habitus Melaſtomæ. Caulis *erectus, brachiatus, acute tetragonus.*

gonus. Folia *anguſto-lanceolata, trinervia, oppoſita, ſcabra, ſubſeſſilia.* Flores *terminales aliquot, ſeſſiles, cincti foliis 4 flore longioribus patentibus.*

RHEXIA.

virginica. 1. RHEXIA calycibus glabris. *Gron. virg.* 41.
Aliſanus vegetabilis carolinianus. *Pluk. amalt.* 8.
Lyſimachia non pappoſa virginiana, tuberariæ foliis hirſutis, flore tetrapetalo rubello. *Pluk. alm.* 235. *t.* 202 *f.* 8.
Habitat in Virginia.
Caulis *tetragonus angulis membranaceis.* Folia *oppoſita, ſublanceolata, internodiis longiora, ſeſſilia, trinervia, pilis vagis hiſpidiuſcula, ſubſerrata ſerraturis ſetaceis.* Pedunculus *terminalis, dichotomus.* Flores *ſolitarii ex dichotomia, ſubſeſſiles, petalis rubris; Antheris falcatis, luteis.*

mariana. 2. RHEXIA foliis ciliatis.
Lyſimachia non pappoſa, terræ marianæ, leptoneuros, flore tetrapetalo rubello, folio & caule hirſutie ferruginea hiſpidis. *Pluk. mant.* 123. *t.* 428. *f.* 1.
Habitat in Marilandia.

OENOTHERA.

biennis. 1. OENOTHERA foliis ovato-lanceolatis planis. *Vir. cliff.* 33. *Hort. upſ.* 94. *Gron. virg.* 254. *Roy. lugdb.* 251. *Gort. gelr.* 78
Oenothera foliis ovato-lanceolatis denticulatis, floribus lateralibus in ſummo caulis. *Hort. cliff.* 144.
Lyſimachia lutea corniculata. *Bauh. pin.* 245: 516. * *Moriſ. hiſt.* 2. *p.* 271. *ſ.* 3. *t.* 11. *f.* 7.
Habitat in Virginia *unde* 1614, *nunc vulgaris Europæ.* ♂

molliſſima. 2. OENOTHERA foliis lanceolatis undulatis. *Vir. cliff.* 33. *Gron. virg.* 42. *Roy. lugdb.* 251.
Oenothera foliis lineari-lanceolatis dentatis, floribus e medio caule. *Hort. upſ.* 144.
Onagra bonarienſis villoſa, flore mutabili. *Dill. elth.* 297. *t.* 219. *f.* 286.
Habitat in agro Bonarienſi. ☉

fruticoſa. 3. OENOTHERA foliis lanceolatis, capſulis acutangulis.
Oenothera florum calyce monophyllo, hinc tantum aperto. *Gron. virg.* 42

Ona-

Onagra anguſtifolia, caule rubro, flore minore. *Tournef. inſt.* 302.
Habitat in Virginia. ♃
Calyx *purpuraſcens, tetraphyllus, ſed rumpitur altero ſæpius & unico latere.* Tubus *filiformis, anguſtiſſimus.* Capſula *angulis 4 acutis compreſſis.* Folia *rarius denticulata.*

GAURA.

1. GAURA. *Gen. nov.* 1111. *Biennis.*
Lyſimachia lutea anguſtifolia virginiana, flore minore. *Pluk. alm.* 235. *t.* 202. *f.* 7. *mala.*
Habitat in Virginia, Penſylvania. ♂

EPILOBIUM.

* *Staminibus declinatis.*

1. EPILOBIUM foliis ſparſis lineari-lanceolatis. *anguſtifolium.*
Epilobium floribus difformibus, piſtillo declinato. *Fl. ſuec.* 304.
Epilobium foliis lanceolatis integerrimis. *Fl. lapp.* 146. *Hort. cliff.* 154. *Roy. lugdb.* 250.
Lyſimachia Chamænerion dicta anguſtifolia. *Bauh. pin.* 245.
β. Lyſimachia Chamænerion dicta latifolia. *Bauh. pin.* 245.
γ. Lyſimachia Chamænerion dicta alpina. *Bauh. pin.* 245. *prodr.* 116.
Habitat in Europa *boreali.* ♃

2. EPILOBIUM foliis alternis lanceolato-ovatis. *latifolium.*
Habitat in Sibiria. ♃
Differt a præcedenti floribus duplo majoribus, foliis lanceolato-ovatis, alternis nec ſparſis, utrinque læviſſimo tomento molliſſimis. Hæc & antecedens differunt a ſequentibus in non paucis, his enim Flores *inæquales petalis integris;* Piſtillum *declinatum;* Folia *alterna;* Folia *erumpentia revoluta contra ac in reliquis.*

* *Staminibus erectis regularibus, petalis bifidis.*

3. EPILOBIUM foliis oppoſitis lanceolatis ſerratis. *hirſutum.*
Hort. cliff. 145. *Fl. ſuec.* 305. *Gron. virg.* 154. *Roy. lugdb.* 251.
Lyſimachia ſiliquoſa hirſuta, magno flore. *Bauh. pin.* 245.
Lyſimachia purpurea. *Fuchſ. hiſt.* 491.

β. Lyſi-

β. Lyſimachia ſiliquoſa hirſuta, parvo flore. *Bauh. pin.* 245. *prodr.* 116.
Habitat in Europæ *humidiuſculis.* ♃

montanum. 4. EPILOBIUM foliis oppoſitis ovatis dentatis. *Fl. lapp.* 147. *Fl. ſuec.* 306. *Hort. cliff.* 145. *Roy. lugdb.* 251.
Lyſimachia ſiliquoſa glabra major.
Pſeudo-Lyſimachium purpureum primum *Dod. pempt.* 85.
Habitat in Europæ *montoſis.*

tetragonum. 5. EPILOBIUM foliis lanceolato-linearibus denticulatis: imis oppoſitis, caule tetragono. *Sauv. monſp.* 75.
Lyſimachia ſiliquoſa glabra minor. *Bauh. pin.* 303. *Raj. hiſt.* 861.
Lyſimachia minor. *Tabern. ic.* 854.
Habitat in Europa. ♃

paluſtre. 6. EPILOBIUM foliis oppoſitis lanceolatis integerrimis, petalis bifidis, caule erecto. *Fl. ſuec.* 307.
Epilobium foliis linearibus. *Fl. lapp.* 149. *Roy. lugdb.* 251.
Lyſimachia ſiliquoſa glabra anguſtifolia. *Bauh. pin.* 245.
β. Epilobium foliis lanceolatis, ramoſe florens. *Fl. lapp.* 148.
Habitat in Europæ *humidiuſculis.* β in *Alpibus.* ♃

alpinum. 7. EPILOBIUM foliis oppoſitis ovato-lanceolatis integerrimis, ſiliquis ſeſſilibus, caule repente.
Epilobium foliis ovalibus: ſuperioribus attenuatis. *Fl. ſuec.* 308.
Epilobium foliis ovato-oblongis integerrimis. *Fl. lapp.* 150.
Epilobium, foliis ellipticis obtuſe lanceolatis, totum læve. *Hall. helv.* 409.
Chamænerion alpinum, alſines foliis. *Scheuch. alp.* 132. 332.
Habitat in Alpibus Helveticis, Lapponicis. ♃
Repens eſt, primo vere florens. germinibus ſeſſilibus.

GRISLEA.

ſecunda. 1. GRISLEA. *Hort. cliff.* 146.
Habitat in America *calidiore.* ♄

ALLOPHYLUS.

zeylanicus. 1. ALLOPHYLUS. *Fl. zeyl.* 140.
Habitat in Zeylona. ♄

MI-

MIMUSOPS.

1. MIMUSOPS foliis alternis remotis. *Fl. zeyl.* 138. *Elengi*
Kauki indorum. *Pluk. alm.* 203. *Breyn. cent.* 20 *t.* 3.
Elengi. *Rheed. mal.* 1. *p.* 34. *t.* 20.

2. MIMUSOPS foliis confertis. *Fl. zeyl.* 137. *Kauki.*
Habitat in Zeylona. ♄

JAMBOLIFERA.

1. JAMBOLIFERA. *Fl. zeyl.* 139. * *pedunculata.*
Jambolones. *Bauh. pin.* 466.
Habitat in India. ♄

SANTALUM.

1. SANTALUM. *Mat. med.* 183. *album.*
Santalum verum. *Breyn. ic.* 94. *t.* 5. *f.* 1
Santalum album. *Bauh. pin.* 392.
Habitat in India. ♄

MEMECYLON.

1. MEMECYLON foliis ovatis. *Fl. zeyl.* 136. *capitellatum.*
Cornus ſylveſtris, foliis croceum colorem tingentibus, floſculis ad foliorum alas globoſis. *Burm. zeyl.* 76. *t.* 30.
Habitat in Zeylona. ♄

LAWSONIA.

1, LAWSONIA ramis inermibus. *Fl. zeyl.* *inermis.*
Liguſtrum ægyptiacum latifolium. *Bauh. pin.* 476.
Alhenna ſ. Henna arabum. *Walth. hort.* 3. *t.* 4.
Pontaletſce. *Rheed. mal.* 4. *p.* 117. *t.* 57.
Habitat in India, Ægypto. ♄

2 LAWSONIA ramis ſpinoſis. *Fl. zeyl.* 134. *ſpinoſa.*
Rhamnus malabaricus. *Mail-anſchi. Pluk. alm.* 38. *t.* 220. *f.* 1.
Mail-anſchi. *Rheed. mal.* 1. *p.* 73. *t.* 40.
Habitat in India. ♄

VACCINIUM.

* *Foliis annotinis deciduis.*

1. VACCINIUM pedunculis unifloris, foliis ſerratis ovatis deciduis, caule angulato. *Fl. lapp.* 143. *Fl. ſuec.* 313. *Mat. med.* 184. *Hort. cliff.* 148. *Roy. lugdb.* 239. *Hall. helv.* 419. *Myrtillus.*
Vitis idæa foliis oblongis crenatis, fructu nigricante. *Bauh. pin.* 470.

Myr-

Myrtillus germanica & Vitis idæa. *Dalech. hiſt.* 191. 192.
Habitat in Europæ *borealis ſylvis umbroſis.* ♄

ſtamineum. 2. VACCINIUM pedunculis ſolitariis unifloris, antheris corolla longioribus, foliis oblongis integerrimis.
Vaccinium ſtaminibus corolla longioribus. *Gron. virg.* 43.
Vitis idæa americana, longiori mucronato folio & crenato, floribus urceolatis racemoſis. *Pluk. alm.* 331. *t.* 339. *f.* 3.
Habitat in America *ſeptentrionali.* ♄
Frutex. Folia *oblonga, integerrima.* Pedunculi *axillares, ſolitarii, uniflori, filiformes, corolla longiores.* Corollæ *quinquefidæ, campanulato patentes.* Antheræ 10. Stylus *flore longior.*

uliginoſum. 3. VACCINIUM pedunculis unifloris, foliis integerrimis ovalibus baſi ciliatis.
Vaccinium foliis ovalibus integerrimis deciduis. *Fl. ſuec.* 312.
Vaccinium foliis annuis integerrimis. *Fl. lapp.* 142. *Hall. helv.* 414.
Vitis idæa foliis ſubrotundis exalbidis. *Bauh. pin.* 470.
Vitis idæa II. *Cluſ. hiſt.* 1. *p.* 61. *t.* 62.
Habitat in Sueciæ *borealibus & alpinis, uliginoſis.* ♄.

album. 4. VACCINIUM pedunculis ſimplicibus, foliis integerrimis ovatis ſubtus tomentoſis.
Habitat in Penſylvania. *Kalm.* ♄
Frutex. Folia *ovata, ſubtus tomentoſa.* Flores *duo vel tres ad apices ramorum: pedunculis aggregatis, breviſſimis, nudis.*

mucronatum 5. VACCINIUM pedunculis ſimpliciſſimis unifloris, foliis ovatis mucronatis glabris integerrimis.
Habitat in America *ſeptentrionali. Kalm.* ♄
Frutex *Ramis teretibus, glaucis.* Folia *elliptica, utrinque glabra integerrima, mucronata, petiolis canaliculatis inſidentia.* Pedunculi *uniflori, foliis paulo breviores.*

corymboſum. 6. VACCINUM floribus corymboſis ovatis, foliis oblongis acuminatis integerrimis.
Habitat in America *ſeptentrionali. Kalm.* ♄
Frutex. Folia *oblonga, acuta, nervis ſubtus villoſis* Corymbi *ex gemmaceo involucro, ſeſſiles.* Corollæ *cylindraceo-ovatæ, longiores, quam in reliquis.* Stamina *decem.*

7. VAC-

7. VACCINIUM racemis filiformibus folioſis, foliis oblongis integerrimis. *frondoſum.*
Vaccinium foliis ovatis integris deciduis, racemis folioſis. *Gron. virg.* 155. *
Habitat in America *ſeptentrionali.* ♄
Frutex. Folia *oblonga, integerrima.* Racemi *infra folia, bracteis oblongis, parvis.* Pedunculi *partiales bracteis longiores, inſtructi bracteolis duabus filiformibus.* Corolla *ovato-campanulata.* Stamina 10.

8. VACCINIUM racemis nudis, caule fruticoſo, foliis crenulatis oblongis. *liguſtrinum.*
Habitat in Penſylvania. *Kalm.* ♄
Flores *in Racemis alternis, numeroſis, deſtitutis bracteis, &. foliolis, qua nota facile diſtingvitur.*

9. VACCINIUM floribus racemoſis, foliis crenulatis ovatis acutis, caule arboreo. *Arctoſtaphylos.*
Vitis idæa orientalis maxima, ceraſi folio, flore variegato. *Tournef. cor.* 42. *it.* 2. *p.* 223. *t.* 223.
β. Vitis idæa cappadocica maxima, meſpili folio, flore variegato. *Tournef. cor.* 42.
Habitat in Cappadocia. ♄
Racemi *foliis longiores, infra folia ſiti, foliolis ovatis inſtructi.*

* *Foliis ſempervirentibus.*

10. VACCINIUM racemis terminalibus nutantibus, foliis obovatis revolutis integerrimis ſubtus punctatis. *Vitis idæa.*
Vaccinium foliis obverſe ovatis perennantibus. *Fl. lapp.* 145. *Fl. ſuec.* 314. *Mat. med.* 185. *Hort. cliff.* 148. *Roy. lugdb.* 239. *Hall. helv.* 414. *Gort. gelr.* 81.
Vitis idæa foliis ſubrotundis non crenatis, baccis rubris *Bauh. pin.* 470.
Habitat in Europæ *frigidioris ſylvis macris.* ♄

11. VACCINIUM foliis integerrimis revolutis ovatis, caulibus repentibus filiformibus nudis. *Oxycoccos.*
Vaccinium ramis filiformibus repentibus, foliis ovatis perennantibus. *Fl. lapp.* 145.
Vaccinium ramis filiformibus, foliis ovatis perennantibus, pedunculis ſimplicibus ſtipula duplici. *Fl. ſuec* 318. *Mat. med.* 186.
Vitis idæa paluſtris. *Bauh. pin.* 471.
Vaccinia paluſtria. *Dod. pempt.* 770. *Lob. ic.* 109.
Habitat in Europæ *paludibus ſphagnoque repletis.* ♃

Ra-

Racemus breviſſimus, pedunculis longiſſimis: bracteis 2 alternis; Corolla revoluta.

hiſpidulum. 12. VACCINIUM foliis integerrimis revolutis ovatis, caulibus repentibus filiformibus hiſpidis.

Vitis idæa paluſtris americana, oblongis ſplendentibus foliis, fructu grandiore rubro plurimis intus acinis referto. *Pluk. alm.* 392. *t.* 320. *f.* 6.

Vitis idæa paluſtris virginiana, fructu majore. *Raj. hiſt* 685.

Habitat in Virginiæ *paludoſis.*

Structura antecedentis, ſed majora omnia, & Caulis ſquamis ſetaceis imbricatus.

ERICA.

* *Antheris bicornibus.*

vulgaris. 1. ERICA antheris bicornibus incluſis, corollis inæqualibus campanulatis mediocribus foliis oppoſitis ſagittatis.

Erica foliis quadrifariam imbricatis triquetris glabris erectis, corollis inæqualibus calyce brevioribus. *Hort. cliff.* 146. *Fl. ſuec.* 309. *Roy. lugdb.* 442.

Erica vulgaris glabra. *Bauh. pin.* 485. *Fl. lapp.* 141.

Habitat in Europæ *campeſtribus ſterilibus frequens.* ♄.

Comparativa mediocris, longior, brevior *corollæ reſpicit proportionem ad calycem.*

umbellata. 2. ERICA antheris bicornibus exſertis, corollis globoſis umbellatis, foliis ternis acerofis glabris. *Læfl. epiſt.* 2. *n.* 8.

Habitat in Luſitania. ♄.

Fruticulus *habitu Ericæ vulgaris.* Folia *terna, acerofa, brevia, glabra, ſubtus linea alba notata.* Umbellulæ *nudæ abſque involucro.* Calyx *compoſitus.* Corolla *pallide cærulea, angulata.*

herbacea. 3. ERICA antheris bicornibus incluſis, corollis campanulatis mediocribus ſecundis, foliis ternis triquetris patulis.

Erica procumbens herbacea. *Bauh. pin.* 486.

Erica coris folio 8. *Cluſ. hiſt.* 1. *p.* 44.

Habitat in Europa *auſtraliori.*

cinerea. 4. ERICA antheris bicornibus incluſis, corollis ovatis racemoſis, foliis ternis glabris linearibus.

Erica foliis linearibus ternis, floribus globoſo-oblongis laxe ſpicatis. *Guett. ſtamp.* 2. *p.* 110.

Eri-

Erica humilis, cortice cinereo, arbuti flore. *Bauh. pin.* 486.
Erica coris folio 6. *Cluſ. hiſt.* 1. *p.* 47.
Habitat in Europa *media.*

5. ERICA antheris bicornibus incluſis, corollis campanulatis longioribus, foliis ternis patentibus, ramis tomentoſis. *ſcoparia.*
Erica erecta, foliis ternis, floribus ad alas ſeſſilibus verticillatis. *Sauv. monſp.* 170.
Erica major ſcoparia, foliis deciduis. *Bauh. pin.* 485.
Erica ſcoparia, floſculis herbaceis. *Lob. ic.* 2. *p.* 215. *Sauv. monſp.* 46.
Habitat Monſpelii, *in* Hiſpania, & Europa *auſtrali.* ♄

6. ERICA antheris bicornibus incluſis, corollis ſubovatis mediocribus ſolitariis, foliis ternis, caule arboreo. *caffra.*
Erica foliis lineari ſubulatis ternis, corollis ovatis, calycibus acutis patulis. *Hort. cliff.* 148.
Habitat in Æthiopia. ♄

7. ERICA antheris bicornibus incluſis, corollis ovatis longioribus, racemis corymboſis ſecundis, foliis ternis. *viridi-purpurea.*
Erica foliis lanceolatis oppoſitis imbricatis, floribus uno verſu racemoſis. *Hort. cliff.* 148. *Sauv. monſp.* 170.
Erica major, floribus ex herbaceo-purpureis. *Bauh. pin.* 485.
Erica corios folio 3. *Cluſ. hiſt.* 1. *p.* 42.
Habitat in Luſitania. ♄

8. ERICA antheris bicornibus incluſis, corollis ſubgloboſis aggregatis calyce longioribus, foliis quaternis ciliatis patentibus. *Tetralix.*
Erica foliis ſubulatis ciliatis quaternis, corollis globoſo-ovatis terminalibus conſertis. *Hort. cliff.* 148. *Fl. ſuec.* 310. *Roy lugdb.* 442.
Erica ex rubro nigricans ſcoparia. *Bauh. pin.* 486.
Habitat in Europæ *borealis paludibus ceſpitoſis.* ♄

9. ERICA antheris bicornibus incluſis, corollis campanulatis longioribus, foliis quaternis patentiſſimis, caule ſubarboreo tomentoſo. *arborea.*
Erica erecta, foliis quaternis, floribus ſpicato-racemoſis. *Sauv. monſp.* 170. 46.
Erica foliis aceroſis linearibus patentiſſimis, corollis ovatis, ſtaminibus brevibus. *Hort. cliff.* 47. *Roy. lugdb.* 442.
Erica maxima alba. *Bauh. pin.* 485

pallido-purpurea. 10. ERICA foliis in ſummitate quinis, caule procumbente. *Segu. ver.* 280.
Erica procumbens dilute purpurea. *Bauh. pin.* 486. *Raj. hiſt.* 1715.
Erica foliis corios, flore purpureo dilutioris coloris. *Bauh. hiſt.* 1. *p.* 358.
Erica coris folio VII. *Cluſ. hiſt.* 1. *p.* 43.
Habitat in Europa *auſtrali.* ♄
Numeroſum gregem Ericarum Æthiopicarum *aliorumque infinita diligentia dudum conquiſivit, deſcripſit, delineavit & abſolvit Botanicus vere magnus Ill. Adrian* Royenus, *quas ut edat publicique juris faciat, omnes Botanici mecum ſerio efflagitant.*

* *Anteris ſimplicibus obtuſis emarginatis.*

ciliaris. 11. ERICA antheris ſimplicibus incluſis, corollis ovatis irregularibus, floribus terno racemoſis, foliis ternis ciliatis. *Lœfl. epiſt.* 2. *n.* 9.
Erica hirſuta anglica. *Bauh. pin.* 602
Erica XII. *Cluſ. hiſt.* 1. *p.* 46.
Habitat in Luſitania. ♄
Planta *ſuffruticoſa, bipedalis.* Folia *terna, patentia, ſeſſilia, ovato-oblonga, acuta, margine reflexa, ciliata.* Racemus *terminalis, terno verticillatus.* Corolla *magna, ovata, ore contracto inæquali.*

triflora. 12. ERICA antheris bifidis incluſis, corollis ſubgloboſis ſubvilloſis ternis, pedunculis triphyllis, foliis ternis.
Habitat in Æthiopia. ♄

curviflora. 13. ERICA antheris bifidis exſertis, corollis clavato-cylindricis curvis ſolitariis longis, foliis ſubternis.
Erica foliis linearibus quaternis oppoſitis villoſis, corollis longiſſimis ſolitariis. *Hort. cliff.* 148.
Erica africana fruteſcens. *Seb. theſ.* 2. *p.* 20. *t.* 19. *f.* 5.
Erica ſpicata, floribus oblongis ex carneo purpureis. *Pluk. mant.* 67. *t.* 346. *f.* 9.
Habitat in Æthiopia. ♄

bruniades. 14. ERICA antheris bifidis exſertis ſtylo brevioribus, corollis globoſis tectis calyce lanato, foliis ternis.
Eriocephalus bruniades ericæformis monomopatenſis, capitulis globulorum inſtar interius cavis & denſa lanugine tectis. *Pluk. mant.* 69. *t.* 347. *f.* 9.
Frutex africanus aromaticus. *Seb. theſ.* 2. *p.* 64. *t.* 63. *f.* 7.
Habitat in Æthiopia. ♄

15. E-

15. ERICA antheris bifidis exſertis, corollis globoſis calycibus hiſpidis. *capitata.*

Erica africana calyce lanuginoſo ex viridi luteo capitulum referente, floribus concoloribus exiguis lanugine obſitis. *Seb. theſ.* 1. *p.* 30. *t.* 20. *f.* 1.

Habitat in Æthiopia. ♄

16. ERICA antheris bifidis ſimplicibus exſertis, corollis ovatis ſublongioribus, foliis quaternis triangularibus patentibus. *carnea.*

Erica procumbens, ternis foliolis, carnea. *Bauh. pin.* 486.

Erica coris folio IX. *Cluſ. hiſt.* 1. *p.* 44.

Habitat in Pannonia, Helvetia.

17. ERICA antheris bifidis ſimplicibus exſertis, corollis campanulatis longioribus, foliis quinis linearibus patentibus. *multiflora.*

Erica, foliis corios, multiflora. *Bauh. hiſt.* 1. *p.* 356.

Erica juniperifolia dense fruticans narbonenſis. *Lob. hiſt.* 620. *Sauv. monſp.* 46.

Habitat Monſpelii. ♄

18. ERICA antheris bifidis incluſis, corollis globoſis glabris quaternis, foliis quaternis ſetaceis patulis. *pilulifera.*

Habitat in Æthiopia. ♄

19. ERICA antheris bifidis exſertis, corollis clavatis, calycibus duplicibus. *coccinea.*

Erica africana anguſtifolia glabra, floribus oblongis tubuloſis dependentibus coccineis, cum longiſſimis filamentis concoloribus. *Seb. theſ.* 1. *p.* 32. *t.* 21. *f.* 4.

Habitat in Æthiopia. ♄

20. ERICA antheris bifidis exſertis, corollis globoſis mediocribus, pedunculis triphyllis, foliis quaternis. *corifolia.*

Erica africana glabra fruticoſa, coris folio, arbuti flore dilute purpureo. *Seb. theſ.* 1. *p.* 32. *t.* 21. *f.* 3.

Habitat in Æthiopia. ♄

21. ERICA antheris bifidis incluſis, corollis cylindricis longioribus aggregatis, foliis verticillatis dentato-aculeatis. *abietina.*

Erica foliis ſubulatis glabris quinis pluribusve verticillatis, floribus longiſſimis terminalibus confertis. *Hort. cliff.* 148.

Erica africana, abietis folio longiore & tenuiore, floribus

bus oblongis ſaturate rubris. *Raj. dendr.* 96. *Seb. theſ.* 1. *p.* 31. *t.* 21. *f.* 1.
Habitat in Æthiopia. ♄

gnaphaloides 22. ERICA antheris bifidis incluſis, corollis globoſis ternis, calycibus duplicibus obtuſis.
Habitat in Æthiopia. ♄
Facies plantæ Gnaphalii.

plukeneti. 23. ERICA antheris bifidis exſertis, corollis ſubcylindricis indiviſis longioribus, calycibus ſimplicibus, foliis linearibus verticillatis.
Chamæpithys æthiopica, foliis læte virentibus, flore oblongo phœniceo plus quam eleganti ſ. plusquenetii. *Pluk. mant.* 45. *t.* 344. *f* 3.
Habitat in Æthiopia.

DAPHNE.

* *Floribus lateralibus.*

Mezereum. 1. DAPHNE floribus ſeſſilibus ternis caulinis, foliis lanceolatis deciduis.
Daphne floribus ſeſſilibus infra folia elliptico-lanceolata. *Fl. lapp.* 140. *Fl. ſuec.* 311. *Mat. med.* 179. *Hort. cliff.* 147. *Roy. lugdb.* 201.
Laureola folio deciduo, flore purpureo, officinis Laureola femina. *Bauh. pin.* 462.
Daphnoides. *Cam. epit.* 937.
Habitat in Europæ *borealis ſylvis.* ♄

Thymelæa. 2. DAPHNE floribus ſeſſilibus axillaribus, foliis lanceolatis, caulibus ſimpliciſſimis.
Daphne floribus tetrandris ſecundum caules ſimpliciſſimos. *Sauv. monſp.* 56.
Thymelæa foliis polygalæ glabris. *Bauh. pin.* 463.
Sanamunda viridis vel glabra. *Bauh. prodr.* 160.
Sanamunda glabra. *Bauh. hiſt.* 1. *p.* 592.
Habitat in Hiſpania & Monſpelii *in Horto Dei.* ♄

Tarton raira 3. DAPHNE floribus ſeſſilibus aggregatis axillaribus, foliis ovatis utrinque pubeſcentibus nervoſis.
Thymelæa foliis candicantibus & ſerici inſtar mollibus *Bauh. pin.* 463.
Tarton-Raire galloprovinciæ monſpelienſium. *Lob. ic.* 371.
Habitat in Galloprovincia. ♄

alpina. 4. DAPHNE floribus ſeſſilibus aggregatis lateralibus, foliis lanceolatis obtuſiuſculis ſubtus tomentoſis.

Thy

Thymelæa floribus inter folia, folio utrinque hirſuto. *Hall. helv.* 187. *Sauv. monſp.* 57.
Chamelæa alpina, folio inferne incano. *Bauh. pin.* 1462.
Chamelæa alpina incana. *Lob. ic.* 370.
β. Chamelæa ſabaudica, folio utrinque incano, flore albo. *Raj. hiſt.* 1588.
Thymelæa, incana, mezerei folio & facie, ſurculis admodum fragilibus. *Pluk. alm.* 366. *t.* 229. *f.* 3.
Habitat in Alpibus Helvetiæ, Genevæ, Italiæ.

5. DAPHNE racemis axillaribus, foliis lanceolatis glabris. *Laureola.*
Daphne racemis lateralibus, foliis lanceolatis integris. *Hort. cliff.* 147. *Hort. upſ.* 94. *Mat. med.* 180. *Sauv. monſp.* 57.
Laureola ſempervirens, flore viridi, quibusdam Laureola mas. *Bauh. pin.* 462.
Laureola. *Dod. pempt.* 365.
Habitat in Anglia, Helvetia, Gallia, Baldo. ♄

6. DAPHNE pedunculis lateralibus bifloris, foliis lanceolato ovatis. *pontica.*
Thymelæa pontica, citrei foliis. *Tournef. itin.* 3. *p.* 180. *t.* 180.
Habitat in Ponto. ♄

* *Floribus terminalibus.*

7. DAPHNE capitulo terminali pedunculato, foliis oppoſitis oblongo-ovatis glabris. *indica.*
Habitat in China. ♄
Frutex *parvus.* Folia *oppoſita, oblongo-ovata, integerrima, glabra.* Pedunculus *terminalis, breviſſimus, apice gerens flores* 6 *ad* 8 *ſeſſiles.*

8. DAPHNE floribus congeſtis terminalibus ſeſſilibus, foliis lanceolatis nudis. *Cneorum.*
Daphne humifuſa, foliis oblongis flores ſeſſiles terminales ſubcingentibus. *Sauv. monſp.* 57.
Thymelæa affinis facie externa. *Bauh. pin.* 463.
Cneorum. *Matth. hiſt.* 46. *Cluſ. hiſt.* 89.
Habitat in Helvetia, Hungaria, Pyrenæis, Baldo, *L. B. Munchhauſen.* ♄

9. DAPHNE panicula terminali, foliis lineari-lanceolatis acuminatis. *Gnidium.*
Daphne foliis lanceolatis baſi anguſtioribus, racemo nudo terminali. *Sauv. monſp.* 56.

Daphne floribus racemoſis, foliis lineari-lanceolatis acuminatis integris. *Guett. ſtamp.* 2. *p.* 427.
Thymelæa foliis lini. *Bauh. pin.* 463.
Thymelæa. *Cluſ. hiſt.* 1. *p.* 87. *Cam. epit.* 974.
Habitat in Hiſpania, Italia, G. Narbonenſi. ♄

ſquarroſa. 10. DAPHNE floribus terminalibus pedunculatis, foliis ſparſis linearibus patentibus mucronatis.
Thymelæa capitata lanuginoſa, foliis creberrimis minimis aculeatis. *Burm. afr.* 134. *t.* 49. *f.* 1.
Habitat in Æthiopia. ♄

DIRCA.

paluſtris. 1. DIRCA. *Gen. nov.* 1078. *
Thymelæa floribus albis primo vere erumpentibus, foliis oblongis acuminatis, viminibus & cortice valde tenacibus. *Gron. virg.* 155.
Habitat in Virginiæ *paludoſis.* ♄

GNIDIA.

pinifolia. 1. GNIDIA foliis ſparſis lineari-ſubulatis.
Rapunculus foliis nervoſis linearibus, floribus argenteis non galeatis. *Burm. afr.* 112. *t.* 41. *f.* 3.
Habitat in Æthiopia. ♄

tomentoſa. 2. GNIDIA foliis alternis ovato-lanceolatis.
Habitat in Æthiopia. ♄
Flores tomentoſi, capitati, terminales.

oppoſitifolia. 3. GNIDIA foliis oppoſitis lanceolatis.
Habitat in Æthiopia. ♄
Frutex *ramis rectis.* Folia *oppoſita, lanceolata, glabra, integerrima.* Flores *terminales, conferti, infundibuliformes, tubo villoſo, petalis emarginatis.*

BÆCKEA.

fruteſcens. 1. BÆCKEA.
Habitat in China. *D. D. Abrah.* Bæck. *S. R. M:tis. Sueciæ medicus ordinarius, Amicus noſter vere ſincerus, e cujus horto ſicco plurimas rariores ſtirpes obtinuimus, etiam hanc primus nobiſcum communicavit.*
Frutex *habitu abrotani, ramis virgatis: Ramulis oppoſitis, brevibus, ſimplicibus.* Folia *oppoſita, linearia, acuta, glabra, integerrima.* Flores *axillares, ſolitarii, pedunculo nudo longitudine floris, foliis longe breviore.* Perianthium *infundibuliforme, quinquedentatum.* Petala

tala 5, *ſubrotunda, patula, calyci inſerta.* Filamenta 8, *quorum* 6 *paria, &* 2 *ſolitaria, breviſſima, inflexa.* Antheræ *ſubovatæ, parvæ.* Germen *ſubrotundum.* Stylus *filiformis, corolla brevior.* Stigma *capitatum. Chinenſibus* Tjongina. *Osbeck.*

DIGYNIA.

GALENIA.

1. GALENIA. *Hort. cliff.* 150. *Roy. lugdb.* 209. *africana.*
Sherardia. *Pont. epiſt.* 14.
Kali lignoſum, flore muſcoſo, roſmarini folio. *Bocc. muſ.* 150. *t.* 110.
Atriplex africana lignoſa fruteſcens, rosmarini foliis. *Till. piſ.* 20. *t.* 25.
Habitat in Africa. ♄

MOEHRINGIA.

1. MOEHRINGIA *muſcoſa.*
Alſine montana, capillaceo folio. *Bauh. pin.* 251. *Scheuchz. alp.* 503. *t.* 6. *Pluk. alm.* 23. *t.* 75. *f.* 1.
Alſine ſaxifraga anguſtifolia minima montana. *Cold. ephr.* 1. *p.* 292. *t.* 290.
β. Alſine tenuifolia muſcoſa. *Bauh. pin.* 251. *Moriſ. bleſ.* 10. *hiſt.* 2. *p.* 551. *ſ.* 5. *t.* 23. *f.* 12.
Habitat in Alpibus Helvetiæ, Italiæ, Auſtriæ.

TRIGYNIA.

POLYGONUM

* Atraphaxoides *caule fruteſcente.*

1. POLYGONUM caule fruticoſo, calycinis foliolis duobus reflexis. *Hort. upſ.* 95. *fruteſcens.*
Atraphaxis inermis, foliis planis. *Hort. cliff.* 138. *Roy. lugdb.* 209.
Lapathum orientale, frutex humilis, flore pulchro. *Tournef. cor.* 38.
Lapathum dauricum montanum fruticans, ramis late ſparſis. *Amm. ruth.* 227.
Habitat in Sibiria, Dauria. ♄

* Biſtorta *ſpica unica.*

Biſtorta. 2. POLYGONUM caule ſimpliciſſimo monoſtachyo, foliis ovatis in petiolum decurrentibus. *Mat. med.* 188.
Biſtorta foliis ovato-oblongis acuminatis. *Hort. cliff.* 150. *Hort. upſ.* 150. *Roy. lugdb.* 217.
Biſtorta major, radice magis intorta. *Bauh. pin.* 192.
Biſtorta. *Cam. epit.* 683.
Habitat in montibus Helvetiæ, Auſtriæ, Galliæ. ♃

viviparum. 3. POLYGONUM caule ſimpliciſſimo monoſtachyo, ofliis lanceolatis.
Biſtorta foliis lanceolatis. *Fl. lapp.* 152. *Fl. ſuec.* 321. *Hort. cliff.* 150.
Biſtorta montana minor, radice intorta inodora, floſculis in ſpicæ cacumine albis ſterilibus, inferna ſpicæ parte tuberculis proliferis turbinatis puniceis fecunda. *Amm. ruth.* 169.
Biſtorta alpina media. *Bauh. pin.* 192.
Biſtorta alpina minor. *Bauh. pin.* 192.
Habitat in Europæ *ſubalpinis paſcuis duris.* ♃

ſerratum. 4. POLYGONUM foliis crenatis.
Polygonum folio oblongo crenato. *Shaw. afr.* 489.
Habitat in Mauritania.

* Perſicaria *piſtillo bifido.*

virginianum 5. POLYGONUM floribus pentandris digynis, corollis quadrifidis, foliis ovatis.
Perſicaria floribus pentandris digynis, corolla quadrifida inæquali. *Wach. ultr.* 258.
Perſicaria florum ſtaminibus quinis, ſtylo duplici, corolla quadrifida inæquali. *Hort. cliff.* 42. *Gron. virg.* 43. *Roy. lugdb.* 216.
Perſicaria fruteſcens maculoſa virginiana, flore albo. *Moriſ. hiſt.* 2. *p.* 589. *Raj. hiſt.* 183.
Habitat in Virginia. ♃

Lapathifolium. 6. POLYGONUM floribus pentandris ſemidigynis, ſtaminibus corollæ regulari æqualibus.
Perſicaria floribus pentandris digynis, corolla regulari ſtaminibus æquali. *Wach. ultr.* 257.
Perſicaria florum ſtaminibus quinis ſemidigynis, ſtylo bifido corollæ regulari æquantibus. *Hort. cliff.* 42.
Perſicaria major, lapathi foliis, calyce floris purpureo. *Tournef. inſt.* 510. *Raj. ſuppl.* 119.
Perſicaria Hydropiper. *Lob. ic.* 315.
Habitat in Gallia.

7. PO-

7. POLYGONUM floribus pentandris ſemidigynis, ſta- *amphibium.*
minibus corolla longioribus.
Perſicaria florum ſtaminibus quinis corollam ſuperantibus, ſtylo bifido. *Hort. cliff.* 41. *Roy. lugdb.* 216.
Perſicaria floribus pentandris digynis, corolla ſtaminibus breviore. *Fl. ſuec.* 318.
Potamogeton ſalicis folio. *Bauh. pin.* 193.
Habitat in Europa.

8. POLYGONUM floribus pentandris trigynis axillari- *maritimum.*
bus, foliis lanceolatis, caule ſtipulis obtecto fruticoſo.
Polygonum maritimum latifolium. *Bauh. pin.* 280.
Polygonum marinum. *Cam. epit.* 691.
Habitat Monſpelii, *in* Italia, Virginia. ♄
Stamina huic ſpeciei quina adnumerat D. Sauvages, a me non numerata.

9. POLYGONUM floribus pentandris trigynis, foliis *ocreatum.*
lanceolatis.
Perſicaria ſpicis longis numeroſis, vaginis integris, floribus pentandris trigynis. *Gmel.*
Habitat in Sibiria. *D. Gmelin.*
Stipulæ *ſunt vaginæ integræ, ventricoſæ, læves, ampliores multo quam caulis.* Folia *lanceolata, revoluta.* Flores *racemoſi.*

10. POLYGONUM floribus hexandris ſemidigynis, fo- *Hydropiper.*
liis lanceolatis, ſtipulis ſubmuticis.
Polygonum foliis lanceolatis, floribus hexandris ſemidigynis. *Mat. med.* 187.
Perſicaria floribus hexandris ſemidigynis. *Fl. ſuec.* 320.
Perſicaria florum ſtaminibus ſenis, ſtylo bifido. *Hort. cliff.* 46. *Roy lugdb.* 216.
Perſicaria urens ſ. Hydropiper. *Bauh. pin.* 101.
Hydropiper. *Dod. pempt.* 607.
Habitat in Europæ *ſubhumidis.* ☉

11. POLYGONUM floribus hexandris digynis, ſpicis *Perſicaria.*
ovatis oblongis, foliis lanceolatis, ſtipulis ciliatis.
Perſicaria floribus hexandris digynis. *Fl. ſuec.* 319.
Perſicaria florum ſtaminibus ſenis, ſtylo duplici. *Hort. cliff.* 42. *Gron. virg.* 157. *Roy. lugdb.* 216.
Perſicaria mitis. *Bauh. hiſt.* 3. *p.* 779. *Fl. lapp.* 71.
Perſicaria mitis maculoſa & non maculoſa, *Bauh. pin.* 101.
Habitat in Europæ *cultis.* ☉




IMAGE EVALUATION
TEST TARGET (MT-3)

6"

Photographic
Sciences
Corporation

23 WEST MAIN STREET
WEBSTER, N.Y. 14580
(716) 872-4503

barbatum. 12. POLYGONUM floribus hexandris trigynis, ſpicis virgatis, ſtipulis truncatis ſetaceo ciliatis, foliis lanceolatis.

Perſicaria foliis ovatis glabris, *Kraſchen. comm. petr.* 1747. *p.* 375. *t.* 13.?

Habitat in China.

Caulis *herbaceus, rufus.* Stipulæ *vaginales, laxæ, piloſæ, truncatæ, ciliatæ, ſetis validis longitudine ferme ipſius ſtipulæ.* Spicæ *virgatæ, longæ, floribus remotis, tribus ex ſingula bractea turbinata.* Folia *lanceolata.*

orientale. 13. POLYGONUM floribus heptandris digynis, foliis ovatis, caule erecto, ſtipulis hirtis.

Perſicaria florum ſtaminbius ſex pluribusque, ſtylo duplici. *Hort. cliff.* 42. *Hort. upſ.* 96. *Roy. lugdb.*

Perſicaria orientalis, nicotianæ folio, calyce florum purpureo. *Tournef. cor.* 38. *Comm. rar.* 43. *t.* 43.

β. Perſicaria maderaſpataana, longiore folio, hirſuta. *Pluk. alm.* 288. *t.* 210. *f.* 7.

Habitat in Oriente, India. ⊙

Indica longe hirſutior eſt, quam orientalis.

penſylvanicum. 14. POLYGONUM floribus octandris digynis, pedunculis hiſpidis, foliis lanceolatis.

Habitat in Penſylvania. *Kalm.*

Facies & *habitus Polygoni* 11, *ſed majora ſtrictiora omnia.* Caulis *ramoſus, angulatus.* Folia *lanceolata, acuminata, ſubtus ad modum ſcabra.* Stipulæ *truncatæ, muticæ.* Pedunculi *ſcabri, ſetis rigidiuſculis apice gluten ſecernentibus.* Spicæ *ſubracemoſæ, floſculis pedicellatis.*

* Polygonum *foliis indiviſis, floribus octandris.*

aviculare. 15. POLYGONUM floribus octandris trigynis axillaribus, foliis lanceolatis, caule procumbente herbaceo.

Polygonum caule procumbente herbaceo, foliis lanceolatis integerrimis. *Mat. med.* 186.

Polygonum. *Hort. cliff.* 150. *Fl. ſuec.* 322. *Gron. virg.* 44. *Roy. lugdb.* 215. *Hall. helv.* 182

Polygonum latifolium. *Bauh. pin.* 281.

β. Polygonum brevi anguſtoque folio. *Bauh. pin.* 281.

γ. Polygonum oblongo anguſto folio. *Bauh. pin.* 281. *Fl. lapp.* 153.

δ. Polygonum anguſtis foliis, calycibus purpuraſcentibus. *Dill. app.* 65.

ε. Poly-

ε. Polygonum erectum humile, foliis orbium. *Dill. app.* 65.
Habitat in Europæ *cultis ruderatis.* ☉

16. POLYGONUM floribus octandris trigynis axillaribus, foliis ovalibus, caule erecto herbaceo. *erectum.*
Habitat in Philadelphia, *enata ex ſeminibus D. Kalmii.* ☉

17. POLYGONIUM floribus octandris trigynis, ſpicis paniculatis articulatis, ſtipulis vaginalibus truncatis. *articulatum.*
Habitat in Canada. *Kalm.* ☉
Radix *fibroſa, parva.* Caulis *pedalis, ramis ſuperne alternis, ſubdiviſus in paniculam floriferam.* Stipulæ *ſolitaria, vaginales, ſuperne latiores, integræ, truncatæ nec fiſſæ.* Folia *linearia, glabra. Paniculam terminant Spicæ filiformes, anguſtiſſimæ, imbricatæ bracteis vaginalibus, turbinatis, truncatis: ex ſinu ſingulo oritur pedunculus ſolitarius, capillaris, baſi articulatus, coloratus, uniflorus.* Corolla *incarnata, quinquepartita, fundo laxiore quam in P. aviculari; ſtaminibus octo, Piſtillo ſtylis* 3.

18. POLYGONUM floribus octandris trigynis racemoſis, foliis lanceolatis, caule divaricato patulo. *divaricatum*
Helxine foliis lanceolatis, caule diffuſo. *Hort. upſ.* 96.
Fagopyrum orientale ramoſum & multiflorum, perſicariæ folio. *Tournef. cor.* 39. *Buxb. cent.* 2. *p.* 31. *t.* 31.
Perſicaria alpina altera ſaxatilis, foliis durioribus acutis. *Bocc. muſ.* 2. *p.* 108. *t.* 83.
Habitat in Sibiria, Corſica. ♃

* Helxine *foliis ſubcordatis*

19. POLYGONUM floribus octandris trigynis, pedunculis ſcabris, foliis ovatis. *chinenſe.*
Habitat in India, China.
Caulis *flexuoſus.* Folia *ovato-cordata, ſ. lato-ovata, glabra utrinque.* Pedunculi *hiſpidi, apice ſæpius trifidi.* Flores *capitati.* Stipulæ *vaginales, latæ, integerrimæ nec ciliatæ, ovatæ.* Flores *in capitula ſubrotunda, pauci, terminales.*

20. POLYGONUM foliis ſagittatis, caule aculeato. *ſagittatum.*
Helxine caule aculeato, foliis ſagittatis. *Gron. virg.* 44. *Cold. noveb.* 92.
Helxine caule erecto aculeis reflexis exaſperato. *Hort. cliff.* 151. *t.* 12. * *Roy. lugdb.* 211.

Fago-

Fagotritico ſimilis, anguſtiori folio, convolvuli modo ſcandens, caule ſpinulis deflexis denſius obſito. *Pluk. mant.* 74. *t.* 394. *f.* 5.
Planta poſterior e novo belgio. *Laët. amer.* 73. *t.* 74.
Habitat in Virginiæ, Marilandiæ *madidis.*

arifolium. 21. POLYGONUM foliis haſtatis, caule aculeato.
Fagotritico ſimilis ſpinoſa ſcandens, ari folio latiore, floridana. *Pluk. amalth.* 87. *t.* 398. *f.* 3.
Planta prior e novo belgio. *Laet. amer.* 73.
Habitat in Virginia, Florida.

Tataricum. 22. POLYGONUM foliis cordato-ſagittatis, caule inermi erecto, ſeminibus ſubdentatis.
Helxine caule erectiuſculo inermi, foliis cordato-ſagittatis, ſeminibus ſubdentatis. *Hort. upſ.* 96.
Helxine caule erecto inermi, foliis cordato-ſagittatis, ſeminum angulis dentatis. *Hort. cliff.* 151.
Fagotriticum ſibiricum. *Act. ſtockh.* 1744. *p.* 117. *t.* 4.
Habitat in Tataria. ☉

Fagopyrum. 23. POLYGONUM foliis cordato-ſagittatis, caule erectiuſculo inermi, ſeminum angulis æqualibus.
Polygonum caule erectiuſculo inermi ramoſo, foliis cordato-ſagittatis, ſeminibus lævibus, *Mat. med.* 188.
Helxine caule erectiuſculo inermi, foliis cordato-ſagittatis, ſeminibus integerrimis. *Hort. upſ.* 96.
Helxine caule erectiuſculo inermi, foliis cordato-ſagittatis. *Hort. cliff.* 151. *Fl. ſuec.* 217. *Roy. lugdb.* 217.
Eryſimum cereale, folio hederaceo, *Bauh. pin.* 27.
Ocymum cereale. *Tabern. hiſt.* 276.
Habitat in Aſia. ☉

Convolvulus. 24. POLYGONUM foliis cordatis, caule volubili, floribus planiuſculis.
Helxine caule volubili. *Fl. lapp.* 154. *Fl. ſuec.* 323. *Hort. cliff.* 150. *Gron. virg.* 157. *Roy. lugdb.* 217.
Convolvulus minor, ſemine triangulo. *Bauh. pin.* 294.
Convolvulum nigrum. *Dod. pempt.* 396.
Habitat in Europæ *agris.* ☉

ſcandens. 25. POLYGONUM foliis cordatis, caule volubili, floribus carinatis.
Fagopyrum ſcandens americanum maximum. *Tournef. inſt.* 511.
Fagopyrum ſcandens, caule rubente, ſemine nigro. *Gron. virg.* 44. *Cold. noveb.* 93.

Fago-

Fagotriticum volubile majus virginianum. *Pluk. alm.* 143. *t.* 177. *f.* 7.

Fagopyrum ſcandens ſ. Volubilis nigra major, flore & fructu membranaceis compreſſis. *Sloan. jam.* 46. *hiſt.* 1. *p.* 138. *t.* 90. *f.* 1.

β. Fagopyrum prælongum dumetorum, ſeminibus alatis duplici more diſpoſitis. *Dill. app.* 60.

Fagopyrum ſylvaticum ſcandens, flore foliaceo. *Pont. anth.* 265.

Habitat in America. ⊙

Flores *plantæ* β. *non vidi, at ſtructura hujus eſt.*

* Caule *arboreo.*

26. POLYGONUM foliis ſubrotundis, caule arboreo, fructibus baccatis. *Uvifera.*

Uvifera foliis ſubrotundis ampliſſimis. *Hort. cliff.* 487.

Uvifera littorea, foliis amplioribus fere orbiculatis craſſis, americana. *Pluk alm.* 394. *t.* 236. *f.* 7.

Prunus maritima racemoſa, folio rotundo glabro, fructu minore purpureo. *Sloan. jam.* 183. *hiſt.* 2. *p.* 129. *t.* 220. *f.* 3. *Raj. dendr.* 40. *Cateſb. car.* 2. *p.* 96. *t.* 96.

Habitat in Caribearum *littoribus maritimis.* ♄

Ex habitu huc retuli (flores non vidi), vel enim hujus generis vel proximi erit.

PAULLINIA.

1. PAULLINIA foliis ternatis, caule aculeato, cirrhis nullis. *Fl. zeyl.* 143. * *aſiatica.*

Chamælæa trifolia aculeata. *Burm. zeyl.* 58. *t.* 24.

Frutex baccifer indicus ſpinoſus trifolius, floribus ſpicatis. *Pluk. alm.* 202. *t.* 95. *f.* 5.

Kaka-toddali. *Rheed. mal.* 5. *p.* 81. *t.* 41.

Habitat in India. ♄

2. PAULLINIA foliis ternatis, petiolis teretiuſculis, foliolis ovato-oblongis. *Seriana.*

Paullinia foliis ternatis, foliolis crenatis, pedunculis cirrhiferis. *Hort. cliff.* 152.

Seriana ſcandens triphylla & racemoſa. *Plum. gen.* 34.

Habitat in America *calidiore.* ♄

3. PAULLINIA foliis ternatis, foliolis cuneiformibus obtuſis ſubdentatis. *Cururu.*

Paullinia foliis ternatis, foliolis obtuſis vix denticulatis glabris deſinentibus in petiolum proprium. *Hort. cliff.* 151. *

Cu-

Cururu ſcandens triphylla. *Plum. gen.* 34.
Habitat in America *calidiore.* ♄

mexicana. 4. PAULLINIA foliis biternatis, petiolis marginatis, foliolis ovatis integris.
Paullinia foliis ternato-decompoſitis, caule aculeato. *Hort. cliff.* 152.
Seriana ſcandens enneaphylla & racemoſa. *Plum. gen.* 34.
Quauhmecatl. *Hern. mex.* 289.
Habitat in America *calidiore.* ♄

curaſſavica. 5. PAULLINIA foliis biternatis, foliolis ovatis ſubſinuatis.
Paullinia foliis decompoſitis ternatis, caule inermi. *Hort. cliff.* 152. *
Cururu ſcandens enneaphylla, fructu racemoſo rubro. *Plum. gen.* 34.
Cordis indi folio & facie fruteſcens curaſſavica latifolia. *Pluk. alm.* 120. *t.* 168. *f.* 6.
Habitat in Curaſſao. ♄

polyphylla. 6. PAULLINIA foliis bipinnatis.
Paullinia foliis ſupradecompoſitis. *Hort. cliff.* 153. *
Seriana fruteſcens polyphylla & racemoſa. *Plum. gen.* 34.
Cordis indi folio & facie fruteſcens, portoricenſis. *Pluk. alm.* 120. *t.* 168. *f.* 5.
Habitat in America *calidiore.* ♄
Cirrhus axillaris; Flores paniculati.

pinnata. 7. PAULLINIA foliis pinnatis: foliolis inciſis, petiolis marginatis. *Hort. cliff.* 52. * *Roy. lugdb.* 464.
Cururu ſcandens pentaphylla. *Plum. gen.* 34.
Clematis pentaphylla, pediculis alatis, fructu racemoſo tricocco & coccineo. *Plum. amer.* 76. *t.* 91.
Piſum cordatum non veſicarium. *Sloan. jam.* 111.
Cururu-ape. *Marcgr. braſ.* 22. *Piſ. braſ.* 114. *Raj. hiſt.* 1347.
Habitat in Braſilia, Jamaica, Domingo. ♄

CARDIOSPERMUM.

Halicacabum 1. CARDIOSPERMUM. *Hort. cliff.* 150. *Hort. upſ.* 97. *Fl. zeyl.* 142. *Roy. lugdb.* 464.
Piſum veſicarium, fructu nigro: alba macula notato. *Bauh. pin.* 743.

Hali-

Halicacabus peregrinus. *Dod. pempt.* 455.
β. Corindum ampliore folio, fructu maximo. *Tournef. inſt.* 431.
γ. Corindum fructu & folio minori. *Tournef. inſt.* 431.
Habitat in Indiis. ⊙

SAPINDUS.

1. SAPINDUS foliis pinnatis. *Saponaria.*
Sapindus. *Hort. cliff.* 152. *Mat. med.* 532. *Roy. lugdb.* 464.
Nux americana, foliis alatis bifidis. *Comm. hort.* 1. *p.* 183. *t.* 94.
Nuciprunifera arbor americana, fructu ſaponario orbiculato monococco nigro. *Pluk. alm.* 255. *t.* 217. *f.* 7.
Habitat in Braſilia, Jamaica. ♄

2. SAPINDUS foliis ternatis. *trifoliata.*
Poerinſii ſ. Vercœpœlongi. *Rheed. mal.* 4. *p.* 43. *t.*
Habitat in Malabaria. ♄

TETRAGYNIA.

PARIS.

1. PARIS. *quadrifolia.*
Paris foliis quaternis. *Fl. lapp.* 155. *Fl. ſuec.* 325. *Hort. cliff.* 153. *Roy. lugdb.* 461. *Hall. helv.* 412.
Solanum quadrifolium bacciferum. *Bauh. pin.* 167.
Aconitum ſalutiferum. *Tabern. hiſt.* 720.
Habitat in Europæ *nemoribus.* ♃

ADOXA.

1. ADOXA. *Hort. cliff,* 152. *Fl. ſuec.* 326. *Roy. lugdb.* 252. *Moſchatellina.*
Moſchatella. *Cord. hiſt.* 172.
Ranunculus nemoroſus Moſchatellina dictus. *Bauh. pin.* 178.
Fumaria bulboſa ſ. tuberoſa minima. *Tabern. ic.* 39.
Habitat in Europæ *nemoribus.* ♃
Huc relata ſecundum florem terminalem ex principiis Phil. bot. 178.

ELATINE.

1. ELATINE foliis oppoſitis. *Fl. lapp.* 156. *Fl. ſuec.* 327. *Gron. virg.* 158. *Roy. lugdb.* 452. *Hydropiper.*
Hydropiper. *Buxb. cent.* 3. *p.* 35. *t.* 37. *f.* 3.

Alſi-

Alſinaſtrum ſerpillifolium, flore albo tetrapetalo. *Vaill. pariſ.* 5. *t.* 2. *f.* 2.

β. Alſinaſtrum ſerpillifolium, flore roſeo tripetalo. *Vaill. pariſ.* 5. *t.* 2. *f.* 1.

Habitat in Europæ *inundatis.* ⊙

Alſinaſtrum. 2. ELATINE foliis verticillatis. *Roy. lugdb.* 452. *Sauv. monſp.* 164. *Boem. lipſ.* 127.

Elatine foliis emerſis linearibus, immerſis capillaceis. *Sauv. act. monſp*, 1743. *p.* 50.

Equiſetum paluſtre, linariæ ſcopariæ folio. *Bauh. pin.* 15.

Alſinaſtrum gallii folio. *Vaill. pariſ.* 6. *t.* 1. *f.* 6.

β. Alſinaſtrum gratiolæ folio. *Tournef. inſt.* 244. *Raj ſuppl.* 502.

Habitat Aboæ, Lipſiæ, Pariſiis, Monſpelii *in foſſis.*

Claſ-

Claſſis IX.

ENNEANDRIA

MONOGYNIA.

LAURUS.

1\. LAURUS foliis trinerviis ovato-oblongis nervos u- *Cinnamomum.*
nientibus. *Fl. zeyl.* 145. *Mat. med.* 190.
Laurus foliis oblongo-ovatis nitidis planis. *Hort. cliff.* 154.
Cinnamomum, foliis latis ovatis, frugiferum. *Burm. zeyl* 62. *t.* 27.
Cinnamomum ſ. Canella Zeylanica. *Bauh. pin.* 408.
Caſſia cinnamomea, *Herm. lugdb.* 129. *t.* 655.
Habitat in Zeylona. ♄

2\. LAURUS foliis trinerviis lanceolatis nervis ſupra ba- *Caſſia.*
ſin unitis. *Fl. zeyl.* 146. *Mat. med.* 191.
Cinnamomum perpetuo florens, folio tenuiore acuto. *Burm. zeyl.* 63. *t.* 28.
Cinnamomum ſ. Canella malabarica ſ. javanenſis. *Bauh pin.* 409.
Carua. *Rheed. mal.* 1. *p.* 107. *t.* 59.
Habitat in Malabaria, Sumatra, Java. ♄

3\. LAURUS foliis trinerviis lanceolato-ovatis: nervis *Camphora.*
ſupra baſin unitis. *Mat. med.* 192.
Laurus foliis ovatis utrinque acuminatis trinerviis nitidis, petiolis laxis. *Hort. cliff.* 154.
Laurus Camphorifera. *Kæmpf. jap.*
Camphora officinarum. *Bauh. pin.* 500.
Arbor camphorifera japonica. *Breyn. prodr.* 2. *p.* 16. *ic.* 16. *t.* 2.
Habitat in Japonia. ♄

4\. LAURUS foliis lanceolatis venoſis perennantibus, flo- *nobilis.*
ribus quadrifidis dioicis. *Hort. cliff.* 155. *Hort. upſ.* 98. *Mat. med.* 194. *Roy. lugdb.* 98.
Laurus vulgaris. *Bauh. pin.* 460.
Laurus. *Cam. epit.* 60.
Habitat in Italia, Græcia. ♄

indica. 5. LAURUS foliis lanceolatis perennantibus venoſis planis, ramulis tuberculatis cicatricibus, floribus racemoſis. *Hort. cliff.* 154. *Gron. virg.* 159.
Laurus indica. *Pluk. alm.* 210. *t.* 301. *f.* 1.
Laurus latifolia indica. *Barr. rar.* 123. *t.* 877.
Cinnamomum ſylveſtre americanum. *Seb. theſ.* 2. *p.* 90. *t.* 84. *f.* 6.
Habitat in Virginia. ♄

Perſea. 6. LAURUS foliis ovatis coriaceis transverſe venoſis perennantibus, floribus corymboſis.
Perſea. *Cluſ. hiſt.* 1. *p.* 2.
Perſea americana. *Bauh. pin.* 441.
Pyro ſimilis fructus in nova hiſpania, nucleo magno. *Bauh. pin.* 439.
Prunifera arbor fructu maximo pyriformi viridi, pericarpio eſculento butyraceo nucleum unicum maximum nullo oſſiculo tectum cingente. *Sloan. jam.* 132. *hiſt.* 2. *p.* 132. *t.* 222. *f.* 2. *Raj. dendr.* 48.
Arbor americana, ampliſſimis pergamenis foliis, ſuperficie nitidiſſima, fructu pyriformi cruſtaceo cortice coriato. *Pluk. alm.* 39. *t.* 267. *f.* 1.
Habitat in America *calida.* ♄

Borbonia. 7. LAURUS foliis lanceolatis transverſe venoſis, calycibus fructus baccatis. *Hort. cliff.* 154. *Gron. virg.* 46. *Roy. lugdb.* 226.
Laurus caroliniensis, foliis acuminatis, baccis cæruleis, pediceliis longis rubris inſidentibus. *Catesb. car.* 1. *p.* 63. *t.* 63.
Habitat in Carolina, Virginia. ♄

æſtivalis. 8. LAURUS foliis venoſis oblongis acuminatis annuis, ramis ſupra-axillaribus.
Laurus foliis lanceolatis enervibus annuis. *Gron. virg.* 159.
Laurus foliis enervibus ovatis utrinque acutis. *Gron. virg.* 46.
Habitat in Virginia *ad ripas rivulorum.* ♄
Pedunculi hujus fructiferi colorati ſunt.

Benzoin. 9. LAURUS foliis enerviis ovatis utrinque acutis integris annuis. *Hort. cliff.* 154. *Mat. med.* 195. *Gron. virg.* 46. *Roy. lugdb.* 226.
Arbor virginiana, citreæ vel limonii folio, Benzoinum fundens. *Comm. hort.* 1. *p.* 189. *t.* 97.

Ar

Arbor virginiana, piſhaminis folio, baccata Benzoinum redolens. *Pluk. alm.* 42. *t.* 139. *f.* 3. 4.
Habitat in Virginia. ♄

10. LAURUS foliis integris trilobisque. *Hort. cliff.* 154. *Mat. med.* 193. *Gron. virg.* 46. *Roy. lugdb.* 227. *Cold. noveb.* 94. *Saſſafras.*
Cornus mas odorata, folio trifido: margine plano, Saſſaphras dicta. *Pluk. alm.* 120. *t.* 222. *f.* 6. *Catesb. car.* 1. *p.* 55. *t.* 55.
Saſſafras arbor, ex florida, ficulneo folio. *Bauh. pin.* 431.
β. Cornus mas ſ. Saſſafras laurinis foliis indiviſis. *Pluk. amalth.* 66.
Habitat in Virginia, Carolina, Florida. ♄

11. LAURUS foliis enerviis obovatis obtuſis. *Mat. med.* 196. *Winteranus.*
Winteranus. *Hort. cliff.* 488.
Cinnamomum ſ. Canella peruana. *Bauh. pin.* 409.
Caſſia lignea jamaicenſis, laureolæ foliis ſubcinereis, cortice piperis modo acri. *Pluk. alm.* 89. *t.* 160. *f.* 1.
Caſſia cinnamomea ſ. Cinnamomum ſylveſtre barbadenſium. *Pluk. alm.* 89. *t.* 160, *f.* 7.
Arbor baccifera laurifolia aromatica, fructu viridi calyculato racemoſo. *Sloan. jam.* 165. *hiſt.* 1. *p.* 87. *t.* 191. *f.* 2. *Cateſb. car.* 2. *p.* 50. *t.* 50.
Habitat in Jamaica, Barbados, Carolina. ♄
Flores ipſe non vidi.

TRIGYNIA.

SPONDIAS.

1. SPONDIAS. *Hort. cliff.* 484. *Mombin.*
Mombin arbor, folio fraxini, fructu luteo racemoſo. *Plum. gen.* 44.
Prunus braſilienſis, fructu racemoſo, ligno intus pro oſſiculo. *Sloan. jam.* 182. *hiſt.* 2. *p.* 126.
Prunus americana. *Mer. ſur.* 13. *t.* 13.
Acaja & Ibametara. *Marcgr. braſ.* 129.
Habitat in Braſilia, Jamaica. ♄

RHEUM.

1. RHEUM foliis glabris, petiolis ſubſulcatis. *Rhaponticum.*
Rheum foliis glabris. *Hort. upſ.* 98. *Mat. med.* 198.
Rheum. *Hort. cliff.* 155.

Rhaponticum. *Alp. rapont.* 1. *t.* 1.
Rhaponticum folio lapathi majoris glabro. *Bauh. pin.* 116.
Habitat in Thracia, Scythia. ♃

Rhabarbarum. 2. RHEUM foliis ſubvillofis, petiolis æqualibus. *Diſſ. Rhabarb.* 1. *t.* 1. *
Rheum foliis ſubvilloſis, *Hort. upſ.* 98. *Mat. med.* 197.
Rhabarbarum ſinenſe, folio criſpo, flagellis rarioribus & minoribus. *Amm. herb.* 206.
Rhabarbarum folio longiori hirſuto criſpo, florum thyrſo longiori & tenuiori. *Amm. ruth.* 9.
Acetoſa montana, folio cubitali oblongiore criſpo, floribus in ſubviridi luteolis. *Meſſerſchmidii. Amm. ruth.* 226.
Habitat in China *ad murum & in* Sibiria. ♃

Ribes. 3. RHEUM foliis granulatis, petiolis æqualibus.
Lapathum orientale, aſpero & verrucoſo folio, Ribes arabibus dictum: *Dill. elth.* 191. *t.* 158. *f.* 192.
Lapathum orientale tomentoſum rotundifolium, Ribes arabum dictum. *Breyn. E. N. C. cent.* 7. *p.* 7.
Lapathum orientale aſperum, folio ſubrotundo, fructu magno purpureo. *Pocock orient.* 189. *t.* 84.
Ribes arabum. *Rauw. It.* 266. 282.
Ribes arabum, foliis petaſitidis. *Bauh. pin.* 455.
Habitat in Perſia, Libano, Carmelo. ♃
Flores *hujus ſpeciei non vidi. Facies ſuadet hujus generis eſſe.*

HEXAGYNIA.

BUTOMUS

umbellatus. 1. BUTOMUS. *Fl. lapp.* 159. *Fl. ſuec.* 328. *Roy. lugdb.* 45. *Hall. helv.* 298.
Juncus floridus major. *Bauh. pin.* 112.
Sedo affinis Juncoides umbellata paluſtris. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 468. *ſ.* 12. *t.* 5. *f.* 1.
Gladiolus aquatilis. *Dod. pempt.* 600.
Habitat in Europæ *aquoſis.* ♃

Clas-

Claſſis X.

DECANDRIA

MONOGYNIA.

SOPHORA.

1. SOPHORA foliis pinnatis: foliolis numeroſis villoſis oblongis. *alopecuroides.*
Sophora. *Hort. cliff.* 156.
Ervum orientale alopecuroides perenne, fructu longiſſimo. *Tournef. cor.* 27. *Dill. elth.* 136.
Glycyrrhiza ſiliquis nodoſis quaſi articulatis. *Buxb. cent.* 3. *p.* 25. *t.* 46
Habitat in Oriente. ♃

2. SOPHORA foliis pinnatis: foliolis numeroſis ſubrotundis. *tomentoſa*
Sophora tomentoſa, foliolis ſubrotundis *Fl. zeyl.* 163. *
Indigophora foliis tomentoſis. *Hort. cliff.* 487.
Colutea zeylanica argentea tota. *Herm. lugdb.* 169. *t.* 171. *Raj. hiſt.* 1720.
Habitat in Zeylona. ♄

3. SOPHORA foliis pinnatis, foliolis ſeptenis glabris. *heptaphylla.*
Sophora glabra, foliolis ſeptenis. *Fl. zeyl.* 104.
Fruticulus ſinenſis, ſennæ ſylveſtris folio anguſtiore, nodoſa ſiliqua roſtro longiore donata *Pluk. amalth.* 18. *t.* 451. *f.* 10.?
Habitat in India. ♄

4. SOPHORA foliis ternatis ſeſſilibus: foliolis linearibus. *Geniſtoides.*
Geniſtra africana, foliis galii. *Old. afr.* 31.
Habitat ad Cap. b. Spei.

5. SOPHORA foliis ternatis ſubſeſſilibus: foliolis ſubrotundis glabris. *tinctoria.*
Cytiſus foliis fere ſeſſilibus, calycibus bractea triplici auctis. *Gron. virg.* 82.
Cytiſus procumbens americanus, flore luteo, ramoſiſſimus, qui Anil ſuppeditat. *Pluk. alm.* 129. *t.* 86. *f.* 2 *Ehret. t.* 1. *f.* 3.
Habitat in Barbados, Virginia.

lupinoides. 6. SOPHORA foliis ternatis petiolatis: foliolis ovalibus piloſis.
Sophora foliis ternatis, ſpica verticillata. *Amœn. acad.* 2. *p.* 350. *
Habitat in Camtſchatca. *G. Demidoff.*

ANAGYRIS.

fœtida. 1. ANAGYRIS. *Cluſ. hiſt.* 1. *p.* 93.
Anagyris floribus lateralibus. *Roy. lugdb.* 371.
Anagyris fœtida. *Bauh. pin.* 391.
Habitat in Italiæ, Siciliæ, Hiſpaniæ *montibus.* ♄

CERCIS.

Siliquaſtrum 1. CERCIS foliis cordato-orbiculatis glabris. *Hort. cliff.* 156. *Hort. upſ.* 99. *Roy. lugdb.* 463.
Siliqua ſylveſtris rotundifolia. *Bauh. pin.* 402.
Arbor judæ. *Dod. pempt.* 786.
Habitat in Italia, Hiſpania, Narbona. ♄

canadenſis. 2. CERCIS foliis cordatis pubeſcentibus. *Hort. cliff.* 156. *Hort. upſ.* 99. *Roy. lugdb.* 463. *Gron. virg.* 47.
Ceratia agreſtis virginiana, folio rotundo minori. *Raj. dendr.* 100.
Habitat in Virginia. ♄

BAUHINIA.

ſcandens. 1. BAUHINIA caule cirrhifero.
Clematis indica, folio bifido, flore fructuque carens arbores tranſcendens. *Raj. ſuppl.* 328.
Naga-mu-valli. *Rheed. mal.* 8. *p.* 57. *t.* 29.
Habitat in Malabaria. ♄

aculeata. 2. BAUHINIA caule aculeato. *Hort. cliff.* 156. *t.* 14. *Roy. lugdb.* 463.
Plumeria aculeata, folio rotundo & emarginato. *Plum. gen.* 23.
Habitat in America *calidiore.* ♄

divaricata. 3. BAUHINIA foliis ovatis: lobis divaricatis.
Bauhinia foliis quinquenerviis: laciniis acuminatis remotiſſimis. *Hort. cliff.* 156. *t.* 15. *Roy. lugdb.* 464.
Habitat in America. ♄

ungulata. 4. BAUHINIA foliis ovatis: lobis parallelis.
Bauhinia foliis ovatis oblongis recta linea bifidis. *Hort cliff.* 157.
Habitat in America. ♄

5. BAU-

5. BAUHINIA foliis cordatis: lobis coadunatis obtuſis. *variegata.*
Arbor ſ. Thomæ ſ. Aſſitra. *Zanon. hiſt.* 26. *t.* 15.
Chovanna-mandaru. *Rheed. mal.* 1. *p.* 57. *t.* 32. *Raj. hiſt.* 1751.
Habitat in Malabariæ, Maderæ *arenoſis.* ♄
Corollæ patentes: Petalis ovatis, acutis, roſeis. luteo purpureoque variegatis.

6. BAUHINIA foliis ſubcordatis bipartitis rotundatis ſubtus tomentoſis. *purpurea.*
Chovanna-mandaru. *Rheed. mal.* 1. *p.* 59. *t.* 33.
Habitat in Indiæ *arenoſis.* ♄
Flores patentes, purpuraſcentes: Petalis lanceolatis, diſtantibus.

7. BAUHINIA foliis cordatis: lobis ſemiorbiculatis tomentoſis. *tomentoſa.*
Bauhinia foliis cordato-ſubrotundis: laciniis rotundatis. *Hort. cliff.* 157. *Hort. upſ.* 99. *Fl. zeyl.* 147. *Roy. lugdb.* 464.
Bauhinia foliis ſubrotundis, flore flaveſcente ſtriato. *Burm. zeyl.* 44. *t.* 18.
Mandaru maderaſpatenſe, foliis firmioribus biſulcis glabritie ſplendentibus. *Pluk. alm.* 240. *t.* 44. *f.* 6.
Chauſchena-pou. *Rheed. mal.* 1. *p.* 63. *t.* 35.
Habitat in India. ♄
Corollæ campanulatæ, albo flaveſcentes: Petalis obovatis

8. BAUHINIA foliis ovatis: lobis acuminatis ſemiovatis. *acuminata.*
Bauhinia inermis, foliis cordatis ſemibifidis: laciniis acuminato-ovatis erectis dehiſcentious. *Hort. cliff.* 157. *Fl. zeyl.* 148.
Sennæ ſpuriæ aut Aſphalto affinis arbor ſiliquoſa, foliis bifidis. *Sloan. jam.* 150. *hiſt.* 1. *p.* 51.
Velutta-mandaru. *Rheed. mal.* 1. *p.* 61. *t.* 34. *Raj. hiſt.* 1751.
Habitat in Indiis. ♄
Corollæ campanulatæ, albæ: Petalis obtuſis.

PARKINSONIA.

1. PARKINSONIA. *Hort. cliff.* 157. *t.* 13. *Hort. upſ.* 99. *Roy. lugdb.* 465. *aculeata.*
Parkinſonia aculeata, foliis minutis uni coſtæ adnexis. *Plum. gen.* 25.
Parkinſonia aculeata, foliis mimoſæ uni coſtæ affixis. *Walth. hort.* 6. *t.* 13.
Habitat in America *calidiore.* ♄

CAS-

CASSIA.

* *Sennæ.*

diphylla. 1. CASSIA foliis conjugatis, ſtipulis cordato-lanceolatis. *Habitat in* India. ☉
Frutex Caule *tereti*. Folia *conjugata ſ. duo in petiolo brevi, ſemiorbiculata, obtuſa, ſtriata.* Stipulæ *cordato-lanceolatæ, totos ramos obtegentes.*

Abſus. 2. CASSIA foliolis bijugatis ovatis. *Fl. zeyl.* 153. *
Senna quadrifolia, ſiliqua plana hirſuta, flore aureo ſangvineo. *Burm. zeyl.* 212. *t.* 97.
Senna exigua maderaſpatana tetraphylla ſiliquifera glabra, florum pediculis ad exortum foliorum propendentibus. *Pluk. alm.* 341. *t.* 60. *f.* 1.
Loto affinis ægyptiaca. *Baub. pin.* 332.
Habitat in India, Ægypto. ☉

Tagera. 3. CASSIA foliolis bijugatis, ſtipulis ciliatis.
Caſſia 6, Senna ſpuria tetraphylla arboreſcens, ſiliquis tenuibus longiſſimis pendulis. *Amm. herb.* 603. *n.* 33?
Tagera. *Rheed. mal.* 2. *p.* 103. *t.* 52? *Raj. hiſt.* 1743?
Habitat in India.
Fruticulus *procumbens: Ramis filiformibus.* Petioli *breviſſimi;* Folia *quatuor, ſemiorbiculata, venoſa, quorum duo exteriora majora.* Stipulæ *cordatæ ſ. cordato-lanceolatæ, margine piloſæ.*

Tora. 4. CASSIA foliolis trijugatis ovatis: exterioribus majoribus; glandula ſubulata inter inferiora. *Roy. lugdb.* 468. *Fl. zeyl.* 152. *Hort. upſ.* 100.
Caſſia humilis, ſiliquis fœnu græci. *Plum. ſpec.* 18.
Caſſia ſiliqua quadrangulari. *Dill. elth.* 72. *t.* 63. *f.* 73.
Habitat in India. ☉
Caules & *Petioli ſcabri.* Stipulæ *lineares, acuminatæ, piloſæ.* Glandulæ *acuminatæ, apice fuſcæ, inter ſingula paria 2 inferiora, non vero inter extimum par ſita.*

bicapſularis. 5. CASSIA foliolis trijugatis obovatis glabris: interioribus rotundioribus minoribus: glandula interjecta globoſa. *Hort. cliff.* 159. *Hort. upſ.* 100. *Roy. lugdb.* 468.
Caſſia hexaphylla, ſiliqua bicapſulari. *Plum. ſpec.* 18.
Habitat in India. ♄
Arboreſcens eſt, & glaberrima. Foliola interiora breviora.

emarginata. 6. CASSIA foliolis trijugatis ovatis rotundatis emarginatis æqualibus. *Hort. cliff.* 159. *Roy. lugdb.* 467.

Caſ-

Caſſia minor hexaphylla fruticoſa, ſennæ foliis. *Sloan. jam.* 146. *hiſt.* 2. *p.* 44. *t.* 180. *f.* 1. 2. 3. 4. *Raj. dendr.* 110.
Habitat in Caribæis. ♄

7. CASSIA foliolis trijugatis ovatis obtuſiuſculis. *obtuſifolia.*
Caſſia fœtida, foliis ſennæ italicæ. *Dill. elth.* 71. *t.* 62. *f.* 72.
Caſſia minor herbacea plerumque hexaphylla, folio obtuſo. *Sloan. jam.* 145. *hiſt.* 2. *p.* 47. *t.* 180. *f.* 5.?
Habitat in Cuba. ⊙

8. CASSIA foliolis trijugatis quadrijugatisque ſubovatis. *Senna.*
Hort. cliff. 159. *Mat. med.* 200. *Roy. lugdb.* 468.
Senna Alexandrina ſ. foliis acutis. *Bauh. pin.* 397. *Moriſ. hiſt.* 2. *p.* 201. *ſ.* 2. *t.* 24. *f.* 1.
β. Senna italica ſ. foliis obtuſis. *Bauh pin.* 397. *Moriſ. hiſt.* 2. *p.* 200. *ſ.* 2. *t.* 24. *f.* 2.
Senna. *Dod. pempt.* 361.
Habitat in Ægypto. ⊙

9. CASSIA foliolis quadrijugatis ovato-lanceolatis retrofalcatis: glandula baſeos petiolorum. *Hort. cliff.* 159.* *falcata.*
Habitat in America. ⊙

10. CASSIA foliolis quinquejugatis ovato-lanceolatis margine ſcabris: exterioribus majoribus; glandula baſeos petiolorum. *occidentalis.*
Caſſia foliolis quatuor parium ovato-lanceolatis, glandula baſeos petiolorum. *Hort. cliff.* 159. *Roy. lugdb.* 467.
Senna occidentalis, odore opii viroſo, orobi pannonici foliis mucronatis, glabra. *Comm. hort.* 1. *p.* 51. *t.* 26.
Habitat in Jamaica.
Caulis *ſeſquipedalis, punctis vagis ſcaber, exaratus deorſum a ſingulo petiolo ſulcis duobus.* Folia *ſuperiora Foliolis quinqueparium, ovato lanceolatis, glabris margine ſcabris, acuminatis, exterioribus ſenſim majoribus, fœtidis.* Racemus *terminalis.* Flores *lutei absque macula.*

11. CASSIA foliolis quinquejugatis ovato-lanceolatis glabris, glandula baſeos petiolorum. *Roy. lugdb.* 46 . *planiſiliqua.*
Caſſia ſiliquis planis. *Plum. ſpec.* 18.
Habitat in America *calidiore.*

12. CASSIA foliolis quinquejugatis ovatis acuminatis glabris, petiolis eglandulоſis. *Fl. zeyl.* 149. *Mat. med.* 199. *fiſtula.*

Caſ-

Caſſia foliolis quinque parium lanceolatis: extimis minoribus. *Hort. cliff.* 158.
Caſſia fiſtula alexandrina. *Bauh. pin.* 405. *Comm. hort.* 1. *p.* 215. *t.* 110.
Conna. *Rheed. mal.* 1. *p.* 37. *t.* 21.
Habitat in India, Ægypto.

hirſuta. 13. CASSIA foliolis ſexjugatis ovatis acuminatis lanatis. *Hort. cliff.* 159. *Roy. lugdb.* 467.
Caſſia americana fœtida, foliis amplioribus villoſis. *Tournef. inſt.* 619.
Senna occidentalis, odore opii viroſo, foliis orobi pannonici mucronatis hirſutis. *Herm. lugdb.* 556.
Habitat in America.

liguſtrina. 14. CASSIA foliolis ſeptemjugatis lanceolatis: extimis minoribus, glandula baſeos petiolorum. *Hort. cliff.* 199. *Hort. upſ.* 100. *Gron. virg.* 47. *Roy. lugdb.* 467.
Caſſia liguſtri folio. *Plum. ſpec.* 10. *Dill. elth.* 350. *t.* 269. *f.* 338.
Caſſia bahamenſis, pinnis foliorum mucronatis anguſtis, calyce floris non reflexo. *Mart. cent.* 21. *t.* 21.
Habitat in Virginia, Bahama. ♃

alata. 15. CASSIA foliolis octojugatis ovali-oblongis: interioribus minoribus, petiolis eglanduloſis, ſtipulis patulis. *Hort. cliff.* 158. *Hort. upſ.* 100. *Roy. lugdb.* 467.
Caſſia ſylveſtris fœtida, ſiliquis alatis. *Plum. ſpec.* 18.
Faba dulcis. *Mer. ſurin.* 58. *t.* 58.
Habitat in America *calidiore.* ♄

marilandica. 16. CASSIA foliolis octojugatis ovato-oblongis æqualibus, glandula baſeos petiolorum. *Hort. cliff.* 159. *Hort. upſ.* 100. *Roy. lugdb.* 467.
Caſſia mimoſæ foliis, ſiliqua hirſuta. *Dill. elth.* 351. *t.* 260. *f.* 339.
Caſſia marilandica, pinnis foliorum oblongis, calyce floris reflexo. *Mart. cent.* 23. *t.* 23.
Habitat in Virginia, Marilandia. ♃

biflora. 17. CASSIA foliolis octojugatis ovalibus emarginatis, glandula mucronata inter intima. *Hort. cliff.* 159.
Habitat in Indiis. ♄

tenuiſſima. 18. CASSIA foliolis novemjugatis oblongis, glandula ſubulata inter infima. *Roy. lugdb.* 478.

Sen-

Senna ſpuria fruteſcens, ſiliquis tenuiſſimis. *Houſt mſſ.*
Habitat in Havana. ♄

19. CASSIA foliolis decemjugatis lanceolatis, glandula baſeos oblonga. *Fl. zeyl.* 150. * *Sophera.*
Senna vigintifolia, ſiliquis teretibus. *Burm. zeyl.* 213. *t.* 98.
Ponnam-Tongera. *Rheed. mal.* 2. *p.* 101. *t.* 52.
Habitat in India.

20. CASSIA foliolis duodecim-jugatis obtuſis acumine, glandulis ſubulatis pluribus, ſtipulis reniformibus barbatis. *Fl. zeyl.* 151. * *auriculata.*
Senna ſpuria maderaſpatana, caule ad foliorum alas geminatis ſubrotundis appendiculis auriculato. *Pluk. alm.* 341. *t.* 314. *f.* 4. *Raj. dendr.* 110.
Habitat in India.

21. CASSIA foliolis duodecim jugatis oblongis obtuſis glabris, glandula nulla. *javanica.*
Caſſia fiſtula javanica, flore carneo. *Comm. hort.* 1. *p.* 217. *t.* 111.
Habitat in India.
Flores mihi non protulit.

* Chamæcriſtæ *foliolis numeroſis.*

22. CASSIA foliolis multijugatis, glandula petioli pedicellata, ſtipulis enſiformibus. *Hort. upſ.* 101. *Chamæcriſta*
Caſſia foliolis plurimum parium linearibus, ſtipulis ſubulatis. *Hort. cliff.* 158. *Gron. virg.* 47.
Chamæcriſta pavonis major. *Comm. hort.* 1. *p.* 53. *t.* 37.
ChamæChriſta pavonis americana, ſiliqua multiplici. *Breyn. cent.* 64. *t.* 24.
Habitat in Jamaica, Barbados, Virginia. ☉
Foliola 20; *Pedunculus ſpatio ſupra petiolum egrediens.*

23. CASSIA foliolis multijugatis linearibus: glandula baſeos petiolorum obſoleta, ſtipulis ſetaceis. *Fl. zeyl.* 154. * *mimoſoides.*
Habitat in Zeylona.
Petioli *absque glandula.* Caulis *non flexuoſus.* Stipulæ *lanceolatæ, ſeta terminatæ.*

24. CASSIA foliolis multijugatis, ſtipulis dimidiato-cordatis. *flexuoſa.*
Senna ſpuria occidentalis, ſiliqua ſingulari, foliis herbæ mi-

mimoſæ. *Herm. lugdb.* 558. *Sloan. jam.* 150. *Raj ſuppl.* 18.
Chamæcriſta pavonis braſiliana, ſiliqua ſingulari *Breyn. cent.* 65. *t.* 23.
Habitat in Braſilia. ⊙

nictitans. 25. CASSIA foliolis multijugatis, floribus pentandris.
Caſſia calycibus acutis, floribus pentandris. *Hort. cliff* 497. *t.* 36. *Hort. upſ.* 101.
Senna ſpuria virginiana, mimoſæ foliis, floribus parvis nictitantibus. *Pluk. alm.* 341. *t.* 314. *f.* 3.
Habitat in Virginia. ⊙

procumbens. 26. CASSIA foliis multijugatis, caule procumbente.
Caſſia americana procumbens herbacea, mimoſæ foliis, floribus parvis, ſiliquis anguſtis planis. *Comm. petrop. t.* 11.
Habitat in Indiis. ⊙

POINCIANA.

pulcherrima. 1. POINCIANA aculeis geminis. *Hort. upſ.* 101.
Poinciana foliis duplicato-pinnatis: foliolis oblongo-ovatis, caule inermi. *Hort. cliff.* 158. *Fl. zeyl.* 159. *Roy. lugdb.* 159.
Frutex pavoninus, Criſta pavonis. *Breyn. cent.* 61. *t.*
Flos pavonis. *Mer. ſur.* 45. *t.* 45.
Tſietti-mandaru. *Rheed. mal.* 6. *p.* 1. *t.* 1.
Habitat in Indiis. ♄

CÆSALPINIA.

braſilienſis. 1. CÆSALPINIA foliolis obovatis integerrimis. *Mat. med.* 205.
Cæſalpina polyphylla aculeis horrida. *Plum. gen.* 26.
Pſeudo-Santalum croceum. *Sloan. jam.* 213. *hiſt.* 2. *p.* 184. *t.* 132. *f.* 34. *Raj. dendr.* 132. *Catesb. car.* 2. *p.* 51. *t.* 51.
Habitat in Jamaicæ, Carolinæ *collibus.* ♄

Criſta. 2. CÆSALPINIA foliis ovatis integerrimis.
Cæſalpinia aculeis recurvis, foliolis ovatis. *Fl. zeyl.* 157. * *Hort. upſ.* 102.
Acacia glorioſa, lentiſci folio, ſpinoſa, flore ſpicato luteo, ſiliqua magna. *Pluk. alm.* 4. *t.* 2. *f.* 2.
Chriſta pavonis, glycyrrhizæ folio, minor repens ſpino-

noſisſima, flore luteo ſpicato minimo, ſiliqua latisſima echinata. *Breyn. ic.* 58. *t.* 28
Habitat in Zeylona. ♄

3. CÆSALPINIA foliolis emarginatis, filamentis lanatis. *Fl. zeyl.* 158. * *Mat. med*, 203. *Sappan.*
Ligno braſiliano ſimile. *Bauh. pin.* 393.
Tſiam-pangam. *Rheed. mal.* 6. *p.* 3. *t.* 2.
Habitat in Indiis. ♄

4. CÆSALPINIA foliolis emarginatis, leguminibus ſulcatis ovalibus *veſicaria.*
Cæſalpina. *Amm. herb.* 604.
Senna ſpuria arborea ſpinoſa, foliis alatis ramoſis ſ. decompoſitis, flore luteo, ſiliquis brevibus ſulcatis nigris, ſabinæ odore. *Sloan. jam.* 149. *hiſt.* 2. *p.* 150. *t.* 181. *f.* 12. *Raj. dendr.* 111.
Colutea veræ crucis veſicaria. *Pluk. alm.* 111. *p.* 165. *t.* 3.
Habitat in America *calidiore.* ♄

GUILANDINA.

1. GUILANDINA aculeata, foliolis ovalibus acuminatis. *Fl. zeyl.* 156. *Hort. upſ.* 101 *Bonduc.*
Guilandina caule fructuque aculeatis. *Hort. cliff.* 158.
Bonduc vulgare minus polyphyllum. *Plum. gen.* 25.
Arbor exotica ſpinoſa, foliis lentiſci. *Bauh. pin.* 399.
Caretti. *Rheed. mal.* 6. *p.* 35. *t.* 22.
Habitat in Indiis. ♄

2. GUILANDINA inermis, foliis ſubbipinnatis: foliolis interioribus ternatis. *Fl. zeyl.* 155. *Mat. med.* 202. *Moringa.*
Lignum peregrinum aquam cæruleam reddens. *Bauh. pin.* 415.
Moringha zeylanica, foliorum pinnis pinnatis, flore majore, fructu anguloſo. *Burm. zeyl.* 162. *t.* 75.
Morungu *Rheed. mal.* 6. *p.* 19. *t.* -
Habitat in Zeylona. ♄
Semina ex Aſia tribus membranis longitudinaliter alata fuere, ex Africa vero membranis his caruere.

3. GUILANDINA inermis, foliis bipinnatis: baſi apiceque ſimpliciter pinnatis. *Gen. plant.* 2. *p.* 518. *dioica.*
Habitat in Canada. ♄

GUAJACUM.

1. GUAJACUM foliolis bijugatis obtuſis. *officinale.*

Gua-

Guajacum foliis pinnatis: foliolis quaternis obtuſis. *Hort. cliff.* 187. *Mat. med.* 207.
Guajacum flore cæruleo, fructu ſubrotundo. *Plum gen.* 39.
Guajacum jamaicenſe, foliis velut muria conditis ſpiſſius virentibus, flore ſubcæruleo. *Pluk. alm.* 180. *t.* 35. *f.* 4.
Guajacum magna matrice. *Bauh. pin.* 448.
Pruno vel Evonymo affinis arbor, folio alato buxeo ſubrotundo. *Sloan. jam.* 186. *hiſt.* 2. *p.* 133. *t.* 222. *f.* 3. 4. 5. 6.
Arbor ligni Sancti vel Guajacum. *Seb. theſ.* 1. *p.* 86. *t.* 53. *f.* 2.
β. Guajacum jamaicenſe, lentiſci ſubrotundis foliis late virentibus, flore albo. *Pluk. alm.* 180. *t.* 35. *f.* 3.
Habitat in Hiſpaniola, Jamaica. ♄

ſanctum. 2. GUAJACUM foliolis multijugatis obtuſis.
Guajacum foliis pinnatis, foliolis obverſe ovatis integerrimis. *Roy. lugdb.* 208.
Guajacum flore cæruleo fimbriato, fructu tetragono. *Plum. gen.* 39.
Guajacum propemodum ſine matrice. *Bauh. pin.* 448.
Jaſminum vulgo americanum ſ. Euonymo affinis occidentalis, alatis ruſci foliis, nucifera, cortice ad genicula fungoſo. *Pluk. alm.* 139. *t.* 94. *f.* 4.
Habitat in Americes *inſula ſ. Johannis de Porto Ricco.* ♄

afrum. 3. GUAJACUM foliolis multijugatis acutis.
Guilandinoides. *Hort. cliff.* 489.
Acacia africana, quæ Acaciæ ſimilis, foliis myrti parvis aculeatis pinnatis, flore coccineo tetrapetaloide. *Walth. hort.* 2. *t.* 2.
Afra arbor acaciæ ſimilis, foliis myrti aculeatis ſplendentibus. *Boerh. lugdb.* 2. *p.* 57.
Habitat in Æthiopia. ♄

CYNOMETRA

cauliflora. 1. CYNOMETRA trunco florifero. *Act. upſ.* 1741. *p.* 79. *Fl. zeyl.* 166.
Cynomorium. *Rumpf. amb.* 1. *p.* 163. *t.* 62.
Habitat in India. ♄

ramiflora. 2. CYNOMETRA ramis floriferis. *Act. upſ.* 1741. *p.* 79. *Fl. zeyl.* 167.

Cy-

Cynomorium ſylveſtre. *Rumpf. amb.* 1. *p.* 164. *t.* 63.
Iripa. *Rheed. mal.* 4. *p.* 65. *t.* 31.
Habitat in India. ♄

ANACARDIUM.

1. ANACARDIUM. *Hort. cliff.* 161. *Fl. zeyl.* 165. *Mat. med.* 206. *Hort. upſ.* 102. *Roy. lugdb.* 463. *occidentale.*
Anacardii alia ſpecies. *Bauh. pin.* 512.
Pomifera ſ. potius Prunifera indica, nuce reniformi. *Cateſb. car.* 3. *p.* 9. *t* 9.
Acajou. *Piſ braſ.* 58. *mant.* 193.
Caſchou. *Mer. ſurin.* 16. *t.* 16.
Kapa-mava. *Rheed. mal.* 3. *p.* 65. *t.* 54.
Habitat in Indiis. ♄

DICTAMNUS.

1. DICTAMNUS. *Hort. cliff.* 161. *Hort. upſ.* 102. *Mat. med.* 208. *Roy. lugdb.* 463. *Sauv. monſp.* 232. *albus.*
Dictamnus albus vulgo Fraxinella. *Bauh. pin.* 222.
Fraxinella. *Reneal. ſpec.* 122. *t.* 121.
Habitat in Germania, Gallia, Italia. ♃

RUTA.

1. RUTA foliis decompoſitis. *Hort. cliff.* 145. *Hort. upſ.* 102. *Mat. med.* 209. *Roy. lugdb.* 461. *graveolens.*
Ruta ſylveſtris major. *Bauh. pin.* 336. *Moriſ. hiſt.* 2. *p.* 507. *ſ.* 5. *t.* 14. *f.* 3.
β. Ruta chalepenſis tenuifolia, florum petalis villis ſcatentibus. *Moriſ. hiſt.* 2. *p.* 509.
Ruta hortenſis altera. *Bauh. pin.* 336. *Raj. hiſt.* 874.
γ. Ruta hortenſis latifolia. *Bauh. pin.* 336.
Ruta graveolens hortenſis. *Dod. pempt.* 119.
δ. Ruta hortenſis latifolia arbuſculæ ſimilis. *Bœrh. lugdb.* 1. *p.* 260.
Ruta africana maxima. *Schwer. hort.* 24.
Habitat in Europæ *auſtralis*, Alexandriæ, Mauritaniæ *ſterilibus.* ♄
Flos primarius quinquefidus, reliqui quadrifidi. Phil. Bot. 178.
Confer: *Ruta* ſylveſtris minor. *Bauh. pin.* 336. *Cam. epit.* 495. Ruta montana legitima. *Cluſ. hiſt.* 2. *p.* 136. *app. alt. fig. ſtructura eadem, facie diſtincta.* montana.

2. RU-

patavina. 2. RUTA foliis ternatis ſeſſilibus.
PſeudoRuta patavina trifolia, floribus luteis umbellatis. *Mich. gen.* 22. *t.* 19.
Habitat prope Patavium.

linifolia. 3. RUTA foliis ſimplicibus indiviſis.
Ruta foliis ſimplicibus ſolitariis. *Hort. cliff.* 146.
Ruta ſylveſtris linifolia hiſpanica. *Bocc. muſ.* 2. *p.* 82 *t.* 73. *Barr. ic.* 1186.
β. Ruta montana, foliis integris ſubrotundis. *Buxb. cent.* 2. *p.* 30. *t.* 28. *f.* 2.
γ. Ruta orientalis, linariæ folio, flore parvo. *Tournef. cor.* 19. *Buxb. cent.* 2. *p.* 30. *t.* 28. *f.* 1.
Habitat in Hiſpania; β. *in* Rodaſtro; γ. *in* Media. ♃

TOLUIFERA.

Balſamum. 1. TOLUIFERA. *Mat. med.* 201.
Balſamum Tolutanum, foliis ceratiæ ſimilibus. *Bauh. pin.* 401.
Habitat in America *prope* Carthagenam. ♄

HÆMATOXYLUM

Campechianum. 1. HÆMATOXYLUM. *Hort. cliff.* 160. *Roy. lugdb.* 465.
Lignum campechianum; ſpecies quædam. *Sloan. jam.* 213. *hiſt.* 2. *p.* 183. *t.* 10 *f.* 1. 2. 3. 4. *Cateſb. car.* 3. *p.* 66. *t.* 66.
Habitat in Campeche Americes. ♄

ADENANTHERA.

pavonina. 1. ADENANTHERA foliis decompoſitis. *Roy. lugdb.* 462. *Vir. cliff.* 36. *Fl. zeyl.* 160. *
Poinciana foliis duplicato-pinnatis: foliolis alternis. *Hort. cliff.* 158.
Mandſiadi. *Rheed. mal.* 6. *p.* 25. *t.* 14.
Habitat in India. ♄

MELIA.

Azedarach. 1. MELIA foliis bipinnatis. *Fl. zeyl.* 162.
Melia foliis decompoſitis. *Hort. cliff.* 161. *Roy. lugdb.* 462.
Azedarach. *Dod. pempt.* 848.
Arbor fraxini folio, flore cæruleo. *Bauh. pin.* 415.
Pſeudo-Sycomorus. *Cam. epit.* 181.

β. Aze

β. Azedarach ſempervirens & florens. *Tourneſ. inſt.* 616. ſemper-virens.
Azadirachta indica, foliis ramoſis minoribus, flore albo ſubcæruleo purpuraſcente majore. *Comm. hort.* 1. *p.* 147. *t.* 76.
Habitat in Syria, β. *in* Zeylona. ♄

2. MELIA foliis pinnatis. *Hort. cliff.* 161. *Fl zeyl.* 161. * Azadirachta
Roy. lugdb. 462.
Olea malabarica, fraxini folio. *Pluk. alm.* 269. *t.* 247. *f.* 1.
Azedarach foliis falcato-ſerratis. *Burm. zeyl.* 40 *t.* 15.
Azadirachta indica, folio fraxini. *Breyn. ic.* 21. *t.* 15.
Arbor indica, fraxino ſimilis, oleæ fructu. *Bauh. pin.* 416.
Aria Bepou. *Rheed. mal.* 4. *p.* 107. *t.* 52.
Habitat in India. ♄

ZYGOPHYLLUM.

1. ZYGOPHYLLUM capſulis priſmatico-pentaedris. Fabago.
Hort. upſ. 103.
Zygophyllum foliis petiolatis. *Hort. cliff.* 160. *Roy. lugdb.* 460.
Capparis portulacæ folio. *Bauh. pin.* 480.
Capparis Fabago. *Dod. pempt.* 741.
Habitat in Syria. ♃
Folia *ovata, petiolata.* Petala *obtuſa.*

2. ZYGOPHYLLUM capſularum angulis compreſſo-membranaceis. Morgſana.
Fabago triphylla & tetraphylla, flore tetrapetalo, fructu membranaceo quadrangulari. *Burm. afr.* 7. *t.* 3 *f.* 2.
Fabago capenſis fruteſcens major. *Dill. elth.* 142. *t.* 116. *f.* 141.
Planta africana fruteſcens, portulacæ foliis, Morgſani ſyrorum, ex brevi pediculo binis. *Pluk. amalth.* 173. *t.* 429. *f.* 4.
Habitat in Æthiopia. ♄
Folia *obverſe ovata, petiolata*; Petala *acuta.*

3. ZYGOPHYLLUM capſulis globoſo-depreſſis. ſeſſilifolium.
Zygophyllum foliis ſeſſilibus. *Hort. cliff.* 160. *Roy. lugdb.* 460.
Fabago capenſis fruteſcens minor. *Dill. elth.* 142. *t.* 116. *f.* 142.

 Faba-

Fabago humilis quadrifolia glabra, flore albido, fructu rotundo. *Burm. afr.* 4. *t.* 2. *f.* 1.
Fabago africana arboreſcens, flore ſulphureo, fructu rotundo. *Comm. rar.* 10. *t.* 10.
Habitat in Æthiopia. ♄
Folia *ſubſeſſilia*, *oblonga*. Petala *crenata*.

fulvum. 4. ZYGOPHYLLUM capſulis ovatis acutis.
Fabago flore luteo, petalorum ungvibus rubris, fructu ſulcato acuto oblongo. *Burm. afr.* 6. *t.* 3. *f.* 1.
Habitat in Æthiopia. ♄
Folia *ſeſſilia*.

coccineum. 5. ZYGOPHYLLUM capſulis cylindricis.
Fabago arabica teretifolia, flore coccineo. *Shaw. afr.* 231. *f.* 231.
Habitat in Æhiopia.
Folia *teretia*.

ſpinoſum. 6. ZYGOPHYLLUM caule aculeato.
Fabago tenuifolia ſpinoſa, fructu rotundo. *Burm. afr.* 5. *t.* 5.
Habitat in Æthiopia. ♄
Folia *linearia*, *acuta*.

FAGONIA.

cretica. 1. FAGONIA ſpinoſa, foliolis lanceolatis planis lævibus. *Hort. upſ.* 103.
Fagonia ſpinoſa. *Hort. cliff.* 160.
Trifolium ſpinoſum creticum. *Baub. pin.* 330. *prodr.* 142. *Cluſ. hiſt.* 2. *p.* 242.
Habitat in Creta. ☉

hiſpanica. 2. FAGONIA inermis.
Fagonica hiſpanica non ſpinoſa. *Tournef. inſt.* 265.
Habitat in Hiſpania. ♃

arabica. 3. FAGONIA ſpinoſa, foliolis linearibus convexis. *Shaw. afr.* 229.
Fagonia arabica, longiſſimis aculeis armata. *Shaw. afr.* 229.
Habitat in Arabia.

TRIBULUS.

maximus. 1. TRIBULUS foliolis quadrijugis: exterioribus majoribus.
Tribulus foliolis trium parium pinnatis. *Hort. cliff.* 160.
Tri-

Tribulus terreſtris major, flore maximo odorato. *Sloan jam.* 90. *hiſt* 1. *p.* 209. *t.* 132. *f.* 1. *Raj. ſuppl.* 650.
Habitat in Jamaicæ *aridis.* ⊙

2. TRIBULUS foliolis quinquejugatis ſubæqualibus. *lanuginoſus.*
Tribulus foliolis quinque parium. *Fl. zeyl.* 168. *
Tribulus terreſtris zeylanicus, cauliculis villoſis, fructu acuminato. *Burm. zeyl.* 226. *t.* 106. *f.* 1.
Habitat in Zeylona.

3. TRIBULUS foliolis ſexjugatis ſubæqualibus. *Hort. cliff.* 160. *Hort. upſ.* 103. *Roy. lugdb.* 460. *Sauv. monſp.* 227. *terreſtris.*
Tribulus terreſtris, ciceris folio, fructu aculeato. *Bauh. pin.* 250.
Tribulus terreſtris. *Lob. ic.* 2. *p.* 84.
Tribulus terreſtris minor incanus hiſpanicus. *Barr. rar.* 54. *t.* 558.
Habitat in Europa *auſtrali ad ſemitas.* ⊙

4. TRIBULUS foliolis octojugatis ſubæqualibus. *Ciſtoides.*
Tribulus foliis octo parium pinnatis. *Roy. lugdb.* 460.
Tribulus terreſtris major curaſſavicus. *Herm. par.* 236. *t.* 236.
Tribulus terreſtris americanus, argemones flore flavo. *Pluk. alm.* 374. *t.* 64. *Raj. ſuppl.* 649.
Habitat in America *calidiore.*

MONOTROPA.

1. MONOTROPA floribus lateralibus octandris; terminali decandro. *Fl. ſuec.* 329. *Phil. bot.* §. 178. *Hypopithys.*
Orobanche quæ Hypopithys dici poteſt. *Bauh. pin.* 88. *prodr.* 31.
Orobanche Hypopithys lutea. *Mentz. pug.* 3. *f.* 5.
Orobanche flore breviore duplici, verbaſculi odore. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 504. *f.* 12. *t.* 16. *f.* 20.
Orobanche verbaſculi odore. *Plot. oxſ.* 146. *t.* 9. *f.* 6. *Pluk. alm.* 273. *t.* 200. *f.* 5.
Habitat in Sueciæ, Germaniæ, Angliæ, Canada *ſylvis. Paraſitica radicum.*

2. MONOTROPA caule unifloro decandro. *uniflora.*
Monotropa flore nutante. *Gron. virg.* 41.
Orobanche monanthos virginiana, flore majore pentapetalo. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 502. *f.* 12. *t.* 16. *f.* 5. *mal.*

 Oro-

Orobanche virginiana, flore pentapetalo cernuo. *Pluk. alm.* 273. *t.* 209. *f.* 2. *Catesb. car.* 1. *p.* 36. *t.* 36. *icon.*
Habitat in Marilandia, Virginia, Canada.

JUSSIÆA.

repens. 1. JUSSIÆA repens, floribus pentapetalis decandris, pedunculis folio longioribus. *Fl. zeyl.* 169.
Nir-Carambu. *Rheed. mal.* 2. *p.* 99. *t.* 51. *Raj. hiſt.* 1510.
Habitat in India.

peruviana. 2. JUSSIÆA erecta, floribus pentapetalis, pedunculis folioſis.
Onagra laurifolia, flore amplo pentapetalo. *Few. peruv.* 716. *t.* 11.
Habitat in Lima.

ſuffruticoſa. 3. JUSSIÆA erecta villoſa, floribus tetrapetalis octandris pedunculatis.
Ludwigia capſulis oblongis uncilialibus. *Roy. lugdb.* 252.
Lyſimachia indica non papposa, flore luteo minimo, ſiliquis caryophyllum aromaticum æmulantibus. *Herm. lugdb.* 396.
Carambu. *Rheed. mal.* 2. *p.* 55. *t.* 49. *Raj. hiſt.* 1510.
Habitat in India.

erecta. 4. JUSSIÆA erecta glabra, floribus tetrapetalis octandris ſeſſilibus. *Fl. zeyl.* 170. *Hort. upſ.* 103.
Ludwigia capſulis oblongis. *Hort. cliff.* 491.
Lycimachia viſcoſa glabra, parietariæ foliis, virginiana. *Pluk. alm.* 235. *t.* 203. *f.* 4.
Jaſminum catalonicum, flore luteo. *Seb. theſ.* 1. *p.* 42. *t.* 24. *f.* 3.
Habitat in America *&* *forte in* Virginia. ☉

SCHINUS.

Myricoides. 1. SCHINUS foliis ſimplicibus lanceolatis ſinuatis.
Habitat in Æthiopia. ♄
Frutex *panicula diffuſa, diſtinctiſſimus a Myrica, cui ſimillimus facie.*

Molle. 2. SCHINUS foliis pinnatis: foliolis ſerratis: impari longiſſimo, petiolo æquali.
Schinus foliis ſerratis impari longiſſimo. *Hort. cliff.* 483.
Lentiſcus peruviana. *Bauh. pin.* 399.

Len-

Lentiſcus africana. *Seb. theſ.* 2. *p.* 7. *t.* 5. *f.* 5.
Molle. *Cluſ. monard.* 322. *t.* 322.
Habitat in Peru. ♄

3. SCHINUS foliis pinnatis, petiolo æquali, foliolis integerrimis æqualibus. *Areira.*
Molle foliis non ſerratis. *Few. peruv.* 3. *p.* 43. *t.* 30
Arreira. *Piſ. braſ.* 132.
Habitat in Braſilia, Peru. ♄

4. SCHINUS foliis pinnatis: foliolis oblongis, petiolo marginato articulato inermi. *Mat. med.* 533. *Fagara.*
Lauro affinis, jaſmini folio alato, coſta media membranulis utrinque extantibus alata, ligno duritie ferro vix cedens. *Sloan. jam.* 137. *hiſt.* 2. *p.* 25. *t.* 162. *f.* 1. *Raj. dendr.* 86.
Habitat in Jamaicæ *campeſtribus.* ♄
Confer Seo ſ. Santio. *Kæmpf. amœn.* 892.

5. SCHINUS foliis pinnatis, petiolo marginato articulato ſubtus aculeato. *tragodes.*
Schinoides petiolis ſubtus aculeatis. *Hort. cliff.* 489. *
Rhoi obſoniorum ſimilis leptophyllos tragodes americana ſpinoſa, rachi medio appendicibus aucto. *Pluk. alm.* 319. *t.* 107. *f.* 4.?
Habitat in America. ♄

6. SCHINUS foliis pinnatis, petiolo marginato articulato, ſpinis axillaribus ſolitariis. *Fl. zeyl.* 175. * *Limonia.*
Malus Limonia indica, fructu puſillo. *Raj. hiſt.* 1658.
Tierou katou Naregam. *Rheed. mal.* 4. *p.* - - -*t.* 12.
Habitat in India *utraque.* ♄

BARTRAMIA.

1. BARTRAMIA. *Fl. zeyl.* 174. *indica.*
Triumfetta XIII. *Amm. herb.* 370.
Lappula benghalenſis tetraſpermos, ribeſii folio, echinis orbicularibus ad foliorum ortum plurimis ſimul ſeſſilibus. *Pluk. alm.* 206. *t.* 41. *f.* 5.
Agrimonia maderaspatana, folio rotundo ſingulari ſubtus incano. *Pet. gaz.* 31. *t.* 42. *f.* 10.
Habitat in India. ♄

MELASTOMA.

1. MELASTOMA foliis denticulatis ovatis acutis. *Acinodendron.*
Melaſtoma foliis ovato-lanceolatis crenatis nervis quin-

 que

que longitudinalibus: extimis obſoletioribus. *Hort. cliff.* 162.

Acinodendrum americanum pentaneuron, foliis craſſis hirſutis ad ambitum rarioribus ſerris. *Pluk. mant.* 4. *t.* 159. *f.* 1.

Groſſularia americana, plantaginis folio ampliſſimo. *Plum. ſpec.* 18.

Groſſulariæ fructu non ſpinoſa, malabathri foliis longa & rufa lanugine hirſutis, fructu maiore cæruleo. *Sloan. jam.* 165. *hiſt.* 2. *p.* 85. *t.* 197. *f.* 2.

Habitat in America *calidiore.* ♄

Groſſularioides. 2. MELASTOMA foliis denticulatis ovatis acuminatis: nervis interioribus ante baſin coadunatis.

Groſſularia alia plantaginis folio, fructu rariore violaceo. *Plum. hiſt. mſſ.*

Arbor americana, latiori & acuminato folio trinervio, utrinque glabro & margine leviter crenato. *Pluk. alm.* 40. *t.* 249. *f.* 4.

Habitat in Surinamo. *D. Bartſch.*

hirta. 3. MELASTOMA foliis denticulatis lanceolatis quinquenervibus, caule hiſpido.

Groſſularia plantaginis folio anguſtiore hirſuto. *Plum. ſpec.* 18.

Arbuſcula jamaicenſis quinquenervis, minutiſſime dentatis foliis & caule pubeſcentibus. *Pluk. alm.* 40. *t.* 264. *f.* 1.

Habitat in America *meridionali.* ♄

holoſericea. 4. MELASTOMA foliis integerrimis ovato-lanceolatis ſubtus ſericeis; nervis ante baſin coadunatis. *Hort. cliff.* 162.

Acinodendrum americanum, ampliore folio trinervi, inferius alba lanugine incano, maximo utrinque glabro. *Pluk. mant.* 4. *t.* 250. *f.* 2.

Arbor racemoſa braſiliana, folio malabathri. *Breyn. cent.* 3. *t.* 2. 4.

Muiva. *Marcgr. braſ.* 117.

Habitat in Braſilia, Jamaica, Surinamo. ♄

malabathrica. 5. MELASTOMA foliis lanceolato-ovatis quinquenervibus ſcabris. *Fl. zeyl.* 171. *

Melaſtoma quinquenervia hirta major, capitulis ſericeis villoſis. *Burm. zeyl.* 155. *t.* 73.

Kadali. *Rheed. mal.* 4. *p.* 87. *t.* 42.

Habitat in India. ♄

6. ME-

6. MELASTOMA foliis lanceolatis trinervibus ſcabris. *Fl. zeyl.* 172. *aſpera.*
Katou-Kadali. *Rheed.* mal. 4. *p.* 91, *t.* 43. *Raj. hiſt* 1493.
Habitat in India. ♄

7. MELASTOMA foliis ovatis trinervibus glabris margine hiſpidis. *Fl. zeyl.* 173. * *octandra.*
Habitat in India. ♄

KALMIA.

1. KALMIA foliis ovatis, corymbis terminalibus. *Gen. nov.* 1079. * *latifolia*
Andromeda foliis ovatis obtuſis, corollis corymboſis infundibuliformibus, genitalibus declinatis. *Gron. virg.* 160.
ChamæDaphne foliis tini, floribus bullatis. *Cateſb. car* 2. *p.* 98. *t.* 98.
Ciſtus ChamæRhododendros mariana laurifolia, floribus expanſis ſummo ramulo in umbellam plurimis. *Pluk. alm.* 49. *t.* 379 *f.* 6.
Habitat in Marilandia, Virginia, Penſylvania. ♄

2. KALMIA foliis lanceolatis, corymbis lateralibus. *Gen. nov.* 1079. * *anguſtifolia*
Azalea foliis lanceolatis integerrimis non nervoſis glabris, corymbis terminalibus. *Gron. virg.* 21.
ChamæDaphne ſempervirens, foliis oblongis anguſtis, foliorum faſciculis oppoſitis. *Cateſb. car.* 3. *p.* 17. *t.* 17. *f.* 1.
Ciſtus ſempervirens laurifolia, floribus eleganter bullatis. *Pluk. alm.* 106. *t.* 161. *f.* 3.
Anonyma. *Cold. noveb.* 100.
Habitat in Penſylvania, Nova Cæſarea, Noveboraco. ♄

LEDUM.

1. LEDUM. *Fl. lapp.* 160. *paluſtre*
Ledum foliis linearibus ſubtus hirſutis, floribus corymboſis. *Fl. ſuec.* 341. *Mat. med.* 210.
Ciſtus Ledon foliis roſmarini ferrugineis. *Bauh. pin.* 467.
Roſmarinum ſylveſtre. *Cam. epit.* 546.
Habitat in Europæ *ſeptentrionalis paludibus uliginoſis.* ♄

RHODODENDRON.

ferrugineum 1. RHODODENDRON foliis glabris ſubtus leproſis, corollis infundibuliformibus.

Azalæa maculis ferrugineis ſubtus adſperſa, floribus decandris. *Lemonier. Sauv. monſp.* 57.

Ledum foliis glabris, flore tubuloſo. *Hall. helv.* 417.

Ledum alpinum, foliis ferrea rubigine nigricantibus. *Bauh. pin.* 468. *Raj. hiſt.* 1005.

Evonymus theophraſti. *Dalech. hiſt.* 27.

Montana allobrogum lentiſcifolia. *Lob. ic.* 366.

Habitat in Alpibus Helveticis, Allobrogicis, Pyrenæis. ♄

dauricum. 2. RHODODENDRON foliis glabris utrinque nudis, corollis rotatis.

Chamærhododendros folio glabro majuſculo, amplo flore roſeo. *Amm. ruth.* 181. *t.* 21.

Habitat in Dauria.

hirſutum. 3. RHODODENDRON foliis ciliatis nudis, corollis infundibuliformibus.

Ledum foliis glabris ciliatis ovatis, flore tubuloſo. *Hall. helv.* 418.

Ledum alpinum hirſutum. *Bauh. pin.* 468. *Raj. hiſt.* 1005.

Ledum alpinum. *Cluſ. hiſt.* 1. *p.* 82.

Balſamum alpinum. *Lob. ic.* 468.

Habitat in Alpibus Helveticis, Auſtriacis, Styriacis, ♄

Chamæciſtus 4. RHODODENDRON foliis ciliatis, corollis rotatis

Ledum foliis ſerpylli ad margines cilii inſtar piloſis, flore purpureo. *Mich. gen.* 225. *t.* 106.

ChamæCiſtus hirſuta. *Bauh. pin.* 466.

ChamæCiſtus VIII. *Cluſ. hiſt.* 1. *p.* 76.

Ciſtus pumilus montis baldi. *Bauh. hiſt.* 2. *p.* 19. *Raj. hiſt.* 1005.

Ciſtus Chamærhododendros foliis confertis ferrea rubigine nitentibus margine piloſis. *Pluk. alm.* 106. *t.* 23. *f.* 4.

Habitat in Baldo *& prope Salisburgum.* ♄

maximum. 5. RHODODENDRON foliis nitidis ovalibus margine acuto reflexo.

Ledum laurocerafi folio. *Amœn. acad.* 2. *p.* 200.

Chamærhododendros, lauri folio, ſempervirens, floribus bullatis corymboſis. *Catesb. car.* 3. *p.* 17. *t.* 17. *f.* 2

Habitat in Virginia. *Collinſon* ♄

Rami

Rami & *Folia magnitudine & conſiſtentia Padi Lauroceraſi dicti, venis reticulatis inſcripta, margine reflexa.*

ANDROMEDA.

1\. ANDROMEDA pedunculis ſolitariis lateralibus, corollis campanulatis, foliis oppoſitis imbricatis obtuſis revolutis. *tetragona*

Andromeda foliis quadrifariam imbricatis obtuſis. *Fl. ſuec.* 338.

Andromeda, foliis quadrifariam imbricatis obtuſis, ovalis floreus. *Fl. lapp.* 166. *t.* 1. *f.* 4. *Hort. cliff.* 163.

Habitat in Alpibus Lapponicis. ♃

2\. ANDROMEDA pedunculis ſolitariis terminalibus, corollis campanulatis, foliis confertis ſubulatis. *hypnoides*

Andromeda foliis aciformibus confertis. *Fl. lapp.* 165. *t.* 1. *f.* 3. *Fl. ſuec.* 337.

Habitat in Alpibus Lapponicis. ♃

3\. ANDROMEDA pedunculis aggregatis, corollis ovatis, foliis ſparſis linearibus obtuſis planis. *cærulea.*

Andromeda foliis linearibus obtuſis ſparſis. *Fl. lapp.* 165. *t.* 1. *f.* 5. *Fl. ſuec.* 336. *Hort. cliff.* 163.

Erica folio abietis, flore arbuti. *Buxb. cent.* 4. *p.* 26. *t.* 53.

Habitat in Lapponiæ *Alpibus.* ♄

4\. ANDROMEDA pedunculis aggregatis, corollis cylindricis, foliis alternis ovatis integerrimis. *mariana.*

Andromeda foliis ovatis, pedunculis faſciculatis, capſulis pentagonis apice dehiſcentibus. *Gron. virg.* 49.

Arbuſcula mariana, brevioribus evonymi foliis pallide virentibus, floribus arbuteis ex eodem nodo plurimis, ſpicatim uno verſu erumpentibus. *Pluk. mant.* 25. *t.* 448.

Habitat in Virginia. ♄

5\. ANDROMEDA pedunculis aggregatis, corollis ovatis, foliis alternis lanceolatis revolutis. *Polifolia.*

Andromeda foliis alternis lanceolatis margine reflexis. *Fl. lapp.* 163. *t.* 1. *f.* 3. *Fl. ſuec.* 335. *Hort. cliff.* 163. *Roy. lugdb.* 440. *Hall. helv.* 416.

Polifolia. *Buxb. act.* 2. *p.* 345. *cent.* 5. *p.* 28. *t.* 49. *f.* 1.

Erica humilis, roſmarini foliis, unedonis flore, capſula ciſtoide. *Pluk. alm.* 136. *t.* 175. *f.* 3.

Habitat in Europæ *frigidioris paludibus turfoſis.* ♄

paniculata. 6. ANDROMEDA racemis ſecundis nudis paniculatis, corollis ſubcylindricis, foliis alternis oblongis crenulatis.

Andromeda foliis ovatis acutis crenulatis planis alternis, floribus racemoſis. *Hort. cliff.* 162. *Gron. virg.* 45.

Frutex foliis ſerratis, floribus longioribus ſpicatis ſubviridibus, ſpica pentagona. *Catesb. car.* 2. *p.* 43. *t.* 43.

Vitis idæa americana, longiori mucronato & crenato folio, floribus urceolatis racemoſis. *Pluk. alm.* 391.

Habitat in Virginia.

racemoſa. 7. ANDROMEDA racemis ſecundis bracteatis, corollis gibbo-cylindricis, foliis alternis oblongis ſerratis.

Habitat in Penſylvania. *Kalm.*

Hæc differt a priori 1. *Racemis minus paniculatis.* 2. *Bractea ſub ſingulo flore lineari-lanceolata, ſtricta, flore longiore, viridi, decidua; in præcedenti nulla bractea.* 3. *Capſulis retinentibus ſtylum, quem antecedens dimittit.* 4. *Foliis magis ſerratis.*

arborea. 8. ANDROMEDA racemis ſecundis nudis, corollis rotundo-ovatis.

Andromeda arborea, foliis oblongo-ovatis integerrimis, floribus paniculatis nutantibus, racemis ſimpliciſſimis. *Gron. virg.* 48.

Frutex foliis oblongis acuminatis, floribus ſpicatis uno verſu diſpoſitis. *Catesb. car.* 1. *p.* 71. *t.* 71.

Habitat in Virginia, Carolina. ♄

calyculata. 9. ANDROMEDA racemis ſecundis foliaceis, corollis ſubcylindricis, floribus alternis lanceolatis obtuſis punctatis.

Ciſtus Ledon ſ. Andromeda, floribus monopetalis parvis albis tubuloſis ſpicatim in ſummis ramulis diſpoſitis, foliis & facie vitis idææ, capſula minima ſicca quinquepartita. *Gron. virg.* 21. ?

ChamæDaphne. *Buxb. act.* 1. *p.* 241. *t.* 8. *f.* 1.

Habitat in Virginia, Canada, Sibiria ♄

Frutex *foliis ovali-lanceolatis, coriaceis, myricæ conſiſtentia, obtuſis, margine recurvis, adſperſis punctis vix conſpicuis, calloſis, ab utraque parte.* Racemi e *ramis propriis, foliolis ovalibus alternis, in quorum ala Flos ſolitarius, pedicellatus.* Calyx *a baſi tegitur duobus foliolis ovatis.* Flores *ad unum latus nutant.* Stamina 10, *antheris oblongis.*

EPI-

EPIGÆA.

1. EPIGÆA. *Gen. nov.* 1087. *repens.*
Memecylum. *Mich. gen.* 13.
Arbutus foliis ovatis integris, petiolis laxis longitudine foliorum. *Gron. virg.* 49.
Pyrolæ affinis repens fruticoſa, foliis rigidis ſcabritie exaſperatis, flore pentapetaloide fiſtuloſo. *Pluk. alm.* 309. *t.* 107. *f.* 1.
Habitat in Virginiæ, Canadæ *pinetis.* ♄

GAULTHERIA.

1. GAULTHERIA. *Kalm. Gen. nov.* 1080. *f.* 6. *procumbens.*
Anonyma pedunculis arcuatis. *Cold. noveb.* 98.
Habitat in Canadæ *ſterilibus arenoſis.* ♄

ARBUTUS.

1. ARBUTUS caule erecto, foliis glabris ſerratis, baccis polyſpermis. *Hort. cliff.* 163. *Roy. lugdb.* 440. *Sauv. monſp.* 59. *Unedo.*
Arbutus folio ſerrato. *Bauh. pin.* 460.
Arbutus. *Cam. epit.* 168.
Habitat in Europa *auſtrali.* ♄
Baccæ *polyſpermæ tuberculis ſeminum exaſperatæ.*

2. ARBUTUS caulibus procumbentibus, foliis ovatis ſubſerratis, floribus ſparſis, baccis polyſpermis. *acadienſis.*
Vitis idæa acadienſis, foliis alaterni. *Tournef. inſt.*
Habitat in Acadia. ♄

3. ARBUTUS caulis procumbentibus, foliis rugoſis ſerratis. *Fl. lapp.* 161. *Fl. ſuec.* 340. *Hort. cliff.* 163. *Roy. lugdb.* 440. *Hall. helv.* 415. *alpina.*
Vitis idæa foliis oblongis albicantibus. *Bauh. pin.* 470.
Vitis idæa. *Cluſ. hiſt.* 1. 61.
Habitat in Alpibus Lapponiæ, Helvetiæ, Sibiriæ ♄

4. ARBUTUS caulibus procumbentibus, foliis integerrimis. *Fl. lapp.* 162. *t.* 6. *f.* 3. *Fl. ſuec.* 339. *Mat. med.* 211. *Hort. cliff.* 163. *Roy. lugdb.* 440. *Hall. helv.* 415. *Uva urſi.*
Uva urſi. *Cluſ. hiſt.* 1. *p.* 63.
Radix idæa putata & Uva urſi. *Bauh. hiſt.* 1. *p.* 524.
Arbutus noveboracenſibus Bearberry. *Cold. nov.* 104.
Habitat in Europa *frigida*, Canada. ♄

CLE-

CLETHRA.

alnifolia. 1. CLETHRA. *Gron. virg.* 47.
Alnifolia americana ſerrata, floribus pentapetalis albis in ſpicam diſpoſitis. *Pluk. alm.* 18. *t.* 115. *f.* 1. *Cateſb. car.* 1. *p.* 66. *t.* 66.
Habitat in Carolina, Virginia, Penſylvania. ♄

PYROLA.

rotundifolia. 1. PYROLA ſtaminibus adſcendentibus, piſtillo declinato. *Fl. ſuec.* 330. *Mat. med.* 212. *Amœn. acad.* 1. *p.* 156.
Pyrola ſtaminibus & piſtillis declinatis. *Fl. lapp.* 169.
Pyrola foliis integerrimis. *Vir. cliff.* 37. *Roy. lugdb.* 440.
Pyrola foliis ſubrotundis, ſcapo racemoſo. *Hort. cliff.* 162.
Pyrola rotundifolia major. *Bauh. pin.* 191.
Pyrola noveboracenſis. *Cold. noveb.* 99.
Habitat in Europa *ſeptentrionaliore*, Virginia, Braſilia. ♃

minor. 2. PYROLA floribus racemoſis diſperſis, ſtaminibus piſtillisque rectis. *It. gotl.* 206. *Fl. ſuec.* 331.
Pyrola foliis ſubrotundis, ſcapo undique racemoſo, genitalibus rectis. *Act. ſtockh.* 1741. *p.* 192.
Pyrola foliis obiter ſerratis ſubrotundis racemoſis, floribus tuba recta. *Hall. helv.* 420.
Pyrola minor. *Riv. pent.* 149. *Raj. angl.* 3. *p.* 363.
Habitat in Europa *frigidiore.* ♃

ſecunda. 3. PYROLA racemo unilaterali. *Fl. ſuec.* 332.
Pyrola floribus uno verſu ſparſis. *Fl. lapp.* 168.
Pyrola folio mucronato ſerrato. *Bauh. pin.* 191.
Pyrola 2 tenerior. *Cluſ. pan.* 506.
Habitat in Europæ *borealis ſylvis.* ♄

umbellata. 4. PYROLA pedunculis ſubumbellatis. *Fl. ſuec.* 333.
Pyrola fruteſcens, arbuti flore. *Bauh. pin.* 191.
Pyrola 3 fruticans. *Cluſ. pan.* 507.
Habitat in Euroqæ, Aſiæ & Americæ *ſeptentrionalis ſylvis.* ♄

maculata. 5. PYROLA pedunculis bifloris.
Pyrola petiolis apice bifloris vel trifloris. *Gron. virg.* 48.
Pyrola marilandica minor, folio mucronato arbuti. *Pet. muſ.* 675.

Pyro-

Pyrola mariana, arbuti foliis anguſtioribus, trifoliata ad medium nervium linea alba utrinque per longitudinem diſcurrente. *Pluk. mant.* 157. *t.* 349. *f.* 4.
Habitat in Americæ *ſeptentrionalis ſylvis.* ♄

6. PYROLA ſcapo unifloro. *Fl. lapp.* 167. *Fl. ſuec.* 334. *Hall. helv.* 420. *uniflora.*
Pyrola rotundifolia minor. *Bauh. pin.* 191.
Singulari flore ampliore. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 505. *ſ.* 12. *t.* 10. *f.* 2.
Habitat in Europæ *borealis ſylvis.* ♃.

DIGYNIA.

ROYENA.

1. ROYENA foliis ovatis ſcabriuſculis. *Hort. cliff.* 149. *Roy. lugdb.* 411. *lucida.*
Staphylodendron africanum ſempervirens, foliis ſplendentibus. 1. *p.* 187. *t.* 96.
Staphylodendrum africanum, folio ſingulari lucido. *Herm. parad.* 232. *t.* 232.
Piſtacia africana. *Pluk. alm.* 298. *t.* 63. *f.* 4. *t.* 317. *f.* 5.
Habitat ad Cap. b. Spei. ♄

2. ROYENA foliis lanceolatis glabris. *Roy. prodr.* 441. *glabra.*
Royena foliis lanceolatis. *Hort. cliff.* 149.
Vitis idæa æthiopica, buxi minoris folio, floribus albis. *Comm. hort.* 1. *p.* 125. *t.* 65.
Vitis idæa æthiopica, myrti foliis, floſculis dependentibus. *Pluk. alm.* 391. *t.* 321. *f.* 4.
Habitat ad Cap. b. Spei. ♄

3. ROYENA foliis lanceolatis hirſutis. *Roy. lugdb.* 441. *hirſuta.*
butus foliis lanceolatis integerrimis hirſutis. *Hort. cliff.* 163.
ylodendrum africanum, folio lanuginoſo roſmari- latiore. *Boerh. lugdb.* 2. *p.* 235.
Habitat ad Cap. b. Spei. ♄

HYDRANGEA.

1. HYDRANGEA. *Gron. virg.* 50. † *arboreſcens.*
Habitat in Virginia. ♄
Frutex *ex ordine Arbuſtivarum XIX, foliis oppoſitis, floribus in cymam digeſtis.*

CHRY-

CHRYSOSPLENIUM.

alternifolium. 1. CHRYSOSPLENIUM foliis alternis. *Fl. ſuec.* 317. *It. ſcan.* 16.

Chryſoſplenium. *Hort. cliff.* 149. *Roy. lugdb.* 209.

Chryſoſplenium foliis amplioribus auriculatis. *Rudb. lapp.* 97. *Fl. lapp.* 151.

Chryſoſplenium foliis pediculis oblongis inſidentibus. *Tournef. inſt.* 146.

Saxifraga aurea, foliis pediculis oblongis inſidentibus. *Raj. hiſt.* 206.

Sedum paluſtre luteum majus, foliis pediculis longis inſidentibus. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 477. *ſ.* 12. *t.* 8. *f.* 8.

Habitat in Sueciæ, Germanniæ, Angliæ *opacis humentibus.* ♃

Flos primarius Decandrus, reliqui Octandri. Phil Bot. 178.

oppoſitifolium. 2. CHRYSOPLENIUM foliis oppoſitis. *Sauv. monſp.* 128.

Chryſoſplenium foliis amplioribus auriculatis. *Tournef. inſt.* 146.

Chryſoſplenium I, Saxifraga aurea. *Tabern. hiſt.* 1224.

Saxifraga aurea. *Dod. pempt.* 316. *Lob. hiſt.* 336. *ic.* 312.

Saxifraga rotundifolia aurea. *Bauh. pin.* 309.

Saxifraga romanorum. *Dalech. hiſt.* 1114.

Sedum paluſtre luteum, foliis ſubrotundis ſeſſilibus. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 477. *ſ.* 12. *t.* 8. *f.* 7.

Alchimilla rotundifolia aurea hirſuta. *Herm. lugdb.* 14.

Habitat in Belgio, Anglia, Canada *locis umbroſis humentibus.*

SAXIFRAGA.

* Foliis *indiviſis*, *Caule ſubnudo.*

Cotyledon. 1. SAXIFRAGA foliis radicatis aggregatis lingulatis cartilagineo-ſerratis, caule paniculato.

Saxifraga foliis ligulatis radicalibus margine cartilagineo acute ſerratis, floribus paniculatis. *Fl. ſuec.* 355.

Saxifraga foliorum marginibus cartilagine crenatis. *Hort. cliff.* 168. *Roy. lugdb.* 453.

Saxifraga foliis radicalibus in orbem poſitis: ſerraturis cartilagineis. *Fl. lapp.* 177. *t.* 2. *f.* 2.

Sanicula montana crenata, folio longiore, pediculo folioſo. *Pluk. alm.* 331. *t.* 222. *f.* 1.

Sedum ſerratum album bicorne, marginibus argenteis. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 478. *ſ.* 12. *t.* 9. *f.* 19. 20.

Co-

Cotyledon media, foliis oblongis ſerratis. *Bauh. pin.* 285.

β. Cotyledon minor, foliis ſubrotundis ſerratis. *Bauh. pin.* 285. *prodr.* 133.

γ. Saxifraga, ſedi folio, flore albo, multiflora. *Tournef. inſt.* 252.
Sedum ſerratum, flore albo, multiflorum. *Dod. pempt.* 113.

δ. Saxifraga, ſedi folio, pyrenaica ſerrata. *Tournef. inſt.* 252.

ε. Cotyledon pyramidale, lato crenato & retuſo folio, polyanthos. *Bocc. muſ.* 2. *p.* 109. *t.* 86.
Saxifraga ſedi folio anguſtiore ſerrato. *Segu. ver.* 448. *t.* 9. *f.* 1.
Habitat in Alpibus Europæ. ♃

2. SAXIFRAGA foliis lanceolatis denticulatis, caule nudo paniculato, floribus ſubcapitatis. *penſylvanica*
Saxifraga foliis radicalibus lanceolatis denticulatis, caule ſubnudo piloſo ramoſo, floribus confertis capitatis. *Gron. virg.* 49.
Saxifraga noveboracenſis. *Cold. noveb.* 105.
Saxifraga penſylvanica, floribus muſcoſis racemoſis. *Dill. elth.* 337. *t.* 253. *f.* 328.
Sanicula virginiana alba, folio oblongo mucronato. *Pluk. alm.* 331. *t.* 59. *f.* 1. & *t.* 222. *f.* 5.
Habitat in Virginia, Penſylvania, Canada.

3. SAXIFRAGA foliis lanceolatis obtuſis piloſis, caule nudo bifloro. *androſacea.*
Saxifraga caule paucifloro, foliis ſubhirſutis lingulatis & tridentatis. *Hall. helv.* 405.
Sedum alpinum tertium. *Col. ecphr.* 2. *p.* 66. *t.* 67. *f. ult.*
Saxifraga alpina, habitu androſaces, villoſa. *Hall. nurib.* 1736. *t.* 1. *f.* 3.
Habitat in Sibiria, Helvetia.

4. SAXIFRAGA foliis linearibus ſubtus punctatis aggregatis recurvatis, caule nudo multifloro. *cæſia.*
Saxifraga roſulis denſiſſimis, foliis craſſis glaucis repandis ſubtus ſulcatis. *Hall. helv.* 402.
Saxifraga alpina minima, foliis cæſiis deorſum incurvis. *Tournef. inſt.* 253. *Segu. veron.* 449. *t.* 9. *f.* 2.
Sedum alpinum album, foliis compactis. *Bauh. pin.* 284. *Moriſ. hiſt.* 3. *ſ.* 12. *t.* 7. *f.* 32.
Sedum alpinum minimum, foliis cinereis, flore candido. *Scheuch. alp.* 341. 141. *t.* 21. *f.* 1.
Habitat in Alpibus Helveticis, Auſtriacis, Pyrenaicis, Baldo.

Fo-

Folia *duplici ordine punctorum callosorum notata evadunt albida.*

burſeriana. 5. SAXIFRAGA foliis aggregatis imbricatis ſubulatis lævibus, caule ſubnudo unifloro.

Sedum alpinum, ſaxifragæ albæ flore. *Bauh. pin.* 284. *Burſ. XVI:* 6.

Habitat in Tauro, Raſtadienſi, ♃

Facies *Sedi minoris.* Folia *juniperina, denſe imbricata, acuta, carinata, glabra.* Caulis *vix digitalis, rufeſcente hiſpidus ſ. glutinoſus, foliolis* 3. *ſ.* 4. *alternis, linearibus.* Flos *magnitudine Saxifragæ granulatæ: venis incarnatis.*

bryoides. 6. SAXIFRAGA foliis ciliatis reflexis, caule nudiuſculo unifloro.

Saxifraga foliis denſiſſimis, foliolis ciliatis, caule unifloro. *Hall. helv.* 403.

Saxifraga pyrenaica minima lutea muſco ſimilis. *Tournef. inſt.* 253.

Sedum muſcoſum. *Bauh. hiſt.* 3. *p.* 695. *Scheuch. alp.* 142. *t.* 21. *f.* 2.

Sedum ejusdem alpinum quartum. *Col. ecphr.* 2. *p.* 66. *t.* 67. *f.* 1. 2.

Habitat in Alpibus Helveticis, Pyrenaicis.

bronchialis. 7. SAXIFRAGA foliis imbribatis ſubulatis ciliatis ſpinoſis, caule ſubnudo multifloro.

Habitat in Sibiria.

Stolones *oblongi, confertim imbricati; Foliis planis, ſubulatis, mucronato-ſpinoſis, ſpinoſo-ciliatis.* Caulis *altus nudiuſculus, foliis aliquot minimis mucronatis margine lævibus.* Panicula *parva.*

ſtellaris. 8. SAXIFRAGA foliis ſerratis, caule nudo ramoſo petalis acuminatis.

Saxifraga foliis lanceolatis dentato-ſerratis, caule nudo ſimplici. *Fl. ſuec.* 355.

Saxifraga caule nudo ſimplici, foliis lanceolatis dentatis, petalis acutis. *Fl. lapp.* 175.

Sanicula myoſotis, floribus albicantibus fere umbellatis. *Pluk. alm.* 331. *t.* 58. *f.* 2. & *t.* 222. *f.* 4.

Sedum montanum hirſutum, mucronato & dentato folio, flore albo guttato *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 478. *ſ.* 12 *t.* 9. *f.* 13.

Habitat in Alpibus Spitsbergenſibus, Lapponicis, Helveticis, Styriacis, Weſtmorlandicis.

9. SA-

9. **SAXIFRAGA** foliis ovalibus retuſis obſolete ſerratis petiolatis, caule nudo, panicula conglomerata. *craſſifolia.*
Saxifraga foliis ovalibus crenulatis, caulibus nudis. *Gmel.*
Habitat in Alpibus Sibiriæ. ♃
Radix *craſſitie fere digiti.* Folia *ſæpe palmaria, coriacea, ovalia, retuſa, repando-crenata, glabra, petiolis longitudine fere foliorum.* Panicula *arcta, congeſta, in caule omnino nudo.* Flores *purpuraſcentes.* Facies *ſequentis, ſed majora omnia & reliqua.*

10. SAXIFRAGA foliis obovatis crenatis ſubſeſſilibus, caule nudo, floribus congeſtis. *nivalis.*
Saxifraga foliis ſubovatis crenatis, caule nudo, floribus capitatis. *Fl. ſuec.* 354.
Saxifraga caule nudo ſimplici, foliis elliptico-ſubrotundis crenatis, floribus capitatis. *Fl. lapp.* 176, *t.* 2. *f.* 5. 6.
Saxifraga foliis cordato-ovalibus crenatis, corolla alba, caule hirſuto aphyllo. *Gron. virg.* 160.
Saxifraga foliis oblongo-rotundis dentatis, floribus compactis. *Raj. angl.* 3. *p.* 354. *t.* 16. *f.* 1.
Sempervivum minus dentatum. *Mart. ſpitzb.* 43. *t. F. f. A.*
Habitat in ſummis Alpibus Spitzbergenſibus, Lapponicis, Arvonicis, Virginia, Canada. ♃

11. SAXIFRAGA foliis cordato-ovalibus retuſis cartilagineo-crenatis, caule nudo paniculato. *Hort. cliff.* 167. * *Geum.*
Geum foliis petiolatis retuſis, ora cartilaginea, ſerrata, caule ramoſo. *Hall. helv.* 400.
Sanicula montana rotundifolia minor. *Bauh. pin.* 243.
Habitat in Alpibus Helveticis, Pyrenaicis. ♃

12. SAXIFRAGA foliis reniformibus dentatis, caule nudo paniculato. *rotundifolia.*
Geum folio circinato acute crenato, piſtillo floris rubro. *Magn. hort.* 87. *t.* 87.
Habitat in Alpibus Pyrenæis, Sibiricis. ♃
Facies *Saxifragæ rotundifoliæ, ſed caulis nudus.*

13. SAXIFRAGA foliis obovatis dentatis petiolatis, caule nudo paniculato. *punctata.*
Geum bicorne ſerratum, pallidiore folio rotundiore, floribus punctatis. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 478. *ſ.* 12. *t.* 9. *f.* 17.
Habitat in Sibiria, ♃

* Foliis *indiviſis*, Caule *folioſo*.

oppoſitifolia. 14. SAXIFRAGA foliis caulinis ovatis oppoſitis imbricatis: ſummis ciliatis. *Fl. ſuec.* 359.

Saxifraga foliis ovatis quadrangulo imbricatis, ramis procumbentibus. *Fl. lapp.* 179. *t.* 2. *f.* 1. *Hall. helv.* 403.

Sedum alpinum ericoides purpuraſcens. *Bauh. pin* 284. *prodr.* 132. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 480. *ſ.* 12. *t.* 10. *f.* 36.

Habitat in rupibus Alpium Spitzbergenſium, Lapponicarum, Pyrenaicarum, Helveticarum. ♃

Caules *filiformes*, *dependentes*, *repentes*. Folia *ovata*, *quadrifariam imbricata*, *oppoſita*, *ſeſſilia*, *ciliata*. Flos *terminalis*, *ſolitarius*, *ſeſſilis*.

aſpera. 15. SAXIFRAGA foliis caulinis lanceolatis alternis ſpinoſo-ciliatis, caule inferne procumbente.

Saxifraga foliis ſimplicibus ciliatis, caule folioſo ramoſo. *Hall. helv.* 403.

Sedum alpinum, foliis crenatis aſperis. *Bauh. pin.* 284. *prodr.* 132.

Sedum alpinum hiſpidum fere ſpinoſum, flore pallido. *Bauh. hiſt.* 3. *p.* 695. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 479. *ſ.* 12. *t.* 10. *f.* 25.

Sedum minimum alpinum villoſum alterum. *Park. theatr.* 738.

Habitat in Alpibus Helveticis.

autumnalis. 16. SAXIFRAGA foliis caulinis linearibus alternis ciliatis radicalibus aggregatis.

Saxifraga ciliorum margine ciliari, floribus luteis maculoſis. *Hall. helv.* 399.

Saxifraga anguſtifolia autumnalis, flore luteo guttato, foliis florum magis acuminatis. *Breyn. cent.* 106. *t.* 48.

Sedum anguſtifolium autumnale, flore luteo guttato. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 477. *ſ.* 12. *t.* 8. *f.* 6.

Habitat in humentibus Boruſſiæ, Angliæ. Helvetiæ.

Calyx corolla longe brevior & viridis eſt.

Hirculus. 17. SAXIFRAXA foliis caulinis lanceolatis alternis nudis inermibus, caule erecto.

Saxifraga petalis latiſſimis luteis lineatis. *Hall. helv.* 399. *t.* 8.

Geum paluſtre luteum bicorne, nardi celticæ ſimilis. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 477.

ChamæCiſtus friſicus, foliis nardi celticæ. *Bauh. pin.* 466.

Hir-

Hirculus qui ChamæCiſti genus. *Cluſ. cur.* 5.
Habitat in Suecia, Helvetia, Lapponia, Sibiria.
Petala *ad baſin Lacuna nectarifera ex rima bivalvi apicibus acutis inſtructa.*

18. SAXIFRAGA foliis caulinis lineari-ſubulatis ſparſis nudis inermibus, caulibus decumbentibus. *aizoides.*
Saxifraga foliis linearibus ſparſis glabris. *Fl. ſuec.* 357.
Saxifraga foliis ſubulatis ſparſis *Fl. lapp.* 178.
Sedum alpinum, flore pallido. *Bauh. pin.* 284. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 477. *ſ.* 12. *t.* 6. *f.* 2.
Sedum minus VI. *Cluſ. hiſt.* 2. *p.* 60.
Habitat in Alpibus Lapponicis, Styriacis, Weſtmorlandicis, Baldo.

19. SAXIFRAGA foliis caulinis reniformibus dentatis petiolatis. *rotundifolia.*
Saxifraga foliis reniformibus acute crenatis, caule ramoſo folioſo. *Hort. cliff.* 167. *Roy. lugdb.* 453. *Hall. helv.* 400.
Sanicula montana rotundifolia major. *Bauh. pin.* 243.
Sanicula alpina. *Cam. epit.* 764.
Habitat in Alpibus Helveticis, Auſtriacis. ♃

* Foliis *lobatis*, Caule *erecto.*

20. SAXIFRAGA foliis caulinis reniformibus lobatis, caule ramoſo, radice granulata. *Hort. cliff.* 167. *Fl. ſuec.* 350. *Mat. med.* 215. *Roy. lugdb.* 453. *Hall. helv.* 401. *granulata.*
Saxifraga rotundifolia alba. *Bauh. pin.* 309.
Saxifraga alba. *Dod, pempt.* 316.
Saxifraga IV. *Cam. epit.* 719.
Habitat in Europæ *apricis.* ♃

21. SAXIFRAGA foliis caulinis palmato-lobatis; caulinis ſeſſilibus, caule ramoſo bulbifero. *bulbifera.*
Saxifraga bulboſa altera bulbifera montana. *Col. ecphr.* 1. *p.* 318. *t.* 317.
Saxifraga ad folia bulbos gerens. *Bauh. pin.* 309.
Sedum bicorne rotundifolium erectum, radice granulata, & ad caulem tubercula proferens. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 474. *ſ.* 12. *t.* 9. *f.* 24.
Habitat in Italia, *pratis ſaxoſis umbroſis.* ♃

22. SAXIFRAGA foliis caulinis palmatis petiolatis, caule ſimpliciſſimo unifloro bulbifero. *cernua.*

 Saxi-

Saxifraga foliis palmatis, caule ſimplici unifloro. *Fl. lapp.* 172. *t.* 2. *f.* 4. *Hort. cliff.* 167. *Fl. ſuec.* 351.
Habitat in Alpibus Lapponicis *frequens.* ♃
Flos *parum nutat.* Folia *caulina glabra, magis palmata & germen ſupra receptaculum magis quam in antecedente, ut diſtinctiſſima a priore planta. Videtur tamen aſſinis ſequentis, licet & ab hac diſtincta.*

rivularis. 23. SAXIFRAGA foliis caulinis palmatis: ſummo florali ovato, caule ſimplici ſubbifloro.
Saxifraga foliis radicalibus quinquelobis, florali ovato, *Fl. lapp.* 174. *t.* 2. *f.* 7. *Fl. ſuec.* 352.
Habitat ad Alpium Lapponicarum *latera & rivulos.*

grœnlandica. 24. SAXIFRAGA foliis caulinis palmato-multifidis ſparſis: laciniis acutis, caule erecto.
Saxifraga tridactylites grœnlandica, caulibus valde folioſis. *Dill. elth.* 337. *t.* 353. *f.* 329.
Habitat in Grœnlandia, *forte etiam in* Pyrenæis & Helveticis *Alpibus.*

tridactylites. 25. SAXIFRAGA foliis caulinis cuneiformibus trifidis alternis, caule erecto ramoſo. *Fl. ſuec.* 353.
Saxifraga foliis trifidis baſi anguſtis, caule erecto. *Roy. lugdb.* 457. *Sauv. monſp.* 208.
Saxifraga foliis omnibus trilobis baſi anguſtis, caule erecto. *Fl. lapp.* 173. *Hort. cliff.* 168.
tectorum. Sedum tridactylites tectorum. *Bauh. pin.* 285.
Paronychia altera. *Dod. pempt.* 113.
alpina. β. Saxifraga alba petræa. *Pon. bald.* 339. *f.* 337. *
Saxifraga aizoides alpina, trifido folio, major alba. *Pluk. alm.* 331. *t.* 222. *f.* 3.
Sedum tridactylites alpinum majus album. *Bauh. pin.* 284. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 479. *ſ.* 12. *t.* 9. *f.* 28.
Habitat α in Europæ *arenoſis,* β *in Alpibus* Lapponicis, Pyrenæis. ⊙

ſedoides. 26. SAXIFRAGA foliis caulinis aggregatis alternis oppoſitisque ſublanceolatis, flore pedunculato.
Saxifraga alpina minima, foliis ligulatis in orbem circumactis, flore ochroleuco. *Segu. ver.* 450. *t.* 9. *f.* 3.
Habitat in Alpibus Tridentinis, Sibiricis.

ceſpitoſa. 27. SAXIFRAGA foliis radicatis aggregatis linearibus integris trifidisque, caule erecto ſubnudo ſubbifloro.
Saxifraga foliis ſimplicibus & trifidis, caule pæne aphyllo paucifloro. *Hall. helv.* 405.

Saxi-

Saxifraga foliis partim integris partim trifidis. *Segu. ver.* 451. *t.* 9. *f.* 4.
Sedum tridactylites alpinum minus. *Bauh. pin.* 284. *prodr.* 131.
Habitat in Alpibus Lapponicis, Helveticis, Tridentinis, Monſpelii. ♃

* Foliis *lobatis* Caulibus *procumbentibus*

28. SAXIFRAGA foliis caulinis cordatis trilobis integriſque, caulibus procumbentibus. *cymbalaria.*
Saxifraga exigua, foliis cymbalariæ. *Buxb. cent.* 2. *p.* 40. *t.* 45. *f.* 2.
Habitat in Oriente.

29. SAXIFRAGA foliis caulinis ovatis lobatis, caule filiformi flaccido. *hederacea*
Saxifraga cretica annua minima, hederaceo folio. *Tournef. cor.* 18.
Habitat in Creta.

30. SAXIFRAGA foliis caulinis linearibus integris trifidiſve, ſtolonibus procumbentibus, caule erecto nudiuſculo. *hypnoides.*
Saxifraga procumbens, foliis linearibus integris trifidiſque. *Hort. cliff.* 168. *Roy. lugdb.* 453. *Sauv. monſp.* 208. *Gort. gelr.* 248.
Saxifraga foliis omnibus anguſtis petiolatis apice tridentatis, caule folioſo ramoſo viſcido. *Hall. helv.* 404.
Sedum alpinum, trifido folio. *Bauh. pin.* 284. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 479. *ſ.* 12. *t.* 9. *f.* 26.
β. Saxifraga procumbens, foliis linearibus integris trifidis & quinquefidis. *Roy. lugdb.* 454. *Sauv. monſp.* 208.
Habitat in Alpibus Helveticis, Auſtriacis, Pyrenaicis, Weſtmorlandicis. ♃

31. SAXIFRAGA foliis caulinis cuneiformibus apice dentatis, caule adſcendente ſubvilloſo.. *adſcendens.*
Sedum tridactylites alpinum, caule folioſo. *Bauh. pin.* 284.
Sedum tridactylites alpinum majus. 3. *Bauh. prodr.* 131. *Burſ. XVI.* 89.
Habitat in Pyrenæis, Baldo, Tauro Raſtadienſi. ♃

TIARELLA.

1. TIARELLA foliis cordatis. *Gen. nov.* 188. *cordifolia.*
Mitella ſcapo nudo. *Hort. cliff.* 167. * *Roy. lugdb.* 459. *Gron. virg.* 160. Cor-

Cortuſa americana, florè ſpicato, petalis integris. *Herm. par.* 129. *t.* 129.
Habitat in America & Aſia *ſeptentrionali.* ♃

trifoliata. 2. TIARELLA foliis ternatis. *Gen. nov.* 188.
Mitella foliis ternatis. *Amœn. acad.* 2. *p.* 351.
Habitat in Aſia *boreali. G. Demidoff.* ♃

MITELLA.

diphylla. 1. MITELLA ſcapo diphyllo. *Gen. nov.* 29. *Hort. cliff.* 167. * *Roy. lugdb.* 459. *Cold. noveb.* 96.
Cortuſa americana altera, floribus minutim fimbriatis. *Mentz. pug. t.* 10.
Cortuſa americana, ſpicato flore, petalis fimbriatis. *Herm. par.* 130.
Habitat in America *ſeptentrionali.*

nuda. 2. MITELLA ſcapo nudo. *Amœn. acad.* 2. *p.* 352.
Habitat in Aſia *boreali.* ♃

SCHLERANTHUS.

annuus. 1. SCLERANTHUS calycibus fructus patulis. *Fl. ſuec.* 348.
Scleranthus. *Hort. cliff.* 166. *Roy. lugdb.* 215.
Polygonum, gramineo folio, majus erectum. *Bauh. pin.* 281
Polygonum montanum, vermiculatæ foliis. *Bauh. pin.* 281.
Vermiculata nova planta. *Col. ecphr.* 1. *p.* 295. *t.* 294?
Habitat in Europæ *arvis, arenoſis.* ⊙

perennis. 2. SCLERANTHUS calycibus fructus clauſis. *Fl. ſuec.* 349.
Knavel incanum, flore majore, perenne. *Raj. angl.* 3. *p.* 160. *t.* 5. *f.* 1.
Alchimilla gramineo folio, majori flore. *Vaill. pariſ.* 4. *t.* 1. *f.* 5.
Habitat in Europæ *campis apricis arenoſis.* ♃

GYPSOPHILA.

aggregata. 1. GYPSOPHILA foliis mucronatis recurvatis, floribus aggregatis. *Gen. nov.* 1103.
Saponaria calycibus pentaphyllis, floribus aggregatis, foliis mucronatis canaliculatis recurvis. *Hort. upſ.* 107.
Caryophyllus ſaxatilis, ericæ foliis, umbellatis corymbis.

bis. *Bauh. pin.* 211. *prodr.* 105. *Raj. hiſt.* 1033. *Magn. monſp.* 53. *t.* 5.

Habitat in monte Vignon Galliæ, Monſpelii, Pyrenæis. ♃

2. GYPSOPHILA foliis lanceolatis, ſtaminibus piſtillo brevioribus. *Gen. nov.* 1103. *repens.*

Saponaria caule ſimplici, foliis ſubulatis planis, ex alis ramuloſa. *Hort. cliff.* 166.

Alſine orientalis altiſſima, gramineo folio, flore albo. *Buxb. cent.* 3. *p.* 32. *t.* 60.

Alſine anguſtifolia caryophylloides multiflora glabra purpuraſcens, radice aſtragalīti. *Pluk. alm.* 22. *t.* 75. *f.* 2.

Caryophyllus ſaxatilis, foliis gramineis, minor. *Bauh. pin.* 211. *Burſ. XI.* 126.

Habitat in Sibiriæ, Auſtriæ, Helvetiæ *montibus.* ♃

Corollæ *albæ*, *extus incarnatæ*, *emarginatæ*; antheræ *ruſeſcentes polline violaceo.*

3. GYPSOPHILA foliis lanceolatis ſcabris, corollis revolutis. *Gen. nov.* 1108. *paniculata.*

Alſine fruteſcens, caryophylli folio, flore parvo albo. *Gerb. tanaiſ.* 15.

Habitat in Sibiriæ, Tatariæ *deſertis ſabuloſis*, Tawrow, Bielogrod. ♃

Folia *margine ſcabra*, *acuta.* Stamina *in fundo floris latent.* Petala *revoluta*, *minora quam in congeneribus.* Styli *longiores corolla*, *incurvi.*

4. GYPSOPHILA foliis lanceolatis ſubtrinerviis rectis. *Gen. nov.* 1103. *altiſſima.*

Saponaria calycibus pentaphyllis, corymbis faſtigiatis, foliis lanceolatis, caule adſcendente. *Hort. upſ.* 107.

Habitat in Sibiria. ♃

Differt a ſequente magnitudine dupla vel quadrupla omnium partium; Structura eadem, tamen diverſa ſpecies.

5. GYPSOPHILA foliis lanceolato-linearibus obſolete triquetris lævibus obtuſis ſecundis. *Gen. nov.* 1103. *faſtigiata.*

Saponaria caule ſimplici, foliis linearibus ex alis foliorum confertis teretibus. *Hort. cliff.* 166.

Saponaria calycibus pentaphyllis, corymbis faſtigiatis, foliis linearibus, caule adſcendente. *It. gotl.* 282. *Fl. ſuec.* 246. *Sauv. monſp.* 145.

Saponaria petalis ovatis, foliis glaucis pulpoſis linearibus. *Hall. jen.* 117. *t.* 2. *f.* 1.

Caryophyllus ſaxatilis, floribus gramineis, umbellatis corymbis. *Bauh. pin.* 211.
Polygonum majus erectum anguſtifolium, floribus candidis. *Mentz. pug. t.* 2. *f.* 2.
Habitat in Gotlandiæ, Boruſſiæ, Helvetiæ *rupibus* ♃
Caulis *in hac, non in antecedente, ante floreſcentiam procumbit, hinc folia ſecunda.*

perfoliata. 6. GYPSOPHILA foliis ovato-lanceolatis ſemiamplexicaulibus.
Saponaria foliis lanceolatis, calycibus campanulatis angula[illegible]. cliff. 165.
Spergula [illegible]flora, foliis inferioribus ſaponariæ, ſuperioribus behen ſimilibus. *Dill. elth.* 368. *t.* 276. *f.* 357
Habitat in Hiſpania & Oriente.

rigida. 7. GYPSOPHILA foliis lineari-lanceolatis planis, caule dichotomo, pedunculis bifloris, petalis emarginatis. *Gen. nov.* 1103.
Saponaria caule dichotomo, foliis ſubulatis planis. *Hort. cliff.* 445. *Roy. lugdb.* 445.
Saponaria caule brachiato, capillaceo folio, calyce campanulato, floribus ſparſis. *Sauv. monſp.* 145.
Tunica minima. *Dalech. hiſt.* 1191.
Habitat Monſpelii *et forte in* Belgio. ♃

muralis. 8. GYPSOPHILA foliis linearibus planis, caule dichotomo, petalis crenatis. *Gen. nov.* 1103.
Saponaria calycibus pentaphyllis, corollis crenato-emarginatis, foliis ſubulatis planis. *Fl. ſuec.* 347. *Sauv. monſp.* 144.
Saponaria foliis linearibus. *Fl. lapp.* 171.
Caryophyllus minimus muralis. *Bauh. pin.* 211.
Lychnis parva paluſtris, foliis acutis lanceolatis, floſculis purpureis. *Mentz. pug. t.* 7. *f.* 4.
Habitat in Suecia, Germania, Helvetia *ad vias.* ☉
Similis Diantho ſaxifrago, at caret ſquamis calycinis.

SAPONARIA.

officinalis. 1. SAPONARIA calycibus cylindricis, foliis ovato-lanceolatis. *Hort. cliff.* 165. *Hort. upſ.* 106. *Mat. med.* 214. *Roy. lugdb.* 444. *Gron. virg.* 160. *Gort. gelr.* 245.
Saponaria major lævis. *Bauh. pin.* 206.
Saponaria vulgaris. *Cam. epit.* 152.
hybrida. β. Saponaria concava anglica. *Bauh. pin.* 206. *Moriſ. hiſt.* 2. *p.* 548. *ſ.* 5. *t.* 22. *f.* 52.

Gen-

Gentiana folio convoluto. *Bauh. hiſt.* 3. *p.* 521.
Habitat in Europa *media.* ♃

2. SAPONARIA calycibus pyramidatis quinquangularibus, foliis ovatis acuminatis ſeſſilibus. *Hort. cliff.* 166. *Hort. upſ.* 107. *Roy. lugdb.* 443. *Guet. ſtamp.* 287. *Sauv. monſp.* 153. *Vaccaria.*
Lychnis ſegetum rubra, foliis perfoliatis. *Bauh. pin.* 204.
Vaccaria. *Dod. pempt.* 104.
Habitat inter ſegetes Galliæ, Germaniæ. ☉

3. SAPONARIA calycibus cylindricis villoſis, caulibus dichotomis procumbentibus. *Ocymoides.*
Saponaria minor quibusdam. *Bauh. hiſt.* 3. *p.* 344.
Lychnis vel Ocymoides repens montanum. *Bauh. pin.* 206.
Habitat in Helvetia & Monſpelii *locis petroſis.* ♃

4. SAPONARIA calycibus cylindricis villoſis, caule dichotomo erecto patulo. *Hort. upſ.* 106. *n.* 2. * *orientalis.*
Saponaria caule dichotomo, foliis lanceolatis petiolatis, floribus ſolitariis pedunculatis. *Roy. lugdb.* 445.
Lychnis orientalis annua ſupina, antirrhini folio, flore minimo purpuraſcente. *Tournef. cor.* 25. *Dill. elth.* 205. *t.* 167. *f.* 204.
Habitat in Oriente. ☉
Similis præcedenti; huic Folia lineari lanceolata, illi lanceolato-ovata.

DIANTHUS.

* *Flores aggregati.*

1. DIANTHUS floribus aggreggatis faſciculatis, ſquamis calycinis ovato-ſubulatis tubum æquantibus, foliis lanceolatis. *Hort. cliff.* 165. *Hort. upſ.* 165. *Roy. lugdb.* 444. *Sauv. monſp.* 144. *barbatus.*
Caryophyllus hortenſis barbatus latifolius. *Bauh. pin.* 208.
Thyrſis. *Reneal. ſpec.* 47.
β. Caryophyllus barbatus hortenſis anguſtifolius. *Bauh. pin.* 209.
Armerius flos alter. *Dod. pempt.* 176.
Habitat in - - - - ♃

2. DIANTHUS floribus ſubaggregatis, ſquamis calycinis ovatis ariſtatis tubum ſubæquantibus, foliis linearibus. *Hort. upſ.* 105. *carthuſianorum.*

 Di-

Dianthus floribus aggregatis, ſquamis calycinis lanceolatis, corollis crenatis. *Guett. ſtamp.* 284.
Caryophyllus ſylveſtris vulgaris latifolius. *Bauh. pin.* 209.
Caryophyllus arvenſis, calyculo florum numeroſo. *Loeſ. pruſſ.* 37. *f.* 7.
β. Caryophyllus ſylveſtris, flore rubro plurimo de ſummo caule prodeunte. *Segu. ver* 434. *t.* 8. *f.* 2.
Habitat in Germaniæ, Italiæ Siciliæ *ſterilibus apricis.*

Armeria. 3. DIANTHUS floribus aggregatis faſciculatis, ſquamis calycinis lanceolatis villoſis tubum æquantibus. *Hort. cliff.* 165. *Fl. ſuec.* 345. *It. gotl.* 301. *Roy. lugdb.* 443. *Sauv. monſp.* 144.
Caryophyllus barbatus ſylveſtris. *Bauh. pin.* 208.
Armeria ſylveſtris altera. *Lob. ic.* 448.
Habitat in ſterilibus Gotlandiæ, Germaniæ, Galliæ, Italiæ. ⊙

prolifer. 4. DIANTHUS floribus aggregatis capitatis, ſquamis calycinis ovatis obtuſis muticis tubum ſuperantibus.
Dianthus floribus aggregatis, capitulo magno, ſquamis calycinis ovatis obtuſis magnis. *Hort. upſ.* 106. *Sauv. monſp.* 144.
Caryophyllus ſylveſtris prolifer. *Bauh. pin.* 209. *Segu. veron.* 26. *t.* 7. *f.* 1.
Caryophyllus ſylveſtris annuus, multis capſulis ſimul junctis donatus. *Moriſ. hiſt.* 2. *p.* 563.
Habitat in Germaniæ *&* *auſtralioris* Europæ *paſcuis ſterilibus.* ⊙

* *Flores ſolitarii, plures in eodem caule.*

Caryophyllus 5. DIANTHUS floribus ſolitariis, ſquamis calycinis ſubovatis breviſſimis, corollis crenatis. *Hort. cliff.* 164. *Hort. upſ.* 104. *Mat. med.* 213. *Roy. lugdb.* 443. *Sauv. monſp.* 143.
coronarius. α. Caryophyllus hortenſis ſimplex, flore majore. *Bauh. pin.* 208.
β. Caryophyllus altilis major. *Bauh. pin.* 207.
γ. Caryophyllus maximus ruber & variegatus. *Bauh. pin.* 209.
imbricatus. δ. Caryophyllus - - - flore pleno ex ſquamis calycinis longiſſime imbricatis. *Hort. cliff. l. c.*
Caryophyllus ſpicam frumenti referens. *E. N. C. cur.* 3. *p.* 368. *t.* 9. *Hort. cliff* 164. *Phil. bot.* 8.
inodorus. ε. Tunica anguſtifolia procumbens, petalis ſerratis. *Hall. helv.* 382.

Caryophyllus ſylveſtris biflorus. *Bauh. pin.* 209. *prodr.* 104.

Caryophyllus ſylveſtris, flore rubro inodoro, calyce oblongo cum brevibus ungvibus. *Segu. ver.* 435. *t.* 7. *f.* 3.

Habitat in Italia. *Rajus.*

Coronarius α cum reliquis γ. β. δ. forte ex ε inodoro prognatus eſt.

Varietas δ. maxime ſingularis eſt.

6. DIANTHUS floribus ſolitariis, ſquamis calycinis lanceolatis binis, corollis crenatis. *Hort. cliff.* 164. *Fl. ſuec.* 342. *Sauv. monſp.* 143. *deltoides.*

Caryophyllus minor repens noſtras. *Raj. hiſt.* 988. *Dill. elth.* 402.

Cariophyllus ſylveſtris vulgaris latifolius. *Bauh. pin.* 209.

Betonica coronaria ſ. Caryophyllus minor, folio viridi nigricante, repens. *Bauh. hiſt.* 3. *p.* 329.

Habitat in Europæ *pratis.* ♃

7. DIANTHUS floribus ſubſolitariis, ſquamis calycinis lanceolatis quaternis, corollis crenatis. *Hort. cliff.* 164. *Hort. upſ.* 104. *glaucus.*

Tunica ramoſior, flore candido cum corolla purpurea. *Dill. elth.* 400. *t.* 298. *f.* 348.

Habitat in Anglia. ♃

8. DIANTHUS floribus ſolitariis, ſquamis calycinis ſubulatis patulis tubum æquantibus, corollis crenatis. *Hort. cliff.* 164. *Hort. upſ.* 104. * *Roy. lugdb.* 443. *chinenſis.*

Caryophyllus ſinenſis ſupinus, leucoji folio, flore unico. *Tournef. act.* 1705. *p.* 348. *f.* 5.

Habitat in China. ☉

9. DIANTHUS floribus ſolitariis, ſquamis calycinis ſubovatis breviſſimis, corollis multifidis fauce pubeſcentibus. *plumarius.*

Dianthus floribus ſolitariis, petalis multifidis baſi canaliculatis. *Hort. upſ.* 105. * *Sauv. monſp.* 143.

Dianthus floribus ſolitariis, corollis lacero-partitis, ſquamis calycinis ovatis acutis. *Fl. ſuec.* 344.

Dianthus petalis multifidis *Fl. lapp.* 170. *Hort. cliff.* 174. *Roy. lugdb.* 443.

Caryophyllus flore tenuiſſime diſſecto. *Bauh. pin.* 209.

Caryophyllus ſylveſtris, flore laciniato odoratiſſimo. *Bauh. pin.* 210.

Habitat in Europæ & Canadæ *paſcuis nemoroſis.*

* *Cau-*

* *Caule unifloro herbaceo.*

arenarius. 10. DIANTHUS caulibus unifloris, ſquamis calycinis ovatis, corollis multifidis, foliis linearibus. *It. goth.* 318. *Fl. ſuec.* 343.

Dianthus foliis brevibus, ſquamis muticis, caule unifloro. *Sauv. meth.* 143.

Caryophyllus ſylveſtris humilis, flore unico. *Bauh. pin.* 209.

Caryophyllus ſylveſtris 1. *Cluſ. hiſt.* 1. *p.* 282. *Dill. elth.* 402.

Armerius flos tertius. *Dod. pempt.* 176.

Habitat in Europæ *frigidioris arena mobili.* ♃

Affinitatem hujus ſummam cum præcedente docet corollæ faux.

alpinus. 11. DIANTHUS caule unifloro, corollis crenatis, ſquamis calycinis exterioribus tubum æquantibus, foliis linearibus obtuſis.

Caryophyllus pumilus latifolius. *Bauh. pin.* 209. *prodr.* 104. *Burſ. XI.* 95.

Caryophyllus ſylveſtris, flore magno inodoro hirſuto. *Bauh. pin.* 209.

Caryophyllus ſylveſtris 2. *Cluſ. hiſt.* 1. *p.* 283. *f.* 1. *bon.*

Habitat in Stiria, Auſtria. ♃

Radix *lignoſa, exſerens caules plures.* Caulis *longitudine digiti, articulis tribus conſtans.* Folia *caulis linearia, obtuſiuſcula, plana, obtuſa, vel verſus terram, ubi ceſpites conſtituunt, lanceolato-linearia.* Calycis *ſquamæ exteriores longitudine tubi calycis; interiores dimidio breviores.* Corolla *magna.* Petala *calycis longitudine, rotundata, dentibus breviſſimis numeroſis crenata, fauce parum villoſa.*

virgineus. 12. DIANTHUS caule ſubunifloro, corollis crenatis, ſquamis calycinis breviſſimis, foliis ſubulatis.

Caryophyllus ſylveſtris repens multiflorus. *Bauh. pin.* 209. *Burſ.* XI. 99.

β. Tunica rupeſtris, folio cæſio molli, flore carneo. *Dill. elth.* 401. *t.* 298. *f.* 385.

Habitat Monſpelii. ♃

Radix perennis. Folia *radicalia copioſa, erecta, in ceſpitem imbricata, acuminata, facie ſtatices ferme.* Caules *aliquot, ſpithamæi,* 4 *articulis ſimpliciſſimis conſtantes, foliis minoribus & ſummis minimis ex vagina perfoliata ortis.* Calycis *ſquamæ latæ, ovatæ, acutæ,*

tæ, breviſſimæ: paribus remotis. Corollæ limbus dimidio brevior tubo calycis, rotundatus, crenatus. Flos unicus in caule, interdum & alter ex ala folii ſupremi.

* *Fruteſcentes.*

13. DIANTHUS caule fruticoſo, foliis ſubulatis. *arboreus.*
Caryophyllus creticus arboreus, juniperi folio. *Tournef. cor.* 23.
Caryophyllus arboreſcens creticus. *Bauh. pin.* 208, *prodr.* 104.
Betonica coronaria arborea cretica. *Bauh. hiſt.* 3. *p.* 328.
Habitat in Creta. ♄

14. DIANTHUS caule fruticoſo, foliis lanceolatis. *fruticoſus.*
Caryophyllus græcus arboreus, leucoji folio peramaro. *Tournef. cor.* 23. *itin.* 1. *p.* 183. *t.* 9.
Habitat in Græcia. ♄

* *Calycibus angulatis.*

15. DIANTHUS calycibus quinquangularibus, ſquamis calycinis lanceolatis æqualibus, foliis ſubulatis. *Saxifragus.*
Dianthus radice repente, ramis decumbentibus, foliis ſubulatis. *Roy. lugdb.* 444.
Dianthus calyce lato & breviſſimo. *Hall. helv.* 381.
Caryophyllus ſaxifragus ſtrigoſior ſ. Caryophyllus ſylveſtris, flore minimo. *Bauh. pin.* 211.
Lychnis pumila caryophyllata, flore rubello, italis Hæmorrhoidalis aldrovandi. *Barr. rar.* 64. *t.* 998.
Habitat in Helvetia, Gallia, Ingolſtadii. ♃

TRIGYNIA.

DRYPIS.

1. DRYPIS. *Ger. emac.* 1312. *ſpinoſa.*
Drypis italica aculeata, floribus albis umbellatis compactis. *Mich. gen.* 24. *t.* 23.
Drypis theophraſti & angvillaræ. *Dalech. hiſt.* 1480. *Lob. ic.* 789. *Tabern. ic.* 144. *Bauh. hiſt.* 3. *p.* 722.
Spina umbella, foliis vidua. *Bauh. pin.* 388.
Carduus foliis tenuiſſime ſpinoſis ad inſtar juniperi. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 161. *ſ.* 7. *t.* 32. *f.* 8.
Habitat in Italia, Mauritania.

CU-

CUCUBALUS.

baccifer. 1. CUCUBALUS calycibus campanulatis, petalis diſtantibus, fructu colorato, ramis divaricatis.
Cucubalus caule ramoſo, floribus trigynis, fructu colorato globoſo. *Hort. cliff.* 170. *Hort. upſ.* 107. *Roy. lugdb.* 446. *Sauv. monſp.* 152.
Alſine ſcandens baccifera. *Bauh. pin.* 250.
Alſine repens. *Dod. pempt.* 403.
Habitat in Tatariæ, Germaniæ, Galliæ, Italiæ *nemoribus.* ♃

Behen. 2. CUCUBALUS calycibus ſubgloboſis glabris reticulato-venoſis, capſulis trilocularibus, corollis ſubnudis. *Fl. ſuec.* 360.
Cucubalus floribus trigynis, calycibus glabris, capſulis trilocularibus. *Hort. cliff.* 176. *Roy. lugdb.* 448.
Cucubalus calycibus ovatis hermaphroditis. *Fl. lapp.* 180
Lychnis ſylveſtris, quæ Behen album vulgo. *Bauh. pin.* 205.
Papaver ſpumeum. *Lob. ic.* 340.
β. Lychnis maritima repens. *Bauh. pin.* 205. *It. gotl.* 197.
Habitat in Europæ *ſeptentrionalioris pratis ſiccis.* ♃

Fabarius. 3. CUCUBALUS foliis obovatis carnoſis. *Roy. lugdb.* 448.
Lychnis maritima ſaxatilis, folio anacampſerotis. *Tournef. cor.* 24. *Boerh. lugdb.* 1. *p.* 214.
Behen album ſ. Polemonium ſaxatile, fabariæ folio, ſiculum. *Bocc. muſ.* 133. *t.* 92.
Habitat in Sicilia.

viſcoſus. 4. CUCUBALUS floribus lateralibus decumbentibus, caule indiviſo, foliis baſi reflexis.
Cucubalus foliis amplexicaulibus, floribus verticillatis, pedunculis erectis. *Roy. lugdb.* 448.?
Lychnis montana viſcoſa noctiflora hirſuta latifolia alba, floribus abſque appendicibus. *Till. piſ.* 105.
Lychnis orientalis maxima, bugloſſi folio undulato. *Tournef. cor.* 24. *itin.* 2. *p.* 361. *t.* 361.
Lychnis major noctiflora drubenſis. *Raj. hiſt.* 995.?
Habitat in Svecia, Italia, Anglia. ♂

ſtellatus. 5. CUCUBALUS foliis quaternis. *Hort. upſ.* 110.
Drypis foliis quaternis. *Cold. noveb.* 106.
Silene foliis quaternis. *Gron. virg.* 50.
Lychnis caryophyllæus virginianus, gentianæ foliis gla-

bris

bris quatuor ex ſingulis geniculis caulem amplexantibus, flore amplo fimbriato. *Raj. hiſt.* 1895.
Habitat in Virginia, Canada.
Petala, *abſque corona, quadrifida, lobis bipartitis.*

6. CUCUBALUS caule dichotomo, petalis quadrifidis. *quadrifidus.*
Lychnis viſcoſa anguſtifolia major. *Bauh. pin.* 205.
Lychnis ſylveſtris X. *Cluſ. hiſt.* 1. *p.* 291.
Caryophyllus minimus humilis alter exoticus, flore candido amœno. *Lob. ic.* 445.
Habitat in Styriæ *monte ad oppidum Eiſenertz.* ♃

7. CUCUBALUS floribus erectis, petalis emarginatis retroflexis: utrinque denticulo notatis. *Haſſelqu.* *ægyptiacus.*
Habitat in Ægypto.

8. CUCUBALUS petalis bipartitis, floribus ſecundis decumbentibus, pedunculis oppoſitis ſolitariis erectis, caule ſimpliciſſimo. *Hort. upſ.* 111. * *tataricus.*
Lychnis ſeptentrionalium, foliis hyſſopi, floribus uno verſu poſitis albis. *Hall. gott.* 33. *
Habitat in Tataria. ♃

9. CUCUBALUS petalis bipartitis, floribus paniculatis, ſtaminibus longis, foliis lanceolato-ovatis. *Hort. upſ.* 111. * *catholicus.*
Silene foliis ovatis utrinque acutis, caule paniculato, floribus nutantibus tenuiſſimis, *Roy. lugdb.* 447.
Lychnis viſcoſa altiſſima, flore muſcoſo, ocymaſtri facie. *Cupan. cath.* 110.
β. Lychnis nocturna non viſcoſa, herbaceo flore. *Dill. elth.* 425. *t.* 316. *f.* 408.
Habitat in Italia, Sicilia. ♃

10. CUCUBALUS floribus dioicis, petalis ſetaceis indiviſis. *Hort. cliff.* 272. *Roy. lugdb.* 445. *Otites.*
Lychnis viſcoſa, flore muſcoſo. *Bauh. pin.* 206,
Seſamoides magnum ſalmanticum. *Cluſ. hiſt.* 1. *p.* 295.
Habitat in Sileſia, Auſtria, Gallia, Sibiria. ♃

11. CUCUBALUS acaulis. *Fl. lapp.* 184. *Fl. ſuec.* 368. *Roy. lugdb.* 447. *Hall. helv.* 375 *acaulis.*
Lychnis alpina pumila, folio gramineo. *Bauh. pin.* 206. *Dill. elth.* 206. *t.* 167. *f.* 206.
Muſcus alpinus, lychnidis flore. *Bauh. hiſt.* 3. *p.* 767.
Habitat in Alpibus Lapponicis, Helveticis, Anglicis. ♃

12. CU-

reflexus. 12. CUCUBALUS floribus ſpicatis alternis ſecundis ſubſeſſilibus, corollis obſoletis nudis. *Hort. upſ.* 112.*
Lychnis ſegetum meridionalium annua hirta, floribus albis uno verſu diſpoſitis. *Moriſ. hiſt.* 2. *p.* 544. *Raj. hiſt.* 996.
Lychnis ſylveſtris alba, ſpica reflexa. *Magn. monſp.* 171. *t.* 170.
Habitat Monſpelii. ☉

SILENE.

* *Floribus lateralibus ſolitariis.*

anglica. 1. SILENE hirſuta, petalis emarginatis, floribus erectis, fructibus reflexis hirſutis alternis. *Hort. upſ.* 113.
Viſcago ceraſtii foliis, vaſculis pendulis anglica. *Dill. elth.* 417. *t.* 309. *f.* 398.
Lychnis ſylveſtris hirſuta annua, flore minore albo. *Vaill. pariſ.* 121. *t.* 16. *f.* 12.
Habitat in Anglia, Gallia. ☉
Petala *in hac emarginata non crenata, in ſequente & emarginata & crenata.*

luſitanica. 2. SILENE hirſuta, petalis dentatis coronatis, floribus erectis, fructibus reflexis ſubſeſſilibus alternis. *Hort. upſ.* 113. *Hort. cliff.* 172.
Silene floribus alternis, petalorum limbis integris crenatis. *Hort. cliff.* 172.
Viſcago hirſuta luſitanica, ſtellato flore. *Dill. elth.* 420. *t.* 311. *f.* 401.
Habitat in Luſitania. ☉

quinquevulnera. 3. SILENE petalis integerrimis ſubrotundis, fructibus erectis alternis. *Hort. cliff.* 171. *Roy. lugdb.* 446.
Silene ſpica incurva uno verſu florida, foliis imis ſpathulatis. *Sauv. monſp.* 146.
Lychnis hirſuta minor, flore variegato. *Dod. mem.* 4. *p.* 291.
Habitat in Hiſpania, Luſatia, Italia, Gallia. ☉

nocturna. 4. SILENE floribus ſpicatis alternis ſecundis ſeſſilibus, petalis bifidis.
Silene foliis lanceolatis, caule ramoſo & floribus ſecundis erectis, calycibus hirſutis. *Roy. lugdb.* 447.
Viſcago hirta noctiflora, floribus obſoletis ſpicatis. *Dill. elth.* 420. *t.* 310. *f.* 400.
Lychnis ſylveſtris nocturna piloſa, floribus unius ordinis dilute-purpureis. *Cup. cath.* 119. *Raj. ſuppl.* 480.

Ly-

Lychnis ſegetum meridionalium annua hirta, floribus albis uno verſu diſpoſitis. *Moriſ. hiſt.* 2. *p.* 346. *ſ.* 5. *t.* 36. *f.* 7.
Habitat in Italia, Penſylvania. ⊙

5. SILENE floribus ſubſpicatis alternis ſecundis, petalis indiviſis, fructibus erectis. *gallica.*
Silene hirſuta, foliis ſeſſilibus oblongo-cuneiformibus obtuſis, calycibus ſtriatis, fructibus erectis alternis. *Dalib. pariſ.* 129.
Viſcago hirta gallica, flore parvo carneo, petalis integris. *Dill. elth.* 419. *t.* 310. *f.* 399.
Habitat in Gallia. ⊙

6. SILENE hirſuta, petalis emarginatis, fructibus erectis alternis hirſutis ſeſſilibus. *ceraſtoides.*
Viſcago ceraſtei foliis, vaſculis erectis ſeſſilibus. *Dill. elth.* 416. *t.* 309. *f.* 397.
Habitat in Europa *auſtrali.* ⊙

* *Floribus lateralibus confertis.*

7. SILENE petalis bifidis, floribus lateralibus ſecundis cernuis, caule recurvato. *nutans.*
Silene foliis lanceolatis, caule paniculato, floribus nutantibus, calyce ſtriato, corolla involuta. *Hort. cliff.* 171. *Fl. ſuec.* 366. *Roy. lugdb.* 446.
Lychnis montana viſcoſa alba latifolia. *Bauh. pin.* 205.
Habitat in Europæ *borealis pratis aridis.* ♃

8. SILENE petalis bifidis: coronula ſubcoadunata, floribus ſecundis, pedunculis oppoſitis trifloris, ramis alternis. *amœna.*
Silene petalis bifidis coronatis: corolla coadunata, calycibus erectis raris piloſis. *Hort. upſ.* 114.
Habitat in Tataria. ♃

9. SILENE petalis bifidis, caule fruticoſo, foliis lato-lanceolatis, panicula trichotoma. *fruticoſa.*
Silene caule folioſo fruticoſo, foliis lineari-lanceolatis acutis glabris, capitulis ovatis. *Vir. cliff.* 38. *Hort. cliff.* 171. *n.* 4. *Hort. upſ.* 111. *n.* 2. *Roy. lugdb.* 446.
Lychnis ſylveſtris myrtifolia behen albo ſimilis. *Bauh. pin.* 205.
Ocymoides fruticoſum. *Cam. hort.* 109. *t.* 33.
Saponaria fruteſcens, acutis foliis, ex ſicilia. *Bocc. ſic.* 58. *t.* 30.
Habitat in Sicilia. ♄

gigantea. 10. SILENE foliis radicalibus cochleariformibus obtuſiſſimis, caule ſubverticillato.

Silene foliis lanceolatis, caule paniculato nudo, floribus erectis. *Hort. cliff.* 171. *Roy. lugdb.* 446.

Silene foliis obverſe ovatis craſſis, limbis corollæ bifidis a ſole revolutis. *Vach. ultr.* 391.

Lychnis ocymaſtri facie, flore viridi. *Herm. par.* 199. *t.* 199.

Habitat in Luſitania. ♂

* *Floribus ex dichotomia caulis.*

Conoidea. 11. SILENE calycibus fructus globoſis acuminatis ſtriis triginta, foliis glabris. *Hort. upſ.* 110. *Sauv. monſp.* 146.

Cucubalus calycibus conicis ſtriatis. *Hort. cliff.* 171. *Roy. lugdb.* 448.

Lychnis ſylveſtris latifolia, calycibus turgidis ſtriatis. *Bauh. pin.* 205.

Lychnis ſylveſtris 2. *Cluſ. hiſt.* 1 *p.* 288.

Habitat inter ſegetes Hiſpaniæ. ☉

conica. 12. SILENE calycibus fructus conicis ſtriis triginta, foliis mollibus. *Hort. upſ.* 110.

Lychnis ſylveſtris anguſtifolia, calycibus turgidis ſtriatis. *Bauh. pin.* 205.

Lychnis glabra annua, foliis oblongis mucronatis, flore amplo rubello, capſula oblonga pyramidali. *Moriſ. hiſt.* 2. *p.* 542. *ſ.* 5. *t.* 36. *f.* 6.

Habitat in Hiſpania, Galloprovincia. ☉

Behen. 13. SILENE calycibus ovatis glabris venoſo-reticulatis, capſulis trilocularibus.

Lychnis veſicaria cretica, parvo flore purpuraſcente. *Dill. elth.* 427. *t.* 317. *f.* 409.

Lychnis cretica, parvo flore, calyce ſtriato purpuraſcente. *Tournef. cor.* 24.

Habitat in Creta. ☉

Differt a Cucubalo Behen corona corollæ, petalorum laminis vix ¼ longitudine calycis, radice annua, corollis purpuraſcentibus, antheris albis; modo hæc ſufficiant pro ſpecie diſtincta.

pendula. 14. SILENE calycibus fructiferis pendulis inflatis: angulis decemſcabris. *Hort. upſ.* 109. *

Cucubalus floribus trigynis erectis, fructibus pendulis, calycibus ſtriis decem criſpis. *Hort. cliff.* 170.

Cu-

β. Cucubalus floribus trigynis erectis, calycibus fructus pendulis anguloſis. *Hort. cliff.* 171.
Viſcago hirſuta ſicula, lychnidis aquaticæ facie, ſupina. *Dill. elth.* 421. *t.* 312. *f.* 404.
Habitat in Creta & Sicilia. ⊙

15. SILENE calycibus decemangularibus: dentibus tubum æquantibus. *noctiflora.*
Cucubalus calycibus fructus ovatis erectis: angulis decem: alternis venoſis. *Hort. upſ.* 3. † *Fl. ſuec. præfat. Sauv. monſp.* 146.
Lychnis noctiflora. *Bauh. pin.* 205. *Raj. hiſt.* 994.
Ocymoides noctiflorum. *Cam. hort.* 109. *t.* 34.
Habitat in Suecia, Germania. ⊙

16. SILENE calycibus floris cylindricis, panicula dichotoma, calycibus villoſis. *virginica.*
Lychnis flore ſimplici ſpecioſo coccineo, foliis oblongis acuminatis adverſis, caule viſcoſo. *Gron. virg.* 161.
Habitat in Virginia. ♃
Planta *polymorpha. Flores facie Cucubali dioici albi, at ſaturate rubri; Calyces anguſtiores quam in congeneribus, hirſuti.* Stamina *cum ſtylis extra florem prominentia.* Caulis *nunc ſimplex digiti longitudine, terminatus floribus in faſciculum collectis, nunc pedalis apice trichotomus, pedunculo intermedio ſemper unifloro.* Folia *oblonga ſ. lato-lanceolata, ut in Gomphrena prima.*

17. SILENE foliis lanceolatis glabris, pedunculis trifidis, petalis emarginatis, calycibus ovatis. *Roy. lugdb.* 447. *antirrhina.*
Silene corymbo dichotomo, floribus pedunculatis, ramis alternis erectis, foliis lanceolatis integerrimis. *Gron. virg.* 50.
Viſcago americana noctiflora, antirrhini folio. *Dill. elth.* 442. *t.* 313. *f.* 403.
Habitat in Virginia, Carolina. ⊙

18. SILENE erecta lævis, calycibus ſubgloboſis glabris venoſis, corollis inapertis. *Hort. upſ.* 112. * *rubella.*
Viſcago luſitanica, flore rubello vix conſpicuo. *Dill. elth.* 324. *t.* 314. *f.* 406.
Habitat in Luſitania. ⊙

19. SILENE caule dichotomo paniculato, calycibus lævibus, petalis breviſſimis emarginatis, foliis glabris lanceolatis. *inaperta.*

Viſcago lævis, inaperto flore. *Dill. elth.* 424. *t.* 315. *f.* 407.
Habitat in Europa *auſtrali.* ☉

cretica. 20. SILENE erecta lævis, calycibus erectis ſulcatis, petalis emarginatis. *Hort. upſ.* 112. *
Viſcago foliis inferioribus bellidis, ſuperioribus tunicæ, calyce ſtrictiore & turgidiore. *Dill. elth.* 422. *t.* 314. *f.* 404. 405.
Habitat in Creta.

portenſis. 21. SILENE caule dichotomo paniculato, calycibus ſtriatis, petalis bifidis, foliis linearibus.
Silene caule erecto, pedunculis longiſſimis erectis unifloris, foliis lineari-lanceolatis. *Roy. lugdb.* 447.?
Habitat in Luſitania. *Læfl.* ☉
Habitus S. inapertæ, at Folia anguſtiora, & Calyces longitudinaliter ſtriati. Planta *ſpithamæa, brachiata, dichotoma.* Folia *linearia acuta glabra.* Pedunculi *filiformes, anguſtiſſimi, longi, erecti, e dichotomia caulis, uniflori.* Calyces *clavati, longi, purpuraſcentes, ſtriis alternis albis.* Stamina *longitudine fere corollæ.*

Muſcipula. 22. SILENE petalis bifidis, caule dichotomo, floribus axillaribus ſeſſilibus, foliis glabris.
Silene floribus triſtyl[illegible], foliis lanceolatis ſeſſilibus, capſulis trilocularibus, floribus ternis. *Sauv. monſp.* 145.
Lychnis ſylveſtris viſcoſa rubra altera. *Baub. pin.* 205.
Lychnis ſylveſtris 3. *Cluſ. biſt.* 1. *p.* 289.
Habitat in Hiſpania, G. Narbonenſi.

polyphylla. 23. SILENE foliis faſciculatis ſetaceis: ramorum florentium oppoſitis. *Roy. lugdb.* 447.
Lychnis ſylveſtris, plurimis foliolis ſimul junctis. *Baub. pin.* 205.
Lychnis ſylveſtris VIII. *Cluſ. biſt.* 1. *p.* 290.
Habitat in Pannonia, Auſtria, Bohemia. ♃

LYCHNIS.

Armeria. 24. SILENE floribus faſciculatis faſtigiatis, foliis ſuperioribus cordatis glabris. *Hort. upſ.* 110.
Silene foliis lanceolato-ovatis glabris, floribus terminalibus faſciculatis faſtigiatis. *Hort. cliff.* 172. *Roy. lugdb.* 446. *Sauv. monſp.* 153.

Lych-

Lychnis viſcoſa purpurea latifolia lævis. *Bauh. pin.* 205.
Armerius flos quartus. *Dod. pemt.* 176.
Habitat in Anglia, Gallia. ☉

25. SILENE floribus erectis, petalis emarginatis, calycibus teretibus, foliis lanceolatis. *Fl. ſuec.* 367. *It. W:goth.* 144. * *rupeſtris.*
Silene floribus erectis laxe diſtantibus, caule dichotomo. *Fl. lapp.* 183.
Alſine alpina glabra. *Bauh. pin.* 251. *prodr.* 118.
Auricula muris alpina glabra. *Bauh. hiſt.* 3. *p.* 360.
β. Caryophyllus holoſteus alpinus gramineus. *Bauh. pin.* 210. *prodr.* 104. *Burſ. XI.* 117.
Habitat in montibus aridis Sueciæ, Helvetiæ. ♂
Varietas β. *foliis linearibus in umbra nata.*

26. SILENE caulibus unifloris, pedunculis longitudine caulis. *Saxifraga.*
Caryophyllus ſaxifragus. *Bauh. pin.* 211.
Saxifraga antiquorum quibusdam. *Bauh. hiſt.* 3. *p.* 338.
Habitat in montibus cretaceis Galliæ, Italiæ. ♃
Radix *lignoſa, ramoſa.* Caules *plures, digitales, ſimplicisſimi, glabri.* Folia *oppoſita linearia acuta glabra, per 4 ad 6 oppoſitiones.* Pedunculus *terminalis, filiformis longitudine caulis; raro pedunculus alter lateralis.* Flos *unicus.* Calyx *clavatus glaber.* Petala *bifida limbo calyce breviore.*

* *

27. SILENE caule folioſo herbaceo, foliis lanceolatis acutis glabris, calycibus erectis. *Hort. cliff.* 171. *Roy. lugdb.* 446. *bupleuroides*
Lychnis orientalis, bupleuri folio. *Tournef. cor.* 2. *itin.* 2. *p.* 139. *t.* 154.
Habitat in Perſia.

STELLARIA.

1. STELLARIA foliis cordatis petiolatis, pedunculis ramoſis. *nemorum.*
Alſine altiſſima nemorum. *Bauh. pin.* 251.
Alſine montana hederacea maxima. *Col. ecphr.* 1. *p.* 289. *t.* 290.
Habitat in Europæ *nemoribus.*

2. STELLARIA foliis ovatis ſeſſilibus, caule dichotomo, floribus ſolitariis, pedunculis fructiferis reflexis. *dichotoma.*

 Habi-

Habitat in Alpibus Helveticis, Sibiricis. ☉
Rami divaricati, dichotomi. Pedunculi fructiferi totire flexi.

radians. 3. STELLARIA foliis lanceolatis ſerrulatis, petalis quinquepartitis.
Alſine ſaxatilis, anguſto & oblongo ſalicis folio, flore albo tenuiſſime laciniato. *Amm. ruth.* 83. *t.* 10.
Habitat in Sibiria.

Holoſtea. 4. STELLARIA foliis lanceolatis ſerrulatis, petalis bifidis.
Alſine foliis lanceolatis. *Hort. cliff.* 172. *Fl. ſuec.* 371. *Roy. lugdb.* 449.
Caryophyllus holoſteus arvenſis, flore majore. *Bauh. pin.* 210.
Gramen. *Fuchſ. hiſt.* 136.
Habitat in Europæ *nemoribus.*

graminea. 5. STELLARIA foliis linearibus integerrimis, floribus paniculatis.
Alſine foliis linearibus. *Fl. lapp.* 189. *Fl. ſuec.* 372. *Hort. cliff.* 172. *Roy. lugdb.* 449.
Caryophyllus arvenſis glaber, flore minore. *Bauh. pin.* 210.
Gramen floridum minus, *Tabern. ic.* 232.
β. Alſine, folio gramineo anguſtiore, paluſtris. *Dill. app.* 69.
γ. Cariophyllus holoſteus alpinus anguſtifolius *Bauh. pin.* 210. *prodr.* 104. *n.* 6. *Burſ. XI:* 2.
Habitat in ſiccis juniperetis ſepibus tectis Europæ. ♃

Ceraſtoides. 6. STELLARIA foliis oblongis, pedunculis ſubbifloris.
Caryophyllus holoſteus montanus anguſtifolius alter. *Bauh. pin.* 210. *prodr.* 104. *Burſ.* XI: 118.
Habitat in Alpibus Lapponicis, *Horto Dei* monſpelienſi.

biflora. 7. STELLARIA foliis ſubulatis, ſcapis ſubbifloris, petalis emarginatis, germinibus oblongis, calycibus ſtriatis.
Sagina ramis erectis bifloris. *Fl. lapp.* 158 *
Mœhringia ſcapis bifloris. *Fl. ſuec.* 316.
Arenaria foliis ſubulatis, calycibus ſtriatis, germinibus oblongis, floribus corymboſis. *Amœn. acad.* 1. *p.* 158.*
Habitat in Alpibus Lapponicis. ♃
Planta *parva, facie Saginæ.* Folia *radicalia ſubulata, in acer-*

acervum congeſta. Caules *digitales, filiformes, maxima parte nudi: ſuperne bifidi in 2 pedunculos ſubjecto pari foliorum: altero pedunculo in medio foliolis duobus.*

ARENARIA.

1. ARENARIA foliis ovatis acutis carnoſis. *Fl. ſuec.* 375. *Fl. lapp.* 149. *It. œl.* 151. **peploides.**
   Alſine litoralis, foliis portulacæ. *Bauh. pin.* 251. *Lœſ. pruſſ.* 12. *t.* 2.
   Telephium maritimum, portulacæ folio. *Buxb. act.* 3. *p.* 271.
   Habitat ad littora maris Europæi *borealia.* ♃

2. ARENARIA foliis ovatis carinatis recurvis quadrifariam imbricatis. *Bauh. pin.* 211. *prodr.* 125. *Burſ. XI.* 135. **tetraquetra.**
   Habitat in Pyrenæis ♃
   Herba *omnino Gypſophilæ aggregata, ſed Pedunculus uniflorus, terminalis.*

3. ARENARIA foliis ovatis obtuſis, pedunculo laterali bifloro. **lateriflora.**
   Habitat in Sibiria.
   Caulis *digitalis filiformis ſimpliciſſimus.* Folia *ovata obtuſa ſubpetiolata glabra.* Pedunculus *axillaris unicus longus bifidus.* Corolla *calyce longior.*

4. ARENARIA foliis ovatis acutis petiolatis nervoſis. *Hort. cliff.* 173. *Fl. ſuec.* 374. * *Roy. lugdb.* 471. **trinervia.**
   Alſine plantaginis folio. *Bauh. hiſt.* 3. *p.* 364.
   Habitat in Europæ *ſylvis.* ☉

5. ARENARIA foliis ſubovatis acutis ſeſſilibus, corollis calyce brevioribus. *Fl. ſuec.* 373. *Hort. cliff.* 173. *Roy. lugdb.* 451. **ſerpyllifolia.**
   Alſine minor multicaulis. *Bauh. pin.* 251.
   Alſine minor. *Fuchſ. hiſt.* 23.
   Habitat in Europæ *ſylvis glareoſis.* ☉

6. ARENARIA foliis filiformibus, ſtipulis membranaceis vaginantibus. *Fl. ſuec.* 376. **rubra.**
   α. Alſine, ſpergulæ facie, minor ſ. Spergula minor, ſubcæruleo flore. *Bauh pin.* 251. *prodr.* 119 **campeſtris.**
   Polygonum foliis gramineis, ſpergulæ capitatis. *Lœſ. pruſſ.* 203. *t.* 63.
   β. Arenaria foliis lineatibus longitudine intermediorum. *Hort. cliff.* 173. *Gron. virg.* 161. *Roy. lugdb.* 451. **marina.**

 Sper-

Spergula marina noſtras. *Raj. hiſt.* 1034.
Alſine ſpergulæ facie media. *Bauh. pin.* 251.
Habitat α *in* Europæ *arenoſis collibus*, β. *in litoribus marinis.* ☉
Stamina in campeſtri certe 10. *ſunt; in maritima prope Aboam ſtamina tantum* 5 *obſervavit D. Kalm.*

ſaxatilis. 7 ARENARIA foliis ſubulatis, caulibus paniculatis, calycum foliolis ovatis.
Arenaria foliis ſubulatis, calycinis laciniis membrana ipſis latiore auctis obtuſis. *Guett. ſtamp.* 2. *p.* 281.
Spergula foliis aciformibus denſis, ramis ramoſis ſubnudis. *Sauv. monſp.* 45.
Alſine glabra, tenuiſſimis foliis, floribus albis. *Herm. par.* 12. *t.* 12.
Alſine ſaxatilis & multiflora, capillaceo folio. *Vaill. pariſ.* 7. *t.* 2. *f.* 3.
Alſine ſaxatilis, laricis folio, minor & minori flore. T. *Magn. monſp.* 11. *t.* 11.
Habitat in Germania, Helvetia, Gallia, Sibiria. ♃

tenuifolia. 8. ARENARIA foliis ſubulatis, caule paniculato, pedunculis ſimplicibus, capſulis erectis, petalis calyce brevioribus.
Arenaria foliis ſubulatis, calycinis laciniis membrana ipſis anguſtiore auctis acutiſſimis. *Guett. ſtamp.* 2. *p.* 282.
Alſine tenuifolia. *Bauh. hiſt.* 3. *p.* 364. *Vaill. pariſ.* 7. *t.* 3. *f.* 1. *Segu. ver.* 418. *t.* 6. *f.* 2.
Habitat in Helvetia, Gallia, Anglia, Italia. ♃
Habet in flore ſtamina decem.

laricifolia. 9. ARENARIA foliis ſetaceis, caule ſuperne nudiuſculo, calycibus ſubhirſutis.
Alſine foliis faſciculatis, petiolis ſimplicibus, calyce hirſuto. *Hall. helv.* 388.
Alſine alpina, junceo folio. *Bauh. pin.* 251. *prodr.* 118.
Lychnoides, juniperi folio, perennis. *Vaill. pariſ.* 121.
Habitat in montoſis Helvetiæ, Genevæ, Pariſiorum, Monſpelii. ♃

mucronata. 10. ARENARIA foliis ſetaceis mucronatis, corollis breviſſimis, calycibus inferne mucronatis.
Alſine foliis faſciculatis tenuiſſimis duriſque, petalis integris. *Hall. helv.* 387. *t.* 7. *f.* 2.
Habitat in Helvetia.

11. A

11. ARENARIA foliis ovatis ciliatis acutis. *ciliata.*
Alſine, ſerpilli folio, multicaulis & multiflora. *Segu. ver.* 421. *t.* 5. *f.* 2.
β. Arenaria foliis ovatis nervoſis ſeſſilibus imbricatis acutis. *Amæn. acad.* 1. p. 162. *n.* 155.
γ. Alſine foliis lanceolatis, petalis integris calyce majoribus. *Hall. helv.* 390. *t.* 7. *f.* 3.
Habitat in Alpibus Helveticis, Pyrenæis. ♃

12. ARENARIA foliis ſubulatis ſubtus hiſpidis.
Habitat Monſpelii *in monte calcaris.*
Habitus *ſpergulæ.* Caules *ſimplices, pilis raris adſperſi.* *hiſpida.* Folia *oppoſita, ſubulata, plana, ſubtus pilis raris hiſpida.* Panicula *primum dichotoma, max alternis pedunculis ramoſa.*

CHERLERIA.

1. CHERLERIA. *Hall. helv.* 391. *t* 6.
Lychnis alpina, muſcoſis foliis denſius ſtipatis, floribus parvis, calyce duriore. *Pluk. alm.* 233. *t.* 42. *f.* 8. *Sedoides.*
Sedum montanum perpuſillum luteum.. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 471. *ſ.* 12. *t.* 6. *f.* 14.
Sedum montanum perpuſillum, luteolis floribus. *Park. theatr.* 738.
Habitat in Alpibus Helvetiæ, Valeſiæ, Gotthardo. ♃

GARIDELLA.

GARIDELLA. *Hort. cliff.* 170. *Hort. upſ.* 108. *Roy. lugdb.* 481. *Nigellaſtrum.*
Garidella foliis tenuiſſime diviſis. *Garid. prov.* 203. *t.* 39.
Nigellaſtrum raris & fœniculaceis foliis. *Magn. hort.* 143. *t.* 143.
Nigella cretica, folio fœniculi. C. B. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 516. *ſ.* 12. *t.* 18. *f.* 6.
Habitat in Galloprovincia. ⊙

MALPIGHIA.

1. MALPIGHIA foliis ovatis integerrimis glabris, pedunculis umbellatis. *Hort. cliff.* 169. *Hort. upſ.* 108. *Roy. lugdb.* 450. *glabra.*
Ceraſus jamaicenſis, fructu tetrapyreno. *Comm. hort.* 1. *p* 145. *t.* 75.

Ceraſus americana, myrti conjugatis foliis, fructu acerbo tetrapyreno. *Pluk. alm.* 94. *t.* 157. *f.* 7.

Arbor baccifera, folio ſubrotundo, fructu ceraſino ſulcato rubro polypyreno: oſſiculis canaliculatis. *Sloan. jam.* 172. *hiſt.* 2. *p.* 106. *t.* 207. *f.* 2. *Raj. dendr.* 74.

Habitat in Jamaica, Braſilia, Surinamo, Curacao. ♄

urens. 2. MALPIGHIA foliis oblongo-ovatis: ſetis decumbentibus rigidis, pedunculis unifloris aggregatis.

Malpighia anguſtifolia & latifolia, fructu ſubtus ſpinoſo. *Plum. gen.* 46.

Meſpilus americana, folio lato ſubtus ſpinoſo, fructu rubro. *Tournef. inſt.* 642.

Arbor baccifera, folio oblongo ſubtiliſſimis ſpinis ſubtus obſito, fructu ceraſino ſulcato polypyreno. oſſiculis canaliculatis. *Sloan. jam.* 172. *hiſt.* 2. *p* 106. *t.* 207. *f.* 3. *Raj. dendr* 74.

Habitat in America *calidiore.* ♄

craſſifolia. 3. MALPIGHIA foliis ovatis integerrimis ſubtus tomentoſis, racemis terminalibus.

Malpighia latifolia, cortice ſangvineo. *Barr. æquin.* 72?

Tiliæ affinis laurifolia, arbuti floribus albis racemoſis odoratis, fructu pentagono. *Sloan. jam.* 136. *hiſt.* 2. *p.* 20. *t.* 163. *f.* 1.?

Habitat in America calidiore. ♄

Arbor. Foliis *ovatis palmaribus craſſis ſubpetiolatis integerrimis, ſupra pubeſcentibus, ſubtus tomentoſis.* Racemi *terminales longi tomentoſi.*

verbaſcifolia 4. MALPIGHIA foliis lanceolato-ovatis tomentoſis integerrimis, racemis terminalibus.

Malpighia humilis, verbaſci folio & facie, caule craſſiſſimo. *Barr. æquin.* 71.

Habitat in America *calidiore.* ♄

Folia *lanceolata-ovata, in petiolos deſinentia, pedalia, villoſa, ſubtus denſiſſimo tomento veſtita.* Racemi *terminales, longi, villoſi.*

aquifolia. 5. MALPIGHIA foliis lanceolatis dentato-ſpinoſis ſubtus hiſpidis.

Malpighia anguſtis & acuminatis aquifolii foliis. *Plum. gen.* 46.

Habitat in America *calidiore.* ♄

coccigera. 6. MALPIGHIA foliis ſubovatis dentato-ſpinoſis.

Mal-

Malpighia humilis, ilicis cocciglandiferæ foliis. *Plum. gen.* 46.
Habitat in America *calidiore.* ♄

BANISTERIA.

1. BANISTERIA foliis alternis lanceolatis ſerratis. *lupuloides.*
Paullinia foliis ſimplicibus lanceolatis ſerratis. *Hort. upſ.* 97.
Lupulus ſylveſtris americana claviculis donata. *Pluk. alm.* 229. *t.* 201. *f.* 4. & *t.* 163. *f.* 3.
Habitat in Barbados. ♄

2. BANISTERIA foliis ſinuato-anguloſis. *anguloſa.*
Acer ſcandens, folio anguloſo. *Plum. ſpec.* 18.
Clematis anguloſo folio, aceris fructu. *Plum. amer.* 77. *t.* 92. *Raj. ſuppl.* 328.
Habitat in America *calidiore.* ♄

3. BANISTERIA foliis ovatis, ſpicis lateralibus, ſeminibus erectis. *purpurea*
Acer ſcandens, pſeudoacaciæ folio, flore purpuraſcente. *Plum. ſpec.* 18.
Habitat in America *meridionali.* ♄

4. BANISTERIA foliis ovato-oblongis acuminatis, racemis lateralibus, ſeminibus patentibus. *Fl. zeyl.* 176.* *benghalenſis.*
Acer ſcandens, foliis citri, flore cæruleo ſpicato. *Plum. ſpec.* 18.
Acer ſcandens, foliis laurinis *Sloan. jam.* 137. *hiſt.* 2. *p.* 26. *Raj. dendr.* 94.
Acer benghalenſis, laurinis foliis, fructu tergemino. *Pluk. alm.* 7. *t.* 3. *f.* 1.
Habitat in Indiis ♄

5. BANISTERIA foliis ovatis, ramis dichotomis. *dichotoma.*
Baniſteria foliis ovatis, ramis dichotomis, ſeminibus extrorſum tenuioribus, introrſum lacinulam emittentibus. *Hort. cliff.* 169. *
Habitat in America *calidiore.* ♄

6. BANISTERIA foliis ovatis, ramis brachiatis, ſeminibus extrorſum tenuioribus. *fulgens.*
Baniſteria foliis ovatis, ramis ramoſis, ſeminibus extrorſum tenuioribus, introrſum lacinulam emittentibus *Hort. cliff.* 169. *
Acer ſcandens, convolvuli folio, flore ex aureo cinereo. *Plum. ſpec.* 18.

Acer

Acer ſcandens minus, apocyni facie, folio ſubrotundo. *Sloan. jam.* 138. *hiſt.* 2. *p.* 27. *t.* 162. *f.* 2. *Raj. dendr.* 94.

Triopteris americana ſcandens, fructu fulgente majore aureo. *Pluk. mant.* 185.

Habitat in America. ♄

brachiata. 7. BANISTERIA foliis ſubovatis, ramis brachiatis, ſeminibus introrſum anguſtioribus.

Baniſteria foliis ſubovatis, ramis ramoſis, ſeminibus introrſum tenuioribus nullam laciuulam emittentibus *Hort. cliff.* 169. *

Habitat in America. ♄

TRIOPTERIS.

jamaicenſis. 1. TRIOPTERIS. *Hort. cliff.* 169. *

Triopteris jamaicenſis, anguſto ſalicis folio, fructu minore fuſco. *Pluk. alm.* 377.

Aceri vel Paliuro affinis, anguſto oblongo liguſtri folio, flore tetrapetalo herbaceo. *Sloan. jam.* 138. *hiſt.* 2. *p.* 27. *t.* 162. *f.* 3. *Raj. dendr.* 94.

Habitat in America *calidiore.* ♄

PENTAGYNIA.

AVERRHOA.

Bilimbi. 1. AVERRHOA caudice nudo fructificante, pomis oblongis obtuſangulis. *Fl. zeyl.* 177. *

Blinbingum teres. *Rumpf. amb.* 1. *p.* 118. *t.* 16.

Bilimbi. *Rheed. mal.* 3. *p.* 55. *t.* 45. 46.

Habitat in India. ♄

Carambola. 2. AVERRHOA axillis foliorum fructificantibus, pomis oblongis acutangulis. *Fl. zeyl.* 178. *

Mala goënnia, fructu octangulari pomi vulgaris magnitudine. *Bauh. pin.* 433.

Prunum ſtellatum. *Rumpf. amb.* 1. *p.* 115. *t.* 35.

Tamara Tonga ſ. Carambolas. *Rheed. mal.* 3. *p.* 51. *t.* 43. 44.

Habitat in India. ♄

acida. 3. AVERRHOA ramis nudis fructificantibus, pomis ſubrotundis. *Fl. zeyl.* 179.

Neli-pouli. *Rheed. mal.* 3. *p.* 57. *t.* 47. 48. *Raj. hiſt.* 1450.

Habitat in India. ♄

COTYLEDON

1. COTYLEDON foliis ſubrotundis planis integerrimis. *Hort. cliff.* 276, *Roy. lugdb.* 454. *orbiculata*
Cotyledon africanum fruteſcens incanum, orbiculatis foliis. *Herm. lugdb.* 349. *t.* 551. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 474. *ſ.* 12. *t.* 7. *f.* 39.
Cotyledon africana fruteſcens, folio longo & anguſto, flore flaveſcente. *Comm. rar.* 23. *t.* 23.
Habitat ad Cap. b. Spei. ♄

2. COTYLEDON foliis ſemigloboſis. *Hort. cliff.* 176. *Roy. lugdb.* 454. *hemiſphærica.*
Cotyledon capenſis, folio ſemiglobato. *Dill. elth.* 112. *t.* 95. *f.* 111.
Habitat in Æthiopia. ♄

3. COTYLEDON foliis ovalibus crenatis, caule ſpicato. *ſerrata.*
Cotyledon foliis radicalibus lanceolatis crenatis: caulinis ſubulatis. *Hort. cliff.* 497. *Roy. lugdb.* 454.
Cotyledon cretica, folio oblongo fimbriato. *Dill. elth.* 113. *t.* 95. *f.* 112.
Habitat in Creta, Sibiria.

4. COTYLEDON foliis oblongis ſpinoſo-mucronatis, caule ſpicato. *ſpinoſa.*
Habitat in Sibiria. *D. Gmelin.*
Habitus *ſpeciei* 3, *Folia integra ſpina ſetacea terminata, flores quinquepartiti.*

5. COTYLEDON foliis cucullatis ſerrato-dentatis alternis, caule ramoſo, floribus erectis. *umbilicus* ♀
Cotyledon foliis peltatis. *Vir. cliff.* 39. *Roy. lugdb.* 454.
Cotyledon flore luteo, radice repente. *Dod. mem.* 265. *t.* 73. repens.
Cotyledon radice tuberoſa longa repente. *Moriſ. præl.* 257. *Raj. hiſt.* 1878.
Cotyledon luteum umbilicatum ſpicatum, radice repente majus. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 471.
Umbilicus repens. *Cam. epit.* 858.
β. Cotyledon vera, radice tuberoſa. *Bauh. hiſt.* 3. *p.* 683. tuberoſa.
Cotyledon major. *Bauh. pin.* 285. *Raj. hiſt.* 1878.
Cotyledon umbilicus veneris. *Cluſ. hiſt.* 2. *p.* 63.
Sedum luteum murale ſpicatum, folio umbilicato rotundo. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 470. *ſ.* 12. *t.* 10. *f.* 4.
Habitat in Luſitania. ♄

6. CO-

laciniata. 6. COTYLEDON foliis laciniatis, floribus quadrifidis. *Hort. cliff.* 175. *Roy. lugdb.* 454.
Cotyledon afra, folio craſſo lato laciniato, floſculo aureo. *Boerh. lugdb.* 1. *p.* 288. *t.* 288.
Telephium africanum, anguſtiori folio, flore aurantiaco. *Pluk. alm.* 362. *t.* 228. *f.* 3.
Habitat in Ægypto. ♄

SEDUM.

* *Planifolia.*

verticillatum. 1. SEDUM foliis quaternis. *Amœn. acad.* 2. *p.* 252. *t.* 4. *f.* 14. *
Sedum aparines facie, tauromenitanum. *Raj. extr.* 233. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 473.
Habitat in Europa *maxime auſtrali*, & Sibiria. ♄

Telephium. 2. SEDUM foliis planiuſculis ſerratis, corymbo folioſo, caule erecto.
Sedum foliis planiuſculis patentibus ſerratis, corymbo terminali. *Hort. cliff.* 176. *Fl. ſuec.* 386. *Mat. med.* 217. *Roy. lugdb.* 456.
Telephium vulgare. *Bauh. pin.* 287.
album, Telephium album. *Fuchſ. hiſt.* 800.
purpureum β. Telephium purpureum majus. *Bauh. pin.* 287.
γ. Telephium purpureum minus. *Bauh. pin.* 287. *prodr.* 133.
δ. Telephium latifolium peregrinum. *Bauh. pin.* 287.
maximum. ε. Sedum foliis ovalibus ſerratis, umbellis in alis foliorum. *Hall. helv.* 35.
Telephium hiſpanicum 1. *Cluſ. hiſt.* 2. *p.* 66.
Telephium repens, folio deciduo. *Bauh. pin.* 287.
Anacampſeros maxima. *Bauh. hiſt.* 3. *p.* 682.
Habitat in Europæ *ſicciſſimis.* ♃

Anacampſeros. 3. SEDUM foliis cuneiformibus integerrimis, caulibus decumbentibus, floribus corymboſis.
Sedum foliis ſpathulatis indiviſis, umbella terminali. *Sauv. monſp.* 77.
Telephium VI. Cepæa plancii. *Cluſ. hiſt.* 2. *p.* 67.
Anacampſeros minor, rotundiore folio, ſempervirens. *Bauh. hiſt.* 3. *p.* 682.
Habitat in - - - - - ♃

Aizoon 4. SEDUM foliis lanceolatis ſerratis planis, caule erecto, cyma ſeſſili terminali.
Sedum foliis planis ſerratis, corymbo folioſo. *Hort. upſ.* 116. *

Ana-

Anacampſeros flore flavo. *Amm. ruth.* 96. *t.* 11.
Habitat in Sibiria. ♄

5. SEDUM foliis cuneiformibus concavis ſubdentatis aggregatis, ramis repentibus, coma terminali. *Hort. upſ.* 116. *hybridum.*
Sedum minus repens, chamædryos foliis, e ſingulis foliorum alis radices agens. *Amm. ruth.* 93.
Habitat in Tataria *ad radices montium uralenſium.* ♄

6. SEDUM foliis planiuſculis angulatis, floribus lateralibus ſeſſilibus ſolitariis. *Hort. cliff.* 176. *Roy. lugdb.* 456. *ſtellatum.*
Sedum echinatum vel ſtellatum, flore albo. *Baub. hiſt.* 3. *p.* 680.
Cotyledon ſtellata. *Baub. pin.* 295.
Habitat in Italia, Gallia, Helvetia.

7. SEDUM foliis planis, caule ramoſo, floribus paniculatis. *Hort. cliff.* 176. * *Roy. lugdb.* 456. *Sauv. monſp.* 76. *Cepæa.*
Sedum annuum album, oblongo portulacæ minoris folio. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 473. *ſ.* 12. *t.* 7. *f.* 37.
Cepæa. *Bauh. pin.* 288. *Cluſ. hiſt.* 2. *p.* 68.
Habitat Monſpelii, Genevæ. ☉

* *Teretifolia.*

8. SEDUM foliis oppoſitis ovatis obtuſis carnoſis, caule infirmo, floribus ſparſis. *daſyphyllum*
Sedum foliis cordato-ovatis compreſſis ſæpius oppoſitis, floribus ſparſis. *Sauv. monſp.* 8.
Sedum foliis ſemiglobosis ſubovatis ſeſſilibus quadrifariam imbricatis. *Wachend. ultr.* 391.
Sedum parvum, folio circinato, flore albo. *Baub. hiſt.* 3. *p.* 691.
Sedum minus, folio circinato. *Bauh. pin.* 283. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 473. *ſ.* 12. *t.* 7. *f.* 35.
Aizoon daſyphyllum. *Dalech. hiſt.* 1133.
Habitat in Helvetia, Luſitania, Hiſpania. ☉

9. SEDUM foliis ſubulatis confertis baſi membranacea ſolutis, floribus cymoſis. *Hort. cliff.* 176. *Ic. gotl.* 178. *Fl. ſuec.* 388. *Roy. lugdb.* 456. *Gort. geir.* 268. *rupeſtre.*
Sedum rupeſtre repens, foliis compreſſis. *Dill. elth.* 343. *t.* 256. *f.* 333.
α. Sedum minus luteum, folio acuto. *Bauh. pin.* 283.

Y. Se-

γ. Sedum minus luteum, ramulis reflexis. *Bauh. pin.* 283.
Habitat ad radices montium Europæ. ♃

album. 10. SEDUM foliis oblongis obtuſis teretiuſculis ſeſſilibus patentibus, cyma ramoſa. *Hort. cliff.* 177. *Fl ſuec.* 387. *Roy. lugdb.* 457. *Hall. helv.* 398.
Sedum minus teretifolium album. *Bauh. pin.* 283.
Vermicularis ſ. Illecebra major. *Lob. hiſt.* 205.
Habitat in Europæ *petris.*

rubens. 11. SEDUM foliis ſubcylindricis obtuſis alternis, cyma ſemper erecta.
Sedum arvenſe, flore rubente. *Bauh. pin.* 283. *prodr.* 132.
Habitat in Gallia, Italia.

acre. 12. SEDUM foliis ſubovatis adnato-ſeſſilibus gibbis erectiuſculis alternis, cyma trifida. *Hort. cliff.* 177. *Fl. ſuec.* 389. *Mat. med.* 218. *Roy. lugdb.* 456.
Sempervivum minus vermiculatum acre. *Bauh. pin.* 283.
Illecebra ſ. Sempervivum tertium. *Dod. pempt.* 129.
Habitat in Europæ *campis ſicciſſimis ſteriliſſimis.* ♃

ſexangulare. 13. SEDUM foliis ſubovatis adnato-ſeſſilibus gibbis erectiuſculis ſexfariam imbricatis. *Fl. ſuec.* 390.
Sempervivum minus vermiculatum inſipidum. *Bauh. pin.* 284?
Sempervivum minimum. *Cam. epit.* 856.
Habitat in Europæ *borealis campis apricis ſiccis.* ♃
Differt a præcedenti, cui ſimillimum, Foliis ſexfariam oblique imbricatis, Ramis nunquam copioſis, ut ceſpitem conſtituant, Floribus in ſingulo ramo cymæ raro ultra tres.

annuum. 14. SEDUM caule erecto ſolitario annuo, foliis ovatis ſeſſilibus gibbis alternis, cyma recurva. *Fl. ſuec.* 391.
Sedum minimum non acre, flore albo. *Raj. angl.* 3. *p.* 270. *t.* 12. *f.* 2. *figura tenus.*
Habitat in Europa *boreali.* ⊙

villoſum. 15. SEDUM caule erecto, foliis planiuſculis, pedunculiſque ſubpiloſis.
Sedum paluſtre ſubhirſutum purpureum. *Bauh. pin.* 283.
Sedum minus III. ſ. paluſtre. *Cluſ. hiſt.* 2. *p.* 59.
Habitat in pratis paludoſis Germaniæ, Angliæ, Galliæ.

PENTHORUM.

ſedoides. 1. PENTHORUM. *Gron. virg.* 51.* *Act. upſ.* 1744. *p.* 12. *t.* 2.
Habitat in Virginia. ♃. ⊙

OXA-

OXALIS.

** Scapo radicali.*

1. OXALIS ſcapo unifloro, foliis ternatis, radice ſqua- *Acetoſella.*
moſo-articulata. *Hort. cliff.* 175. *Fl. ſuec.* 385. *Roy. lugdb.* 458. *Mat. med.* 216.
Oxalis foliis ternatis, ſcapo unifloro. *Fl. lapp.* 194.
Trifolium acetoſum vulgare. *Bauh. pin.* 330.
Trifolium acetoſum. *Dod. pempt.* 578.
β. Oxys flore ſubcæruleo. *Tournef. inſt.* 88.
γ. Oxys flore purpuraſcente. *Tournef. inſt.* 88.
Habitat in Europæ *borealis ſylvis.* ♃

2. OXALIS ſcapo unifloro, foliis ternatis, radice bul- *purpurea.*
boſa. *Hort. cliff.* 175. *Roy. lugdb.* 458.
Oxalidi affinis planta bulboſa africana, flore purpureo magno. *Breyn. cent.* 102. *t.* 46.
Oxys bulboſa africana rotundifolia, caulibus & floribus purpureis amplis. *Comm. hort.* 1. *p.* 41. *t.* 21.
Oxys bulboſa trifolia hirſuta, flore albo. *Burm. afr.* 67. *t.* 27. *f.* 3.
Habitat in Æthiopia. ♃

3. OXALIS ſcapo unifloro, foliis ternatis ſemibifidis: *longiflora.*
lobis lanceolatis.
Habitat in Virginia.
Caulis *nudus, ſimplex, ſquamis aliquot adſperſus, e radice per terram exit terminatus Umbella ex foliis novem & flore unico.* Folia *petiolata, ternata: foliolis ſeſſilibus plus quam ſemibifidis: lobis lanceolatis.* Pedunculus *uniflorus, in medio ſtipularum pari notatus.* Flos *unicus, longus.*

4. OXALIS ſcapo unifloro foliis ternatis bipartitis. *flava.*
Oxalis bulboſa, anguſtis digitatis foliis, flore ſolitario luteo. *Burm. afr.* 68. *t.* 27. *f.* 4.
Oxys africana bulboſa, floribus amplis luteis, foliis minimis hirſutis. *Raj. ſuppl.* 549.
Oxalis africana bulboſa, foliis ſimpliciter decaphyllis, flore flavo. *Burm. afr.* 69. *t.* 27. *f.* 5.
Oxalis bulboſa, ſimplici caule ad ſummum folioſo, flore luteo. *Burm. afr.* 81. *t.* 30. *f.* 1.
Habitat in Æthiopia. ♃

5. OXALIS pedunculis unifloris, caule dichotomo. *incarnata.*
Oxalis caule bulbifero. *Hort. cliff.* 175. *Roy. lugdb.* 458.

Oxys bulboſa æthiopica minor, folio cordato, flore ex albido purpuraſcente. *Comm. hort.* 1. *p.* 43. *t.* 22.
Habitat in Æthiopia. ♃

violacea. 6. OXALIS ſcapo umbellifero, foliis ternatis obcordatis.
Oxalis caule aphyllo, flore purpureo, radice tuberoſa rotunda. *Gron. virg.* 161.
Oxys purpurea virginiana, radice lilii more nucleata. *Pluk. alm.* 274. *t.* 102. *f.* 4.
Habitat in Virginia, Canada. ♃

Pes capræ. 7. OXALIS ſcapo umbellifero, foliis ternatis bipartitis.
Oxalis bulboſa pentaphylla & hexaphylla, floribus magnis luteis & copioſis. *Burm. afr.* 80. *t.* 29.
Habitat in Æthiopia. ♃

ſenſitiva. 8. OXALIS ſcapo umbellifero, foliis pinnatis. *Fl. zeyl* 180.
Oxyoides malabarica ſenſitiva, caule viridi glabro, flore luteo majore. *Garc. act. angl.* 1730. *p.* 379. *t.* 2.
Herba Mimoſa malabarienſium. *Zan. hiſt.* 199. *t.* 61.
Herba viva. *Cluſ. exot.* 290.
Herba viva foliis polypodii. *Bauh. pin.* 259.
Todda vaddi. *Rheed. mal.* 9. *p.* 33. *t.* 19.
Habitat in India.

* * *Foliis caulinis alternis.*

verſicolor. 9. OXALIS caule ſimplici, pedunculo unifloro abbreviato, foliis filiformibus ſubramoſis.
Oxalis bulboſa trifolia, foliis linearibus obtuſis, flore externe rubro, intus albo. *Burm. afr.* 65. t. 27. *f.* 1.
Oxys africana, foliis tenuiſſimis in ſummitate caulis. *Raj. ſuppl.* 598.
β. Oxys bulboſa africana anguſtifolia, flore rubro obſoleto amplo. *Raj. ſuppl.* 548.
Oxys africana, foliis tenuiſſimis, flore amplo verſicolore. *Pluk. amalth.* 169. *t.* 434. *f.* 6.
Oxalis bulboſa anguſtifolia, caule folioſo, flore rubro. *Burm. afr.* 66. *t.* 27. *f.* 2.
Habitat in Æthiopia. ♃

hirta. 10. OXALIS caule ramoſo, pedunculis unifloris, foliis ſeſſilibus lanceolatis.
Oxalis caule ramoſo, foliis lineari-lanceolatis ſeſſilibus, floribus lateralibus ſolitariis. *Roy. lugdb.* 532.
Oxalis radice longa fibroſa, caulibus ramoſis, foliis ternis anguſtis, florum petiolis longiſſimis. *Burm. afr.* 71. *t.* 28. *f.* 2.

Oxys

Oxys africana, hirſutis latioribus foliis, flore magno purpureo. *Pluk. amalth.* 164.

β. Oxalis bulboſa, foliis anguſtis ternis hirtis, flore purpureo. *Burm. afr.* 70. *t.* 28. *f.* 1.

Oxys africana bulboſa, flore purpureo, caule folioſo. *Raj. ſuppl.* 599.

Oxys africana bulboſa, dorychnii monſpelienſium parvis foliis, floribus purpureis amplis. *Pluk. amalth.* 164. *t.* 434. *f.* 7.

Habitat in Æthiopia.

11. OXALIS caule ramoſo diffuſo, pedunculis umbelliferis. *Hort. cliff.* 175. *Hort. upſ.* 116. *Roy. lugdb.* 458. *Sauv. monſp.* 173. *Gort. gelr.* 91. *corniculata.*

Oxys flavo flore. *Cluſ. hiſt.* 2. *p.* 249.

Trifolium acetoſum corniculatum. *Bauh. pin.* 330. luteum minus repens. etjam procumbens. *Moriſ. hiſt.* 2. *p.* 183. *ſ.* 2. *t.* 17. *f.* 2.

Habitat in Italia, Sicilia. ☉

Confer. Oxalis lutea annua, floribus dentatis. *Few. per.* 3. *p.* 49. *t.* 24.

12. OXALIS caule ramoſo erecto, pedunculis umbelliferis. *Gron. virg.* 161. *ſtricta.*

Oxys americana erectior. *Tournef. inſt.* 80.

Trifolium acetoſum corniculatum luteum majus rectum indicum ſ. virgineum. *Moriſ. hiſt.* 2. *p.* 184. *ſ.* 2. *t.* 17. *f.* 3.

Habitat in Virginia.

13. OXALIS caule fruticoſo, foliis ternatis: intermedio petiolato. *fruteſcens.*

Oxys lutea fruteſcens, trifolii bituminoſi facie. *Plum. ſpec.* 2.

Habitat in America *meridionali.* ♄

AGROSTEMMA.

1. AGROSTEMMA hirſuta, calycibus corollam æquantibus, petalis integris nudis. *Githago.*

Agroſtemma. *Hort. cliff.* 175. *Fl. ſuec.* 383. *Roy. lugdb.* 449.

Lychnis ſegetum major. *Bauh. pin.* 204.

Lolium *Fuchſ. hiſt.* 127.

Habitat inter Europæ *ſegetes.* ☉

Cœli roſa. 2. AGROSTEMMA glabra, foliis lineari-lanceolatis, petalis emarginatis coronatis. *Hort. upſ.* 115. *
Lychnis ſegetum, Nigellaſtrum minus glabrum dicta, flore eleganter rubello. *Moriſ. hiſt.* 2. *p.* 543. *ſ.* 5. *t.* 22. *f.* 32.
Lychnis foliis glabris, calyce duriore. *Bocc. ſic.* 27.
PſeudoMelanthium glabrum ſiculum. *Raj. hiſt.* 999.
Habitat in Sicilia. ☉

Coronaria. 3. AGROSTEMMA tomentoſa, foliis ovato-laciniatis, petalis integris coronatis. *Hort. upſ.* 115.
Coronaria. *Hort. cliff.* 174. *Roy. lugdb.* 449.
Lychnis coronaria dioſcoridis ſativa. *Bauh. pin.* 203.
Lychnis. *Cam. epit.* 569.
Habitat in Italia. ♂

Flos jovis. 4. AGROSTEMMA tomentoſa, petalis emarginatis.
Lychnis coronaria ſylveſtris. *Bauh. pin.* 204. *Moriſ. hiſt.* 2. *p.* 540. *ſ.* 5. *t.* 36. *f.* 2.
Lychnis umbellifera montana helvetica. *Zan. hiſt.* 128. *t.* 51. *Raj. hiſt.* 993.
Habitat in Helvetia.

LYCHNIS.

chalcedonica 1. LYCHNIS floribus faſciculatis faſtigiatis. *Hort. cliff.* 174. *Hort. upſ.* 115. *Roy. lugdb.* 449.
Lychnis hirſuta, flore coccineo, major. *Bauh. pin.* 203.
Flos conſtantinopolitanus. *Dod. pempt.* 178.
Habitat in Tataria. ♃

Flos cuculi. 2. LYCHNIS petalis quadrifidis, fructu ſubrotundo. *Hort. cliff.* 174. *Fl. ſuec.* 304. *Roy. lugdb.* 139.
Caryophyllus pratenſis, flore laciniato ſimplici ſ. Flos cuculi. *Bauh. pin.* 210.
β. Caryophyllus pratenſis, flore pleno. *Bauh. pin.* 210.
Odontites plinii. *Cluſ. hiſt.* 1. *p.* 292. 293.
Habitat in partis Europæ *humidiuſculis.* ♃

Viſcaria. 3. LYCHNIS petalis integris.
Silene floribus pentagynis, capſulis quinquelocularibus. *Hort. cliff.* 172. *Fl. ſuec.* 364. *Roy. lugdb.* 445.
Lychnis ſylveſtris viſcoſa rubra anguſtifolia. *Bauh. pin.* 205.
Lychnis ſylveſtris VI. *Cluſ. hiſt.* 1. *p.* 289.
Habitat in Europæ *ſeptentrionalis pratis ſiccis.* ♃

alpina. 4. LYCHNIS petalis bifidis corymboſis.
Silene floribus corymboſis, caule erecto, foliis lanceolato-linearibus. *Roy. lugdb.* 447.

Silene lapponica alpina, facie viſcariæ. *Fl. lapp.* 185. *
Silene floribus in capitulum congeſtis. *Hall. helv.* 376. *t.* 7.
Habitat in Alpibus Lapponicis, Helveticis, Sibiricis, Pyrenaicis. ♃ ♄

5. LYCHNIS petalis bifidis, caule dichotomo, foliis ſub-hirtis. *ſibirica.*
Habitat in Sibiria. *Gmelin.* ♃
Statura Silenes rupeſtris, ſed Radix perennis, Folia minus glabra, & Styli 5 diſtingvunt plantam.

6. LYCHNIS floribus dioicis. *Hort. cliff.* 171. *Fl. ſuec.* 361. *Roy. lugdb.* 448. *dioica.*
Cucubalus caule compoſito, calycibus oblongo-ovatis. *Fl. lapp.* 182.
Lychnis ſylveſtris ſ. aquatica purpurea ſimplex. *Bauh. pin.* 204.
Lychnis ſylveſtris noctiflora alba ſimplex, calyce ampliſſimo. *Till. piſ.* 105. *t.* 41. *f.* 1.
Melandrium plinii genuinum. *Cluſ. hiſt.* 1. *p.* 294. mas.
β. Cucubalus floribus hermaphroditis pentagynis, capſulis unilocularibus. *Hort. cliff.* 170.
Lychnis ſylveſtris alba ſimplex. *Bauh. pin.* 204.
γ. Lychnis alba multiplex. *Bauh. pin.* 204.
Habitat in Europæ *frigidæ pratis ſucculentis.* ♃

7. LYCHNIS calyce inflato, corolla calyce breviore, caule ſubunifloro. *apetala.*
Cucubalus caule ſimpliciſſimo unifloro, petalis calyce brevioribus. *Fl. ſuec.* 363.
Cucubalus caule ſimpliciſſimo unifloro, corolla incluſa. *Fl. lapp.* 181. *t.* 12. *f.* 1.
Habitat in Alpibus Lapponicis, Sibiricis.
In Sibiria planta caule multifloro lecta eſt.

CERASTIUM.

* *Capſulis oblongis.*

1. CERASTIUM foliis connatis. *Hort. cliff.* 173. *Hort. upſ.* 115. *Roy. lugdb.* 450. *perfoliatum.*
Myoſotis orientalis perfoliata, lychnidis folio. *Tournef. cor.* 18. *Dill. elth.* 295. *t.* 217. *f.* 284.
Habitat in Græcia. ⊙

2. CERASTIUM erectum villoſo-viſcoſum. *Hort. cliff.* 174. *Fl. ſuec.* 379. *Roy. lugdb.* 450. *viſcoſum.*

Ceraſtium corolla calyci æquali. *Fl. lapp.* 193.
Myoſotis hirſuta altera viſcoſa. *Vaill. pariſ.* 142. *t.* 30. *f.* 1.
Alſine hirſuta altera viſcoſa. *Bauh. pin.* 257.
Habitat in Europæ *pratis macilentis.* ⊙

ſemidecandrum. 3. CERASTIUM floribus pentandris, petalis emarginatis. *Hort. cliff.* 173. *Fl. ſuec.* 382. *It. œl.* 17. *Roy. lugdb.* 450. *Gron. virg.* 51. *Gort. gelr.* 90.
Ceraſtium corolla calyce breviore. *Fl. lapp.* 193.
Ceraſtium hirſutum minus, parvo flore. *Raj. angl.* 3. *p.* 348. *t.* 15. *f.* 1.
Myoſotis arvenſis hirſuta minor. *Vaill. pariſ.* 142. *t.* 30. *f.* 2.
Habitat in campis apricis ſteriliſſimis Europæ *borealis.* ⊙
Filamenta *huic* 5 *ſterilia,* 5 *antherifera.*

pentandrum. 4. CERASTIUM floribus pentandris, petalis integris. *Læfl. deſcr.* 26.
Habitat in Hiſpania.
Planta *minima, ſimilis C. ſemidecandro, a quo differt: colore viridi nec incano. Staminibus* 5 *fertilibus; nec* 5 *aliis anthera deſtitutis. Petalis calyce longe brevioribus lanceolatis acutis; nec acute emarginatis.*

arvenſe. 5. CERASTIUM foliis lineari-lanceolatis obtuſis glabris, corollis calyce majoribus. *Fl. ſuec.* 381.
Ceraſtium foliis calycibusque hirſutis. *Hort. cliff.* 174. *Roy. lugdb.* 450.
Myoſotis arvenſis hirſuta, flore majore. *Vaill. pariſ.* 141. *t.* 30. *f.* 4.
Caryophyllus arvenſis hirſutus, flore majore. *Bauh. pin.* 210.
Habitat in Scania & *auſtraliori* Europa. ♃

dichotomum 6. CERASTIUM foliis lanceolatis, caule dichotomo ramoſiſſimo, capſulis erectis. *Roy. lugdb.* 450.
Lychnis ſegetum minor. *Bauh. pin.* 204.
Alſine corniculata. *Cluſ. hiſt.* 2. *p.* 184.
Habitat inter ſegetes Hiſpaniæ. ⊙

alpinum. 7. CERASTIUM foliis ovato-lanceolatis, caule diviſo, capſulis oblongis.
Ceraſtium foliis lanceolatis, corollis calyce majoribus. *Fl. ſuec.* 380.
Ceraſtium foliis lanceolato-ovatis, caule ſubunifloro. *Roy. lugdb.* 451.

Cera-

Ceraſtium corolla calyce majore. *Fl. lapp.* 192.
Alſine myoſotis facie, lychnis alpina, flore amplo niveo, repens. *Raj. angl.* 3. *p.* 349. *t.* 15. *f.* 2.
Habitat in Alpibus Europæ.

* *Capſulis ſubrotundis,*

8. CERASTIUM foliis lanceolatis, pedunculis ramoſis, capſulis ſubrotundis. *repens.*
Ceraſtium caule perenni procumbente, foliis lanceolatis tomentoſis. *Roy. lugdb.* 450.
Ceraſtium perenne procumbens. *Hort. cliff.* 174.
Myoſotis arvenſis, polygoni folio. *Vaill. pariſ.* 141. *t.* 30. *f.* 5.
Lychnis incana repens. *Bauh. pin.* 206.
Habitat in Gallia, Italia. ♃

9. CERASTIUM foliis linearibus acuminatis glabris, pedunculis unifloris ſubtomentoſis, capſulis globoſis. *ſtrictum.*
Myoſotis caule hirſuto, foliis peranguſtis glabris, flore calycem excedente. *Hall. helv.* 384. *t.* 5. *f.* 1.
Alſine apina ſubhirſuta, linariæ folio. *Scheuch. alp.* 2. *p.* 130.
Caryophyllus holoſteus alpinus, foliis ſtrictiſſimis glabris acutis, flore magno. *Burſ. XI.* 119.
Habitat in Alpibus Auſtriacis, Helveticis.

10. CERASTIUM caule perenni procumbente, foliis lineari-lanceolatis ſubhirſutis. *ſuffruticoſ.*
Myoſotis tenuiſſimo folio rigido. *Tourneſ. inſt.* 205.
Habitat in Europa *auſtrali.* ♄

11. CERASTIUM foliis lanceolatis ſcabris, petalis crenatis, capſulis globoſis. *maximum.*
Habitat in Sibiria. D. *Gmelin.*

12. CERASTIUM foliis cordatis ſeſſilibus, floribus ſolitariis, fructibus pendulis. *aquaticum.*
Alſine major. *Bauh. pin.* 250.
Alſine maxima ſolanifolia. *Mentz. pug.* 2. *t.* 1. *f.* 3.
Habitat ad littora lacuum Europæ. ♃

13. CERASTIUM foliis ovatis ſubtomentoſis, ramis unifloris, capſulis globoſis. *latifolium.*
Caryophyllus holoſteus alpinus latifolius. *Bauh. pin.* 211. *prodr.* 104.
Habitat in Alpibus Helvetiæ. ♃

 14. CE-

tomentoſum. 14. CERESTIUM foliis oblongis tomentoſis, pedunculis ramoſis, capſulis globoſis.
Ceraſtium foliislanceolato-linearibus ſubhirſutis, corolla calycem ſuperante. *Sauv. monſp.* 142.
Caryophyllus holoſteus tomentoſus latifolius. *Bauh. pin.* 210. *prodr.* 104.
β. Caryophyllus holoſteus tomentoſus anguſtifolius. *Bauh. pin.* 210. *prodr.* 104.
Habitat in Granada. ♃

SPERGULA.

arvenſis. 1. SPERGULA foliis verticillatis, floribus decandris. *Hort. cliff.* 173. *Fl. ſuec.* 377. *Roy. lugdb.* 451.
Spergula fructu pendulo. *Fl. lapp.* 190.
Spergula. *Dod. pempt.* 527.
Alſine Spergula dicta major. *Bauh. pin.* 251.
Habitat in Europæ *agris.* ⊙

pentandra. 2. SPERGULA foliis verticillatis, floribus pentandris. *Lœfl. deſcr.* 23.
Spergula foliis filiformibus verticillatis raris, ſeminibus nigris. *Sauv. monſp.* 167.
Alſine ſpergulæ facie minima, ſeminibus emarginatis. *Tournef. inſt.* 244. *Vaill. pariſ.* 8.
Alſine ſpergulæ facie minima. *Magn. monſp.* 14.
Arenaria teretifolia verna, flore albo, ſemine limbo foliaceo cincto. *Rupp. jen.* 101.
Spergula annua, ſemine foliaceo nigro circulo membranaceo albo cincto - - - *Moriſ. hiſt.* 2. *p.* 551. *blæſ.* 28. *Dill. giſſ.* 46. *E. N. C. cent.* 5. *p.* 275. *t.* 4.
Habitat in Germania, Gallia. Anglia, Hiſpania. ⊙

nodoſa. 3. SPERGULA foliis oppoſitis ſubulatis lævibus, caulibus ſimplicibus.
Spergula foliis oppoſitis, pedunculis ſimplicibus. *Hort. cliff.* 173. *Fl. ſuec.* 378. *Roy. lugdb.* 451.
Alſine nodoſa germanica. *Bauh. pin.* 251.
Alſine paluſtris, ericæ folio, polygonoides, articulis crebrioribus, flore albo pulchello. *Pluk. alm.* 23. *t.* 7. *f.* 4.
Polygonum, foliis gramineis, alterum. *Lœſ. pruſſ.* 204. *t.* 64.
Habitat in Europæ *frigidioris campis ſubhumidis.* ♃

4. SPER-

4. SPERGULA foliis oppoſitis ſubulatis ciliatis faſciculatis. *laricina.*
Habitat in Sibiria. *D. Gmelin.*

5. SPERGULA foliis oppoſitis linearibus lævibus, pedunculis ſolitariis longiſſimis, caule repente. *saginoides.*
Alſine tenuifolia, pedunculis florum longiſſimis. *Vaill. pariſ.* 8. *Sauv. monſp.* 142.
Habitat in Gallia, Sibiria. *D. Gmelin.*

DECAGYNIA.

NEURADA.

1. NEURADA. *Hort. upſ.* 117. *procumbens.*
Chamædrifolia tomentoſa maſcarienſis. *Pluk. alm.* 97. *t.* 275. *f.* 6.
Habitat in Ægypto, Arabia. ⊙

PHYTOLACCA.

1. PHYTOLACCA foliis integerrimis. *Hort. cliff.* 177. *Hort. upſ.* 117. *Gron. virg.* 161. *Roy. lugdb.* 222. *americana.*
Phytolacca vulgaris. *Dill. elth.* 318. *t.* 239. *f.* 309.
Solanum racemoſum americanum. *Pluk. alm.* 353. *t.* 225. *f.* 3.
β. Phytolacca mexicana, baccis ſeſſilibus. *Dill. elth.* 218 *t.* 239. *f.* 308.
Habitat in Virginia, Mexico. ♃

2. PHYTOLACCA foliis ſerratis. †
Nalagu. *Rheed. mal.* 2. *p.* 43. *t.* 26. *Raj. hiſt.* 1635? *aſiatica.*
Habitat in Malabaria.

Claſſis XI.

DODECANDRIA

Stamina inter XI & XIX incluſive

MONOGYNIA.

ASARUM.

europæum. 1. ASARUM foliis reniformibus obtuſis binis.
Aſarum foliis ſubcordatis petiolatis. *Hort. cliff.* 178. *Fl. ſuec.* 392. *Mat. med.* 219. *Guett. ſtamp.* 198. *Roy. lugdb.* 207.
Aſarum. *Bauh. pin.* 197. *Cam. epit.* 19.
Habitat in Europæ *nemoribus.* ♃

canadenſe. 2. ASARUM foliis reniformibus mucronatis.
Aſarum foliis ſubcordatis petiolatis. *Gron. virg.* 52.
Aſarum canadenſe, mucronato folio. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 511. *ſ.* 13. *t.* 7. *f.* 4.
Aſarum canadenſe. *Corn. canad.* 24. *t.* 25.
Habitat in Canada. ♃
An varietas præcedentis; ſic ſuadent Folia bina; diſſuadent alia.

virginicum. 3. ASARUM foliis cordatis obtuſis glabris petiolatis. *Gron. virg.* 162.
Aſarum virginianum, piſtolochiæ foliis ſubrotundis, cyclaminis more maculatis. *Pluk. alm.* 53. *t.* 78. *f.* 2. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 511. *ſ.* 17. *t.* 7. *f.* 3.
Habitat in Virginia, terra Mariana, Carolina. ♃

Hypociſtis. 4. ASARUM foliis ſeſſilibus imbricatis, floribus quadrifidis. *Mat. med.* 220.
Aſarum aphyllum ſquamoſum. *Sauv. monſp.* 4.
Hypociſtis. *Bauh. pin.* 465. *Cam. epit.* 96. 97. *Cluſ. hiſt.* 1. *p.* 68. 79.
Habitat in Hiſpania, Luſitania *paraſitica ciſti*

GETHYLLIS.

afra. 1. GETHYLLIS. *Hort. cliff.* 493. *
Habitat in Africa.
Statura Croci.

RHI-

RHIZOPHORA.

1. RHIZOPHORA foliis ovato-oblongis obtuſiuſculis integerrimis, calycibus ſeſſibilibus, fructibus cylindraceo-ſubulatis. *Fl. zeyl.* 181. * *conjugata.*
Habitat in India. ♄

2. RHIZOPHORA foliis ovato-lanceolatis integerrimis, radice terræ ſuperimpoſita. *gymnorhiza.*
Rhizophora calycum laciniis perſiſtentibus patentibus verſus fructum incurvatis. *Wackend. ult.* 89.
Candel. *Rheed. mal.* 6. *p.* 57. *t.* 31. 32. *Raj. hiſt.* 1769.
Habitat in Indiæ *ripis ſalſis.* ♄

3. RHIZOPHORA foliis obtuſis, pedunculis bigeminatis folio longioribus, fructibus ſubulatis. *Candel.*
Tſierou-Kandel. *Rheed. mal.* 6. *p.* 63. *t.* 35. *Raj. hiſt.* 1770.
Habitat in Indiæ *ſalſis.* ♄

4. RHIZOPHORA foliis acutis, fructibus ſubulato-clavatis. *Mangle.*
Rhizophora ſegmentis calycum perſiſtentibus reflexis, fructu acuminato. *Wach. ultr.* 90.
Mangles aquatica, foliis ſubrotundis & punctatis. *Plum. gen.* 13.
Mangle pyri foliis, cum ſiliquis longis, ficui indicæ affinis. *Bauh. hiſt.* 1. *p.* 415. *Sloan. jam.* 155. *hiſt.* 2. *p.* 63.
Peckandel. *Rheed. mal.* 66. *p.* 91. *t.* 34. *Raj. hiſt.* 1770.
Habitat in paludibus Caribæarum, Malabariæ. ♄

5. RHIZOPHORA fructibus cylindricis obtuſis. *cylindrica.*
Kari-Kandel. *Rheed. mal.* 6. *p.* 59. *t.* 33. *Raj. hiſt.* 1770.
Habitat in uliginoſis Malabariæ. ♄

SAMYDA.

1. SAMYDA. *Amœn. acad.* 1. *p.* 401. * *Guidonia.*
Guidonia, nucis juglandis folio, major. *Plum. gen.* 24.
β Guidonia, nucis juglandis folio, minor. *Plum. gen.* 24.
Habitat in America *calidiore.* ♄

GARCINIA.

1. GARCINIA. *Hort. cliff.* 182. *Mangoſtana*

Man-

Mangoſtans. *Garc. act. angl.* 431. *t.* 1. *Bont. jav.* 115.
Mangoſtana. *Rumpf. amb.* 1. *p.* 132. *t.* 43.
Laurifolia javanenſis. *Bauh. pin.* 461. *Raj. hiſt.* 1662.
Habitat in Java. ♄

STYRAX.

officinale. 1. STYRAX. *Hort. cliff.* 187. *Hort. upſ.* 122. *Mat. med.* 227. *Roy. lugdb.* 265. *Sauv. monſp.* 306.
Styrax folio mali cotonei. *Bauh. pin.* 452.
Styrax. *Cam. epit.* 38.
Habitat in Syria, Judæa, Italia. ♄

CRATEVA.

Tapia. 1. CRATEVA inermis. *Fl. zeyl.* 211.
Crateva. *Hort. cliff.* 484.
Apioſcorodon ſ. Arbor americana triphyllos, allii odore, poma ferens. *Pluk. alm.* 34. *t.* 137. *f.* 7.
Niirvala. *Rheed. mal.* 3. *p.* 49. *t.* 22.
Habitat in India *utraque.* ♄

Marmelos. 2. CRATEVA ſpinoſa. *Fl. zeyl.* 212.
Cucurbitifera trifolia ſpinoſa medica, fructu pulpa cydonii æmula. *Pluk. alm.* 125. *t.* 170. *f.* 5.
Cydonia exotica. *Bauh. pin.* 435.
Covalam. *Rheed. mal.* 3. *p.* 37. *t.* 37.
Habitat in India. ♄

TRIUMFETTA.

Lappula. 1. TRIUMFETTA. *Hort. cliff.* 210.* *Hort. upſ.* 148. *Roy. lugdb.* 476.
Lappula bermundenſis althæoides ſpicata, fructu orbiculari majore. *Pluk. alm.* 206. *t.* 245. *f.* 7.
Agrimonia lappacea inodora, folio ſubrotundo dentato. *Sloan. jam.* 92. *hiſt.* 1. *p.* 211. *Raj. ſuppl.* 247.
Habitat in Jamaica, Braſilia, Bermudis. ♄

PEGANUM.

Harmala. 1. PEGANUM foliis multifidis. *Hort. upſ.* 144.
Peganum. *Hort. cliff.* 206. *Hort. upſ.* 144. *Roy. lugdb.* 461.
Ruta ſylveſtris, flore magno albo. *Bauh. pin.* 336.
Harmala. *Dod. pempt.* 121.

Habi-

Habitat in arena Madritii, Alexandriæ, Cappadociæ, Galatia. ♃

2. PEGANUM foliis indiviſis. *daurica.*
Harmala montana daurica perennis multicaulis, polygalæ folio, flore albo. *Amm. ruth.* 91.
β. Harmala montana, polygalæ foliis, floribus luteis. *Amm. ruth.* 92.
Habitat in Sibiria. ♃

PORTULACA.

1. PORTULACA foliis cuneiformibus, floribus ſeſſilibus. *Roy. lugdb.* 473. *Gron. virg.* 59. *Hort. upſ.* 146. *Mat. med.* 260. *Dalib. pariſ.* 158. *Hall. helv.* 392. *Sauv. monſp.* 168. *oleracea.*
Portulaca foliis cuneiformibus verticillatis ſeſſilibus, floribus ſeſſilibus. *Hort. cliff.* 207.
Portulaca anguſtifolia ſylveſtris. *Bauh. pin.* 288.
β. Portulaca latifolia ſativa. *Bauh. pin.* 288.
Portulaca domeſtica. *Lob. ic.* 388.
Habitat in Europa *auſtrali*, India, *Inſ.* Aſcenſionis, America, ☉

2. PORTULACA foliis ſubulatis alternis: axillis piloſis, floribus ſeſſilibus. *piloſa.*
Portulaca foliis linearibus acutis, caule procumbente piloſo. *Roy. lugdb.* 473.
Portulaca curaſſavica, anguſto longo lucidoque folio, procumbens. *Comm. hort.* 1. *p.* 2. *t.* 5.
Portulaca coraſſavica lanuginoſa procumbens. *Herm. par.* 215. *t.* 215.
Portulaca lanuginoſa procumbens, vermiculatæ foliis, americana. *Pluk. alm.* 304. *t.* 247. *f.* 7. 5.
β. Portulaca coraſſavica lanuginoſa, pſyllii folio, erectior & elatior, flore dilutius rubente. *Herm. par.* 214. *t.* 214.
Portulaca curaſſavica lanuginoſa, kali folio, erector & elatior. *Pluk. alm.* 303. *t.* 165. *f.* 4.
Habitat in America *meridionali.* ☉
Folia *alterna, ſed terminalia ſ. floralia octo in orbem digeſta.* Flores *ſeſſiles, terminales, calyce bifido, Staminibus quindecim, Stylo quinquefido.*

3. PORTULACA foliis ovatis gibbis, pedunculo multifloro, caule fruticoſo. *Anacampſeros.*

Ana-

Anacampſeros foliis ovatis convexis acutiuſculis. *Hort. upſ.* 146.

Anacampſeros foliis acuminatis. *Hort. cliff.* 207. *Roy. lugdb.* 412.

Telephiaſtrum folio globoſo. *Dill. elth.* 375. *t.* 281. *f.* 363.

Portulaca africana ſempervirens, flore rubicundo. *Comm. hort.* 2. *p.* 177. *t.* 89. *Raj. ſuppl.* 507.

Habitat ad Cap. b. ſpei. ♄

Axillæ foliorum piloſæ ſunt, & Folia ſucculenta conjungunt hanc cum Portulacis, quamvis ſtamina plurima &. Capſula apice dehiſcens.

Portulacaſtrum. 4. PORTULACA foliis lanceolatis convexis, pedunculis unifloris.

Portulaca curaſſavica, anguſto longo lucidoque folio. *Herm. par.* 212. *t.* 212.

Habitat in Curaſſao.

Calyx quinquefidus, Capſula horizontaliter diſſiliens.

LYTHRUM.

Salicaria. 1. LYTHRUM foliis oppoſitis cordato-lanceolatis, floribus ſpicatis dodecandris.

Lythrum foliis oppoſitis. *Hort. cliff.* 178. *Fl. ſuec.* 393. *Roy. lugdb.* 458. *Guett. ſtamp.* 2. *p.* 122.

Lythrum floribus verticillatis. *Fl. lapp.* 197.

Lyſimachia ſpicata purpurea. *Bauh. pin.* 246.

Lyſimachia purpurea communis major. *Cluſ. hiſt.* 2. *p.* 51.

β. Blattaria rubra ſpicata major, folio ſubrotundo. *Moriſ. hiſt.* 2. *p.* 490. *ſ.* 5. *t.* 10. *f.* 11.

γ. Lyſimachia trifolia ſpicata purpurea. *Bocc. muſ.* 167.

δ. Lyſimachia quadrifolia purpurea, mollioribus & longioribus foliis. *Bocc. muſ.* 167.

Habitat in Europa *ad ripas aquarum.* ♃

verticillatum. 2. LYTHRUM foliis oppoſitis ſubtus tomentoſis ſubpetiolatis, floribus verticillatis lateralibus.

Lythrum foliis oppoſitis, floribus verticillatis. *Gron. virg.* 52.

Habitat in Virginia.

petiolatum. 3. LYTHRUM foliis oppoſitis linearibus petiolatis, floribus dodecandris.

Lythrum foliis petiolatis. *Gron. virg.* 52.

Habitat in Virginia.

4 LY

4. LYTHRUM foliis oppoſitis linearibus, floribus oppoſitis hexandris. *lineare.*
Lythrum foliis linearibus, floribus hexandris ſolitariis. *Gron. virg.* 162.
Habitat in Virginia.
Caulis *filiformis erectus angulatus* Foliis *oppoſitis linearibus, terminatus ſpica majore & duabus lateralibus minoribus compoſitis ex Floribus oppoſitis remotis, ſub ſingulis folio.* Facies *ſequentis.*

5. LYTHRUM foliis alternis linearibus, floribus hexandris. *Hort. upſ.* 118. *Hyſſopifolia.*
Lythrum foliis alternis. *Hort. cliff.* 178. *Sauv. monſp.* 53. *Roy. lugdb.* 458. *Gort. gelr.* 271.
Salicaria hyſſopi folio latiore. *Hall. jen.* 147. *t.* 2. *f.* 3.
Hyſſopifolia. *Bauh. pin.* 218.
β. Lyſimachia rubra non ſiliquoſa. *Bauh. pin.* 246
γ. Lyſimachia linifolia purpureo-cærulea *Bauh. pin.* 246.
Habitat in Germaniæ, Helvetiæ, Angliæ, Galliæ *inundatis.* ☉

6. LYTHRUM foliis alternis linearibus, floribus tetrapetalis. *thymifolia.*
Lythrum foliis linearibus. *Sauv. monſp.* 49.
Salicaria minima tenuifolia. *Tournef. inſt.* 254.
Hyſſopifolia minor ſ. potius thymifolia maritima. *Bauh. hiſt.* 3. *p.* 792.
Polygonum aquaticum minus. *Barr. ic.* 773. *f.* 2.
Habitat in Italiæ & G. Narbonenſis *uliginoſis.* ☉
Petala 4, *ſtamina* 2, *calyx* 4*dentatus.* Folia *lineari-lanceolata, alterna, ima oppoſita.* Flores *ſolitarii axillares.* Calyx *ſtipulis* 2 *lateralibus fulcitus. D. Sauvages.*

7. LYTHRUM foliis alternis lanceolatis, panicula virgata, floribus dodecandris. *virgatum.*
Salicaria orientalis, ſalicis folio acutiſſimo & glabro. *Tournef. cor.* 18.
Salicaria glabra ramoſiſſima, longiſſimis & anguſtiſſimis foliis. *Amm. ruth.* 89.
Salicaria glabra, longioribus & anguſtioribus foliis *Amm. ruth.* 88.
Habitat in Sibiria, Tataria,
Caulis *paniculatus Ramis alternis longis.* Flores 2 ſ. 3 *pedicellati ex ſingula ala alterna racemi.*

DI-

DIGYNIA.

HELIOCARPUS.

americana. 1. HELIOCARPUS. *Hort. cliff.* 211 * *t.* 16.
Habitat in America *meridionali.* ♄

AGRIMONIA.

Eupatoria. 1. AGRIMONIA foliis caulinis pinnatis, fructibus hiſpidis. *Hort. cliff.* 179. *Fl. ſuec.* 394. *Hort. upſ.* 118. *Mat. med.* 221. *Gron. virg.* 53. *Roy. lugdb.* 240. *Hall. helv.* 407. *Guett. ſtamp.* 1. *p.* 293. *Dalib. pariſ.* 139.
Eupatorium veterum ſ. Agrimonia. *Bauh. pin.* 321.
Eupatorium. *Fuchſ. hiſt.* 244. *Cam. epit.* 756.
β. Agrimonia medio modo odorata. *Moriſ. bleſ.*
γ. Eupatorium odoratum. *Bauh. pin.* 321.
Agrimonia orientalis humilis, radice craſſiſſima repente. *Tournef. cor.* 21.
Habitat in Europæ *pratis apricis argillaceis.* ♃

Agrimonoides. 2. AGRIMONIA foliis caulinis ternatis, fructibus glabris. *Hort. cliff.* 179. *Roy. lugdb.* 241.
Agrimoniæ ſimilis *Bauh. pin.* 321.
Agrimonoides. *Col. ecphr.* 1. *p.* 145. *t.* 144. *Boerh. lugdb.* 1. *p.* 179.
Habitat in Italiæ *nemoribus umbroſis humentibus.*

TRIGYNIA.

RESEDA.

Luteola. 1. RESEDA foliis lanceolatis integris, calycibus quadrifidis.
Reſeda foliis ſimplicibus lanceolatis integris. *Hort. cliff.* 212. *Vir. cliff.* 49. *Fl. ſuec.* 439. *Roy. lugdb.* 403. *Dalib. pariſ.* 160.
Luteola herba ſalicis folio. *Bauh. pin.* 100.
Lutum herba. *Dod. pempt.* 80.
Habitat in Europa *ad vias & pagos.* ☉

canescens. 2. RESEDA foliis ſubulatis ſparſis. *Sauv. monſp.* 48.
Reſeda foliis ſimplicibus oblongis integris. *Guett. ſtamp.* 1. *p.* 225.
Reſeda alba minor. *Bauh. pin.* 100.

Seſa-

Seſamoides ſalmanticum parvum 2. *Cluſ. hiſt.* 1. *p.* 296. *t.* 295.
Habitat in Salmantica.

3. RESEDA foliis linearibus baſi dentatis, floribus tetragynis. *glauca.*
Reſeda linariæ foliis. *Bauh. pin.* 100. *prodr.* 41. *Burſ. IV.* 88.
Reſeda, linariæ folio, glaucum pyrenaicum, flore flammineo. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 601. *ſ.* 15. *t.* 1. *f.* 4.
Reſeda, linariæ Folio, pyrenaica, glauco folio. *Pluk. alm.* 317. *t.* 107. *f.* 2. *Raj. ſuppl.* 511.
Luteola pumila pyrenaica, linariæ folio. *Tourneſ. inſt.* 424.
Habitat in Pyrenæis.

4. RESEDA foliis linearibus obtuſis, floribus pentagynis. *purpuraſcens.*
Reſeda alba minor 1. *Bauh. pin.* 100. *Raj. hiſt.* 1054.
Seſamoides ſalmanticum parvum 1. *Cluſ. hiſt.* 1. *p.* 296.
Seſamoides foliis craſſis, floribus ex herbaceo purpuraſcentibus. *Tourneſ. inſt.* 424.
Habitat in collibus Salmanticis. Monſpelii.

5. RESEDA foliis lanceolatis integris, fructibus ſtellatis. *Seſamoides.*
Seſamoides fructu ſtellato. *Tourneſ. inſt.* 424.
Habitat Monſpelii *in Horto Dei.*

6. RESEDA foliis pinnatis, floribus tetragynis. *Hort. upſ.* 149. *alba.*
Reſeda foliis pinnatis integerrimis. *Hort. cliff.* 212.
Reſeda maxima. *Bauh. pin.* 100. *Lob. hiſt.* 110.
β. Reſeda minor alba, foliis dentatis. *Barr. rar.* 78. *t.* 588.
Habitat Monſpelii. ☉

7. RESEDA foliis omnibus trifidis, inferioribus pinnatis. *Hort. cliff.* 213. *Hort. upſ.* 149. *Roy. lugdb.* 483. *Hall. helv.* 315. *Dalib. pariſ.* 150. *Gort. gelr.* 310. *lutea.*
Reſeda vulgaris. *Bauh. pin.* 100. *Raj. hiſt.* 1053.
Reſeda lutea. *Bauh. hiſt.* 3. *p.* 467.
β. Reſeda gallica criſpa. *Bocc. ſic.* 77. *t.* 41. *f.* 3.
Reſeda maſſilienſis, foliis latioribus criſpis. *Pluk. alm.* 317. *t.* 55. *f.* 4.
Habitat in Europæ *auſtralioris montibus cretaceis.* ☉

8. RESEDA foliis integris trilobisque, calycibus maximis. *Hort.* [illegible] 412. *Dalib. pariſ.* 159. *Phyteuma.*

Reſeda floribus trigynis, calycibus maximis hexaphyllis *Hort. upſ.* 150.

Reſeda minor vulgaris. *Tournef. inſt.* 423.

Reſedæ affinis Phyteuma. *Baub. pin.* 100. *prodr.* 42. *t.* 42.

Erucago apula trifida & quinquefolia. *Col. ecphr.* 267. *t.* 269.

β. Reſeda minor vulgaris, folio minus inciſo. *Tournef. inſt.* 423.

γ. Reſeda minor vulgaris, foliis integris. *Tournef. inſt.* 423. Phyteuma. *Baub. hiſt.* 3. *p.* 386. *fig.*

Habitat in Gallia, Italia. ☉

EUPHORBIA.

* *Fruticoſæ aculeatæ.*

antiquorum. 1. EUPHORBIA aculeata ſubnuda triangularis articulata: ramis patentibus. *Hort. cliff.* 196. * *Hort. upſ.* 138. *Fl. zeyl.* 199. *Mat. med.* 154. *Roy. lugdb.* 194. *Diſſ. euph.* 1. *

Euphorbium antiquorum verum. *Comm. hort.* 1 *p.* 23. *t.* 12.

Schadidacalli. *Rheed. mal.* 2. *p.* 81. *t.* 42.

β. Tithymalus aizoides triangularis & quadrangularis articuloſus & ſpinoſus, ramis compreſſis. *Comm. præl* 21. *t.* 55. *f.* 5.

Habitat in India. ♄

canarienſis 2. EUPHORBIA aculeata nuda ſubquinquangularis, aculeis geminatis. *Hort. cliff.* 196. * *Hort. upſ.* 138. *Roy. lugdb.* 194. *Diſſ, euph.* 2. *

Tithymalus aizoides fruticoſus canarienſis aphyllus quadrangularis & quinquangularis, ſpinis geminis aduncis atronitentibus armatus. *Comm. hort.* 2. *p.* 207 *t.* 104.

Tithymalus aizoides lactifluus ſ. Euphorbia canarienſis quadrilatera & quinquelatera, cerei effigie. *Pluk. alm.* 370. *t.* 320. *f.* 2.

Habitat in Canariis. ♄

heptagona. 3. EUPHORBIA aculeata nuda ſeptemangularis: ſpinis ſolitariis ſubulatis floriferis. *Hort. cliff.* 196. * *Roy. lugdb.* 194. *Diſſ. euph.* 6. *

Euphorbium heptagonum, ſpinis longiſſimis in apice frugiferis. *Boerh. lugdb.* 1 *p.* 258. *t.* 258.

Habitat - - - - ♄

4. EUPHORBIA aculeata nuda: angulis tuberoſis ſpinis interſtinctis. *Diſſ. euph.* 5. *mammillaris*
Euphorbium polygonum, aculeis longioribus ex tuberculorum internodiis prodeuntibus. *Iſn. act.* 1720. *p.* 386.
Tithymalus aizoides africanus, validiſſimis ſpinis ex tuberculorum internodiis provenientibus. *Comm. præl.* 59. *t.* 9.
Habitat in Æthiopia. ♄
Differt ab Heptagona angulis duplicatis toruloſis; ſpinæ ſolitariæ inter ſingula tubercula longitudinaliter digeſta. Flores *non vidi; an ex ſpinarum apice, ut heptagonæ?*

5. EUPHORBIA aculeata nuda multangularis, ſpinis ſolitariis ſubulatis. *Roy. lugdb.* 195. *Diſſ. euph.* 4. *cereiformis.*
Euphorbium polygonum ſpinoſum, cerei effigie. *Iſnard. act.* 1720. *p.* 385.
Euphorbium cerei effigie, caulibus gracilioribus. *Boerh. lugdb.* 1. *p.* 258.
Euphorbium aphyllum anguloſum, florum coma denſiſſima. *Burm. afr.* 19. *t.* 9. *f.* 3.
Tithymalus africanus ſpinoſus, cerei effigie. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 245. *Pluk. alm.* 370. *t.* 231. *f.* 1.
Habitat in Æthiopia. ♄

6. EUPHORBIA aculeata nuda multangularis: aculeis geminatis. *Hort. cliff.* 196. * *Hort. upſ.* 138. *Roy. lugdb.* 195. *Diſſ. euph.* 3. * *officinarum*
Euphorbium polygonum ſpinoſum, cerei effigie. *Iſnard. act.* 1720. *p.* 500. *t.* 10.
Euphorbium cerei effigie, caulibus craſſioribus ſpinis validioribus armatum. *Comm. hort.* 1. *p.* 21. *t.* 11. *Seb. theſ.* 1. *p.* 29. *t.* 19. *f.* 2.
Euphorbium. *Bauh. pin.* 387.
Habitat in Æthiopia & Africa *calidiore.* ♄

7. EUPHORBIA aculeata ſeminuda: angulis oblique tuberculatis. *Hort. cliff.* 196. * *Hort. upſ.* 139. *Fl. zeyl.* 200. *Roy. lugdb.* 194. *Diſſ. euph.* 7. * *neriifolia.*
Euphorbium afrum ſpinoſum, foliis latioribus non ſpinoſis. *Seb. theſ.* 1. *p.* 18. *t.* 9. *f.* 1.
Tithymalus aizoides arboreſcens ſpinoſus, caudice angulari, nerii folio. *Comm. præl.* 22. 56. *t.* 6.
Tithymalus indicus ſpinoſus, nerii folio. *Comm. hort.* 1. *p.* 25. *t.* 13.

Ela Calli. *Rheed. mal.* 2. *p.* 83. *t.* 43.
Habitat in India. ♄

* *Fruticoſæ inermes.*

(*Vel caulis nec dichotomus, nec umbelliferus* 13. 15.)

Caput meduſæ 8. EUPHORBIA inermis imbricata tuberculis foliolo lineari inſtructis. *Hort. cliff.* 197. *Hort. upſ.* 139. *Roy. lugdb.* 195. *Diſſ. euph.* 8.
Planta lactaria africana. *Comm. hort.* 1. *p.* 33. *t.* 17.
Tithymalus aizoides africanus, ſimplici ſquamato caule, chamænerii folio. *Comm. præl.* 58. *t.* 8. & *p.* 23. 57. *t.* 7.
β. Euphorbium anacantum ſquamoſum, lobis florum tridentatis. *Iſnard. act.* 1720. *p.* 502. *t.* 11.
γ. Euphorbium erectum aphyllum, ramis rotundis, tuberculis tetragonis. *Burm. afr.* 16. *t.* 7. *f.* 2.
δ. Euphorbium humile procumbens, ramis ſimplicibus copioſis, caule craſſiſſimo tuberoſo. *Burm. afr.* 20. *t.* 10. *f.* 1.
ε Euphorbium procumbens, ramis plurimis ſimplicibus ſquamoſis, foliis deciduis. *Burm. afr.* 17. *t.* 8.
ζ Euphorbium procumbens, ramis geminatis, caule glabro oblongo cinereo. *Burm. afr.* 18. *t.* 9. *f.* 1.
Habitat in Æthiopia. ♄
Diſtinctiſſima planta petalis palmatis. ♄

viminalis. 9. EUPHORBIA inermis nuda fruticoſa filiformis volubilis: cicatricibus oppoſitis. *Hort. cliff.* 197. * *Hort. upſ.* 140. *Diſſ. euph.* 9. *
Felfel Tavil. *Alp. ægypt.* 190. *t.* 190. *Dill. elth.* 368.
Habitat in Africæ *maritimis.* ♄

mauritanica 10. EUPHORBIA inermis ſeminuda fruticoſa filiformis flaccida, foliis alternis. *Hort. cliff.* 197. *Hort. upſ.* 140. *Roy. lugdb.* 195. *Diſſ. euph.* 10. *
Tithymalus aphyllus mauritaniæ. *Dill. elth.* 384. *t.* 289. & 373.
Habitat in Africæ *maritimis.* ♄

Tirucalli. 11. EUPHORBIA inermis ſubnuda fruticoſa filiformis erecta, ramis patulis determinate confertis. *Hort. cliff.* 197. *Hort. upſ.* 139. *Fl. zeyl.* 197. *Roy. lugdb.* 195. *Diſſ. euph.* 11. *
Tithymalus indicus frutescens. *Comm. hort.* 1. *p.* 27. *t.* 14.
Tithymalus arboreſcens, caule aphyllo. *Pluk. phyt.* 319. *f.* 9.
TiruCalli. *Rheed. mal.* 8. *p.* - - - *t.* 44.
Habitat in India. ♄

12. EUPHORBIA inermis fruticoſa, foliis diſtiche alternis ovatis. *Hort. cliff.* 198. * *Roy. lugdb.* 195. *Diſſ. euph.* 12. * *Tithymaloides.*
Tithymalus curaſſavicus myrtifolius, flore coccineo melliſluo. *Herm. par.* 234. *t.* 234. *myrtifolia.*
Tithymalus curaſſavicus myrtifolius, flore papilionaceo coccineo parvo. *Comm. hort.* 1. *p.* 31. *t.* 16. *Pluk. alm.* 369. *t.* 230. *f.* 2.
β. Tithymaloides laurocéraſi folio non ſerrato. *Dill. elth.* 383. *t.* 288. *f.* 372. *padifolia.*
Habitat in Curaſſao, *at* β. *forte in India.* ♄

13. EUPHORBIA inermis, foliis ſerratis petiolatis difformibus ovatis lanceolatis panduriformibus. *Diſſ. euph.* 13. *heterophylla.*
Tithymalus curaſſavicus, ſalicis & atriplicis foliis variis, caulibus viridantibus. *Pluk. alm.* 369. *t.* 12. *f.* 6.
Tithymalus curaſſavicus, ſalicis & atriplicis foliis hirſutis, caulibus ſubrubentibus. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 336.
Habitat in America *calidiore.*

14. EUPHORBIA foliis oppoſitis ſubcordatis petiolatis emarginatis integerrimis, caule fruticoſo. *Diſſ. euph.* 15. *cotinifolia.*
Euphorbia inermis, caule fruticoſo, foliis oppoſitis ſubcordatis emarginatis, petiolis folio longioribus. *Hort. cliff.* 198. *Roy. lugdb.* 196.
Tithymalus curaſſavicus, folio cotini triphyllos, petalis florum ſerratis. *Pluk. alm.* 369. t. 230. *f.* 3.
Tithymalus arboreus curaſſavicus, cotini folio. *Seb. theſ.* 1. *p.* 75. *t.* 46. *f.* 4.
Tithymalus arboreus americanus, cotini folio. *Comm. hort.* 1. *p.* 29. *t.* 15.
Habitat in Curacao. ♄

15. EUPHORBIA inermis herbacea ramoſa, foliis ſubcordatis integerrimis petiolo brevioribus, floribus ſolitariis. *Diſſ. euph.* 14. *ocymoidea.*
Euphorbia inermis, foliis ſubcordatis obtuſis integerrimis petiolatis, caule ramoſo erecto. *Roy. lugdb.* 199.
Habitat in Campechia. *Houſt.*

* *Dichotomæ (umbella bifida aut nulla).*

16. EUPHORBIA dichotoma, foliis ſerrulatis ovatis obtuſis trinerviis, panicula terminali, caulibus ſimplicibus. *Diſſ. euph.* 17. * *origanoides.*

 Ha-

Habitat in Inſula Aſcenſionis. ♃
Planta refert ita Origanum, ut primo intuitu nequeat non pro eo agnoſci.

hypericifolia 17. EUPHORBIA dichotoma, foliis ſerratis ovali-oblongis glabris, corymbis terminalibus, ramis divaricatis. *Diſſ. euph.* 16. *
Euphorbia inermis, foliis ovalibus oppoſitis hinc ſerratis uniformibus, ramis alternis, caule erectiuſculo. *Hort. cliff.* 198. *Hort. upſ.* 143. * *Roy. lugdb.* 196. *Gron. virg.* 58.
Tithymalus erectus, floribus rarioribus, foliis oblongis glabris integris. *Burm. zeyl.* 224. *t.* 105. *f.* 2.
Tithymalus erectus acris, parietariæ foliis glabris, floribus ad caulium nodos conglomeratis. *Sloan. jam.* 82. *hiſt.* 1. *p.* 197. *t.* 126.
Habitat in India. ☉

hirta. 18. EUPHORBIA dichotoma, foliis ſerrulatis ovatis acuminatis, pedunculis capitatis axillaribus, caulibus piloſis. *Diſſ. euph.* 18. *
Euphorbia inermis, foliis oppoſitis ovalibus ſerratis uniformibus, pedunculis capitatis axillaribus. *Fl. zeyl.* 197. *
Tithymalus botryoides zeylanicus, cauliculis villoſis. *Burm. zeyl.* 223. *t.* 104.
Habitat in India. ☉

pilulifera. 19. EUPHORBIA dichotoma, foliis ſerratis ovali-oblongis, pedunculis bicapitatis axillaribus, caule erecto. *Diſſ. euph.* 19.
Tithymalus botryoides erectus, florum capitulis conjugatis & longiori pediculo inſidentibus. *Burm. zeyl.* 224. *t.* 105. *f.* 1. *Pet. gaz. t.* 80. *f.* 14.
Habitat in India. ☉

thymifolia. 20. EUPHORBIA dichotoma, foliis ſerratis ovali-oblongis, capitulis axillaribus glomeratis ſubſeſſilibus, caulibus procumbentibus. *Diſſ. euph.* 20.
Tithymalus foliis oppoſitis oblique cordatis obtuſis ſerratis, pedunculis multifloris. *Fl. zeyl.* 198.
Tithymalus indicus annuus dulcis, floribus albis, caulibus viridantibus & rubentibus. *Pluk. alm.* 372. *t.* 113. *f.* 2.
β. Tithymalus humilis ramoſiſſimus hirſutus, foliis thymi ſerratis. *Burm. zeyl.* 225. *t.* 105. *f.* 3.
Habitat in India ☉

21. EU-

21. EUPHORBIA dichotoma, foliis ſerratis oblongis *maculata.*
piloſis, floribus axillaribus ſolitariis, ramis patulis.
Tithymalus ſ. Chamæſyce altera virginiana, foliis crenatis & macula fuſca eleganter notatis. *Pluk. alm.* 372. *t.* 65. *f.* 8.
Habitat in America *ſeptentrionali.* ⊙
Caules *dichotomi: Ramis alternis, patentibus, ſupra purpuraſcentibus.* Folia *ovali-oblonga, trinervia, ſubpiloſa, ſerrata, altero latere maxima parte integerrima, tenera adhuc planta notata macula fuſca.* Flores *axillares, ſolitarii, parvi, calyce rufo.*

22. EUPHORBIA dichotoma, foliis crenulatis ſubro- *Chamæſyce.*
tundis, floribus ſolitariis axillaribus, caulibus procumbentibus. *Diſſ. euph.* 22. *
Euphorbia inermis, foliis oblique cordatis ſerrulatis uniformibus, ramis alternis, floribus ſolitariis. *Hort. cliff.* 198. * *Roy. lugdb.* 196. *Gmel. ſib.* 2. *p.* 237.
Chamæſyce. *Bauh. pin.* 293. *Cluſ. hiſt.* 2. *p.* 187.
Habitat in Europa *auſtrali*, Sibiria. ⊙

23. EUPHORBIA dichotoma, foliis integerrimis ſemi- *Peplis.*
cordatis, floribus ſolitariis axillaribus, caulibus procumbentibus. *Diſſ. euph.* 21.
Euphorbia foliis ſubrotundis obtuſis, floribus ſolitariis in foliorum alis. *Guett. ſtamp.* 2. *p.* 420.
Peplis maritima, folio obtuſo. *Bauh. pin.* 293.
Peplis. *Cluſ. hiſt.* 2. *p.* 187. *Cam. epit.* 970.
Peplion. *Dalech. hiſt.* 970.
Habitat in Narbonæ, Hiſpaniæ *maritimis.* ⊙

24. EUPHORBIA foliis oppoſitis integerrimis lanceola- *polygonifolia.*
tis obtuſis, floribus ſolitariis axillaribus, caulibus procumbentibus. *Diſſ. euph.* 23. *
Euphorbia procumbens, ramulis alternis, foliis lanceolato-linearibus, floribus ſolitariis. *Gron. virg.* 58.
Euphorbia minima ramoſiſſima anguſtifolia. *Raj. ſuppl.* 431.
Habitat in Canada, Virginia. ⊙

25. EUPHORBIA dichotoma, foliis integerrimis lance- *Ipecacuanha.*
olatis, pedunculis axillaribus unifloris folia æquantibus, caule erecto. *Diſſ. euph.* 24.
Tithymalus flore exiguo viridi apicibus flavis, antequam folia emittit florens. *Gron. virg.* 58.
Habitat in Virginia, Canada. ♃

[redacted]




IMAGE EVALUATION
TEST TARGET (MT-3)

6″

Photographic
Sciences
Corporation

23 WEST MAIN STREET
WEBSTER, N.Y. 14580
(716) 872-4503



portulacoides. 26. EUPHORBIA dichotoma, foliis integerrimis ovalibus retuſis, pedunculis axillaribus unifloris folia æquantibus, caule erecto. *Diſſ. euph.* 25. *
Tithymalus perennis, portulacæ folio. *Feuill. peruv.* 707. *t.* 2?
Habitat in Philadelphia. *Kalm.* ♃

* *Umbella trifida.*

Peplus. 27. EUPHORBIA umbella trifida: dichotoma, involucellis ovatis, foliis integerrimis obovatis petiolatis *Diſſ. euph.* 27. *
Euphorbia foliis obverſe ovatis integerrimis, umbella univerſali trifida triphylla, partialibus dichotomis diphyllis. *Hort. cliff.* 199. *Fl. ſuec.* 437. * *Roy. lugdb.* 197. *Dalib. pariſ.* 156.
Peplus ſ. Eſula rotunda. *Bauh. pin.* 292.
Peplus. *Fuchſ. hiſt.* 603. *Dod. pempt.* 375.
Habitat in Europæ *cultis oleraceis.* ⊙

falcata. 28. EUPHORBIA umbella trifida: dichotoma, involucellis cordato-ſubfalcatis acutis, foliis lanceolatis obtuſiuſculis. *Diſſ. euph.* 28.
Habitat in Europa *auſtrali.*

exigua. 29. EUPHORBIA umbella trifida: dichotoma, involucellis lanceolatis, foliis linearibus. *Diſſ. euph.* 29. *
acuta. Euphorbia inermis, foliis alternis linearibus acutis, umbella univerſali trifida, partialibus dichotomis diphyllis. *Hort. cliff.* 199. *Hort. upſ.* 143. * *Roy. lugdb.* 197. *Dalib. pariſ.* 157. *Gort. gelr.* 304.
Tithymalus ſ. Eſula exigua. *Bauh. pin.* 291.
Eſula minima tragi. *Dalech. hiſt.* 1656.
retuſa. β. Tithymalus ſ. Eſula exigua, foliis obtuſis. *Bauh. pin.* 291. *prodr.* 132.
γ. Tithymalus exiguus ſaxatilis. *Bauh. pin.* 291. *prodr.* 132. *Magn. monſp.* 259. *t.* 258. *Burſ. XVI.* 55.
Habitat in Luſatia, Gallia, Helvetia, Hiſpania *inter ſegetes*; β. Monſpelii *in ſaxoſis.* γ. Paduæ & Maſſiliæ. ⊙

tuberoſa. 30. EUPHORBIA umbella trifida, involucro tetraphyllo, caule nudo, foliis oblongis emarginatis. *Diſſ. euph.* 26.
Euphorbia inermis, foliis oblongis obtuſis emarginatis. *Roy. lugdb.* 199.
Tithymalus humilis, folio lapathi. *Buxb. cent.* 2. *p.* 27. *t.* 23.

Tithy-

Tithymalus tuberoſus acaulos, foliis oblongis cucullatis & planis. *Burm. afr.* 9. *t.* 4.
Tithymalus africanus humilis, foliis latioribus oblongis, tuberoſa radice. *Raj. ſuppl.* 933.
Habitat in Ægypto *&* Æthiopia. ♃

* *Umbella quadrifida.*

31. EUPHORBIA umbella quadrifida: dichotoma, foliis oppoſitis integerrimis. *Diſſ. euph.* 30. * *Lathyrus.*
Euphorbia inermis, foliis oppoſitis lanceolatis integerrimis, umbella univerſali quadrifida tetraphylla, ulterioribus dichotomis. *Hort. cliff.* 140. *Mat. med.* 256.
Euphorbia inermis, foliis oppoſitis lanceolatis, umbella univerſali trifida polyphylla, partialibus triphyllis, reliquis diphyllis. *Hort. cliff.* 198. *Roy. lugdb.* 196. *Dalib. pariſ.* 155.
Lathyrus major. *Bauh. pin.* 293.
Lathyrus. *Cam. epit.* 968. *Fuchſ. hiſt.* 454.
Habitat in Gallia, Italia *ad agrorum margines.* ♂

* *Umbella quinquefida.*

32. EUPHORBIA umbella ſubquinquefida ſimplici, involucellis ovatis: primariis triphyllis, foliis oblongis integerrimis, caule fruticoſo. *Diſſ. euph.* 33. * *ſpinoſa.*
Euphorbia inermis fruticoſa, foliis lanceolatis integerrimis, floribus ſolitariis terminalibus, involucris triphyllis. *Hort. cliff.* 201. *Roy. lugdb.* 196.
Euphorbia inermis fruticoſa, ramis ſiccis pungens, foliis ad umbellas ternis ſæpius ovatis, floribus ſolitariis. *Sauv. monſp.* 51.
Tithymalus maritimus ſpinoſus. *Bauh. pin.* 291.
Habitat in Creta. ♄

33. EUPHORBIA umbella quinquefida: bifida, involucellis obcordatis. *Diſſ. euph.* 31. *Apios.*
Tithymalus tuberoſa pyriformi radice. *Bauh. pin.* 292.
Tithymalus tuberoſa radice. *Cluſ. hiſt.* 2. *p.* 190.
Habitat in Creta.

34. EUPHORBIA umbella quinquefida: bifida, involucellis ſubovatis, foliis lanceolatis obtuſis integerrimis. *Diſſ. euph.* 35. *dulcis.*
Tithymalus montanus non acris. *Bauh. pin.* 292.
Pityuſa ſ. Eſula minor altera, floribus rubris. *Lob. ic.* 358.
Habitat in Gallia, Italia, Germania.

 35. EU-

Pithyuſa. 35. EUPHORBIA umbella quinquefida: bifida, involucellis ovatis mucronatis, foliis lanceolatis: infimis involutis retrorſum imbricatis. *Diſſ. euph.* 36.
Tithymalus foliis brevibus aculeatis. *Bauh. pin* 292.
Pithyuſa. *Dalech. hiſt.* 1652.
Habitat in arenoſis Belgii, Hiſpaniæ, Italiæ. ♃

portlandica. 36. EUPHORBIA umbella quinquefida: dichotoma, involucellis cordatis, foliis lineari-lanceolatis obtuſiuſculis acuminatis reflexis.
Tithymalus maritimus minor. *Raj. ſyn.* 3. *p.* 313. *t.* 24. *f.* 6.
Habitat in Angliæ *Devonſchire.* ♃

Paralias. 37. EUPHORBIA umbella ſubquinquefida: bifida, involucellis cordato-reniformibus, foliis ſurſum imbricatis. *Diſſ. euph.* 53.
Euphorbia inermis, foliis ſetaceo-linearibus confertis, umbella univerſali multifida, partialibus ramoſe bifidis. *Hort. cliff.* 200. *Roy. lugdb.* 193. *Gort. getr.* 306.
Tithymalus maritimus. *Bauh. pin.* 291. *Dod. pempt.* 370. *f.* 1. 2.
Tithymalus paralios. *Cam. epit.* 962.
Habitat in Europæ *arena maritima.* ♃

aleppica. 38. EUPHORBIA umbella quinquefida: dichotoma, involucellis ovato-lanceolatis mucronatis, foliis inferioribus ſetaceis. *Diſſ. euph.* 37.
Tithymalus foliis inferioribus capillaceis; ſuperioribus myrto ſimilibus. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 338.
Tithymalus cypariſſius. *Alp. exot.* 65. *t.* 64.
Habitat in Creta, Aleppo. ♃

ſegetalis. 39. EUPHORBIA umbella quinquefida: dichotoma, involucellis cordatis acutis, foliis lineari-lanceolatis, ramis floriferis. *Diſſ. euph.* 34.
Euphorbia inermis, foliis alternis linearibus acutis, partialibus umbellæ ovato-rhombeis, petalis bicornibus. *Hort. upſ.* 142. *
Euphorbia inermis, foliis linearibus acutis ad umbellam quinis iſocelibus, ad umbellulas ter dichotomas ovato trigonis. *Sauv. monſp.* 46.
Tithymalus annuus, lunato flore, linariæ folio longiore. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 339. *f.* 10. *t.* 2. *f.* 3.
Tithymalus maritimo affinis, linariæ folio. *Bauh. pin.* 291 ?

Tithy-

Tithymalus ſegetum longifolius. *Raj. angl.* 2. *p.* 312. *
Habitat in Mauritania. ⊙

40. EUPHORBIA umbella quinquefida: trifida: dichotoma, involucellis obovatis, foliis cuneiformibus ſerratis. *Diſſ. euph.* 42. *Helioſcopia.*
Euphorbia foliis crenatis, umbella univerſali quinquefida pentaphylla, partialibus trifidis, propriis triphyllis. *Hort. cliff.* 198. *Fl. ſuec.* 436. * *Roy. lugdb.* 197. *Dalib. pariſ.* 156.
Euphorbia inermis, foliis ſubrotundis crenatis. *Fl. lapp.* 220.
Tithymalus helioſcopius. *Bauh. pin.* 291. *Fuchſ. hiſt.* 811.
Habitat in Europæ *cultis.* ⊙
Umbellæ radii bis trifidi, dein dichotomi & Involucra ſimilia.

41. EUPHORBIA umbella quinquefida: trifida: dichotoma, involucellis diphyllis reniformibus, foliis amplexicaulibus cordatis ſerratis. *Diſſ. euph.* 43. * *ſerrata.*
Euphorbia inermis, foliis denticulatis: caulinis lanceolatis, umbellarum cordatis. *Hort.cliff.* 200. *Roy. lugbd.* 197.
Tithymalus characias, folio ſerrato. *Bauh. pin.* 290.
Tithymalus myrtites valentinus. *Cluſ. hiſt.* 2. *p.* 189.
Habitat in Narbona, Hiſpania. ⊙

42. EUPHORBIA umbella quinquefida: trifida: dichotoma, involucellis ſubovatis, foliis lanceolatis ſerrulatis, capſulis verrucoſis. *Diſſ. euph.* 32. *verrucoſa.*
Euphorbia inermis, foliis linearibus, umbella univerſali trifida triphylla, partialibus trifidis, propriis dichotomis diphyllis, foliolis ſubrotundis. *Guett. ſtamp.* 269. *Dalib. pariſ.* 154.
Tithymalus myrſinites, fructu verrucæ ſimili. *Bauh. pin.* 291.
Tithymalus foliis ſubhirſutis ad caulem ellipticis, ſubfloribus binis ſubrotundis. *Hall. helv.* 191. *
Habitat in Gallia, Helvetia.

43. EUPHORBIA umbella quinquefida: trifida: dichotoma, involucellis foliiſque oblongis obtuſis, petalis membranaceis. *Diſſ. euph.* 38. *corollata.*
Euphorbia inermis, foliis lanceolatis obtuſis alternis, ramis floriferis dichotomis, petalis maximis ſubrotundis. *Gron. virg.* 58.
Habitat in Virginia, Canada.

44. EU-

corallioides. 44. EUPHORBIA umbella quinquefida: trifida: dichotoma, involucellis ovatis, foliis lanceolatis, capſulis lanatis. *Diſſ. euph.* 39.

Euphorbia inermis fruticoſa, foliis lanceolatis, involucro univerſali quinquefido, partialibus trifidis, reliquis bifidis. *Hort. upſ.* 142. * *Roy. lugdb.* 198.

Tithymalus arboreus, caule corallino, folio hyperici, pericarpio barbato. *Bœrh. lugdb.* 1. *p.* 256.

Habitat in Sicilia, Mauritania, Oriente. ♃

piloſa. 45. EUPHORBIA umbella quinquefida: trifida: bifida, involucris ovatis, petalis integris, foliis lanceolatis ſubpiloſis apice ſerrulatis.

Euphorbia foliis alternis ex ovali-lanceolatis, umbellis diphyllis ſubtrifloris, capſulis erectis muricatis, caule ſimplici. *Gmel. ſib.* 2. *p.* 226. *t.* 93.

Tithymalus paluſtris villoſus mollior erectus. *Barr. rar.* 41. *t.* 885.

Tithymalus inermis hirſutus. *Bauh. pin.* 292? *prodr.* 135? *Magn. monſp.* 255.

Habitat in Sibiria. ♃

Habitus exacte E. paluſtris, ut facile pro eadem ſumeretur, eodemque tempore floret, paulo tamen major. Folia *lato-lanceolata, alterna, utrinque vix manifeſte piloſa, apice ita tenuiſſime ſerrata, ut vix obſerventur ſerraturæ.* Umbellæ *cum umbellulis lateralibus ita coacervatæ, ut primaria difficilius eruatur, luteæ petalis & involucris.* Flores *primarii maſculi pentapetali; reliqui hermaphroditi tetrapetali: petalis transverſe ovalibus.* Fructus *verrucoſ & pilis albis ſubtiliſſimis adſperſi.* Rami *ſteriles ex alis foliorum inferiorum, ut ex ſummis alis pedunculi umbelluliferi.*

orientalis. 46. EUPHORBIA umbella quinquefida: quadrifida: dichotoma, involucellis ſubrotundis acutis, foliis lanceolatis. *Diſſ. euph.* 40.

Euphorbia inermis, foliis lanceolatis, involucro univerſali quinquefido lanceolato, partiali tetraphyllo ſubrotundo, propriis diphyllis. *Roy. lugdb.* 198.

Tithymalus orientalis, ſalicis folio, caule purpureo, flore magno. *Tournef. cor.* 2.

Habitat in oriente.

platyphyllos. 47. EUPHORBIA umbella quinquefida: ſubquadrifida: dichotoma, involucellis primariis tetraphyllis, foliis ſerratis lanceolatis ſeſſilibus. *Diſſ. euph.* 41.

Eu-

Euphorbia inermis, foliis alternis lanceolatis amplexicaulibus ſubſerratis, umbella univerſali quinquefida pentaphylla, partialibus bifidis. *Hort. upſ.* 141. *

Euphorbia inermis, foliis lanceolatis, umbella univerſali partialiumque prima quinquefidis: ſecunda trifida: reliquis bifidis. *Roy. lugdb.* 198. *Dalib. pariſ.* 156.

Tithymalus arvenſis latifolius germanicus. *Bauh. pin.* 291.

Tithymalus platyphyllos. *Fuchſ. hiſt.* 813.

Habitat in agris Galliæ, Angliæ, Germaniæ. ⊙

* *Umbella multifida.*

48. EUPHORBIA umbella multifida: dichotoma, involucellis ſubcordatis, petalis ſubbicornibus, ramis ſterilibus foliis uniformibus. *Diſſ. euph.* 48. * *Eſula.*

Euphorbia inermis, foliis lanceolato-linearibus, involucri univerſalis foliis quinis ovato-acutis, partialis ſemiorbiculatis. *Hort. upſ.* 141. *Sauv. monſp.* 47.

Euphorbia inermis, foliis ligulatis patulis ad umbellam quinis ovato-oblongis acutis, bracteis trigonis. *Sauv. monſp.* 51?

Tithymalus lithoſpermi majoris folio. *Magn. monſp.* 304?

Eſula minor. *Dalech. hiſt.* 1653. *Dod. pempt.* 374.

Habitat in Germania, Belgio, Gallia. ♃

Flores *omnes fertiles: petala flaveſcentia,* 4, *obſolete bicornia?* Fructus *glaber.* Umbellæ *caulis laterales dichotomæ.*

49. EUPHORBIA umbella multifida: dichotoma, involucellis ſubcordatis, ramis ſterilibus foliis ſetaceis, caulinis lanceolatis. *Diſſ. euph.* 49. * *Cypariſſias.*

Euphorbia inermis, foliis confertis linearibus, umbella univerſali multifida, partialibus dichotomis: foliolis ſubrotundis. *Hort. cliff.* 199. * *Hort. upſ.* 142. * *Roy. lugdb.* 197. *Dalib. pariſ.* 155. *Gort. gelr.* 105.

Tithymalus cypariſſias. *Bauh. pin.* 291. *Dalech. hiſt.* 1644.

Tithymalus cypreſſinus. *Tabern. hiſt.* 990.

Habitat in Miſnia, Bohemia, Helvetia, G. Narbonenſi.

50. EUPHORBIA umbella ſuboctifida: bifida, involucellis ſubovatis, foliis ſpathulatis patentibus carnoſis mucronatis margine ſcabris. *Diſſ. euph.* 52. *Myrſinites.*

Euphorbia inermis, foliis ſuperioribus reflexis latioribus lanceolatis, umbella univerſali trifida, partialibus bifidis. *Hort. cliff.* 199. *Hort. upſ.* 141. Eu-

Euphorbia inermis, foliis ligulatis ſpinula terminatis, ad umbellam duodenis, bracteis trigonis ſpinula termina-tis. *Sauv. monſp.* 51.
Tithymalus myrſinites latifolius. *Bauh. pin.* 296.
Tithymalus myrſinites legittimus. *Cluſ. hiſt.* 2. *p.* 189
Habitat in Calabria, Monſpelii. ♃
Caules *multi, pedales, deflexi, virides, inferne a caſ foliorum cicatriſati.* Folia *alterna, ſpathulata, coriace concava, glauco-viridia, patentia, mucronata, margi ne ſubſcabra, ſuperiora reflexa.* Umbella 7-9 *fida radiis ſemel bifidis.* Involucrum *univerſale foliol* 7-9, *ovatis, tenuioribus, acutis;* Involucella *diphyl la, ſubcordata, latiora, concava, acuta, margine ſub ſcabra.* Flores *intra involucella primaria & ſecunda ria maſculi, reliqui hermaphroditi.* Calyces *ore ſer rati.* Petala 4, *flava, bicornia apicibus teretibus ni tentia.* Capſulæ *glabræ.*

paluſtris. 51. EUPHORBIA umbella multifida: ſubtrifida: bifida involucellis ovatis, foliis lanceolatis, ramis ſterilibus *Diſſ. euph.* 47. *
Euphorbia foliis lanceolatis, umbella univerſali multifi da polyphylla, partialibus trifidis triphyllis, propriis di chotomis. *Hort cliff.* 200. *Fl. ſuec.* 438. * *Mat med.* 255. *Roy. lugab.* 198. *Dalib. pariſ.* 153. *Gort gelr.* 307.
Tithymalus paluſtris fruticoſus. *Bauh. pin.* 292.
Eſula major. *Dalech. hiſt.* 1653.
Habitat in Suecia *auſtrali*, Germania, Belgio. ♃

hyberna. 52. EUPHORBIA umbella ſexfida: dichotoma, involu cellis ovalibus, foliis integerrimis, ramis nullis, ca pſulis verrucoſis. *Diſſ. euph.* 50.
Tithymalus latifolius hiſpanicus. *Bauh. pin.* 291. *Ta bern. hiſt.* 987.
Tithymalus hibernicus, vaſculis muricatis erectis. *Dill elth.* 387. *t.* 290. *f.* 374.
Habitat in Hibernia, Sibiria, Auſtria, Pyrenæis. ♃

Dendroides. 53. EUPHORBIA umbella multifida: dichotoma, invo lucellis ſubcordatis: primariis triphyllis, caule arboreo *Diſſ. euph.* 51.
Tithymalus myrtifolius arboreus. *Bauh. pin.* 290.
Tithymalus dendroides. *Cam. epit.* 965.
Habitat in. Italia, Creta, Inſulis Stæchadum. ♄

54. EUPHORBIA umbella multifida: dichotoma, involucellis perfoliatis orbiculatis, foliis obtuſis. *Diſſ. euph.* 46. *Amygdaloides.*
Tithymalus characias amygdaloides. *Bauh. pin.* 290
Habitat in Gallia, Germania.

55. EUPHORBIA umbella multifida: dichotoma, involucellis perfoliatis ſubcordatis, foliis lanceolatis integerrimis. *Diſſ. euph.* 45. *ſylvatica.*
Tithymalus ſylvaticus, lunato flore. *Bauh. pin.* 290. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 335. *ſ.* 10. *t.* 1. *f.* 3. *Barr. ic.* 830. 839. 829.
Tithymalus lunato flore. *Col. ecphr.* 2. *p.* 57. *t.* 57.
Habitat in Germania, Gallia, Hiſpania, Italia. ♄

56. EUPHORBIA umbella multifida: bifida, involucellis perfoliatis emarginatis, foliis integerrimis, caule fruteſcente. *Diſſ. euph.* 44. *Characias.*
Euphorbia inermis, foliis lanceolatis, umbella univerſali multifida, partialibus dichotomis, involucris ſemibifidis perfoliatis *Hort. cliff.* 199. *Hort. upſ.* 142. * *Roy. lugdb.* 197.
Tithymalus characias rubens peregrinus. *Bauh. pin.* 290.
Tithymalus characias 1. *Cluſ. hiſt.* 2. *p.* 188.
Tithymalus foliis pini. *Bauh. pin.* 292.
Habitat in Gallia, Hiſpania, Italia. ♄
Caules *quadripedales, fruticoſi, ſecundum annos ramoſi, craſſitie digiti.* Rami *annotini ſuperne craſſiores, ſubvilloſi, infra folia adſperſi cicatricibus transverſis.* Ramus *florifer primo vere ex apice ramorum excreſcit, fruticat, perit, cum ad latera baſeos novi rami prodeunt.* Folia *lanceolata, coriacea, ſubtomentoſa, viridia, reflexa nervo utrinque elevato, verſus flores latiora obtuſiora.* Umbella *parva, conferta, terminalis, ſeſſilis: Radiis numeroſis ſemel bifidis.* Involucrum *univerſale polyphyllum, ſublanceolatum, parvum, reflexum; Involucella perfoliata, ſemibifida.* Flores *intra involucella primaria maſculi, reliqui hermaphroditi; omnes Petalis 4, purpureis, humidis. Germina villoſa*

PENTAGYNIA

GLINUS.

1. GLINUS. *lotoides.*
Alſine lotoides ſicula. *Bocc. ſic.* 21, *t.* 11. *Moriſ. hiſt.* 2. *p.* 552.
Alſi-

Alſine heliotropio cognata. *Cup. cath.*
Portulaca bætica, luteo flore, ſpuria aquatica. *Barr. rar.* 478. *t.* 336.
Habitat in Sicilia, Hiſpania *ad foſſas.*

DODECAGYNIA.

SEMPERVIVUM.

arboreum. 1. SEMPERVIVUM caule arboreſcente lævi ramoſo.
Sempervivum caule inferne nudo lævi ramoſo. *Hort. cliff.* 179. *Hort. upſ.* 118. *Roy. lugdb.* 456.
Sedum majus arboreſcens, floſculis candidis. *Bauh. pin.* 282.
Sedum majus legitimum. *Cluſ. hiſt.* 2. *p.* 58.
Habitat in Luſitania, Creta, Corcyra, Zacintho. ♄.

canarienſe. 2. SEMPERVIVUM caule foliorum ruderibus lacero, foliis retuſis.
Sempervivum caule infra folio lacero, foliis cuneiformibus: ſummis ſubrotundis. *Hort. cliff.* 179. *Roy. lugdb.* 457.
Sedum canarium, foliis omnium maximis. *Comm. hort.* 2. *p.* 180. *t.* 95.
Sedum majus canarinum acaulon, pilis ad oras foliorum hiſpidis. *Pluk. alm.* 340. *t.* 314. *f.* 1. *Raj. ſuppl.* 362.
Habitat in Canariis. ♄

tectorum. 3. SEMPERVIVUM foliis ciliatis, propaginibus patentibus.
Sempervivum foliis radicalibus carnoſis ciliatis, caulinis imbricatis membranaceis, corymbo racemoſo reflexo. *Hort. cliff.* 179. *Fl. ſuec.* 375. *Mat. med.* 222. *Roy. lugdb.* 457.
Sempervivum majus alterum ſ. Barba jovis. *Dod. pempt.* 127.
Sedum majus vulgare. *Bauh. pin.* 283.
Habitat in Europæ *tectis & collibus.* ♃

globiferum. 4. SEMPERVIVUM foliis ciliatis, propaginibus globoſis.
Sempervivum foliis radicalibus in globum congeſtis ciliatis, propaginibus globoſis. *Hort. cliff.* 180. *Roy. lugdb.* 457.
Sedum majus vulgari ſimile, globulis decidentibus. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 472. *ſ.* 12. *t.* 7. *f.* 18.

Se-

Sedum vulgari magno ſimile. *Bauh. hiſt.* 3. *p.* 688.
Habitat in Rutheno *D. Gmelin.* ♃

5. SEMPERVIVUM foliis pilis intertextis, propaginibus globoſis. *arachnoideum.*
Sempervivum foliis radicalibus in globum congeſtis: villis reticulatim connexis. *Hort. cliff.* 180. * *Roy. lugdb.* 457.
Sempervivum rubrum montanum gnaphaloides. *Col. ecphr.* 1. *p.* 292. *t.* 291.
Sedum montanum tomentoſum. *Bauh. pin.* 284.
Habitat in Alpibus Italiæ, Helvetiæ. ♃

6. SEMPERVIVUM foliis integerrimis, propaginibus patulis. *montanum.*
Sedum roſulis liberis, foliis lævibus. *Hall. helv.* 393.
Sedum alpinum, rubro magno flore. *Bauh. pin.* 284.
Sedum majus montanum, foliis non dentatis, floribus rubentibus. *Bauh. pin.* 283.
Sedum minus, flore rubente. *Beſl. eyſt. vern.* 6. *t.* 8. *f.* 2.
Habitat in rupibus Helvetiæ. ♃

Claſſis XII.

ICOSANDRIA.

MONOGYNIA.

CACTUS.

EchinoMelocacti *ſubrotundi.*

mammillaris. 1. CACTUS ſubrotundus tectus tuberculis ovatis barbatis. *Hort. cliff.* 181. *Hort. upſ.* 119. *Roy. lugdb.* 278
EchinoMelocactus minor lacteſcens, tuberculis ſ. mammillis majoribus. *Herm. par.* 136. *t.* 136.
Ficoides ſ. Melocactus mammillaris glabra ſulcis carens fructum ſuum undique fundens. *Pluk. alm.* 146. *t.* 29. *f.* 1.
Ficoides ſ. Ficus americana ſphærica tuberculata lacteſcens, flore albo. *Comm. hort.* 1. *p.* 105. *t.* 55.
Habitat in Americæ *calidioris rupibus.* ♄

Melocactus. 2. CACTUS ſubrotundus quatuordecim-angularis. *Hort. cliff.* 181. *Hort. upſ.* 119 *Roy. lugdb.* 297.
Melocactus indiæ occidentalis. *Bauh. pin.* 384.
EchinoMelocactus. *Cluſ. exot.* 92. *t.* 92.
Habitat in Jamaica, America *calidiore.* ♄

* Cerei *erecti ſtantes per ſe.*

heptagonus. 3. CACTUS erectus oblongus ſeptemangularis. *Hort. cliff.* 181. * *Roy. lugdb.* 279.
Habitat in America. ♄

tetragonus. 4. CACTUS quadrangularis longus erectus: angulis compreſſis. *Hort. cliff.* 181. *Hort. upſ.* 119. *Roy. lugdb.* 280.
Cereus erectus minor, fructu ſpinoſo, coſtarum numero varians. *Herm. par.* 117.
Habitat in Curacao, America *calidiore.* ♄

hexagonus. 5. CACTUS erectus ſexangularis longus. *Hort. cliff.* 181. *Hort. upſ.* 119. *Roy. lugdb.* 279.
Cereus ſurinamenſis. *Eph. N. C.* 3. *p.* 394. *t.* 7. 8
Cereus erectus altiſſimus ſurinamenſis. *Herm. par.* 116 *Raj. dendr.* 23.
Habitat Surinami. ♄

6. CA-

6. CACTUS ſubquinquangularis erectus longus articu- *pentagonus.*
latus. *Hort. cliff.* 182. * *Roy. lugdb.* 280.
Habitat in America.

7. CACTUS erectus longus octangularis: angulis com- *repandus.*
preſſis undatis, ſpinis lana longioribus. *Hort. cliff.* 182. *Roy. lugdb.* 279.
Habitat in America *calidiore.* ♄

8. CACTUS erectus longus ſubnovemangularis: angulis *lanuginoſus.*
obſoletis, ſpinis lana brevioribus. *Hort. cliff.* 182. *Roy. lugdb.* 279.
Cereus curaſſavicus erectus maximus, fructu rubro non ſpinoſo, lanugine flaveſcente. *Herm. par.* 115. *t.* 115.
Habitat in Curacao. ♄

9. CACTUS erectus longus ſuboctangularis: angulis ob- *peruvianus.*
tuſis. *Hort. cliff.* 181. *Hort. upſ.* 120. *Roy. lugdb.* 279.
Cereus erectus, fructu rubro non ſpinoſo. *Herm. par.* 114.
Cereus peruvianus ſpinoſus, fructu rubro nucis magnitudine. *Bauh. pin.* 458.
Euphorbii arbor cerei effigie. *Lob. ic.* 2. *p.* 25.
Habitat in Jamaicæ, Peru *apricis aridis maritimis.* ♄

10. CACTUS erectus articulatus ſub-decangularis: ar- *Royeni.*
ticulis ſubovatis, ſpinis lanam æquantibus. *Roy. lugdb.* 279.
Habitat in America. ♄

* Cerei *repentes radiculis lateralibus.*

11. CACTUS repens ſubquinquangularis. *grandiflorus.*
Cactus ſcandens, angulis quinque pluribusque obtuſis. *Hort. cliff.* 182. *Hort. upſ.* 121. * *Roy. lugdb.* 280.
Cereus americanus major articulatus, flore maximo nocte ſe aperiente ſ. ſuaviſſimum odorem ſpirante. *Volk. heſp.* 1. *p.* 133. *t.* 234.
Habitat in Jamaica, VeraCruce. ♄

12. CACTUS repens decemangularis. *flagelliformis.*
Cactus ſcandens, angulis decem obſoletis. *Hort. upſ.* 121.
Cereus minor ſcandens polygonus ſpinoſiſſimus, flore purpureo. *Erhet. tab.* 2. *f.* 2.
Ficoides americanum ſ. Cereus minima ſerpens americana. *Pluk. alm.* 148. *t.* 158. *f.* 6.
Habitat in America *calidiore.* ♄

triangularis. 13. CACTUS repens triangularis.
Cactus triangularis ſcandens articulatus. *Hort. cliff.* 182. *Hort. upſ.* 121. *Roy. lugdb.* 280.
Ficoides americanum, ſ. Cereus erectus criſtatus, foliis triangularibus profunde canaliculatis. *Pluk. alm.* 147. *t.* 29. *f.* 3.
Habitat in Braſilia, Jamaica.

* Opuntiæ *compreſſæ articulis proliferis.*

moniliformis. 14. CACTUS articulato-prolifer, articulis globoſis ſpinoſis glomeratis.
Melocactus, ex plurimis globulis opuntiæ modo naſcentibus, ſpinoſiſſimus. *Plum. ſpec.* 20.
Habitat in America *calidiore.* ♄

Opuntia. 15. CACTUS articulato-prolifer, articulis ovatis, ſpinis ſetaceis.
Cactus compreſſus articulatus ramoſiſſimus, articulis ovatis: ſpinis ſetaceis. *Hort. cliff.* 183. *Hort. upſ.* 120. *Gron. virg.* 54. *Roy. lugdb.* 280.
Opuntia vulgo herbariorum. *Bauh. hiſt.* 1. *p.* 154.
Ficus indica, folio ſpinoſo, fructu majore. *Bauh. pin.* 458.
Habitat in America, Peru, Virginia, *nunc in* Hiſpania, Luſitania. ♄. ♃.

Ficus indica. 16. CACTUS articulato-prolifer, articulis ovato-oblongis, ſpinis ſetaceis.
Cactus compreſſus articulatus ramoſus, articulis ovato-oblongis: ſpinis ſetaceis *Hort. cliff.* 183. *Hort. upſ.* 120. *Roy. lugdb.* 280.
Habitat in America *calidiore.* ♄

Tuna. 17. CACTUS articulato: prolifer, articulis ovato-oblongis: ſpinis ſubulatis.
Cactus compreſſus articulatus ramoſus, articulis ovato-oblongis, ſpinis ſubulatis. *Hort. cliff.* 183. *Hort. upſ.* 120. *Roy. lugdb.* 280.
Tuna major, ſpinis validis flavicantibus, flore gibbo. *Dill. elth.* 396. *t.* 295. *f.* 238.
Opuntia major, folio oblongo rotundo: ſpinis longis & validiſſimis, flore luteo. *Sloan. jam.* 103. *hiſt.* 2. *p.* 149. *t.* 224. *f.* 1.
Habitat in Jamaica & America *calidiore.* ♄

cochenillifer 18. CACTUS articulato-prolifer: articulis ovato-oblongis ſubinermibus.
Cactus compreſſus articulatus ramoſus, articulis ovato-oblongis ſubinermibus. *Hort. upſ.* 121. Tu-

Tuna mitior, flore ſanguineo, cochinillifera. *Dill. elth.* 399. *t.* 297. *f.* 383.
Ficus indica major lævis ſ. ſpinoſa vermiculos profe-rens. *Pluk. alm.* 146. *t.* 281. *f.* 383.
Opuntia maxima, folio oblongo rotundo majore ſpinulis nonnullis & innocentibus obſito. *Sloan. jam.* 194. *hiſt.* 2. *p.* 152. *t.* 8. *f.* 1. 2.
Habitat in Jamaica & America *calidiore.* ♄

19. CACTUS articulato-prolifer, articulis cylindrico-ventricoſis compreſſis. *curaſſavicus.*
Cactus tereti-compreſſus articulatus ramoſus. *Hort. cliff.* 182. *Hort. upſ.* 120. *Roy. lugdb.* 280.
Ficus indica ſ. Opuntia curaſſavica minima. *Comm. hort.* 1. *p.* 107. *t.* 56.
Ficus indica ſ. Opuntia minor caulеſcens arbuſculæ in modum, ramis cineritiis ſpinoſiſſima. *Pluk. alm.* 147. *t.* 281. *f.* 3.
Habitat in Curacao. ♄.

20. CACTUS prolifer enſiformi-compreſſus ſerrato-repandus. *Phyllanthus.*
Cactus foliis enſiformibus obtuſe ſerratis. *Hort. cliff.* 183. *Roy. lugdb.* 281.
Cereus ſcolopendri folio brachiato. *Dill. elth.* 73. *t.* 64. *f.* 74.
Phyllanthos americana, ſinuoſis foliis longis. *Pluk. alm.* 296. *t.* 247. *f.* 5.
Habitat in Braſilia, Surinamo, Americe *meridionali.* ♄

21. CACTUS caule tereti arboreo ſpinoſo, foliis lanceolato-ovatis. *Hort. upſ.* 1[illegible]2. *Pereſkia.*
Pereſcia. *Hort. cliff.* 122. [illegible]*y. lugdb.* 281.
Pereſkia aculeata, flore a[illegible] fructu flaveſcente. *Plum. gen.* 37. *Dill. elth.* 305. [illegible] 227. *f.* 294.
Malus americana ſpinoſa, portulacæ folio, fructu folioſo, ſemine reniformi ſplendente. *Comm. hort.* 1. *p.* 135. *t.* 70.
Portulaca americana latifolia ad foliorum ortum lanugine obducta, longioribus aculeis horrida. *Pluk. alm.* 135. *t.* 215. *f.* 6.
Habitat in America calidiore, Jamaica, Margaretha. ♄

22. CACTUS caule tereti arboreo ſpinoſo, foliis cuneiformibus retuſis. *portulacifolius.*
Opuntia arbor ſpinoſiſſima, foliis portulacæ cordatis. *Pluk. ſpec.* 6.

Habitat in America *calidiore.* ♄
Fructus hujus minimae foliis adſperſus, uti præcedentis.

PHILADELPHUS.

coronarius. 1. PHILADELPHUS foliis ſubdentatis.
Philadelphus. *Hort. cliff.* 188. *Hort. upſ.* 122.
Syringa alba ſ. Philadelphus athenæi. *Bauh. pin.* 399.
Frutex coronarius. *Cluſ. hiſt.* 1. *p.* 55.
Habitat in - - - - ♄
Flos *primarius quinquefidus calyce, corolla, piſtillo, capſula. Phil. bot.* 178

inodorus. 2. PHILADELPHUS foliis integerrimis.
Philadelphus flore albo majore inodoro. *Catesb. car.* 2. *p.* 84. *t.* 84
Habitat in Carolina. ♄

PSIDIUM.

Guajava. 1. PSIDIUM.
Pſidium ramis tetragonis. *Hort. upſ.* 122.
Pſidium caule quadrangulo. *Hort. cliff.* 184. *Fl. zeyl.* 192.
Guajava alba acida, fructu rotundiore. *Pluk. alm.* 181. *t.* 193. *f.* 4
β. Guajava alba dulcis. *Comm. hort.* 1. *p.* 121. *t.* 63.
Habitat in India. ♄

EUGENIA.

malaccenſis. 1. EUGENIA foliis integerrimis, pedunculis ramoſis lateralibus. *Fl. zeyl.* 187.
Perſici oſſiculo fructus malaccenſis rubens. *Bauh. pin.* 441.
Nati-ſchambu *Rheed. mal.* 1. *p.* 29. *t.* 18. *Raj. hiſt.* 1478.
Habitat in India. ♄

Jambos. 2. EUGENIA foliis integerrimis, pedunculis ramoſis terminalibus. *Fl. zeyl.* 188.
Perſici oſſiculo fructus malaccenſis ex candido rubeſcens. *Bauh. pin.* 441.
Malacca ſchambu *Rheed. mal.* 1. *p.* 27. *t.* 17. *Raj. hiſt.* 1478.
Habitat in India. ♄

uniflora 3. EUGENIA foliis integerrimis, pedunculis unifloris lateralibus. *Fl. zeyl.* 189.

Eu-

Eugenia. *Roy. lugdb.* 265.
Eugenia indica, myrti folio deciduo, flore albo, fructu ſuaverubenti molli leviter ſulcato & odoro. *Mich. gen.* 226. *t.* 108.
Myrtus indica, foliis rigeſcentibus latis ac recurvis parum odoratis. *Till. piſ.* 117. *t.* 44.
Habitat in India. ♄

4. EUGENIA foliis crenatis, pedunculis terminalibus, pomis oblongis acutangulis. *Fl. zeyl.* 190. * *acutangula.*
Tjieria-ſamſtravadi. *Rheed. mal.* 4. *p.* 51. *t.* 7. *Raj. hiſt.* 1480.
Habitat in India. ♄

5. EUGENIA foliis crenatis, racemis longiſſimis, pomis ovatis. *Fl. zeyl.* 191. * *racemoſa.*
Samſtravadi ſ. Caibatſiumbu. *Rheed. mal.* 4. *p.* 11. *t.* 16. *Raj. hiſt.* 1479.
Habitat in India. ♄

MYRTUS.

1. MYRTUS floribus ſolitariis: involucro diphyllo. *Hort. cliff.* 42. *Hort. upſ.* 123. *Mat. med.* 224. *Roy. lugdb.* 269. *communis.*
Myrtus communis italica. *Bauh. pin.* 468.
β. Myrtus bætica latifolia 1. 2. *Bauh. pin.* 469. *Cluſ. hiſt.* 1. *p.* 65. bætica.
γ. Myrtus minor vulgaris. *Bauh. pin.* 469. tarentina.
δ. Myrtus foliis minimis & mucronatis. *Bauh. pin.* 469. mucronata.
ε. Myrtus ſylveſtris, foliis acutiſſimis. *Bauh. pin.* 469. acutifolia.
ζ. Myrtus anguſtifolia bætica. *Bauh. pin.* 469. anguſtifolia
η. Myrtus latifolia belgica. *Bauh. pin.* 469. belgica.
θ. Myrtus latifolia romana. *Bauh. pin.* 468. romana.
Habitat in Europa *auſtrali*, Aſia, Africa. ♄

2. MYRTUS floribus ſolitariis, pedunculis nudis, petalis ſubciliatis. *braſiliana.*
Arbor braſiliana, myrti laureæ foliis inodoris. *Comm. hort.* 1. *p.* 173. *t.* 89.
Habitat in Braſilia. *D. Wachend.* ♄
Folia *ovata*, *obtuſa*, *petiolata*, *glabra*, *oppoſita*. Flores *ſolitarii*, *axillares*, *pedunculati*, *pedunculo aphyllo*. Corollæ *petala* 4. *ſ.* 5, *lacero-ciliata*, *obverſe ovata*, *concava*, *reflexa*. Stamina *circiter* 40.

3. MYRTUS pedunculis multifloris, foliis lanceolato-ovatis. *Fl. zeyl.* 185. * *cumini.*
Habitat in Zeylona. ♄

4. MYR

Zeylanica. 4. MYRTUS pedunculis multifloris, foliis ovatis ſubpetiolatis.

Myrtus foliis ovatis acuminatis obtuſiuſculis. *Fl. zeyl.* 182. *

Myrtus zeylanica odoratiſſima, baccis niveis monococcis. *Herm. lugdb.* 434. *t.* 435.

Myrtoides foliis ovatis. *Hort. cliff.* 489. *Roy. lugdb.* 535.

Habitat in Zeylona. ♄

androſæmoides. 5. MYRTUS pedunculis multifloris, foliis ſubovalibus ſeſſilibus. *Fl. zeyl.* 184. *

Habitat in Zeylona. ♄

caryophyllata. 6. MYRTUS pedunculis multifloris, foliis obovatis. *Fl. zeyl.* 183. *Mat. med.* 225.

Caryophyllus aromaticus ind. occid. foliis & fructu rotundis. *Pluk. alm.* 188. *t.* 155. *f.* 3.

Habitat in Zeylona. ♄

Pimento. 7. MYRTUS foliis alternis. *Fl. zeyl.* 186. *Mat. med.* 225.

Myrtus calycibus absque appendiculis. *Hort. cliff.* 501.

Myrtus arborea aromatica, foliis laurinis. *Sloan. jam.* 161, *hiſt.* 2. *p.* 76. *t.* 191. *f.* 1.

Caryophyllus aromaticus americanus, lauri acuminatis foliis, fructu orbiculari. *Pluk. alm.* 88. *t.* 155. *f.* 4.

Habitat in India. ♄

PUNICA.

Granatum. 1. PUNICA. *Hort. cliff.* 134. *Hort. upſ.* 122. *Mat. med.* 223. *Roy. lugdb.* 267.

Malus punica ſylveſtris. *Bauh. pin.* 438.

Malus punica ſativa. *Bauh. pin.* 438.

Malus punica. *Cam. epit.* 130. 131.

β. Balauſtia flore pleno majore & minore. *Bauh. pin.* 438.

Habitat in Hiſpania, Italia, Mauritania *ſolo cretaceo.* ♄

AMYGDALUS.

Perſica. 1. AMYGDALUS foliorum ſerraturis omnibus acutis. *Hort. cliff.* 189. *Hort. upſ.* 123. *Mat. med.* 230. *Roy. lugdb.* 267.

Perſica molli carne & vulgaris. *Bauh. pin.* 440.

Perſica rubra. *Cam. epit.* 145.

β. Nuciperſica, quæ nucum juglandium faciem repræſentat. *Bauh. pin.* 440. *Raj. hiſt.* 1516.

Habitat - - - - ♄

2. AMYGDALUS foliis petiolatis: ſerraturis infimis glanduloſis. *Hort. cliff.* 186. *Hort. upſ.* 123. *Mat. med.* 229. *Roy. lugdb.* 267. *communis.*
Amygdalus ſylveſtris. *Bauh. pin.* 442.
β. Amygdalus ſativa. *Bauh. pin.* 441.
Amygdalus. *Dod. pempt.* 798.
γ. Amygdalus amara. *Tournef. inſt.* 627.
Habitat in Mauritaniæ *ſepibus.* ♄

3. AMYGDALUS foliis petiolatis baſi attenuatis. *Hort. cliff.* 186. *Hort. upſ.* 124. *Roy. lugdb.* 267. *nana.*
Amygdalus indica nana. *Pluk. alm.* 28. t. 11. f. 3.
Armeniaca perſicæ foliis, fructu exſucco. *Amm. ruth.* 273. *t.* 30?
Habitat in Aſia *ſeptentrionali?*

PRUNUS.

1. PRUNUS floribus racemoſis, foliis deciduis baſi ſubtus biglanduloſis. *Padus.*
Padus glandulis duabus baſi foliorum ſubjectis. *Hort. cliff.* 185. *Fl. ſuec.* 396. *Roy. lugdb.* 269. *Hall. helv.* 397.
Padus foliis annuis. *Fl. lapp.* 198.
Ceraſus racemoſa ſylveſtris, fructu non eduli. *Bauh. pin.* 451.
Habitat in Europa. ♄

2. PRUNUS floribus racemoſis, foliis deciduis baſi antice glanduloſis. *Virginiana.*
Ceraſus ſylveſtris, fructu nigricante in racemis longis pendulis phytolaccæ inſtar congeſtis. *Gron. virg.* 54. *Roy. lugdb.* 537.
Ceraſi ſimilis arbuſcula mariana, padi folio, flore albo parvo racemoſo. *Pluk. mant.* 43. *t.* 339. *Cateſb. car.* 1. *p.* 28. *t.* 28.
Habitat in Virginia. ♄

3. PRUNUS floribus racemoſis, foliis ſempervirentibus eglanduloſis. *luſitanica.*
Padus foliis glandula deſtitutis. *Vir. cliff.* 42. *Hort. upſ.* 126. *Roy. lugdb.* 269.
Padus foliis ſempervirentibus ovatis. *Hort. cliff.* 185.
LauroCeraſus luſitanica minor. *Dill. elth.* 193. *t.* 159. *f.* 193.
Habitat in Luſitania, Penſylvania. ♄

LauroCeraſus. 4. PRUNUS floribus racemoſis, foliis ſempervirentibus dorſo biglanduloſis.
Padus glandulis duabus dorſo foliorum innatis. *Vir cliff.* 42. *Hort. upſ.* 126. *Roy. lugdb.* 269.
Padus foliis ſempervirentibus lanceolato-ovatis. *Hort cliff.* 185.
Ceraſus folio laurino. *Bauh. pin.* 450.
Lauroceraſus. *Cluſ. hiſt.* 1. *p.* 4. *Cam. hort. t.* 23.
Habitat in Trapezunte *unde in* Europam *venit* 1576. ♄

Mahaleb. 5. PRUNUS floribus corymboſis, foliis ovatis.
Ceraſus foliis ovatis. *Vir. cliff.* 43. *Hall. helv.* 360. *Roy. lugdb.* 268. crenatis. *Hort. cliff.* 487.
Ceraſo affinis. *Bauh. pin.* 451.
Mahaleb. *Cam. epit.* 91.
Habitat in Helvetia. ♄

Armeniaca. 6. PRUNUS floribus ſeſſilibus, foliis ſubcordatis.
Prunus foliis ovato-cordatis. *Hort. cliff.* 186. *Hort. upſ.* 124. *Roy. lugdb.* 268.
Mala Armeniaca majora. *Bauh. pin.* 442.
Mala Armeniaca majora, nucleo dulci. *Bauh. pin.* 442.
Malus Armeniaca minor. *Bauh. pin.* 442.
Habitat - - - -

ſibirica. 7 PRUNUS floribus ſeſſilibus, foliis ovato-oblongis.
Armeniaca betulæ folio & facie, fructu exſucco. *Amm. ruth.* 272. *t.* 29.
Habitat in Sibiria
An haec ſatis diſtincta a precedenti?

Ceraſus. 8. PRUNUS pedunculis ſimplicibus, foliis ovato-lanceolatis conduplicatis.
Ceraſus foliis ovato-lanceolatis. *Vir. cliff.* 43. *Hort. upſ.* 125. *Mat. med.* 233. *Roy. lugdb.* 267. *Hall. helv.* 356.

caproniana. α. Ceraſus ſativa rotunda rubra & acida. *Bauh. pin.* 449.
roſea. β. Ceraſus hortenſis, flore roſeo. *Bauh. pin.* 450.
plena. γ. Ceraſus hortenſis, flore pleno. *Bauh. pin.* 450.
dulcis. δ. Ceraſa alba dulcia. *Bauh. pin.* 450.
juliana. ε. Ceraſa carne tenera & aquoſa. *Bauh. pin.* 450.
actiana. ζ. Ceraſus ſylveſtris ac major, fructu ſubdulci: nigro colore inficiente. *Bauh. pin.* 450.
auſtera. η. Ceraſus acidiſſima ſanguineo ſucco. *Bauh. pin.* 450.
pumila. θ. Ceraſus pumila. *Bauh. pin.* 450.
avium. Ceraſus racemoſa hortenſis. *Bauh. pin.* 450.

ϰ. Ce-

κ. Ceraſa ſativa majora. *Bauh. pin.* 450. Bigarella.
λ. Ceraſa craſſa carne dura. *Bauh. pin.* 450. Duracina.
Habitat in Europa. ♄.

9. PRUNUS pedunculis ſimplicibus, foliis lanceolato-ovatis convolutis. *domeſtica.*
Prunus inermis, foliis lanceolato-ovatis. *Hort. cliff.* 186. *Hort. upſ.* 124. *Mat. med.* 232. *Roy. lugdb.* 268.
Prunus. *Bauh. pin.* 443.
β. Pruna majora dulcia & parva atro-cærulea. *Bauh. pin.* 443. *n.* 23. Damaſcena.
γ. Pruna magna craſſa ſubacida. *Bauh. pin.* 443. hungarica.
δ. Pruna oblonga cærulea. *Bauh. pin.* 443. juliana.
ε. Pruna nigra: carne dura. *Bauh. pin.* 443. pernicona.
ζ. Pruna coloris ceræ ex candido in luteum palleſcente. *Bauh. pin.* 443. cerea.
η. Pruna magna rubra rotunda. *Bauh. pin.* 443. acinaria.
θ. Pruna rotunda flava dulcia mali amplitudine. *Bauh. pin.* 443. maliformis.
ι. Pruna anguſto matureſcentia minora & auſteriora. *Bauh. pin.* 443. auguſtana.
κ. Pruna parva præcocia. *Bauh. pin.* 443. præcox.
λ. Pruna parva ex viridi flaveſcentia. *Bauh. pin.* 443. cereola.
μ. Pruna amygdalina. *Bauh. pin.* 443. amygdalina.
ν. Pruneoli albi oblongiuſculi acidi. *Bauh. pin.* 443. galatenſis.
ο. Pruna ex flavo rufeſcentia mixti ſaporis gratiſſima. *Bauh. pin.* 443. Brignola.
ξ. Prunus fructu rotundo nigro-purpureo dulci. *Bauh. pin.* 444. myrobalan.
Habitat in Europæ *auſtralioris locis elevatis.* ♄

10. PRUNUS ſpinoſa, foliis lanceolatis. *Hort. cliff.* 186. *Fl. ſuec.* 397. *Mat. med.* 231. *Roy. lugdb.* 268. *Hall. helv.* 355. *ſpinoſa.*
Prunus ſylveſtris. *Bauh. pin.* 444. *Tabern. ic.* 992.
Habitat in Europæ *collibus apricis.* ♄

DIGYNIA.

CRATÆGUS.

1. CRATÆGUS foliis ovatis inæqualiter ſerratis ſubtus tomentoſis. *Hort. cliff.* 187. *Fl. ſuec.* 398. *Vir. cliff.* 43. *Mat. med.* 234. *Roy. lugdb.* 271. *Sauv. monſp.* 306. *Aria.*

Alni

Alni effigie, lanato folio, major. *Bauh. pin.* 452.
Aria. *Dalech. hiſt.* 202.
Sorbus alpina. *Bauh. hiſt.* 1. *p.* 65.

ſuecica. β. Cratægus inermis foliis ellipticis ſerratis transverſaliter ſinuatis ſubtus villoſis. *Fl. lapp.* 199.
Sorbus ſylveſtris anglica *Raj. hiſt.* 1459.
Habitat in Europæ, Helvetiæ, *frigidis:* β. *in* Suecia, Anglia. ♄

terminalis. 2. CRATÆGUS foliis cordatis ſeptangulis: lobis infimis divaricatis.
Cratægus foliis cordatis acutis: lacinulis acutis ſerratis. *Hort. cliff.* 187. *Roy. lugdb.* 271. *Sauv. monſp.* 286.
Sorbus torminalis & Crategus theophraſti. *Bauh. hiſt.* 1. *p.* 63.
Sorbus torminalis. *Cam. epit.* 162.
Meſpilus, apii folio, ſylveſtris non ſpinoſa ſ. Sorbus torminalis. *Bauh. pin.* 454.
Habitat in Anglia, Germania, Helvetia, Burgundia. ♄

coccinea. 3. CRATÆGUS foliis ovatis repando-angulatis ſerratis glabris. *Hort. cliff.* 187. *Hort. upſ.* 126. *Gron. virg.* 54. *Roy. lugdb.* 272.
Meſpilus, apii folio, virginiana ſpinis horrida, fructu amplo coccineo. *Pluk. alm.* 249. *t.* 46. *f.* 4.
Meſpilus ſpinoſa ſ. Oxyacantha virginiana maxima. *Angl. hort.* 49. *t.* 13. *f.* 1.
Habitat in Virginia, Canada. ♄
Variat cum validis ſpinis lateralibus & absque ſpinis.

Crus galli. 4. CRATÆGUS foliis lanceolato-ovatis ſerratis glabris, ramis ſpinoſis.
Meſpilus aculeata pyrifolia denticulata ſplendens, fructu inſigni rutilo, virginienſis. *Pluk. alm.* 249. *t.* 46. *f.* 1.
Meſpilus pruni foliis, ſpinis longiſſimis fortibus, fructu rubro magno. *Clayt. virg.* 55.

tomentoſa. 5. CRATÆGUS foliis cuneiformi-ovatis ſerratis ſubangulatis ſubtus villoſis, ramis ſpinoſis.
Meſpilus inermis, foliis ovato oblongis ſerratis ſubtus tomentoſis *Gron. virg.* 55.
Habitat in Virginia. ♄

viridis. 6. CRATÆGUS foliis lanceolato-ovatis ſubtrilobis ſerratis glabris, caule inermi.
Meſpilus inermis, foliis oblongis integris acuminatis ſerratis parvis utrinque viridibus. *Gron. virg.* 163.
Habitat in Virginia. ♄

7. CRA-

7. CRATÆGUS foliis lanceolatis ſerratis, caule inermi, corymbis ſquamoſis. *indica.*
Habitat in India. ♄
Frutex ramis inermibus. Folia *lato-lanceolata, obtuſe ſerrata, craſſiuſcula, petiolata.* Corymbi *terminales pedunculis ſquamoſis, bracteis ſubulatis.*

8. CRATÆGUS foliis obtuſis bitrifidis ſerratis *Hort. cliff.* 188. *Fl. ſuec.* 399. *Roy. lugdb.* 272. *Oxyacantha.*
Meſpilus, apii folio, ſylveſtris ſpinoſa ſ. Oxyacantha. *Bauh. pin.* 454.
Oxyacantha ſ. Spina acuta. *Dod. pempt.* 751
Habitat in Europæ *pratis apricis duris.* ♄

9. CRATÆGUS foliis obtuſis bitrifidis ſubdentatis. *Azarolus.*
Meſpilus apii folio laciniato. *Bauh. pin.* 453.
Meſpilus Aronia veterum. *Bauh. hiſt.* 1. *p.* 67.
β. Meſpilus orientalis, apii folio, ſubtus hirſuto. *Pock. orient.* 189. *t.* 85. *Aronia.*
Habitat Florentiæ, Monſpelii. ♄
Differre videtur ab Oxyacantha *ſola magnitudine, ut Sorbus domeſtica a ſylveſtri; in hac quadruplo majora omnia; ſpinæ in culta pauciores & ſæpe nullæ.*

TRIGYNIA.

SORBUS.

1. SORBUS foliis pinnatis utrinque glabris. *Hall. helv.* 250. *aucuparia.*
Sorbus foliis pinnatis. *Hort. cliff.* 188. *Fl. ſuec.* 400. *Mat. med.* 235. *Roy. lugdb.* 274.
Sorbus ſylveſtris, foliis domeſticæ ſimilis. *Bauh. pin.* 415.
Sorbus ſylveſtris. *Cam. epit.* 161.
Habitat in Europæ *frigidioribus.* ♄

2. SORBUS foliis pinnatis ſubtus tomentoſis. *Hall. helv.* 351 *domeſtica.*
Sorbus ſativa. *Bauh. pin.* 415.
Sorbus legitima. *Cluſ.* 1. *p.* 10.
Habitat in Europæ *calidioribus.* ♄

PEN-

PENTAGYNIA.

MESPILUS.

germanica. 1. MESPILUS inermis, foliis lanceolatis integerrimis ſub-tus tomentoſis, calycibus acuminatis. *Hort. cliff.* 189. *Hort. upſ.* 129. *Mat. med.* 236. *Roy. lugdb.* 270. *Boehm. lipſ.* 174.

Meſpilus germanica, folio laurino non ſerrato. *Bauh. pin.* 453.

Meſpilus. *Dod. pempt.* 801.

β. Meſpilus, folio laurino, major. *Bauh. pin.* 453.

Habitat in Europa *auſtrali.* ♄

Pyracantha. 2. MESPILUS ſpinoſa, foliis lanceolato-ovatis crenatis, calycibus fructus obtuſis. *Hort. cliff.* 189. *Vir. cliff.* 44. *Roy. lugdb.* 271.

Oxyacantha dioſcoridis ſ. Spina acuta, pyri folio. *Bauh. pin.* 454.

Uva urſi. *Dalech. hiſt.* 164.

Habitat in Galloprovinciæ, Italiæ *ſepibus.* ♄

arbutifolia. 3. MESPILUS inermis, foliis lanceolatis crenatis ſubtus tomentoſis. *Hort. cliff.* 189. *Roy. lugdb.* 271.

Sorbus virginiana, folio arbuti. *Herm. lugdb.* 578. *t.* 669.

Sorbus aucuparia virginiana, foliis arbuti, *Breyn. prodr.* 1. *p.* 15.

Habitat in Virginia. ♄

Amelanchier 4. MESPILUS inermis, foliis ovalibus ſerratis, cauliculis hirſutis.

Meſpilus inermis, foliis ovalibus ſerratis acutis. *Hort. cliff.* 189. *Roy. lugdb.* 271.

Alni affigie, lanato folio, minor. *Bauh. pin.* 452.

Vitis idæa III. *Cluſ. hiſt.* 1. *p.* 75.

Habitat in Helvetia, Auſtria, Galloprovincia. ♄

Tenella *adhuc herba ramis petiolis pedunculis foliis ſubtus villoſo-tomentoſa eſt, adulta fructifera glabra lanam exuit.*

canadenſis. 5. MESPILUS inermis, foliis ovato-oblongis glabris ſerratis, caule inermi.

Meſpilus inermis, foliis ſubtus glabris obverſe-ovatis. *Gron. virg.* 54.

Habitat in Virginia, Canada. ♄

6. ME

6. MESPILUS foliis ovatis integerrimis. *Hort. cliff.* 189. *Fl. ſuec.* 403. *Roy. lugdb.* 271. *Hall. helv.* 352. *Cotoneaſter.*
Cotoneaſter folio rotundo non ſerrato. *Bauh. pin.* 452.
Chamæ Meſpilus geſneri. *Cluſ. hiſt.* 1. *p.* 60.
Chamæ Meſpilus cordi. *Bauh. pin.* 452.
Habitat in Europæ *frigidioris collibus apricis inque* Pyreneis, Ararat. ♄

7. MESPILUS inermis, foliis ovalibus ſerratis glabris, floribus capitatis, bracteis deciduis linearibus. *Chamæ Meſpilus.*
Cratægus foliis ovalibus utrinque glabris plicatis indiviſis ſerratis. *Hort. cliff.* 497. *Vir. cliff.* 43. *Roy. lugdb.* 272. *Hall. helv.* 353.
Cotoneaſter folio oblongo ſerrato. *Bauh. pin.* 452.
Cotoneaſter forte geſneri. *Cluſ. hiſt.* 1. *p.* 63.
Habitat in alpibus Auſtriacis, Pyrenaicis. ♄
Folia *pruni argute ſerrata ſerraturis verſus apicem inflexis tenuiſſimis, utrinque nuda.* Stipulæ *lineares, petiolis longiores, deciduæ.* Corymbus *ex alis pedunculatus, conglobatus in capitulum, pedunculo ſubvilloſo, foliis dimidio brevior.* Bracteæ *inter flores lineares, flore longiores, coloratæ, deciduæ.*

PYRUS.

1. PYRUS foliis ſerratis, foliis baſi productis. *Hort. cliff.* 190. *Hort. upſ.* 130. *Fl. ſuec.* 401. *Roy. lugdb.* 266. *Hall. helv.* 351. *communis.*
Pyrus ſylveſtris. *Bauh. pin.* 439. *Dod. pempt.* 351. Pyraſter.
β Pyrus Bergamotta gallis. *Bauh. hiſt.* 1. *p.* 45. falerna.
γ. Pyrus boni chriſtiani. *Bauh. hiſt.* 1. *p.* 44. pompejana.
δ. Pyrus jeſu ſ. moſchatellina rubra. *Bauh. hiſt.* 1. *p.* 44. favonia.
ε. Pyra dorſalia eademque liberalia dicta. *Bauh hiſt.* 1. *p.* 53. Volema.
Habitat in Europa. ♄

2. PYRUS foliis ſerratis, pomis baſi concavis. *Hort cliff.* 189. *Hort. upſ.* 130. *Fl. ſuec.* 402. *Mat. med.* 237. *Roy. lugdb.* 266. *Hall. helv.* 351. *Malus.*
Malus ſylveſtris. *Bauh. pin.* 435. *Dod. pempt.* 790. ſylveſtris.
β. Malus pumila, quæ potius frutex quam arbor. *Bauh. pin.* 433. paradiſiaca.
γ. Malus praſomila. *Bauh. pin.* 433. praſomila.
δ. Malus ſativa, fructu ſanguinei coloris ex auſtero ſubdulci. *Tournef. inſt.* 635. rubelliana.
ε. Mala curtipendula dicta *Bauh. hiſt.* 1. *p.* 21. celliana.

ζ. Po-

Epirotica. ζ. Poma orbiculata. *Ruell. ſtirp.*
Habitat in Europa. ♄

coronaria. 3. PYRUS foliis ſerrato-anguloſis.
Malus ſylveſtris, floribus odoratis. *Gron. virg.* 55.
Habitat in Virginia. ♄

Cydonia. 4. PYRUS foliis integerrimis. *Hort. cliff.* 160. *Mat. med.* 238. *Roy. lugdb.* 267.
Malus cotonea ſylveſtris. *Bauh. pin.* 435.
β. Malus cotonea major. *Bauh. pin.* 434.
γ. Malus Cotonea minor. *Bauh. pin.* 434.
Cotonea & Cydonia. *Lob. hiſt.* 580.
Habitat ad ripas petroſas Danubii. ♄

TETRAGONIA.

fruticoſa. 1. TETRAGONIA foliis linearibus. *Roy. lugdb.* 250.
Tetragonia. *Hort. cliff.* 188. *Hort. upſ.* 126.
Tetragonocarpus africana rutilans, foliis longis & anguſtis. *Comm. hort.* 2. *p.* 205. *t.* 103.
Evonymo affinis africana, portulacæ folio. *Seb. theſ.* 2. *p.* 13. *t.* 11. *f.* 8.
Habitat in Æthiopia. ♃

herbacea. 2. TETRAGONIA foliis ovatis. *Roy. lugdb.* 450
Tetragonocarpos africana, radice magna craſſa & carnoſa. *Comm. hort.* 2. *p.* 203. *t.* 102.
Habitat in Æthiopia. ♄

MESEMBRYANTHEMUM.

* *Albis corollis.*

nodiflorum. 1. MESEMBRYANTHEMUM foliis alternis teretiuſculis obtuſis ciliatis. *Hort. upſ.* 129.
Kali craſſulæ minoris foliis. *Bauh. pin.* 289. *Moriſ. hiſt.* 2. *p.* 610. *ſ.* 5. *t.* 33. *f.* 7.
Kali neapolitanum aizoides repens. *Col. ecphr.* 2. *p.* 72. *t.* 73.
Kali II. *Alp. ægypt.* 125. *t.* 127.
Habitat in Ægypto, Neapoli. ☉

cryſtallinum 2. MESEMBRYANTHEMUM foliis alternis ovatis obtuſis undulatis. *Hort. cliff.* 216. *Hort. upſ.* 127. *Roy. lugdb.* 281.
Meſembryanthemum cryſtallinum, plantaginis folio undulato. *Dill. elth.* 231. *t.* 180. *f.* 211.

Fi-

Ficoides africana, folio plantaginis undulato micis argenteis adſperſo. T. *Bradl. ſucc.* 5. *t.* 15. *f.* 48.
Habitat in Africa? ☉

3. MESEMBRYANTHEMUM foliis ſemiteretibus, floribus ſeſſilibus axillaribus. *geniculiflorum.*
Meſembr. ramis undique papilloſis folio craſſioribus. *Hort. cliff.* 218. *Roy. lugdb.* 285.
Meſemb. capenſe geniculiflorum neapolitanum creditum. *Dill. elth.* 271. *t.* 205. *f.* 261.
Ficoides neapolitana, flore candido. H. *Bradl. ſucc.* 5. *t.* 17. *f.* 34.
Ficoides capenſe, folio tereti, flore albido. *Pet. gaz.* *t.* 78. *f.* 3.
Habitat ad Cap. b. Spei. ♄

4. MESEMBRYANTHEMUM foliis ſemicylindraceis, floribus quadifidis. *noctiflorum.*
Meſembr. foliis ſubulatis ſemicylindricis lævibus vix connatis apice recurvis. *Hort. cliff.* 220. *Roy. lugdb.* 286.
Meſembr. noctiflorum, flore intus candido extus phœniceo odoratiſſimo. *Dill. elth.* 273. *t.* 206. *f.* 262.
β. Meſemb. noctiflorum, flore intus candido extus ſtramineo odoratiſſimo. *Dill. elth.* 274. *t.* 206. *f.* 263.
Habitat in Africa. ♄
Calyx *huic quadrifidus, ſtyli* 4, *fructus quadrilocularis.*

5. MESEMBRYANTHEMUM foliis ſubtrigonis ſubulatis, caule erecto, corymbo trichotomo. *umbellatum.*
Meſembr. fruteſcens, floribus albis umbellatis. *Dill. elth.* 277. *t.* 208. *f.* 266.
Ficoides africana erecta teretifolia, floribus albis umbellatis. *Herm. par.* 166. *t.* 166. *Bradl. ſucc.* 4. *p.* 12. *t.* 44.
Habitat ad Caput b. Spei. ♄

6. MESEMBRYANTHEMUM acaule, foliis ſubteretibus connatis, floribus octagynis. *calamiforme.*
Meſembr. calamiforme. *Dill. elth.* 239. *t.* 186. *f.* 228.
Ficoides capenſis humilis, cepææ folio, flore ſtamineo. *Bradl. ſucc.* 2. *p.* 10. *f.* 19.
Habitat ad Cap. b Spei. ♃

7. MESEMBRYANTHEMUM foliis lanceolatis planis crenulatis. *Hort. cliff.* 217. *Hort. upſ.* 128. *Roy. lugdb.* 283. *Tripolium.*

 Me-

Meſembr. tripolii folio, flore argenteo. *Dill. elth.* 230 *t.* 179. *f.* 220.

Ficoides africanum, Meſembryanthemum ſ. Ficus aizoides major procumbens, tripolii folio magis ſucculento denticulis fimbriato. *Pluk. mant.* 77. *t.* 329 *f.* 4.

Habitat in Africa. ♂

* *Rubicundis corollis.*

bellidiflorum 8. MESEMBRYANTHEMUM acaule, foliis triquetris linearibus apice trifariam dentatis. *Hort. cliff.* 218.* *Roy. lugdb.* 283.

Meſembr. bellidiflorum. *Dill. elth.* 244. *t.* 189. *f.* 233.

Habitat in Africa ♃

deltoides. 9. MESEMBRYANTHEMUM caulefcens, foliis deltoidibus triquetris dentatis. *Hort. cliff.* 218.* *Roy. lugdb.* 284.

Meſembr. deltoides & dorſo & lateribus muricatis. *Dill. elth.* 255. *t.* 195. *f.* 246.

Ficus aizoides africana erecta, folio triangulari breviuſculo fimbriato, floribus roſeis odoratis. *Volk. heſp.* 223. *t.* 224. *f.* 5.

β. Meſembr. deltoides, dorſo & lateribus muricatis, majus. *Dill. elth.* 254. *t.* 196. *f.* 247.

γ. Meſembr. deltoides, non dorſo ſed lateribus muricatis. *Dill. elth.* 253. *t.* 195. *f.* 243. 244.

Habitat in Africa. ♄

barbatum. 10. MESEMBRYANTHEMUM foliis apice barbatis. *Hort. cliff.* 216. * *Hort. upſ.* 127. *Roy. lugdb.* 282.

Meſembr. radiatum, ramulis prolixis recumbentibus *Dill. elth.* 245. *t.* 190. *f.* 234.

Ficoides capenſis, tereti folio: apicibus hirtis. *Pet. gaz.* *t.* 77. *f.* 6.

Ficoides capenſis fruteſcens, folio tumido extremitate ſtellata, flore purpureo, *Bradl. ſucc.* 1. *p.* 6. *t.* 5. & 15.

Ficus aizoides, folio tereti in villos radiatos abeunte, flore rubro. *Volk. heſp.* 222. *t.* 124. *f.* 6.

β. Meſembr. radiatum humile, foliis minoribus. *Dill. elth.* 246. *t.* 190. *f.* 235.

γ. Meſembr. radiatum humile, foliis majoribus. *Dill. elth.* 248. *t.* 190. *f.* 236.

Habitat ad Cap. b. Spei. ♄

hiſpidum. 11. MESEMBRYANTHEMUM caule hiſpido, foliis cylindricis deflexis.

Me-

Meſembr. caule hiſpido. *Hort. cliff.* 217. * *Roy. lugdb.* 282.
Meſembr. piloſum micans, flore ſaturate purpureo. *Dill. elth.* 289. *t.* 277. *f.* 278.
β. Meſembr. piloſum micans, flore purpureo pallidiore. *Dill. elth.* 290. *t.* 214. *f.* 280. 279.
γ. Meſembr. piloſum micans, flore purpureo ſtriato. *Dill. elth.* 291. *t.* 215. *f.* 281.
Ficoides ſ. Ficus aizoides africana, folio longo tenui, flore aurantio. *Bradl. ſucc.* 4. *p.* 13. *t.* 35.
Ficus aizoides teretifolia, foliis cryſtallino rore eleganter conſperſis, floribus dilute roſeis. *Volk. heſp.* 221. *t.* 224. *f.* 2.
Habitat ad Cap. b. Spei. ♄

12. MESEMBRYANTHEMUM caule foliisque pubeſcentibus. *Hort. cliff.* 217. * *Roy. lugdb.* 282. *villoſum.*
Habitat in Africa. ♄

13. MESEMBRYANTHEMUM foliis ſubulatis ſubtus undique ſcabris. *Hort. cliff.* 219. * *Hort. upſ.* 129. *ſcabrum.*
Meſembr. purpureum ſcabrum, ſtaminibus expanſis *Dill. elth.* 259. *t.* 197. *f.* 250.
Ficoides capenſis, triangulari folio acuto, flore purpureo. *Pet. gaz. t.* 77. *f.* 3.
β. Meſembr. purpureum ſcabrum, ſtaminibus collectis. *Dill. elth.* 260. *t.* 197. *f.* 251.
Habitat in Africa. ♄

14. MESEMBRYANTHEMUM articulis caulinis terminatis in folia acuminata ſubtus dentata. *Hort. cliff.* 218. *Roy. lugdb.* 284. *uncinatum.*
Meſembr. perfoliatum, foliis minoribus diacanthis. *Dill. elth.* 250. *t.* 193. *f.* 239.
Ficoides afra, folio triangulari glauco perfoliato breviſſimo apice ſpinoſo *Bradl. ſucc.* 3. *t.* 27.
β. Meſembr. perfoliatum, foliis majoribus triacanthis. *Dill. elth.* 251. *t.* 193. *f.* 240.
Ficoides africana fruteſcens perfoliata, folio triangulari glauco punctato. *Bradl. ſucc.* 5. *p.* 13. *t.* 46.
Habitat in Africa. ♄

15. MESEMBRYANTHEMUM ſpinis ramoſis. *Hort. cliff.* 216. * *Roy. lugdb.* 281. *ſpinoſum.*
Meſembr. fruticeſcens, ramis triacanthis *Dill. elth.* 276. *t.* 208. *f.* 265.
Ficoides africana, aculeis longiſſimis & foliolis naſcend-

bus ex foliorum alis. *Tournef. act.* 1705. *p.* 316
Bradl. ſucc. 41. *t.* 39.
Habitat in Africa. ♄

tuberoſum. 16. MESEMBRYANTHEMUM foliis ſubulatis papilloſis, radice capitata. *Hort. cliff.* 216.* *Roy. lugdb.* 282.
Meſembr. fruticeſcens, radice ingenti tuberoſa. *Dill. elth.* 275. *t.* 207. *f.* 264.
Habitat in Africa. ♄

tenuifolium. 17. MESEMBRYANTHEMUM foliis ſubulatis ſemiteretibus glabris internodio longioribus. *Hort. cliff.* 220. *Hort. upſ.* 128. *Roy. lugdb.* 286.
Meſembr. tenuifolium procumbens, folio tenuiore viridi, flore coccineo. *Dill. elth.* 264. *t.* 201. *f.* 256.
Ficoides capenſis humilis teretifolia, flore coccineo. *Bradl. ſucc.* 1. *p.* 13. *t.* 9.
Ficoides africana minor procumbens, folio tenuiore viridi, flore coccineo. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 507. *ſ.* 12. *t.* 8. *f.* 6.
Habitat in Africa. ♄

ſtipulaceum. 18. MESEMBRYANTHEMUM foliis ſubulatis ſubcylindraceis obſolete papilloſis diſtinctis. *Hort. cliff.* 220. *Roy. lugdb.* 287.
Meſembr. fruteſcens, flore purpureo rariore. *Dill. elth.* 279. *t.* 209. *f.* 267. 268.
Habitat in Africa. ♄

craſſifolium. 19. MESEMBRYANTHEMUM caule repente ſemicylindraceo, foliis ſemicylindricis lævibus connatis apice triquetris. *Hort. cliff.* 217.* *Roy. lugdb.* 283.
Meſembr. craſſifolium repens, flore purpureo. *Dill. elth.* 266. *t.* 201. *f.* 257.
Ficoides africana reptans, folio triangulari viridi, flore ſaturate purpureo. *Bradl. ſucc.* 4. *p.* 16. *t.* 38.
Habitat in Africa. ♃

falcatum. 20. MESEMBRYANTHEMUM foliis acinaciformibus diſtinctis lævibus, ramis teretibus. *Hort. cliff.* 219.* *Roy. lugdb.* 285.
Meſembr. falcatum minimum, flore purpureo parvo. *Dill. elth.* 288. *t.* 213. *f.* 276.
Ficoides afra, folio triangulari enſiformi breviſſimo, flore dilute purpuraſcente filamentoſo. *Bradl. ſucc.* 5. *p.* 9. *t.* 42.
Habitat in Africa. ♄

* *Luteis corollis.*

21. MESEMBRYANTHEMUM foliis acinaciformibus connatis: angulo carinali ſcabris, ramis angulatis. *Hort. cliff.* 219. *Roy. lugdb.* 284. *acinaciforme*
Meſembr. acinaciforme, flore ampliſſimo purpureo. *Dill. elth.* 282. *t.* 211. *f.* 270. & *t.* 212. *f.* 271. purpureum
β. Meſembr. falcatum majus, flore amplo luteo. *Dill. elth.* 283. *t.* 212. *f.* 272. flavum.
Ficoides ſ. Ficus aizoides africana major procumbens, triangulari folio, fructu maximo eduli. *Herm. lugdb.* 244. *t.* 245. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 506. *f.* 12. *t.* 7. *f.* 1.
γ. Meſembr. falcatum majus, flore purpureo mediocri. *Dill. elth.* 285. *t.* 211. *f.* 273.
Habitat ad Cap. b. Spei. ♄

22. MESEMBRYANTHEMUM foliis ſubtriquetris ſcabris, corollis bicoloribus. *bicolor.*
Meſembr. tenuifolium fruticeſcens, flore croceo. *Dill. elth.* 207. *t.* 202. *f.* 258.
Ficoides ſ. Ficus aizoides africana minor erecta, triangulari folio viridi, flore intus aureo; foris purpureo. *Herm. lugdb.* 250. *t.* 249. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 507. *f.* 12. *t.* 6. *f.* 4.
Ficoides capenſis fruteſcens, folio tereti punctato, petalis luteis. *Bradl. ſucc.* 1. *p.* 8. *t.* 7.
Habitat in Africa. ♄
Corollæ extus purpureæ, intus flavæ.

23. MESEMBRYANTHEMUM foliis ſubulatis triquetris: angulo carinali retrorſum ſerratis. *Hort. cliff.* 218. *Roy. lugdb.* 284. *ſerratum.*
Meſembr. ſerratum, flore acetabuliformi luteo. *Dill. elth.* 249. *t.* 192. *f.* 238.
Habitat in Africa. ♄

24. MESEMBRYANTHEMUM foliis ſubulatis ſubcylindraceis papilloſis diſtinctis, caule ſcabro. *Hort. cliff.* 220. * *Roy. lugdb.* 287. *micans.*
Meſembr. micans, flore phœniceo: filamentis atris. *Dill. elth.* 292. *t.* 215. *f.* 282.
Ficoides capenſis, tereti folio, flore croceo. *Pet. gaz.* *t.* 7. *f.* 9.
Ficoides capenſis, folio tereti argenteo, petalis perplurimis aurantiacis. *Bradl. ſucc.* 1. *p.* 9. *t.* 8.
Habitat ad Cap. b. Spei. ♄

ſplendens. 25. MESEMBRYANTHEMUM foliis linearibus obſolete triquetris diſtinctis: ſummis imbricatis lævibus. *Hort. cliff.* 220. *
Meſembr. foliis confertis ſplendentibus, flore pallido. *Dill. elth.* 270. *t.* 204. *f.* 260.
Ficoides capenſis fruteſcens, foliis teretibus confertis glaucis, flore albo. *Bradl. ſucc.* 1. *p.* 7. *t.* 6.
β Meſembr. foliis triquetris gibbis oppoſitis imbricatis, ramis inferne nudis. *Hort. cliff.* 220. *Roy. lugdb.* 286.
Habitat ad Cap. b. Spei. ♄

roſtratum. 26. MESEMBRYANTHEMUM acaule, foliis ſemicylindricis connatis externe tuberculatis. *Hort. cliff.* 219. *Roy. lugdb.* 285.
Meſembr. roſtrum ardeæ referens. *Dill. elth.* 240. *t.* 186. *f.* 239.
Habitat in Africa. ♃

verruculatum. 27. MESEMBRYANTHEMUM foliis ſubcylindricis acutis connatis arcuatis lævibus. *Hort. cliff.* 220. *Hort. upſ.* 128. *Roy. lugdb.* 285.
Meſembr. foliis verruculiformibus, floribus mellinis umbellatis. *Dill. elth.* 268. *t.* 203. *f.* 259.
Habitat in Africa. ♄

glaucum. 28. MESEMBRYANTHEMUM foliis ſubulatis triquetris ſtrictis acutis: punctis pellucidis obſoletis ſparſis. *Hort. cliff.* 220. *Roy. lugdb.* 283.
Meſembr. ſcabrum, flore ſulphureo convexo. *Dill. elth.* 156. *t.* 196. *f.* 248.
Ficoides africana fruteſcens, folio triangulari breviore glauco. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 507. *f.* 12. *t.* 5. *f.* 3.
Ficoides afra, caule lignoſo, erecta, folio triangulari enſiformi ſcabro, flore luteo magno. *Bradl. ſucc.* 4. *p.* 15. *t.* 32.
Ficoides ſ. Ficus aizoides africana minor erecta, folio triangulari glauco, flore luteo. *Herm. lugdb.* 247. *t.* 248.
Habitat in Africa. ♄

loreum. 29. MESEMBRYANTHEMUM cauleſcens, foliis ſubulatis ſemicylindricis recurvis connatis longis. *Hort. cliff.* 219. *. *Hort. upſ.* 128. *Roy. lugdb.* 285.
Meſembr. foliis corniculatis longioribus. *Dill. elth.* 262. *t.* 199. *f.* 253. 254.
Ficoides capenſis, folio triangulari, flore luteo intus pallido. *Pet. gaz.* *t.* 77. *f.* 10.

β Me

β. Meſembr. foliis corniculatis brevioribus. *Dill. elth.* 261. *t.* 198. *f.* 252.
Ficoides africana reptans, folio triangulari craſſo longiſſimo, flore intus luteo extus aurantiaco. *Bradl. ſucc.* 4. *p.* 18. *t.* 40.
γ. Meſembr. loreum. *Dill. elth.* 264. *t.* 200. *f.* 255.
Habitat in Africa. ♃

30. MESEMBRYANTHEMUM foliis planis oppoſitis ovatis acuminatis connatis integerrimis. *Hort. cliff.* 217. * *Roy. lugdb.* 283. *tortuoſum.*
Meſembr. tortuoſum, foliis ſempervivi expanſis. *Dill. elth.* 234. *t.* 182. *f.* 223.
Ficoides capenſis, folio lato acuto, flore albo intus luteo. *Pet. gaz. t.* 78. *f.* 10.
Ficoides africana procumbens, foliis planis conjugatis lucidis. *Bradl. ſucc.* 3. *p.* 7. *t.* 16.
β. Meſembr. tortuoſum, foliis ſempervivi congeſtis. *Dill. elth.* 233. *t.* 181. *f.* 222.
Ficoides capenſis procumbens, oleæ folio, flore albo medio croceo. *Bradl. ſucc.* 2. *p.* 7. *t.* 16.
Habitat ad Cap. b. Spei. ♃
Petala exteriora albida, interiora flava ſunt.

31. MESEMBRYANTHEMUM ſubacaule, foliis ciliato-dentatis. *Hort. cliff.* 218. * *Roy. lugdb.* 283. *ringens.*
Meſembr. rictum caninum referens. *Dill. elth.* 241. *t.* 188. *f.* 231. *caninum.*
Ficoides capenſis humilis, folio triangulari prope ſummitatem dentato, flore luteo. *Bradl. ſucc.* 2. *p.* 8. *t.* 17.
β. Meſembr. rictum felinum repræſentans. *Dill. elth.* 240. *t.* 187. *f.* 230. *felinum.*
Ficoides afra, folio triangulari enſiformi craſſo brevi ad margines laterales multis majoribus ſpinis aculeato. *Mart. cent.* 30. *t.* 30.
Habitat ad Cap. b. Spei. ♃

32. MESEMBRYANTHEMUM foliis dolabriformibus. *Hort. cliff.* 219. *Roy. lugdb.* 284. *dolabriforme.*
Meſembr. folio dolabriformi. *Dill. elth.* 248. *t.* 191. *f.* 237.
Ficoides capenſis humilis, foliis cornua cervi referentibus, petalis luteis, noctiflora. *Bradl. ſucc.* 1. *p.* 11. *t.* 10.
Habitat in Africa. ♃

33. MESEMBRYANTHEMUM foliis difformibus *Roy. lugdb.* 287. *difforme.*

Meſembryanth. foliis difformibus, flore luteo. *Dill. elth* 252. *t.* 194. *f.* 241. 242.

Ficoides Meſembryanthemum craſſiſſimo & valde ſucculento folio nigris punctis notato. *Pluk. alm.* 148. *t.* 325. *f.* 4.

Habitat in Æthiopia. ♄

linguiforme. 34. MESEMBRYANTHEMUM acaule, foliis linguiformibus altero margine craſſioribus. *Hort. cliff.* 219. *Hort. upſ.* 128. *Roy. lugdb.* 282

Meſembryanth. folio ſcalprato. *Dill. elth.* 235. *t.* 183. *f.* 224.

β. Maſembr. folio lingniformi latiore. *Dill. elth.* 236. *t.* 184. *f.* 224.

γ. Meſembr. folio linguiformi anguſtiore. *Dill. elth.* 238. *t.* 185. *f.* 226.

δ. Meſembr. folio linguiformi longiore. *Dill. elth.* 23. *t.* 185. *f.* 227.

Habitat in Africa. ♃

Hæc Decagyna eſt.

pugioniforme. 35. MESEMBRYANTHEMUM foliis alternis ſubulatis triquetris longiſſimis. *Hort. cliff.* 216. * *Hort. upſ.* 129. *Roy. lugdb.* 281.

Meſembr. folio pugioniformi, flore amplo ſtramineo. *Dill. elth.* 280. *t.* 210. *f.* 269.

Ficus capenſis, caryophylli folio, flore aureo ſpecioſo. *Bradl. ſucc.* 2. *p.* 5. *t.* 14.

Habitat ad Cap. b. Spei. ♄

Hæc polygyna eſt.

AIZOON

canarienſe. 1. AIZOON foliis cuneiformi-ovatis, floribus ſeſſilibus. *Hort. upſ.* 127.

Aizoon foliis obverſe ovatis. *Hort. cliff.* 41; *Roy. lugdb.* 221.

Ficoidea procumbens, portulacæ folio. *Niſſ. act.* 1711. *p.* 422. *t.* 13. *f.* 1.

Kali aizoides canarienſis procumbens. *Pluk. alm.* 202. *t.* 304. *f.* 4. *Volk. norib.* 236. *t.* 236.

Habitat in Canariis. ☉

hiſpanicum. 2. AIZOON foliis lanceolatis, floribus ſeſſilibus.

Ficodea hiſpanica annua, folio longiore. *Dill. elth.* 143. *t.* 117. *f.* 143.

Habitat in Hiſpania. ☉

paniculatum 3. AIZOON foliis lanceolatis, floribus paniculatis.

Aizo-

Aizoon foliis lanceolatis ſubtus hirſutis. *Roy. lugdb.* 221.
Habitat in Africa.

SPIRÆA.

1. SPIRÆA foliis lanceolatis obtuſis ſerratis nudis, floribus duplicato-racemoſis. *Hort. cliff.* 191. *Hort. upſ.* 131. *Roy. lugdb.* 277. *ſalicifolia.*
Spiræa theophraſti forte. *Cluſ. hiſt.* 1. *p.* 80.
Frutex ſpicatus, foliis ſerratis ſalignis. *Bauh. pin.* 475.
Spiræa ſalicis folio longiore ſerrato, floribus rubris. *Amm. ruth.* 265.
Habitat in Sibiria, Tataria. ♄

2. SPIRÆA foliis lanceolatis inæqualiter ſerratis ſubtus tomentoſis, floribus duplicato-racemoſis. *tomentoſa.*
Ulmaria pentacarpos, integris ſerratis foliis parvis ſubtus incanis, virginiana. *Pluk. alm.* 393. *t.* 321 *f.* 5.
Habitat in Philadelphia. *Kalm.* ♄
Differt a præcedenti Foliis magis profunde & inæqualiter ſerratis; foliis *ſubtus valde tomentoſis adeoque craſſis*; racemo *terminali compoſito denſiori longiori.* Floribus *demum magis rubris*, & Corollis *octuplo-minoribus.*

3 SPIRÆA foliis integerrimis, umbellis ſeſſilibus. *Hort. upſ.* 131. *hypericifolia*
Spiræa foliis integerrimis, pedunculis ſimplicibus. *Hort. cliff* 190. *Roy. lugdb.* 277.
Pruno ſylveſtri affinis canadenſis. *Bauh. pin* 517. *Pluk. alm.* 308. *t.* 218. *f.* 5.
Habitat in Canada. ♄

4. SPIRÆA foliis ovatis inciſo-ſerratis glabris, umbellis pedunculatis. *chamædryfolia,*
Spiræa chamædryos foliis. *Amm. ruth.* 269.
Habitat in Sibiria. *D. Gmelin.* ♄

5. SPIRÆA foliis oblongiuſculis apice ſerratis, corymbis lateralibus. *crenata.*
Spiræa hiſpanica, hyperici folio crenato. *Barr. rar.* 1376. *t.* 564.
Spiræa hyperici folio ampliore, modo integro modo dentato. *Amm. ruth.* 270.
Habitat in Sibiria, Hiſpania. ♄

6. SPIRÆA foliis lobatis ſerratis, corymbis terminalibus. *opulifolia.*

Spiræa foliis inciſis angulatis, floribus corymboſis. *Hort. cliff.* 190. *Gron. virg.* 55. *Roy. lugdb.* 277.

Evonymus virginiana, ribeſii folio, capſulis eleganter bullatis. *Comm. hort.* 1. *p.* 169. *t.* 87.

Habitat in Virginia, Canada. ♄

ſorbifolia. 7. SPIRÆA foliis pinnatis, foliolis uniformibus ſerratis, caule fruticoſo, floribus paniculatis.

Spiræa foliis pinnatis. *Amœn. acad.* 2. *p.* 352. *

Spiræa ſorbi folio tenniter crenato, floribus in thyrſo albis. *Amm. ruth.* 186.

Habitat in Sibiriæ *uliginoſis*. ♄

Aruncus. 8. SPIRÆA foliis ſupradecompoſitis, ſpicis paniculatis, floribus dioicis.

Aruncus. *Hort. cliff.* 463. *Roy. lugdb.* 278. *Gron. virg.* 121.

Barba capræ floribus oblongis. *Bauh. pin.* 163.

Barba capræ. *Cam. hort.* 26. *t.* 9.

Habitat in Auſtriæ, Alverniæ *montanis*. ♃

Filipendula. 9. SPIRÆA foliis pinnatis: foliolis uniformibus ſerratis, caule herbaceo, floribus cymoſis.

Filipendula foliis pinnatis: foliolis uniformibus. *Hort. cliff.* 191. *Fl. ſuec.* 404. *Mat. med.* 239. *Roy. lugdb.* 277.

Filipendula vulgaris. *Bauh. pin.* 163.

Filipendula. *Cam. epit.* 608.

Habitat in Europæ *paſcuis*. ♃

Ulmaria. 10. SPIRÆA foliis pinnatis: impari majore lobato, floribus cymoſis. *Fl. lapp.* 201. *Hort. cliff.* 191. *Fl. ſuec.* 405. *Mat. med.* 241. *Roy. lugdb.* 277.

Barba capræ floribus compactis. *Bauh. pin.* 164.

Regina prati. *Dod. pempt.* 57.

Habitat in Europæ *pratis uliginoſis, umbroſis*. ♃

trifoliata. 11. SPIRÆA foliis ternatis ſerratis ſubæqualibus, floribus ſubpaniculatis.

Filipendula foliis ternatis. *Hort. cliff.* 191. *Hort. upſ.* 131. *Roy. lugdb.* 277. *Gron. virg.* 55.

Ulmaria major trifolia, flore amplo pentapetalo, virginiana. *Pluk. alm.* 393. *t.* 236. *f.* 5. *Raj. ſuppl.* 330.

Ulmaria virginiana trifolia, floribus candidis amplis longis & acutis. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 323.

Habitat in Virginia, Canada.

DA-

DALIBARDA.

1 DALIBARDA *repens.*
Habitat in Canada. *Kalm.* ♃
Radix *repens.* Stolones *reptantes, herbacei.* Folia *cordata, obtuſa, obtuſe crenata, venoſa, pilis raris adſperſa.* Petioli *piloſi, foliis ſæpius longiores.* Scapi *nudi, piloſi, longitudine petiolorum, uniflori.* Calyx *quinquepartitus.* Corolla *alba.* Semina 5, *nuda, ovata. Diverſa a* Rubo *ſeminibus nudis.*

POLYGYNIA.

ROSA.

1 ROSA inermis, calycis foliolis indiviſis, fructu oblongo. *Hall. helv.* 348. *cinnamomea*
Roſa ſylveſtris, odoratiſſimo rubro flore. *Bauh. pin* 483.
Habitat in Helvetia. ♄

2. ROSA aculeata, foliis odoratis ſubtus rubiginoſis. *Hall. helv.* 350. *Dalib. pariſ.* 145. *eglanteria.*
Roſa ſylveſtris, foliis odoratis. *Bauh. pin.* 483.
Roſa eglanteria. *Tabern. ic.* 1087.
Habitat in Helvetia, anglia. ♄

3. ROSA foliis utrinque villoſis, fructu ſpinoſo. *Hall. helv.* 350. *villoſa.*
Roſa ſylveſtris pomifera major. *Bauh. pin.* 484.
Habitat in Europa *auſtrali.* ♄

4. ROSA caule aculeato, petiolis inermibus, calycibus ſemipinnatis. *Fl. ſuec.* 406. *canina.*
Roſa ſylveſtris [illegible] re odorato incarnato. *Bauh. pin.* 483.
Habitat in Europa. ♄

5. ROSA caule petiolisque aculeatis, calycis foliolis indiviſis. *Fl. ſuec.* 407. *ſpinoſiſſima.*
Roſa campeſtris ſpinoſiſſima, flore albo odorato. *Bauh pin.* 483.
Habitat in Europa. ♄

6. ROSA caule aculeato, pedunculis hiſpidis, calycibus ſemipinnatis glabris. *centifolia.*
Roſa multiplex media *Bauh. pin.* 482.

Ro-

Roſa centifolia batavica II. *Cluſ. hiſt.* I. *p.* 114.
Habitat in Europa. ♄

alba 7. ROSA caule aculeato, pedunculis lævibus, calycibus ſemipinnatis glabris.
Roſa alba vulgaris major. *Bauh. pin.* 482.
β. Roſa alba, flore pleno. *Beſl. eyſt. vern.* 6. *t.* 3. *f.* 1.
Habitat in Europa. ♄

gallica. 8. ROSA foliis carinatis ſubtus ſcabris. *Dalib. pariſ.* 145. †
Habitat in Gallia. ♄

indica. 9. ROSA ſubinermis, foliolis quinis ſubtus tomentoſis: impari majori, ſtipulis obſoletis.
Roſa chuſan glabra, juniperi fructu. *Pet. gaz.* 56. *t.* 35. *f.* 11.
Habitat in China, ♄
Rami *inermes; rarius armati una alterave ſpina tenuiſſima verſus folia vel in petiolis.* Folia *pinnata: Foliolis quinis, ſubtus tomentoſis, ſupra glabris, ſerratis: extimo duplo majore.* Pedunculi *longi, nudi, ſimplices.* Calyx *inciſus, lævis.* Fructus *magnitudine Sorbi aucupariæ. Species Roſarum difficile diſtingvuntur, difficilius determinantur; mihi videtur naturam miſcuiſſe plures vel luſu ex uno plures formaſſe; hinc qui paucas vidit ſpecies facilius eas diſtinguit, quam qui plures examinavit.*

ſempervirens. 10. ROSA caule aculeato, foliolis quinis glabris perennantibus.
Roſa ſempervirens jungermanni. *Cluſ. hiſt.* 2. *app. alt.* *Dill. elth.* 326. *t.* 246. *f.* 318.
Roſa moſchata ſempervirens. *Bauh. pin.* 482.
Habitat in Germania. ♄

pendulina. 11. ROSA fructibus oblongis pendulis.
Roſa ſangviſorbæ majoris folio, fructu longo pendulo *Dill. elth.* 325. *t.* 245. *f.* 317.
Habitat in Europa. ♄

carolina. 12. ROSA foliis ſerratis medio tenus integerrimis.
Roſa carolina fragrans, foliis medio tenus ſerratis. *Dill. elth.* 325. *t.* 245. *f.* 316.
Habitat in Carolina.

RUBUS.

* *Fruteſcentes.*

idæus. 1. RUBUS foliis quinato-pinnatis ternatiſque, caule aculea-

culeato, petiolis canaliculatis. *Fl. ſuec.* 408. *Mat.med.* 242.

Rubus caule erecto hiſpido, foliis ternatis. *Fl. lapp.* 204. *Hort. cliff.* 192. *Hort. upſ.* 133. *Roy. lugdb.* 273

Rubus idæus ſpinoſus. *Bauh. pin.* 479.

β. Rubus idæus fructu albo. *Bauh. pin.* 479.

γ. Rubus idæus lævis. *Bauh. pin.* 479.

Habitat in Europæ *lapidoſis.* ♃. ♄

2. RUBUS foliis quinato-pinnatis ternatisque, caule aculeato, petiolis teretibus. *occidentalis*

Rubus foliis longioribus ſubtus molli lanugine obductis & incanis, flore & fructu minoribus. *Sloan. jam.* 173. *hiſt.* 2. *p.* 109. *t.* 213. *f.* 1. *Raj. dendr.* 76.

Rubus idæus, fructu nigro, virginianus. *Dill. elth.* 327. *t.* 287. *f.* 319.

Habitat in Canada. *Kalm.*

Caulis *teres, lævis; aculeis recurvis.* Petioli *teretes aculeis recurvis.* Folia *ternata, intermedio pedicellato, ovata, inciſo-ſerrata, ſubtus albo-tomentoſa.* Racemus *terminalis.* Fructus *niger, variat etiam fructu rubro. magis acido quam R. idæi.* Differt *imprimis a R. idæo, cui ſimillimus, petiolis teretibus nec canaliculatis.*

3. RUBUS foliis ternatis nudis, caulibus petiolisque hiſpidis. *hiſpidus.*

Habitat in Canada. *Kalm.* ♄

Caules *viticulis longis, procumbentibus, lignoſis, una cum petiolis adſperſi ſetis rigidis.* Folia *ternata, nuda, inciſo-ſerrata: intermedio pedicellato; pedunculi etiam hiſpidi.*

4. RUBUS foliis ternatis nudis, caule aculeato: *Hort. cliff.* 192. *Fl. ſuec.* 163. *Gron. virg.* 163. *Roy. lugdb.* 273. *Hall. helv.* 344. *cæſius.*

Rubus repens, fructu cæſio. *Bauh. pin.* 479.

Rubus minor. *Dod. pempt.* 742.

Habitat in Europæ *dumetis.* ♄

Folia *ſubtus non tomentoſa, quamvis ſæpe pubeſcentia.*

5. Rubus foliis quinato-digitatis ternatisque, caule petiolisque aculeatis. *Fl. ſuec.* 409. *fruticoſus.*

Rubus caule aculeato, foliis ternatis ac quinatis. *Hort. cliff.* 192. *Gron. virg.* 163. *Roy. lugdb.* 273.

Rubus vulgaris ſ. Rubus fructu nigro. *Bauh. pin.* 479.

Rubus. *Cam. epit.* 751.

β. Rubus vulgaris major, fructu albo. *Raj. angl.* 3. *p.* 467.

γ. Ru-

γ. Rubus flore albo pleno. *Magn. hort.* 175.
Habitat in ſepibus præſertim maritimis Europæ. ♄

canadenſis. 6. RUBUS foliis digitatis denis quinis ternatisque, caule inermi.
Habitat in Canada. *Kalm.*
Caulis *ſubpurpureus.* Foliola *lanceolata, utrinque nuda, tenuiſſima, argute ſerrata.* Bracteæ *lanceolatæ.* Stipulæ *lineares, acutæ.*

odoratus 7. RUBUS foliis ſimplicibus palmatis, caule inermi multifolio multifloro. *Hort. cliff.* 192. * *Hort. upſ.* 133 *Roy. lugdb.* 274.
Rubus odoratus. *Corn. canad.* 149. *t.* 150.
Habitat in Canada. ♃ - ♄

* *Herbacei.*

ſaxatilis. 8. RUBUS foliis ternatis nudis, flagellis reptantibus herbaceis. *Fl. ſuec.* 411.
Rubus caule repente annuo, foliis ternatis. *Fl. lapp.* 206. *Roy. lugdb.* 274. *Hall. helv.* 344. *Roy. lugdb.* 274.
ChamæRubus ſaxatilis. *Bauh. pin.* 110.
Habitat in Europæ *collibus lapidoſis.* ♃

arcticus. 9 RUBUS foliis ternatis, caule inermi unifloro. *Fl. ſuec.* 412. *Mat. med.* 244.
Rubus caule unifloro, foliis ternatis. *Fl. lapp.* 207. *t.* 5. *f.* 2. *Hort. cliff.* 292. *Roy. lugdb.* 274.
Rubus humilis, flore purpureo. *Buxb. cent.* 5. *p.* 13. *t.* 26. *mala.*
Rubus trifolius humilis non ſpinoſus, ſapore & odore fragariæ, fructu rubro polycocco. *Amm. ruth.* 185.
Habitat in Bothnia Sueciæ, Sibiria, Canada. ♃

Chamæmorus. 10. RUBUS foliis ſimplicibus lobatis, caule unifloro. *Fl. ſuec.* 413. *Mat. med.* 244.
Rubus caule bifolio unifloro, foliis ſimplicibus. *Fl. lapp.* 208. *t.* 5. *f.* 1. *Hort. cliff.* 192. *Roy. lugdb.* 279.
ChamæRubus foliis ribes. *Bauh. pin.* 480.
Morus norvegica. *Till. aboenſ.* 47. *t.* 150.
Habitat in Sueciæ *paludibus uliginoſis, turfoſis frequens.* ♃

FRAGARIA.

veſca. FRAGARIA flagellis reptans. *Hort. cliff.* 192. *Hort. upſ.* 133. *Fl. ſuec.* 414. *Mat. med.* 245. *Roy. lugdb.* 274. *Hall. helv.* 243. Fra-

Fragaria vulgaris. *Bauh. pin.* 326. *Fl. lapp.* 209. *Gron. virg.* 56. ſylveſtris.
Fragaria fructu albo. *Bauh. pin.* 326.
β. Fragaria fructu parvi pruni magnitudine. *Bauh. pin.* 327. ſativa.
γ. Fragaria chiloenſis, fructu maximo, foliis carnoſis hirſutis. *Dill. elth.* 145. *t.* 120. *f.* 146. chiloenſis.
Habitat in Europæ *borealis ſterilibus, duris, apricis.* ♃

2. FRAGARIA caule erecto ſuffruticoſo, foliis hirſutis. muricata.
Fragaria arborea, flore herbaceo. *Zan. hiſt.*
Fragaria major veſca, flore herbaceo. *Moriſ. hiſt.* 2. *p.* 186.
Habitat in - - - ♄
Folia *inter flores diſtinguunt hanc a prima.*

3. FRAGARIA caule decumbente repente. *Roy. lugdb.* 274. *Dalib. pariſ.* 147. *Sauv. monſp.* 177. ſterilis.
β. Fragaria ſterilis. *Bauh. pin.* 327.
Fragaria ſterilis ſ. minime veſca hirſuta minime incana. *Moriſ. hiſt.* 2. *p.* 196. *ſ.* 2. *t.* 19. *f.* 5.
Fragaria ſylveſtris minime veſca ſ. ſterilis. *Lob. ic.* 698
Habitat in Anglia. ♃
Caules *procumbentes, nullus rectus;* Pedunculi *axillares, uniflori;* Foliola *ovalia;* Baccæ *exſuccæ.*

POTENTILLA

* *Foliis pinnatis.*

1. POTENTILLA foliis pinnatis, caule fruticoſo. *Hort. cliff.* 193. *Fl. ſuec.* 416. *Roy. lugdb.* 275. fruticoſa.
Pentaphylloides rectum fruticoſum eboracenſe. *Moriſ. hiſt.* 2. *p.* 193. *ſ.* 2. *t.* 23. *f.* 5. *Hortul. angl.* 54 *t.* 54.
Pentaphylloides rectum fruteſcens. *Walth. hort.* 95. *t.* 17
Pentaphylloides fruticoſa elatior. *Amm. ruth.* 88. *t.* 17. & 89. *t.* 18. *f.* 1.
Habitat in Eboraco, Anglia, Oelandia *auſtrali*, Sibiria. ♄

2. POTENTILLA foliis pinnatis ſerratis, caule repente. *Fl. lapp.* 210. *Fl. ſuec.* 415. *Hort. cliff.* 193. *Mat. med.* 246. *Roy. lugdb.* 275. Anſerina.
Potentilla. *Bauh. pin.* 321. *Cam. epit.* 758.
Habitat in Europæ *paſcuis; in argilloſis argentea.* ♃

3. POTENTILLA foliis bipinnatis utrinque tomentoſis: ſegmentis parallelis approximatis, caulibus decumbentibus. ſericea.

Po-

Potentilla foliis duplicato-pinnatis: pinnulis linearibus integerrimis brevibus. *Gmel. mſſ.*

Habitat in Sibiria. ♃

Habitus *foliorum P. anſerinæ argenteæ, quamvis minima ſunt; caulis vero & fructificationes P. vernæ.* Radix *ſquamis foliorum ruderibus nigris veſtita.* Folia *pinnata ex* 13 *circiter foliolis ovatis, tomentoſis, ſericeis, pectinato-pinnatifidis, & paralleliſſ.* Pedunculi *piloſi.* Caules *foliis duplo ſ. triplo longiores, decumbentes absque ſarmentis, nec repentes, in medio folio unico minori magisque divaricato inſtructi, teretes, apice* Floribus *aliquot luteis, alternis, pedunculatis.*

multifida. 4. POTENTILLA foliis bipinnatis: ſegmentis integerrimis diſtantibus ſubtus tomentoſis, caule decumbente.

Pentaphylloides ſupinum minus, folio glabro, non ſerrato. *Amm. ruth.* 116.

Pentaphylloides repens, foliis pinnatis. *Bauh. cent.* 1. *p.* 30. *t.* 49. *f.* 1.

β. Pentaphylloides ſupina minor, foliis alatis hirſutis varie diſſectis. *Amm. ruth.* 117.

Habitat in Sibiria, Tataria, Cappadocia. ♃

Habitus *multa indicat affinia cum P. argentea.* Folia *ex ſeptem foliolis, ſegmentis linearibus ſ. lanceolatis, quinis ſ. ſummum ſeptenis, alternis, at in impari oppoſitis, a ſe invicem hiantibus ſive apice remotis, ſubtus tomentoſis.*

fragarioides. 5. POTENTILLA foliis pinnatis ternatisque: extimis majoribus, flagellis reptantibus.

Potentilla foliis ternatis hirſutis utrinque viridibus: lobatis acceſſoriis. *Gmel. mſſ.*

Habitat in Sibiria. ♃

Facies *Fragariæ ſterilis.* Radix *ſubtuberoſa.* Folia *ſericea petiolis piloſis, pinnata ex* 3. 5. *vel* 7. *Foliolis ovatis, oppoſitis, ſerratis, baſi quo propioribus eo minoribus.* Stolones *decumbentes.*

rupeſtris. 6. POTENTILLA foliis pinnatis alternis: foliolis quinis ovatis crenatis, caule erecto. *Hort. cliff.* 193. *It. wgoth.* 63. 76. *Roy. lugdb.* 275.

Pentaphylloides erectum. *Bauh. hiſt.* 2. *p.* 398. *Moriſ. hiſt.* 2. *p.* 192. *ſ.* 2. *t.* 20. *f.* 1.

Quinquefolium fragiferum. *Bauh. pin.* 326. *Cluſ. hiſt.* 2. *p.* 107. *n.* 5.

Ha-

Habitat ad latera montium Weſtrogothiæ, Sibiriæ, Germaniæ. ♃

7. POTENTILLA foliis pinnatis ſubæqualibus: foliolis oblongis ſub-bifidis: extimis confluentibus. *bifurca.*
Pentaphylloides orientale ſupinum, foliis alatis bifidis vel trifidis. *Tournef. cor.* 21.
Habitat in Sibiria. ♃

8. POTENTILLA foliis pinnatis: foliolis ſubrotundis dentatis æqualibus, caule erecto. *pimpinelloides.*
Pentaphylloides orientale erectum, folio & facie pimpinellæ. *Tournef. cor.* 21. *Buxb. cent* 1. *p.* 30. *t.* 48.
Habitat in Armeniæ *ſaxoſis.* ♃

9. POTENTILLA foliis pinnatis, caule dichotomo decumbente. *Hort. cliff.* 193. *Hort. upſ.* 133. *Roy. lugdb.* 275. *ſupina.*
Pentaphyllum alpinum minus ſupinum. *Pluk. alm.* 285. *t.* 106. *f.* 7.
Pentaphyllum ſupinum quorundam, potentillæ facie. *Cluſ. hiſt.* 2. *p.* 107.
Quinquefolio fragifero affinis. *Bauh pin.* 326.
Habitat ad Moguntiam & *in* Sibiria. ⊙

* *Foliis quinatis.*

10. POTENTILLA foliis digitatis lanceolatis ſerratis utrinque ſubpiloſis, caule erecto. *recta.*
Potentilla foliis digitatis, caule erecto corymboſo. *Hort. upſ.* 133. * *Roy. lugdb.* 275.
Quinquefolium rectum luteum. *Bauh. pin.* 325.
Quinquefolium alterum vulgare. *Dod. pempt.* 116.
Habitat in Italia, Narbona, *ad agrorum margines.* ⊙
Folia *utrinque viridia, et adulta fere nuda.*

11. POTENTILLA foliis quinatis cuneiformibus inciſis ſubtus tomentoſis, caule erecto. *argentea.*
Potentilla foliis digitatis, caule erecto corymboſo. *Fl. ſuec.* 417.
Potentilla foliis digitatis inciſo-ſerratis, caule erecto. *Hort. cliff.* 193.
Quinquefolium folio argenteo. *Bauh. pin.* 325.
Pentaphyllum minus. *Cam. epit.* 760.
Habitat in Europæ *ruderatis.* ♃

12. POTENTILLA foliis ſeptenis quinatiſque cuneiformibus inciſis piloſis, caule adſcendente. *hirta.*

Quinquefolium montanum rectum hirſutum. *Bauh. pin.* 325. *prodr.* 139.

Habitat Monſpelii *D. Sauvages*; *inque* Pyrenæis. ♃

Differt *a præcedente Foliis radicalibus ſeptenis, & ſubtus longis diſtinctis pilis hirſutis, nec tomentoſis, apice argutius furcatis.* Pedunculi *uniflori, longi.*

ſtipularis. 13. POTENTILLA foliis digitatis ſeſſilibus ſtipulæ inſidentibus.

Potentilla foliis novenis ſtipulis inſidentibus. *Gmel. mſſ.*

Habitat in Sibiria. ♃

Caulis *adſcendens, filiformis, lævis, apice diviſus.* Stipulæ *amplexicaules, ſolitariæ, emarginatæ.* Foliola 8. *ad* 9. *lineari-lanceolata, ſubſerrata, glabra, ex emarginatura ſtipulæ pendentia absque petiolo.*

verna. 14. POTENTILLA foliis radicalibus quinatis acute ſerratis, caulinis ternatis, caule declinato. *Fl. ſuec.* 419.

Potentilla foliis quinatis inciſis, caule aſſurgente. *Fl. lapp.* 212. *Hort. cliff.* 194. *Roy. lugdb.* 276.

Potentilla foliis quinatis acute ſerratis ora ſericea, petalis maculatis. *Hall. helv.* 339. *t.* 6. *f.* 4.

Quinquefolium minus repens alpinum aureum. *Bauh. pin.* 325.

Habitat in Europæ *paſcuis ſiccis, frigidioribus.* ♃

canadenſis. 15. POTENTILLA foliis quinatis villoſis, caule adſcendente hirſuto.

Habitat in Canada. *Kalm.*

Habitus *fragariæ.* Folia *radicalia quinata: foliolis obverſe ovatis, acute ſerratis, ſupra pubeſcentibus, ſubtus villoſis albo-ſericeis, petiolis valde albo hirſutis.* Caulis *digitalis, ramoſus, rarioribus foliis.* Corollæ *luteæ. Similis præcedenti, a qua differt Foliis valde piloſis, argute ſerratis, ſubrotundis & Caule valde hirſuto.*

alba. 16. POTENTILLA foliis digitatis apice conniventi-ſerratis, caulibus filiformibus procumbentibus, receptaculis hirſutis. *Hort. cliff.* 194. *Roy. lugdb.* 276.

Quinquefolium album. *Hall. it. helv.* 70.

Quinquefolium album minus alterum. *Bauh. pin.* 325

Pentaphyllum majus, flore albo. *Cluſ. hiſt.* 2. *p.* 105.

β. Quinquefolium album majus. *Bauh. prodr.* 325.

Quin-

Quinquefolium album minus. *Bauh. pin.* 325. *prodr.* 139.
Habitat in alpibus Stiriæ, Auſtriæ, Panoniæ. ♃

17. POTENTILLA foliis digitatis, caule repente, pedunculis unifloris. *Fl. ſuec.* 418. *Mat. med.* 247. *reptans.*
Potentilla foliis digitatis longitudinaliter patenti-ſerratis, caule repente. *Hort. cliff.* 194. *Gron. virg.* 163.
Quinquefolium majus repens. *Bauh. pin.* 325.
Quinquefolium majus luteum. *Fuchſ. hiſt.* 624.
Habitat in Europæ *apricis argilloſis.* ♃

* *Foliis ternatis.*

18. POTENTILLA foliis ternatis, caule ramoſo erecto, pedunculis ſupra genicula enatis. *Hort. upſ.* 134. * *monſpelienſis.*
Pentaphylloides majus erectum, flore luteo. *Moriſ. hiſt.* 2. *p.* 193. *ſ. t.* 20. *f.* 2.
Pentaphylloides fragariæ folio. *Magn. monſp.* 304.
Fragaria ſterilis alpina cauleſcens. *Boerh. lugdb.* 1. *p.* 42.
Habitat Monſpelii. ⊙
Foliola *ovata, obtuſa, obtuſe & æqualiter ſerrata.*

19. POTENTILLA foliis ternatis, caule dichotomo, pedunculis axillaribus. *norvegica.*
Potentilla foliis ternatis, caule corymboſo erecto. *Fl. ſuec.* 420.
Potentilla foliis ternatis inciſis, caule diffuſo. *Fl. lapp.* 211. *Hort. cliff.* 193. *Roy. lugdb.* 275.
Quinquefolium hirſutum luteum paucioribus laciniis. *Læſel. pruſſ.* 118. *t.* 70.
Habitat in Norvegiæ, Sueciæ, Boruſſiæ, Canadæ *agris.* ⊙
Foliola *lanceolata, ſerrata, dentata.*

20. POTENTILLA foliis ternatis inciſis ſubtus tomentoſis, caule adſcendente. *nivea.*
Fragaria ſterilis, foliis ſubtus incanis, magno flore albo. *Vaill. pariſ.* 55?
Habitat in Alpibus Lapponiæ, Sibiriæ.
Structura *P. vernæ, ſed folia P. argenteæ, at terna & latiora, magisque hirſuta, ſubtus tomentoſa nivea.* Corolla *lutea.*

21. POTENTILLA foliis ternatis dentatis utrinque ſubpiloſis, caule erecto foliis longiore. *grandiflora.*

Potentilla foliis ternatis, petalis cordatis luteis. *Hall helv.* 342. *t.* 6. *f.* 2.
Fragaria ſterilis, ampliſſimo folio & flore, petalis cordatis. *Vaill. pariſ.* 55. *t.* 10. *f.* 1.
Habitat in Helvetia, Sibiria. ⊙
Folia *utraque pagina concoloria, nec inferiori argentea.*

acaulis. 22. POTENTILLA foliis ternatis dentatis utrinque tomentoſis, caule foliis breviore.
Potentilla foliis ternatis mollibus incanis, caulibus vix uncialibus. *Gmel. mſſ.*
Habitat in Sibiria. ♃
Folia *ternata, rugoſa, tomentoſa, piloſa, coriacea, cuneiformia, dentata.* Stipulæ *latæ, acutæ, piloſæ.* Caulis *biflorus, ſ. Scapus ſæpe uniflorus, petiolis brevior.* Corolla *maxima, lutea: petalis emarginatis, baſi flavis.* Stamina *lutea.*

TORMENTILLA.

erecta. 1. TORMENTILLA caule erecto.
Tormentilla. *Cam. epit.* 685. *Fl. lapp.* 213. *Fl. ſuec.* 421. *Mat. med.* 249. *Hort. cliff.* 194. *Roy. lugdb.* 276.
Tormentilla ſylveſtris. *Bauh. pin.* 326.
Habitat in Europæ *paſcuis ſiccis.* ♃

reptans. 2. TORMENTILLA caule repente.
Pentaphyllum minus viride, flore aureo tetrapetalo, radiculas in terram e geniculis dimittens. *Moriſ. hiſt.* 2. *p.* 190.
Pentaphyllum reptans alatum, foliis profundius ſerratis. *Plot. oxf.* 6. §. 7. *t.* 9. *f.* 5.
Habitat in Anglia. ♃

GEUM.

virginianum 1. GEUM floribus erectis, fructu globoſo: ariſtis uncinatis nudis, foliis ternatis. *Hort. cliff.* 195. *Gron. virg.* 56.
Caryophyllata virginiana, albo flore minore, radice inodora. *Herm. par.* 111. *t.* 111.
Habitat in Virginia. ♃
Folia *caulina inferiora ternata, ſuperiora ſimplicia; color corollæ albus, nec ut in ſequenti luteus; Stipulæ integræ.*

2. GE-

2. GEUM floribus erectis, fructu globoſo: ariſtis unci- *urbanum.*
natis nudis, foliis lyratis. *Hort. cliff.* 195. *Fl. ſuec.* 423. *Mat. med.* 249. *Roy. lugdb.* 276.
Caryophyllata vulgaris. *Bauh. pin.* 321.
Caryophyllata. *Dod. pempt.* 137.
Habitat in Europæ *umbroſis.* ♃
Folia *radicalia lyrata in hac, & ſtipulæ dentatæ.*

3. GEUM floribus nutantibus, fructu oblongo: ariſtis *rivale.*
plumoſis. *Hort. cliff.* 195. *Fl. ſuec.* 424. *Roy. lugdb.* 276.
Geum rivale. *Fl. lapp.* 216.
Caryophyllata aquatica, nutante flore. *Bauh. pin.* 321.
Caryophyllata ſeptentrionalium. *Lob. ic.* 694.
β. Caryophyllata aquatica altera. *Bauh. pin.* 322.
Habitat in Europæ *pratis ſubhumidis.* ♃

4. GEUM flore erecto ſolitario, fructu oblongo: ari- *montanum.*
ſtis plumoſis.
Caryophyllata pinnis confertioribus extrema ſubrotunda, tubis rectis. *Hall. helv.* 336. *
Caryophyllata alpina lutea. *Bauh. pin.* 322.
Caryophyllata montana. *Cam. epit.* 727.
β. Caryophyllata alpina minor. *Bauh. pin.* 322. *prodr.* 139.
Caryophyllata alpina minima, flore aureo. *Barr. rar.* 588. *t.* 399.
Habitat in Alpibus Helvetiæ, Auſtriæ, Delphinatus. ♃

5. GEUM foliolis uniformibus inciſis: alternis minori- *reptans.*
bus, caule repente.
Caryophyllata alpina, apii folio. *Bauh. pin.* 322.
Caryophyllata alpina tenuifolia incana, flore luteo longius radicata. *Barr. rar.* 589. 400. *Bocc. muſ.* 160. *t.* 128.
Habitat in Helvetia *& valle* Barſilionenſi.

DRYAS.

1. DRYAS pentapetala, foliis pinnatis. *Amœn. acad.* 2. *pentapetala.*
p. 353. *
Habitat in Camſchatka. ♃

2. DRYAS octopetala, foliis ſimplicibus. *octopetala.*
Dryas. *Fl. lapp.* 215. *Fl. ſuec.* 426. *Hort. cliff.* 195. *Roy. lugdb.* 279. *Hall. helv.* 335. *Segu. ver.* 512.

 Cha-

Chamædrys 3. ſ. montana. *Cluſ. hiſt.* 2. *p.* 351.
Habitat in Alpibus Lapponicis, Helveticis, Auſtriacis, Sabaudicis, Hibernicis, Sibiricis. ♃

COMARUM.

paluſtre. 1. COMARUM. *Fl. lapp.* 214. *Fl. ſuec.* 422. *Hort. cliff.* 195. *Roy. lugdb.* 276. *Hall. helv.* 337.
Quinquefolium paluſtre rubrum. *Bauh. pin.* 325.
Pentaphyllum paluſtre. *Cord. hiſt.* 85
Habitat in Europæ *uliginoſis.* ♃

Clas-

Claſſis XIII.

POLYANDRIA.

MONOGYNIA.

MARCGRAVIA.

1. MARCGRAVIA. *umbellata.*
Marcgravia ſcandens, fructu radiatim poſito. *Pluk. gen.* 7.
Habitat in America *calidiore.* ♄
Folia *alterna, petiolata, ovato-lanceolata, integerrima.* Umbella *ſimplex pedunculis numeroſis, in orbem poſitis, æqualibus, horizontaliter patentibus.* Flores *adſcendentes, nudi; corolla calyceque caducis.* Diſcus *umbellæ conſtans glandulis nectariferis, ſeſſilibus, ſæpius quinis, erectis, forma corollæ ringentis, galeæ ſ. ſupremi petali aconiti, ore ambitum reſpicientibus.*

MORISONIA.

1. MORISONIA. *americana.*
Moriſonia arbor nucis juglandis folio. *Pluk. gen.* 36.
Habitat in America *calidiore.* ♄
Folia *alterna, petiolata, ovata, obtuſa.*

BREYNIA.

1. BREYNIA foliis oblongo-ovalibus. *Roy. lugdb.* 476. *indica.*
Breynia elæagni foliis. *Plum. gen.* 40. *Breyn. ic.* 13. *t.* 13.
Ceratoniæ affinis arbor ſiliquoſa, oleæ folio, flore tetrapetalo albido; ſiliqua tereti ventricoſa. *Sloan. jam.* 153. *hiſt.* 2. *p.* 60. *Raj. dendr.* 100.
Habitat in America *calidiore.* ♄

CAPPARIS.

1. CAPPARIS aculeata. *Hort. cliff.* 203. *Mat. med.* 259. *Roy. lugdb.* 476. *ſpinoſa.*
Capparis ſpinoſa, fructu minore, folio rotundo. *Bauh. pin.* 480.
β. Capparis folio acuto. *Bauh. pin.* 480.
Capparis ſicula, duplicata ſpina, folio acuto. *Bocc. ſic.* 79. *t.* 42. *f.* 3.

γ. Cap-

γ. Capparis aculeis geminis, foliis ovatis utrinque acutis. *Fl. zeyl.* 210. *
Habitat in Europæ *auſtralis arenoſis, ruderatis.* ♄

gynophallophora. 2. CAPPARIS inermis, foliis ovalibus alternis perennantibus. *Hort. cliff.* 204.
Habitat in America ♄

Baducca. 3. CAPPARIS inermis, foliis ovato-oblongis determinate confertis perennantibus. *Hort. cliff.* 204. *
Capparis arboreſcens indica Baducca dicta. *Raj. hiſt.* 1630.
Baducca. *Rheed. mal.* 6. *p.* 105. *t.* 57.
Habitat in India. ♄

ACTÆA.

ſpicata. 1. ACTÆA racemo ovato, fructibusque baccatis.
Actæa. *Hort. cliff.* 209. *Fl. ſuec.* 431. *Hort. upſ.* 138. *Mat. med.* 253. *Roy. lugdb.* 480. *Dalib. pariſ.* 152
Actæa caule inermi. *Fl. lapp.* 217.
nigra. Aconitum bacciferum. *Bauh. pin.* 182.
Chriſtophoriana. *Cluſ. hiſt.* 2. *p.* 86.
alba. β. Aconitum baccis niveis. *Corn. canad.* 76. *t.* 77.
Chriſtophoriana americana racemoſa baccis niveis & rubris. *Moriſ. hiſt.* 2. *p.* 8. *ſ.* 1. *t.* 2. *f.* 7.
Habitat in nemoribus Europæ; β. Americæ. ♃
Petala *rhombea, plano-membranacea.*

racemoſa. 2. ACTÆA racemis longiſſimis, fructibus unicapſularibus.
Actæa racemis longiſſimis. *Gron. virg.* 59. *Mat. med.* 253.
Chriſtophoriana americana procerior & longius ſpicata. *Hort. elth.* 79. *t.* 67. *f.* 78.
Chriſtophorianæ facie herba ſpicata. *Amalth.* 54. *t.* 383. *f.* 3.
Habitat in Florida, Virginia, Canada. ♃
Petala craſſa, gibba, minima, pedicellata, acumine ſetaceo acuminata, calycis foliolis plura.

cimicifuga. 3. ACTÆA racemis paniculatis, fructibus quadricapſularibus.
Cimicifuga. *Amœn. acad.* 2. *p.* 354. *
Thalictroides fœtidiſſimum, chriſtophorianæ facie. *Amm. ruth.* 102.
Habitat in Sibiria *D. Kraſheninnikof.* ♃
Petala 4. *ſubrotunda, calyce majora, teneriora. Styli* 4.

BUC-

BOCCONIA.

1. BOCCONIA. *fruteſcens.*
Bocconia ramoſa, ſphondylii folio tomentoſo. *Plum. gen.* 55.
Chelidonium majus arboreum, foliis quercinis. *Sloan. jam.* 82. *hiſt.* 1. *p.* 195. *t.* 125.
Habitat in Jamaica, Mexico. ♄

SANGUINARIA.

1. SANGUINARIA. *Hort. cliff.* 202. *Gron. virg.* 57. *canadenſis.*
Sanguinaria minor, flore ſimplici. *Dill. elth.* 335. *t.* 252. *f.* 326.
Chelidonium majus canadenſe acaulon. *Corn. canad.* 212. *Moriſ. hiſt.* 2. *p.* 257. *ſ.* 3. *t.* 11. *f.* 1. *Raj. hiſt.* 1887.
β. Sanguinaria major, flore ſimplici. *Dill. elth.* 335. *t.* 252. *f.* 325.
γ. Sanguinaria major, flore pleno. *Dill. elth.* 335. *t.* 252. *f.* 326.
Habitat in America *ſeptentrionali.* ♃

PODOPHYLLUM.

1. PODOPHYLLUM foliis peltatis lobatis. *peltatum.*
Podophyllum. *Hort. cliff.* 202. *Hort. upſ.* 137. *Gron. virg.* 57. *Roy. lugdb.* 480.
Anapodophyllum canadenſe. *Cateſb. car.* 1. *p.* 24. *t.* 24.
Aconitifolia humilis, flore albo unico campanulato, fructu cynosbati. *Mentz. pug. t.* 11.
Habitat in America *ſeptentrionali.* ♃

2. PODOPHYLLUM foliis binatis ſemicordatis. *diphyllum.*
Habitat in Virginia. *Collinſon.* ♃
Folia *radicalia, petiolata, binata ut in Hymenea, glabra, integerrima, ſemicordata, abſque pedicellis.* Scapus *radicalis, uniflorus, fructu antecedentis.* Flos *mihi non viſus.*

CHELIDONIUM.

1. CHELIDONIUM pedunculis umbellatis. *majus.*
Chelidonium pedunculis multifloris umbellatis. *Hort. cliff.* 201. *Fl. ſuec.* 430. *Hort. upſ.* 137. *Mat. med.* 252. *Roy. lugdb.* 478. *Dalib. pariſ.* 152.
Chelidonium majus vulgare. *Bauh. pin.* 144.
Chelidonium majus. *Fuchſ. hiſt.* 865.

β. Chelidonium majus, foliis quernis. *Bauh. pin.* 144.
Chelidonium majus, folio laciniato. *Cluſ. hiſt.* 2. *p.* 203.
Habitat in Europæ *ruderatis.* ♃

Glaucium. 2. CHELIDONIUM pedunculis unifloris, foliis amplexicaulibus ſinuatis, caule glabro.
Chelidonium glabrum, pedunculis unifloris. *Hort. upſ.* 137. *Roy. lugdb.* 478. *Dalib. pariſ.* 152.
Chelidonium pedunculis unifloris. *Hort. cliff.* 201. *Gron. virg.* 57.
Papaver corniculatum luteum. *Bauh. pin.* 171.
Papaver corniculatum, flavo flore. *Cluſ. hiſt.* 2. *p.* 91.
Habitat in Angliæ, Helvetiæ, Galliæ, Italiæ, Virginiæ *arenoſis.* ⊙

corniculatum. 3. CHELIDONIUM pedunculis unifloris, foliis ſeſſilibus pinnatifidis, caule hiſpido.
Chelidonium hiſpidum, pedunculis unifloris. *Hort. upſ.* 137. *Sauv. monſp.* 286.
Glaucium hirſutum, flore phœniceo. *Tournef. inſt.* 254.
Papaver cornutum, phœniceo flore. *Cluſ. hiſt.* 2. *p.* 91.
Habitat in Hungaria, Bohemia, Monſpelii. ⊙

hybridum. 4. CHELIDONIUM pedunculis unifloris, foliis pinnatifidis linearibus, caule lævi.
Papaver caule ramoſo, foliis linearibus pinnatifidis, capſulis ſulcatis. *Hort. upſ.* 136. *Sauv. monſp.* 252.
Papaver corniculatum violaceum. *Bauh. pin.* 172.
Papaver corniculatum, violaceo flore. *Cluſ. hiſt.* 2. *p.* 92.
Habitat in Europa *auſtraliore.* ⊙
Stigmata 4.

PAPAVER.

* *Capſulis hiſpidis.*

hybridum. 1. PAPAVER capſulis ſubgloboſis toroſis hiſpidis, caule folioſo multifloro.
Papaver foliis ternato-pinnatifidis, capſulis ſulcatis hiſpidis. *Hort. cliff.* 201.
Papaver caule ramoſo, foliis lineari-pinnatifidis, capſulis ſulcatis hiſpidis. *Hort. upſ.* 136.
Argemone capitulo breviore. *Bauh. pin.* 172.
Argemone capitulo hirſuto rotundo torulis canaliculato. *Moriſ. hiſt.* 2. *p.* 278. *ſ.* 3. *t.* 14. *f.* 9. *Lob. ic.* 276.
Habitat in Europa *auſtraliore.* ⊙

Argemone. 2. PAPAVER capſulis clavatis hiſpidis, caule folioſo multifloro. Papa-

Papaver capſulis hiſpidis oblongo-turbinatis ſulcatis. *Fl. ſuec.* 429. *Dalib pariſ.* 152.
Papaver foliis ternato-pinnatis, fructu angulato. *Hort. cliff.* 201. *Roy. lugdb.* 419. *Sauv. monſp.* 252.
Argemone capitulo longiore. *Bauh. pin.* 172. *Lob. ic.* 276.
Argemone capitulo tenuiore longiore hirſuto. *Moriſ. hiſt.* 2. *p.* 278. *ſ.* 3. *t.* 14 *f.* 10.
Habitat in Europæ *campis arenoſis.* ⊙

3. PAPAVER capſula hiſpida, ſcapo unifloro nudo hiſpido, foliis bipinnatis. *alpinum.*
Papaver perenne, pilis rigidiſſimis, foliis pinnatis, flore luteo hirſuto. *Hall. helv.* 304.
Papaver alpinum ſaxatile, coriandri folio. *Segu. ver.* 1. *p.* 416. *t.* 4. *f.* 4.
Argemone alpina, foliis ſcandicis, lutea. *Bauh. pin.* 172. *prodr.* 93. *Burſ. IX*: 58.
Argemone alpina, coriandri folio. *Bauh. pin.* 172.
Argemone minor penæ. *Dalech. hiſt.* 1714.
Habitat in Helvetia, *Sneeberg* Auſtriæ. ♃
Flores *plantæ Burſerianæ apud C. Bauhinum albi erant, nec lutei, aſſerente Burſero.*

4. PAPAVER capſulis hiſpidis, ſcapo unifloro nudo hiſpido, foliis ſimplicibus pinnato-ſinuatis. *Hort. upſ.* 136. *nudicaule.*
Papaver erraticum nudicaule, flore flavo odorato. *Dill. elth.* 302. *t.* 224. *f.* 291.
Papaver erraticum, luteo flore, capite oblongo hiſpido. *Amm. ruth.* 61. *n.* 81.
Habitat in Sibiria. ♂
Stipulæ 8 *ad* 9.

* *Capſulis glabris.*

5. PAPAVER capſulis glabris globoſis, caule piloſo multifloro, foliis pinnatifidis inciſis. *Rhœas.*
Papaver foliis pinnatifidis hiſpidis, fructu ovato. *Hort. cliff.* 201. *Fl. ſuec.* 428. *Hall. helv.* 303. *Mat. med.* 251. *Roy. lugdb.* 478. *Dalib. pariſ.* 151.
Papaver caule multifloro folioſo hiſpido, foliis pinnatifidis, capſulis lævibus. *Hort. upſ.* 136. *Sauv. monſp.* 252.
Papaver erraticum majus. *Bauh. pin.* 171.
Papaver rhoeas prius. *Dalech. hiſt.* 439.
β Papaver erraticum, pleno flore. *Bauh. pin.* 171.
γ Papaver erraticum minus. *Bauh. pin.* 171.
Habitat in Europæ *arvis, agris.* ⊙

6. PA-

ſomniferum. 6. PAPAVER calycibus capſuliſque glabris, foliis amplexicaulibus inciſis.

Papaver caule multifloro, foliis ſimplicibus glabris inciſis caulinis. *Hort. upſ.* 135. *Mat. med.* 250.

Papaver foliis ſimplicibus glabris inciſis. *Hort. cliff.* 200. *Hall. helv.* 303. *Roy. lugdb.* 879.

Papaver hortenſe, ſemine albo. *Bauh. pin.* 170.

β. Papaver hortenſe, ſemine nigro. *Bauh. pin.* 170.

γ. Papaver criſtatum, floribus & ſemine albUm. *Bauh. pin.* 171.

δ. Papaver criſtatum, floribus rubris, ſemine nigro. *Bauh. pin.* 171.

ε. Papaver, flore pleno, album. *Bauh. pin.* 171.

Habitat in Europæ *auſtralioris ruderatis.* ⊙

Caulis, Folia, Calyces, Capſulæ glabra. Stigmata 10.

cambricum 7. PAPAVER capſulis glabris oblongis, caule multifloro lævi, foliis pinnatis inciſis.

Papaver foliis pinnatis, fructu acuminato. *Hort. cliff.* 201. *Roy. lugdb.* 479.

Papaver cambricum perenne, flore ſulphureo. *Dill. elth.* 300. *t.* 223. *f.* 290.

Argemone cambro-britannica lutea, capite longiore glabro. *Moriſ. hiſt.* 2. *p.* 297. *ſ.* 3. *t.* 14. *f.* 12.

Papaver erraticum pyrenaicum, flore flavo. *Bauh. pin.* 171. *prodr.* 92. *Burſ. IX*: 45.

Habitat in Cambriæ *ſeptentrionalis nemoroſis.* ♃

Stigmata 5. *ſ.* 6. *diſtincta. Capſula oblonga, inferne anguſtior.*

orientale. 8. PAPAVER capſulis glabris, caulibus unifloris ſcabris folioſis, foliis pinnatis ſerratis. *Hort. upſ.* 136.

Papaver foliis pinnatis, fructu globoſo. *Roy. lugdb.* 279.

Papaver orientale hirſutiſſimum, flore magno. *Tournef. cor.* 17. *itin.* 3. *p.* 127. *t.* 127. *Comm. rar.* 34. *t.* 34.

Habitat in Oriente ⊙

Stigmata 16. Setæ *in caule ſparſæ, cauli adpreſſæ, baſi prominula aſperæ. Capſulæ hiſpidæ.*

ARGEMONE.

mexicana. 1. ARGEMONE capſulis quinquevalvibus, foliis ſpinoſis.

Argemone. *Hort. cliff.* 201. *Hort. upſ.* 135. *Roy. lugdb.* 479.

Papaver ſpinoſum. *Bauh. pin.* 171. *prodr.* 93. *t.* 92. *Cluſ. hiſt.* 2. *p.* 93.

Papa-

Papaver ſpinoſum luteum, foliis albis venis notatis. *Moriſ. hiſt. 2. p. 277. ſ. 3. t. 14. f. 5.*
Habitat in Mexico, Jamaica, Caribæis, *nunc* in Europa *auſtrali.* ♂

2. ARGEMONE capſulis trivalvibus. *armeniaca.*
Papaver orientale, hypecoi folio, fructu minimo. *Tournef. cor.* 17.
Habitat in Armenia.

3. ARGEMONE capſulis quadrivalvibus, caule nudo. *pyrenaica.*
Habitat in Pyrenæis. *Tournefort.*
Hæc *ſemiquadrivalvis, uti ſpecies ſecunda ſemitrivalvis, & prima ſemiquinquevalvis; Hæ ſpecies vel ſub diſtincto genere ſimul tradendæ vel etiam ad genus papaverinum amandandæ omnes. Hujus habitus plurimum accedit Papaveri alpino.*

MUNTINGIA.

1. MUNTINGIA. *Calabura.*
Muntingia pedunculis unifloris. *Hort. cliff.* 203. *
Muntingia folio ſericeo molli, fructu majori. *Plum. gen.* 41.
Meſpilus americana, alni vel coryli foliis, fructu mucilaginoſo albo. *Comm. hort.* 1. *p.* 155. *t.* 80.
Calabura alba. *Pluk. alm.* 75. *mant.* 34. *t.* 154. *f.* 4.
Loti arboris folio anguſtiore, rubi flore, fructu polyſpermo umbilicato. *Sloan. jam.* 162. *hiſt.* 2. *p.* 80. *t.* 194. *f.* 1. *Raj. dendr.* 32.
Habitat in Jamaica. ♄

CLUSIA.

1. CLUSIA foliis aveniis. *major.*
Cluſia flore albo, fructu coccineo. *Plum. gen.* 21.
Cenchramidea arbor ſaxis adnaſcens, obrotundo pingui folio, fructu pomiformi. *Pluk. alm.* 92. *t.* 157. *f.* 2.
Terebinthus folio ſingulari non alato rotundo ſucculento, flore pallide luteo. *Sloan. jam.* 167. *hiſt.* 2. *p.* 97. *t.* 200. *f.* 1. *Raj. dendr.* 51.
β. Cluſia flore roſeo major, fructu ſubviridi. *Plum. gen* 21
γ. Cluſia alia minor: flore albo, fructu vireſcente. *Plum. gen.* 21.
Habitat in Jamaicæ & Caribæarum *apricis.* ♄
Arbor *foliis oppoſitis, obverſe ovatis, in petiolos deſinentibus, integerrimis.* Pedunculi *axillares, ſæpius triflori.*

2. CLU-

minor. 2. CLUSIA foliis venoſis,
Cluſſa, flore roſeo, minoi, fructu flaveſcente, *Plum. gen.* 21.
Habitat in America *meridionali.* ♄
Arbor *foliis venoſis.* Racemus *florum terminalis.*

SARRACENIA.

purpurea. 1. SARRACENIA foliis gibbis. *Hort. cliff.* 427. *Gron. virg.* 164.
Sarracena foliis brevioribus latioribus. *Cateſb. car.* 2. *p.* 70. *t.* 70.
Coilophyllum virginianum, breviore folio, flore purpuraſcente. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 533.
Bucanephyllum americanum, limonio congener dictum. *Pluk. alm.* 71. *amalth.* 46. *t.* 376. *f.* 6.
Limonium peregrinum, foliis forma floris ariſtolochiæ. *Bauh. pin.* 192.
Habitat in Americæ *ſeptentrionalis udis.* ♃

flava. 2. SARRACENIA foliis ſtrictis.
Sarracena foliis rectis. *Hort. cliff.* 497. *Gron. virg.* 164.
Sarracena foliis longioribus & anguſtioribus. *Cateſb. car* 2. *p.* 69. *t.* 69.
Coilophyllum virginianum, longiore folio erecto, flore luteo. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 533.
Bucanephyllum elatius virginianum ſ. Limonio congeneris altera ſpecies elatior, foliis triplo longioribus. *Pluk. alm.* 72. *amalth.* 46. *t.* 152. *f.* 3. (*mala*) *t.* 376. *f.* 5. *bona.*
Thuris limpidi folium. *Bauh. hiſt.* 1. *p.* 307. *Dalech. hiſt.* 1754. *Lob. adv.* 430.
Habitat in Americæ *ſeptentrionalis udis.* ♃

NYMPHÆA.

lutea. 1. NYMPHÆA calice magno pentaphyllo. *Fl. lapp.* 218. *Fl. ſuec.* 426. *Hort. cliff.* 203. *Mat. med.* 258. *Roy. lugdb.* 480. *Dalib. pariſ.* 150.
Nymphæa lutea major. *Bauh. pin.* 193.
Nymphæa lutea. *Cam. epit.* 635.
Habitat ad Europæ *littora ſub dulci aqua.* ♃
In Canada *eadem floris magnitudine vix Calthæ. Kalm.*

alba. 2. NYMPHÆA foliis cordatis integerrimis, calyce quadrifido.
Nymphæa calyce tetraphyllo, corolla multiplici. *Fl. lapp.*

lapp. 219. *Fl. ſuec.* 427. *Hort. cliff* 203. *Roy. lugdb.* 480. *Dalib. pariſ.* 150.
Nymphæa alba major. *Bauh. pin.* 193.
Nymphæa alba. *Cam. epit.* 634.
Habitat in Europæ & Americæ *aquis dulcibus.* ♃

3. NYMPHÆA foliis cordatis dentatis. *Fl. zeyl.* 194.* *Lotus.*
Nymphæa indica, flore candido, folio in ambitu ſerrato. *Sloan. jam.* 120. *hiſt.* 1. *p.* 252. *Raj. ſuppl.* 630.
Lotus ægyptia. *Alp. ægypt.* 103. *exot.* 214. *t.* 213. 216. 218. 220. 222. 226.
Ambel. *Rheed. mal.* 11. *p.* 51. *t.* 26.
Habitat in calidis Indiæ, Africæ, Americæ. ♃

4. NYMPHÆA foliis undique integris. *Hort. cliff.* 203. *Fl. zeyl.* 193. *Nelumbo.*
Nymphæa indica, Faba ægyptia dicta, flore incarnato. *Herm. par.* 205. *t.* 205.
Nymphæa fabifera, indiæ paludibus gaudens, foliis umbilicatis amplis, pediculis ſpinoſis, flore roſeo purpureo. *Pluk. alm.* 267. *t.* 207. *f.* 5. & *t.* 322. *f.* 1. *opt.*
Tamara. *Rheed. mal.* 11. *p.* 59. *t.* 30.
Bem-Tamara. *Rheed. mal.* 11. *p.* 61. *t.* 31. *Raj. ſuppl.* 632.
β Nymphææ affinis glandifera virginiana, umbilicato folio, flore luteo pleno. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 514. *Raj. ſuppl.* 632.
Habitat in Indiis. ♃
Varietas β. *differt ſeminibus duris, in reliquis convenit ut vix diſtingvenda videatur.*

BOMBAX.

1. BOMBAX foliis digitatis, caule aculeato.
Xylon foliis digitatis, caule aculeato. *Fl. zeyl.* 221 *Hort. upſ.* 148. *Ceiba.*
Xylon caule aculeato. *Hort. cliff.* 75. *Roy. lugdb.* 437.
Goſſypium arboreum, caule ſpinoſo. *Bauh. pin.* 430.
Moul-elavou. *Rheed. mal.* 3. *p.* 61. *t.* 52.
Habitat in India *utraque.* ♄

BOMBAX foliis digitatis, caule inermi.
Xylon foliis digitatis, caule inermi. *Fl. zeyl.* 220. *Hort. upſ.* 148. *pentandrum.*
Xylon caule inermi. *Hort. cliff.* 175. *Roy. lugdb.* 437.
Goſſypium javanenſe, ſalicis folio. *Bauh. pin.* 430.
Panja. *Rheed. mal.* 3. *p.* 59. *t.* 49. 50. *f.* 51.
Habitat in Indiis. ♄

3. BOM-

religioſa. 3. BOMBAX foliis quinquelobis acuminatis ſubtus tomentoſis (Xylon). *Fl. zeyl.* 222. *
Goſſypium fruteſcens annuum, folio vitis ampliori quinquefido. *Pluk. alm.* 172. *t.* 188. *f.* 2.
Habitat in India. ♄

BIXA.

Orellana. 1. BIXA. *Hort. cliff.* 211. *Mat. med.* 266. *Roy. lugdb.* 477.
Orleana ſ. Orellana folliculis lappaceis. *Pluk. alm.* 272. *t.* 209. *f.* 4. *Comm. hort.* 1. *p.* 65. *f.* 33.
Arbor mexiocana, fructu caſtaneæ, coccifera. *Bauh. pin.* 419.
Urucu. *Sloan. jam.* 150. *hiſt.* 2. p. 52. *t.* 181. *f.* 1.
Habitat in America *calidiore.* ♄

SLOANEA.

dentata. 1. SLOANEA foliis cordato-ovatis denticulatis, ſtipulis ſerratis.
Sloanea amplis caſtaneæ foliis, fructu echinato. *Plum. gen.* 49.
Apeiba. *Marcgr. braſ.* 123. *t.* 123. *Raj. hiſt.* 1643.
Habitat in America *meridionali.* ♄

emarginata. 2. SLOANEA foliis oblongis integerrimis emarginatis.
Anona foliis laurinis in ſummitate inciſis, fructu compreſſo ſcabro fuſco in medio acumine longo. *Cateſb. car.* 2. *p.* 87. *t.* 87.
Habitat in Carolina. ♄

MAMMEA.

americana. 1. MAMMEA ſtaminibus flore brevioribus.
Mammei magno fructu, perſicæ ſapore. *Plum. gen.* 44.
Mamay. *Bauh. hiſt.* 1. *p.* 172. *Dalech. hiſt.* 1836. *Laet. amer.* 356.
Malus perſica maxima, foliis rotundis ſplendentibus glabris, fructu maximo ſcabro rugoſo. *Sloan. jam.* 179. *hiſt.* 2. *p.* 123. *t.* 217. *f.* 3.
Arbor indica Mamei dicta. *Bauh. pin.* 417. *Raj. hiſt.* 1665.
Habitat in Hiſpaniola, Jamaica. ♄
Rami ſcabri; Folia *oblonga, obtuſa.*

aſiatica. 2. MAMMEA ſtaminibus flore longioribus.
Habitat in Java. *Osbeck.* ♄

Ar-

Arbor *magna, ſæpius procumbens*. Folia *pedalia, obovata ſ. oblonga, lævia*. Pedunculi *uniflori*. Calyx *ovatus, bipartitus*. Petala 4, *ovata, calyce triplo longiora, brevi decidua, cum* Staminibus *corolla duplo longioribus, numeroſis, ſubulatis, erectis*. Antheræ *ſubrotundæ, minimæ*. Fructus *tetragonus*.

OCHNA.

1. OCHNA. *Fl. zeyl.* 209. * *Jabotapita.*
Jabotapita cinnamomi folio, floribus ſpicatis. *Burm. zeyl.* 123. *t.* 56.
β. Arbor africana, ſubrotundo folio margine denticulis acutis aſpero, floribus pentapetalis atropurpureis. *Pluk. alm.* 41. *t.* 263. *f.* 1. 2.
γ. Jabotapita. *Marcgr. braſ.* 101. *Raj. hiſt.* 1632.
Jabotapita pyramidato flore luteo, fructu rubro. *Plum. gen.* 42.
Habitat in India, β. *in* Africa, γ. *in* America.
Racemi *perſiſtunt ſquarroſi infra folia a caſu pedicellorum & fructificationum.*

CHRYSOBALANUS.

1. CHRYSOBALANUS. *Icaco.*
Myrobalanus minor, folio fraxini alato, fructu purpureo: oſſiculo magno fibroſo. *Sloan. jam.* 182. *hiſt.* 2. *p.* 126. *t.* 219. *f.* 3. 4. 5. *Raj. dendr.* 33.
Prunus Icaco. *Lab. itin.* 3. *p.* 30.
Icaco fructu purpureo. *Plum. gen.* 44.
β. Icaco fructu ex albo rubeſcente. *Plum. gen.* 44.
γ. Icaco fructu nigro. *Plum. gen.* 44.
δ. Myrobalanus folio fraxini alato, fructu luteo: oſſiculo magno fibroſo. *Sloan. jam.* 181. *hiſt.* 2. *p.* 125. *t.* 219. *f.* 1. 2. *Raj. dendr.* 43.
Arbor indica juglandi ſimilis 5, ſ. Hobos. *Bauh. pin.* 417.
ε. Myrobalanus 6. ſ. Myrobalanis flavis ſimilis fructus. *Bauh. pin.* 446.
Condondum. *Rumpf. amb.* 1. *p.* 161. *t.* 60.
Habitat in Jamaica, Braſilia, Barbiches, Surinamo. ♄

CALOPHYLLUM.

1. CALOPHYLLUM foliis ovalibus. *Fl. zeyl.* 201. * *Inophyllum.*
Arbor indica, mali medicæ amplioribus foliis. *Pluk. alm.* 41. *t.* 147. *f.* 3.

Ponna ſ. Ponna-maram. *Rhedd. mal.* 4. *p.* 79. *t.* 38. *Raj. hiſt.* 1525.
Habitat in India. ♄

Calaba. 2. CALOPHYLLUM foliis ovatis obtuſis. *Fl. zeyl.* 202. *
Calophyllum foliis ovatis obtuſis: ſtriis parallelis tranſverſis. *Hort. cliff.* 206. *Roy. lugdb.* 476.
Tſierou-ponna. *Rheed. mal.* 4. *p.* 81. *t.* 39.
Habitat in Indiis. ♄

TILIA.

europæa. 1. TILIA floribus nectario deſtitutis.
Tilia. *Hort. cliff.* 204. *Fl. ſuec.* 432. *Mat. med.* 262. *Roy. lugdb.* 477. *Dalib. pariſ.* 153.
Tilia femina, folio majore. *Bauh. pin.* 426.
Tilia urbana. *Geſn. tab. III.*
β. Tilia montana, maximo folio. *Bauh. pin.* 426.
γ. Tilia femina, folio minore. *Bauh. pin.* 426.
δ. Tilia ulmi folio, ſemine hexagono. *Raj. angl.* 3. *p.* 473
ε Tilia foliis molliter hirſutis, viminibus rubris, fructu tetragono. *Raj. angl.* 3. *p.* 473.
ζ. Tilia bohemica, foliis minoribus glabris, fructu oblongo utrinque acuminato minime coſtulato. *Till. piſ.* 165. *t.* 49. *f.* 9.
Habitat in Europæ *pratis*. ♄

americana. 2. TILIA floribus ectario inſtructis. *Kalm.*
Tilia foliis majoribus mucronatis. *Gron. virg.* 58.
Tilia, ampliſſimis glabris foliis, noſtrati ſimilis. *Pluk. mant.* 181.
Haditat in Virginia Canada. ♄

MICROCOS.

aniculata. 1. MICROCOS panicula terminali. *Fl. zeyl.* 207. *
Microcos foliis alternis oblongis acuminatis. *Burm. zeyl.* 159. *t.* 74.
Schageri-Cottam. *Rheed. mal.* 1. *p.* 105. *t.* 56.
Habitat in India. ♄

ateriflora 2. MICROCOS pedunculis axillaribus confertis dichotomis. *Fl. zeyl.* 208. *
Hamdamanias. *Herm. zeyl.* 3
Habitat in Zeylona. ♄

ELÆ

ELÆOCARPUS.

ELÆOCARPUS. *Fl. zeyl.* 206. * *ſerrata.*
Elajocarpos foliis lauri ſerrato, floribus ſpicatis. *Burm. zeyl.* 39. *t.* 40
Perin-Kara. *Rheed. mal.* 4. *p.* 51. *t.* 24. *Raj. hiſt.* 1546. *dendr.* 42.
Habitat in India. ♄

MESUA.

1. MESUA foliis lanceolatis. *Fl. zeyl.* 203. * *ferrea.*
Naghas. *Herm. zeyl.* 7.
Balutta-tſiampacam ſ. Caſtanea roſea indica. *Rheed. mal.* 3. *p.* 63. *t.* 53. *Raj. hiſt.* 1680.
Habitat in India. ♄

VATERIA

1. VATERIA. *Fl. zeyl.* 204. *indica.*
Pænoe. *Rheed. mal.* 4. *p.* 33. *t.* 15.
Habitat in India. ♄

THEA.

1. THEA. *Hort. cliff.* 204. *Mat. med.* 264. *ſinenſis.*
Thee. *Kæmpf. jap.* 605. *t.* 606.
Thee frutex. *Bart. act.* 4. *p.* 1. *t.* 1. *Bont. jav.* 87. *t.* 88. *Barr. rar.* 128. *t.* 904.
Thee ſinenſium. *Breyn. cent. III. t.* 112. *ic.* 17. *t.* 3. *Bocc. muſ.* 114. *t.* 94.
Chaa. *Bauh. pin.* 147.
Evonymo affinis arbor orientalis nucifera, flore roſeo. *Pluk. alm.* 139. *t.* 88. *f.* 6.
Habitat in Japonia, China. ♄
Vidi *flores in aliis hexapetalos, in aliis enneapetalos; an ejusdem ſpeciei judicent, qui poſſunt vivam inſpicere.*

CARYOPHYLLUS

1. CARYOPHYLLUS. *Hort. cliff.* 207. *Mat. med.* 26. *aromaticus.*
Caryophyllus aromaticus, fructu oblongo. *Bauh. pin.* 410.
Caryophyllus aromaticus ind. orient, fructu clavato monopyreno. *Pluk. alm.* 88. *t.* 155. *f.* 1.
Caryophyllus. *Cluſ. exot.* 16.
Habitat in Moluccis *ſolo aridiſſimo.* ♄

MENTZELIA.

aſpera. 1. MENTZELIA. *Hort. cliff.* 492.
Mentzelia foliis & fructibus aſperis. *Plum. gen.* 41.
Onagra americana, folio betonicæ, fructu hiſpido. *Tournef. inſt.* 302.
Habitat in America.
Folia *ſerrata, alterna.* Rami *alterni.* Flores *axillares, ſolitarii, ſeſſiles.*

PLINIA.

pinnata. 1. PLINIA.
Plinia fructu croceo odorato. *Plum. gen.* 9.
Habitat in America. ♄
Arbor Folia *pinnata, abrupta; foliolis circiter* 12, *ovato-lanceolatis, integerrimis.* Flores *ſeſſiles, ſparſi per ramos nudos ſeniores.* Fructus *edules.*

MIMOSA.

* *Foliis ſimpliciter pinnatis.*

Lebbeck. 1. MIMOSA foliis pinnatis: foliolis oblongo-ellipticis, petiolis obverſe clavatis. *Haſſelquiſt. act. upſ.* 1750. *p.* 9. *
Haditat in Ægypto *ſuperiore.* ♄

Inga. 2. MIMOSA foliis pinnatis quinquejugis: petiolo articulato marginato.
Mimoſa inermis, foliis pinnatis: petiolis membranaceis alatis. *Hort. cliff.* 209.
Arbor ſiliquoſa braſilienſis, foliis pinnatis coſta media membranulis extantibus alata. *Sloan. jam.* 153. *hiſt.* 2. *p.* 58. *t.* 183. *f.* 1. *Raj. hiſt.* 1762.
Habitat in Braſilia, Jamaica, Surinamo ♄

fagifolia. 3. MIMOSA foliis pinnatis bijugis; petiolo marginato.
Arbor ſiliquoſa, faginis foliis, americana, floribus comoſis. *Pluk. alm.* 44. *t.* 141. *f.* 2.
Habitat in Barbados. ♄

nodoſa. 4. MIMOSA foliis pinnatis bijugis: foliolis interioribus minoribus, petiolo lineari.
Mimoſa inermis, foliis pinnatis: foliolis quatuor, glandula ovata inter infima minora. *Vir. cliff.* 49. *Hort. cliff.* 209. *Roy. lugdb.* 471.
Phaſeolus arboreus tetraphyllos zeylanicus. *Pluk. alm.* 294. *t.* 211. *f.* 5.
Habitat in Zeylona. ♄

* Fo-

* *Foliis, petiolo bipartito, non pinnatis.*

5. MIMOSA foliis bigeminis acuminatis. *Fl. zeyl.* 218. * *bigemina.*
Katou-conna. *Rheed. mal.* 6. *p.* 21. *t.* *Raj. hiſt.* 1746.
Habitat in India. ♄

6. MIMOSA foliis bigeminis obtuſis. *Hort. upſ.* 207. *Roy. lugdb.* 470. *Unguis cati.*
Acaciæ quodammodo accedens ſ. Ceratiæ & Acaciæ, media jamaicenſis ſpinoſa, bigeminatis foliis. *Pluk. phyt.* 1. *f.* 6.
Acacia arborea major ſpinoſa, pinnis quatuor majoribus ſubrotundis, ſiliquis varie intortis. *Sloan. jam.* 152. *hiſt.* 2. *p.* 56.
Habitat in Jamaica, Caribæis. ♄

7. MIMOSA foliis tergeminis. *tergemina.*
Acacia fruteſcens non aculeata, flore purpuraſcente, alia. *Plum. hiſt. mſſ. Houſt. mſſ.*
Habitat in America *meridionali.* ♄
Petiolus bifidus: pedicello ſingulo terminato foliolis duobus; ſed inſuper Foliola *duo oppoſita ad divaricationem petioli communis.*

* *Foliis conjugatis ſ. Folia duo pinnata, communi petiolo annexa.*

8. MIMOSA foliis conjugatis pinnatis: foliolis æqualibus, ſtipulis ſpinoſis. *circinalis.*
Acacia foliis amplioribus, ſiliquis circinatis. *Plum. ſpec.* 17.
Habitat in America *calidiore.* ♄

9. MIMOSA foliis conjugatis pinnatis: foliolis intimis minoribus, caule inermi. *purpurea.*
Acacia fruteſcens non aculeata, flore purpuraſcente. *Plum. ſpec.* 17.
Habitat in America *meridionali.* ♄

10. MIMOSA foliis conjugatis pinnatis: foliolis æqualibus, caule aculeis incurvis. *cinerea.*
Mimoſa maderaſpatana ſpinoſa intſiæ accedens, cortice cinereo, ramis communi pediculo binis. *Pluk. alm.* 4. *t.* 2. *f.* 1.
Habitat in India. ♄

11. MIMOSA foliis conjugatis pinnatis: partialibus bijugis ſubrotundis, caule inermi herbaceo. *viva.*

 Mi-

Mimoſa herbacea non ſpinoſa minima repens. *Sloan. jam.* 153. *hiſt.* 2. *p.* 58. *t.* 182. *f.* 7. *Raj. ſuppl.* 480.
Habitat in Jamaicæ *pratis.* ♃

cæſia. 12. MIMOSA foliis conjugatis pinnatis: partialibus trijugis ſubæqualibus, caule aculeato.
Mimoſa foliis conjugatis: foliolis pinnatis: pinnis ſenis ſubæqualibus. *Hort. upſ.* 145.
Mimoſa undique aculeata, foliis geminatis pinnatis: foliolis intimis minimis. *Hort. cliff.* 208.
Æſchynomene ſpinoſa latifolia ſ. Herba viva vel ſpinoſa latifolia, piloſo & ſubrotundo folio. *Comm. hort.* 1. *p.* 55. *t.* 28.
Habitat in India. ♄
Flores *ſpicæ inferiores decandri ſteriles; ſuperiores decandri fertiles.*

ſenſitiva. 13. MIMOSA foliis conjugatis pinnatis: partialibus bijugis: intimis minimis, caule aculeato.
Mimoſa caule aculeato, foliis geminatis: partialibus tetraphyllis, foliolis intimis minimis. *Roy. lugdb.* 471.
Mimoſa ſpinoſa prima ſ. braſiliana latifolia, ſiliquis radiatis. *Breyn. cent.* 31. *t.* 16.
Habitat in Braſilia. ♄

pudica. 14 MIMOSA foliis ſubdigitatis pinnatis, caule aculeato hiſpido.
Mimoſa foliis digitatis: foliolis pinnatis, caule aculeato hiſpidoque, foliis pinnato-palmatis: ſingulis numeroſe pinnatis. *Hort. cliff.* 208. *Hort. upſ.* 144.
Mimoſa ſpinoſa 3, ſiliquis parvis echinatis. *Breyn. cent.* 40. *t.* 18.
Æſchynomene ſpinoſa, flore globoſo albido, ſiliculis articulatis echinatis. *Comm. hort.* 1. *p.* 57. *t.* 29.
Habitat in Braſilia. ♄
Calyx *infundibuliformis, trifidus: lobo altero latiore.* Corolla *nulla.* Staminum *filamenta* 4, *calyce ſexies longiora, erecta, filiformia.* Germen *ſubrotundum.* Stylus *ſubulatus, ſtaminibus paulo brevior.* Stigma *acutum.*

* *Foliis duplicato-pinnatis, inermes.*

Entada. 15. MIMOSA inermis, foliis bipinnatis cirrho terminatis. *Fl. zeyl.* 219.
Entada. *Rheed. mal.* 9. *p.* 151. *t.* 67.
Habitat in utraque India. ♄

16. MI-

16. MIMOSA inermis, foliis bipinnatis, ſpicarum flori- *plena.*
bus pentandris: inferioribus plenis. *Hort. upſ.* 145. *
Mimoſa herbacea non ſpinoſa procumbens & paluſtris, flore luteo pleno, *Houſt. mſſ. t.* 1.
Habitat in Vera Cruce. ☉

17. MIMOSA inermis, foliis bipinnatis, ſpicis cernuis, *virgata.*
floribus decandris: inferioribus caſtratis apetalis. *Fl. zeyl.* 505. *Hort. upſ.* 145.
Mimoſa inermis, foliis duplicato-pinnatis, ſiliquis linearibus glabris. *Hort. cliff.* 209.
Habitat in India. ♄

18. MIMOSA inermis decumbens, foliis bipinnatis, ſpi- *pernambucana.*
cis cernuis, floribus pentandris: inferioribus caſtratis. *Hort. upſ.* 145. *
Mimoſa americana pigra, ſiliquis longis anguſtis allium olentibus. *Pluk. alm.* 552. *t.* 307. *f.* 3.
Habitat in America. ♄

19. MIMOSA inermis, foliis bipinnatis, leguminibus ſpi- *arborea.*
raliter circumvolutis, caule arboreo.
Acacia non ſpinoſa jamaicenſis, foliis lata baſi in metæ formam faſtigiatis. *Pluk. alm.* 6. *t.* 251. *f.* 2.
Acacia arborea maxima non ſpinoſa, pinnis majoribus, flore albo, ſiliqua contorta coccinea ventricoſa elegantiſſima. *Sloan. jam.* 157. *hiſt.* 2. *p.* 54. *t.* 182. *f.* 1. 2. *Raj. ſuppl.* 477.
Habitat in Jamaicæ & Caribæarum *humidis.* ♄

20. MIMOSA inermis foliis bipinnatis: foliolis exterio- *vaga.*
ribus majoribus incurvatis pubeſcentibus. *Hort. cliff.* 209.
Mimoſa non ſpinoſa ind. or; caſtaneæ foliis, floribus ſtamineis amplis, ſiliqua cruſtacea placentæ in modum colorato. *Pluk. mant.* 2. *p.* 331. *f.* 1.
Arbor ſiliquoſa braſiliana, ſiliqua tortuoſa, fruteſcens, fraxinellæ foliis. *Breyn. cent.* 1. *t.* 15. *an?*
Habitat in India. ♄

21. MIMOSA inermis, foliis bipinnatis: partialibus quin- *latiſiliqua.*
quejugis: propriis decemjugis.
Acacia non ſpinoſa, ſiliquis latis compreſſis, flore albo. *Plum. ſpec.* 17.
Habitat in America *calidiore.*
Bracteæ *dimidiato-cordatæ.* Pedunculi *terni*; Flores *capitati.*

polyſtachia. 22. MIMOSA inermis, foliis bipinnatis: partialibus propriisque ſexjugis oblongis.

Acacia alia ſcandens, ſpica multiplici, ſiliquis latis. *Plum. ſpec.* 7

Habitat in America *calidiore.*

Flores *ſpicati: Legumina lata, longa, obtuſa.*

peregrina. 23. MIMOSA inermis, foliis bipinnatis: partialibus ſedecemjugis: propriis quadragintajugis; glandula baſeos petiolari.

Mimoſa inermis, foliis duplicato-pinnatis, glandula ad baſin petiolorum, ſiliquis ovato-oblongis planis. *Hort. cliff.* 209.

Habitat in America. ♄

glauca. 24. MIMOSA inermis, foliis bipinnatis: partialibus ſexjugis, leguminibus membranaceis.

Mimoſa inermis, foliis duplicato-pinnatis: partialibus utrinque ſenis pluribusque, ſiliquis planis membranaceis. *Roy. lugdb.* 472.

Mimoſa arboreſcens non ſpinoſa, pinnis acaciæ latioribus inferne glaucis, flore albo. *Breyn. cent.* 1. *p.* 73.

Acaciæ ſimilis americana non ſpinoſa, floribus globoſis albis ramoſis. *Kigg. beaum.* 3.

Habitat in America. ♄

* *Foliis duplicato-pinnatis, ſpinæ aculei ſ. geminii ſ. ſolitarii, nec ſparſi.*

cinerea. 25. MIMOSA ſpinis ſolitariis, foliis bipinnatis, floribus ſpicatis. *Fl. zeyl.* 215. *

Acacia ſpinoſa ex alis ſpicata, foliis pennas avium referentibus. *Burm. zeyl.* 3. *t.* 2. *bona.*

Acacia maderaſpatana, minutiſſimis foliis, aculeis ferocibus alternis frondoſa, cortice cinereo. *Pluk. alm.* 3. *t.* 121. *f.* 5.

Habitat in India. ♄

cornigera. 26. MIMOSA ſpinis axillaribus geminis connatis, foliis bipinnatis. *Hort. cliff.* 208. *Roy. lugdb.* 470.

Acacia cornuta ind. orientalis. *Seb. theſ.* 1. *p.* 113. *t.* 70. *f.* 13.

Acacia americana, grandibus aculeis ad ramulorum exortum cornua bovina referentibus, ſiliqua roſtrata. *Pluk. alm.* 3. *p.* 122. *f.* 1.

Acaciæ ſimilis, ſpinis corniformibus, mexicana. *Comm. hort.* 1. *p.* 209. *t.* 107.

Habitat in Mexico, Cuba. ♄

27.

27. MIMOSA ſpinis oppoſitis longitudine foliorum, foliis bipinnatis: partialibus bijugatis. *horrida.*
Acacia maderaſpatana, foliis parvis, aculeis e regione binis prægrandibus horrida, cortice cinereo. *Pluk. alm.* 3. *t.* 121. *f.* 4.
Habitat in India. ♄

28. MIMOSA ſpinis geminis approximatis, foliis bipinnatis: partialibus bijugatis. *Hort. cliff.* 208. *Roy. lugdb.* 470. *ſcorpioides.*
Acacia foliis ſcorpioidis leguminoſæ. *Bauh. pin.* 392.
Acacia ægyptiaca. *Hern. mex.* 866. *t.* 866. *bona.*
Acacia vera ſ. Spina ægyptiaca, ſubrotundis foliis, flore luteo, ſiliqua brevi & paucioribus iſthmis glabris & cortice nigricantibus donata. *Pluk. alm.* 3. *t.* 123. *f.* 1.
Habitat in Ægypto, Arabia. ♄

29. MIMOSA ſpinis ternis: intermedio reflexo, foliis bipinnatis, floribus ſpicatis. *Senegal.*
Mimoſa aculeata, floribus polyandris ſpicatis, legumine compreſſo lævi elliptico. *Adanſon, ex B. Juſſieu.*
Mimoſa ſpinis geminis diſtinctis, foliis duplicato-pinnatis: partialibus utrinque quino-pluribus. *Hort. cliff.* 209. *Hort. upſ.* 146. *Roy. lugdb.* 411. *Mat. med.* 261.
Acacia. *Bauh. pin.* 392. *Alp. ægypt.* 9. *t.* 9.
Acacia altera vera, ſiliqua longa villoſa, cortice candicante donata. *Pluk. alm.* 3. *p.* 251. *f.* 1.
Habitat in Arabia. ♄
Cortice *albo diſtinguitur hæc ſpecies primo intuitu.* Spinæ *ad folii exortum tres.*

30. MIMOSA ſpinis geminis diſtinctis, foliis bipinnatis: partialibus octojugatis. *Hort. upſ.* 146. *farneſiana.*
Acacia indica farneſiana. *Ald. farneſ.* 2. *Raj. hiſt.* 977.
Habitat in Domingo. ♄

31. MIMOSA ſpinis geminis patentibus, foliis bipinnatis: partialibus extimis glandula interſtinctis. *nilotica.*
Habitat in Ægypto, *unde ſemina per D. Haſſelquiſt.* ♄
Habitus *A. Farneſianæ & Senegal; differt a priore ramis absque punctis calloſis, ut ab hoc cortice minime albo ſed purpuraſcente; nec Spinas habet ternas ut in ſenegal, ſed binas easque longiores quam farneſiana.* Rami *purpuraſcentes, læves.* Folia *bipinnata,* 5 *circiter*

 ter

ter parium foliorum partialium, inter duo paria partialium exteriorum glandula petiolo communi inſerta eſt.

* *Foliis duplicato-pinnatis: aculei ſparſi.*

cæſia. 32. MIMOSA aculeata, foliis bipinnatis: foliolis ovali-oblongis oblique acuminatis. *Fl. zeyl.* 217.
Acacia ſpinoſa, indiæ orientalis, foliis ſubtus cæſiis, floribus globoſis luteis. *Pluk. mant.* 1. *t.*330. *f.* 3.
Habitat in India. ♄

pennata. 33. MIMOSA aculeata, foliis bipinnatis numeroſiſſimis lineari-aceroſis, panicula aculeata, capitulis globoſis. *Fl. zeyl.* 216.
Acacia aculeata multiflora, foliis pennas avium referentibus. *Burm. zeyl.* 2. *t.* 1.
Habitat in Zeylona. ♄

Intſia. 34. MIMOSA aculeata, foliis bipinnatis, foliolis incurvis, caule angulato.
Mimoſa aculeis undique ſparſis ſolitariis, foliis duplicato-pinnatis, caule angulato. *Hort. cliff.* 209. *Gron. virg.* 195.
Acacia maderaſpatana ſpinoſa, pinnis veluti lunulatis: nervo pinnularum ad unicum latus vergente. *Pluk. alm.* 4. *t.* 122. *f.* 2.
Intſia. *Rheed. mal.* 4. *p.* - - - *t.* 122. *f.*
Habitat in India. ♄

ſemiſpinoſa. 35. MIMOSA aculeata, foliis bipinnatis, articulis caulinis ſuperne aculeatis.
Mimoſa aculeis ad ſummitatem internodiorum confertis, foliis duplicato-pinnatis. *Hort. cliff.* 208.
Habitat in America. ♄

quadrivalvis 36. MIMOSA aculeata, foliis bipinnatis, caule quadrangulo, aculeis recurvis, leguminibus quadrivalvibus.
Mimoſa undique aculeata, caule angulato, foliis duplicato-pinnatis: partialibus utrinque ternis. *Roy. lugdb.* 471.
Mimoſa herbacea procumbens ac ſpinoſa, caule quadrangulo, ſiliquis quadrivalvibus. *Houſt. mſſ. fig. bon. Amm. herb.* 586.
Habitat in Vera Cruce. ♃
Aculei *recurvi, ſparſi in caule, petiolis, pedunculis.* Folia *partialia utrinque terna foliolis plurimis.* Pedunculi *axillares, terminati Capitulo globoſo.*

37. MI-

37. MIMOSA aculeata, foliis bipinnatis: partialibus viginti-jugatis: propriis multijugatis. *tenuifolia.*
Acacia repens aculeata, flore albo, foliis omnium minimis. *Plum. ſpec.* 17.
Habitat in America *calidiore.*
Aculei *recurvi in caule & Pedunculis communiter.* Flores *capitati, laterales, plures.*

38. MIMOSA aculeata, foliis bipinnatis: partialibus quinque-jugatis: propriis tri-jugatis trinerviis. *cerasonta.*
Acacia repens aculeata, flore albo, foliis ſiliquæ. *Plum. ſpec.* 17.
Habitat in America *calidiore.*
Aculei *recurvi in caule & petiolis.* Pedunculi *laterales, conferti.* Flores *capitati.* Legumina *obtuſa, ſutura aculeata.*

39. MIMOSA aculeata, foliis bipinnatis: partialibus quinque-jugatis: propriis decem-jugatis, petiolis inermibus. *tamarindifolia.*
Acacia aculeata, flore albo, foliis tamarindi. *Plum. ſp.* 17.
Habitat in America *meridionali.* ♄
Pedunculi *ramoſi.* Flores *ſpicati.*

CISTUS.

* *Exſtipulatæ fruticoſæ.*

1. CISTUS arboreſcens, foliis cordatis lævibus acuminatis petiolatis. *Hort. cliff.* 205. *Roy. lugdb.* 474. *populifolia.*
Ciſtus Ledon, foliis populi nigræ, major. *Bauh. pin.* 467.
Ledum latifolium 2. majus. *Cluſ. hiſt.* 1. *p.* 78.
β Ciſtus Ledon, foliis populi nigræ, minor. *Bauh. pin.* 467.
Ledum latifolium 2 minus. *Cluſ. hiſt.* 1. *p.* 78.
Habitat in Luſitania. ♄

2. CISTUS arboreſcens, foliis ovatis petiolatis trinerviis ſupra glabris: petiolis baſi connatis. *laurifolia.*
Ciſtus Ledon, foliis laurinis. *Bauh. pin.* 467.
Ledon 1 latifolium. *Cluſ. hiſt.* 1. *p.* 77.
Habitat in Hiſpania. ♄

3. CISTUS arboreſcens, foliis lanceolatis ſupra lævibus, petiolis baſi coalitis vaginantibus. *Hort. cliff.* 205. *Sauv. monſp.* 147. 150. *ladanifera.*
Ciſtus ladanifera hiſpanica incana. *Bauh. pin.* 467.
Ciſtus Ledon 1. anguſtifolius. *Cluſ. hiſt.* 1. *p.* 77.
Habitat in Hiſpaniæ, Luſitaniæ *collibus.* ♄
Flores *umbellati.* Folia *criſpa, utrinque acuta. Sauv.*

4. CI-

incana. 4. CISTUS arboreſcens, foliis ſeſſilibus utrinque villoſis rugoſis: inferioribus ovatis baſi connatis; ſummis lanceolatis. *Hort. cliff.* 205. *Hort. upſ.* 143. *Roy. lugdb.* 475.
Ciſtus mas anguſtifolius. *Bauh. pin.* 464.
Ciſtus mas 2. *Cluſ. hiſt.* 1. *p.* 69.
Habitat in Hiſpania, G. Narbonenſi. ♄

monſpelienſis. 5. CISTUS arboreſcens, foliis lanceolatis ſeſſilibus utrinque villoſis trinerviis, alis nudis. *Hort. cliff.* 205. *Hort. upſ.* 144. *Roy. lugdb.* 1475. *Sauv. monſp.* 147.
Ciſtus ladanifera monſpelienſium. *Bauh. pin.* 467.
Ledum. *Dalech. hiſt.* 230.
β. Ciſtus Ledon foliis oleæ, ſed anguſtioribus. *Bauh. pin.* 467.
Ledon 5. *Cluſ. hiſt.* 1. *p.* 79.
Habitat in Narbonenſi & Regno Valentino. ♄

albida. 6. CISTUS arboreſcens, foliis oblongis tomentoſis incanis ſeſſilibus ſupra aveniis, alis nudis. *Sauv. monſp.* 150.
Ciſtus mas, folio oblongo incano. *Bauh. pin.* 464.
Ciſtus mas 1. *Cluſ. hiſt.* 1. *p.* 68.
Ciſtus mas 4. monſpelienſis, folio oblongo albido. *Bauh. hiſt.* 2. *p.* 3.
Habitat in G. Narbonenſi, Hiſpania. ♄

Salvifolia. 7. CISTUS arboreſcens, foliis ovatis petiolatis utrinque hirſutis, alis nudis. *Hort. cliff.* 205. *Roy. lugdb.* 475. *Sauv. monſp.* 150.
Ciſtus femina, folio ſalviæ. *Bauh. pin.* 464.
Ciſtus femina. *Cluſ. hiſt.* 1. *p.* 60.
Habitas in Italia, Sicilia, Narbona. ♄
Pedunculi *uniflori, diphylli.* Corollæ *albæ. D. Sauv.*

criſpa. 8. CISTUS arboreſcens, foliis lanceolatis hirſutis repandis, alis nudis. *Hort. cliff.* 206. *Roy. lugdb.* 475. *Sauv. Monſp.* 147.
Ciſtus mas, foliis chamædryos. *Bauh. pin.* 464.
Ciſtus mas 5. *Cluſ. hiſt.* 1. *p.* 69.
Habitat in Luſitania. ♄
Ramuli, pedunculi & calyces tenui lana adſperſi.

halimifolia. 9. CISTUS arboreſcens, alis nudis, foliolis duobus calycinis linearibus. *Hort. cliff.* 205. *Roy. lugdb.* 475. *Sauv. monſp.* 147.
Ciſtus femina, portulacæ marinæ folio latiore obtuſo. *Bauh. pin.* 465.

Ciſtus

Ciſtus folio halimi 1. *Cluſ. hiſt.* 1. *p.* 71.
β. Ciſtus femina, portulacæ marinæ folio anguſtiore mucronato. *Bauh. pin.* 465.
Ciſtus halimi folio 2. *Cluſ. hiſt.* 1. *p.* 71.
Habitat in Luſitaniæ *maritimis.* ♄

* *Exſtipulatæ, ſuffruticoſæ.*

10. CISTUS ſuffruticoſus procumbens exſtipulatus, foliis oppoſitis, floribus umbellatis. *umbellatus.*
Ciſtus foliis linearibus non ſtipulatis, caule florali umbellato lignoſo. *Guett. ſtamp.* 2. *p.* 180. *Dalib. pariſ.* 158.
Ciſtus Ledon foliis thymi. *Bauh. pin.* 467.
Ledon X. *Cluſ. hiſt.* 1. *p.* 81.
Habitat in Gallia, Hiſpania. ♄

11. CISTUS ſuffruticoſus procumbens exſtipulatus, foliis alternis linearibus, pedunculis unifloris. *Fumana.*
Ciſtus caule procumbente, foliis alternis. *Fl. ſuec.* 435. *Guett. ſtamp.* 157.
Ciſtus fruticoſus procumbens, foliis aciformibus nudis. *Sauv. monſp.* 45.
Helianthemum foliis linearibus ſæpius alternis non ſtipulatis, pedunculis unifloris, caule lignoſo. *Guett. ſtamp.* 2. *p.* 18.
ChamæCiſtus, ericæ folio, luteus elatior. *Bauh. pin.* 466.
Helianthemum tenuifolium glabrum erectum, luteo flore. *Bauh. hiſt.* 2. *p.* 18.
β. Ciſtus fruticoſus procumbens, foliis aciformibus nudis, floribus auriculatis. *Sauv. monſp.* 46.
ChamæCiſtus, ericæ folio, luteus humilior. *Bauh. pin.* 466.
Helianthemum tenuifolium glabrum, luteo flore, per humum ſparſum. *Bauh. hiſt.* 2. *p.* 18.
Habitat in Gallia, Gotlandia, Helvetia. ♄
Corolla calyce vix major eſt.

12. CISTUS ſuffruticoſus exſtipulatus procumbens, foliis oppoſitis villoſis ſubtus tomentoſis. *canus.*
Ciſtus foliis ovatis ſubtus incanis, aliis nudis, caule procumbente. *Sauv. monſp.* 148.
ChamæCiſtus foliis myrti minoris incanis. *Bauh. pin.* 466.
ChamæCiſtus foliis myrti tarentinæ canis & cinereis. *Bauh. hiſt.* 2. *p.* 18.

Cha-

ChamæCiſtus 3. *Cluſ. hiſt.* 1. *p.* 74.
Habitat in G. Narbonenſi, Hiſpania. ♄

marifolius. 13. CISTUS ſuffruticoſus exſtipulatus, foliis oppoſitis ovatis petiolatis planis ſubtus tomentoſis.
Helianthemum luteum, thymi durioris folio. *Barr. rar.* 521. *t.* 441.
Habitat Maſſiliæ. ♄

Oelandicus. 14. CISTUS ſuffruticoſus procumbens exſtipulatus, foliis oppoſitis oblongis utrinque glabris, petiolis ciliatis, petalis emarginatis.
Ciſtus caule procumbente, foliis oblongis utrinque glabris, ſtipulis nullis. *Fl. ſuec.* 434. *
Habitat in rupibus apricis Oelandiæ. ♄

* *Exſtipulatæ, herbaceæ.*

Tuberaria. 15. CISTUS exſtipulatus perennis, foliis radicalibus ovatis trinerviis tomentoſis: caulinis glabris lanceolatis; ſummis alternis.
Ciſtus perennis, foliis humi appreſſis villoſis; ſummis glabris. *Sauv. monſp.* 149.
Ciſtus folio plantaginis. *Bauh. pin.* 465.
Tuberaria noſtras. *Bauh. hiſt.* 2. *p.* 12.
Tuberaria major. *Bauh. hiſt.* 2. *p.* 12.
Habitat in Galloprovincia, Hiſpania, Piſis. ♃

guttatus. 16. CISTUS herbaceus exſtipulatus, foliis oppoſitis trinerviis, racemis ebracteatis.
Ciſtus annuus, foliis radicalibus oppoſitis lanceolatis trinerviis, ramiferis ternatis linearibus. *Sauv. monſp.* 148.
Ciſtus foliis oblongo acuminatis non ſtipulatis, caule florali racemoſo. *Guett. ſtamp.* 2. *p.* 181. *Dalib. pariſ.* 158.
Ciſtus flore pallido, punicante macula inſignito. *Bauh. pin.* 465.
Helianthemum flore maculoſo. *Col. ecphr.* 2. *p.* 78. *t.* 77.
Habitat in G. Narbonenſi, Italia. ☉
Racemi *capillares omnino, absque ullis vel minimis bracteis.*

canadenſis. 17. CISTUS herbaceus exſtipulatus, foliis omnibus alternis lanceolatis, caule adſcendente.
Habitat in Canada. *Kalm.* ♃
Facies *C. Helianthemi, ſed Folia alterna.*

* *Stipulatæ*, *herbaceæ*.

18. CISTUS herbaceus erectus glaber ſtipulatus floribus ſolitariis ſubſeſſilibus, folio ternato oppoſitis. *Hort. upſ.* 144. *Sauv. monſp.* 178. *ledifolius.*
Ciſtus ſtipulis quaternis, foliis oblongis, caule erecto. *Hort. cliff.* 475.
Ciſtus ledi folio. *Bauh. pin.* 465.
Ciſtus annuus, foliis ledi. *Lob. ic.* 2. *p.* 118.
Habitat Monſpelii. ⊙

19. CISTUS herbaceus patulus villoſus ſtipulatus, floribus ſolitariis ſubſeſſilibus bractea triplici oppoſitis. *Hort. upſ.* 144. *ſalicifolius.*
Ciſtus ſtipulis quaternis, foliis ſubovatis ſubtus tomentoſis, caule procumbente. *Hort. cliff.* 206.
Ciſtus folio ſalicis. *Bauh. pin.* 465.
Ciſtus annuus 1. *Cluſ. hiſt.* 1. *p.* 76.
Habitat in Luſitania, Hiſpania. ⊙

20. CISTUS herbaceus erectus ſtipulatus, foliis lineari-lanceolatis petiolatis, calycibus inflatis corolla majoribus. *ægyptiacus.*
Habitat in Ægypto. *B. Juſſieus.* ⊙
Conf. CytiCiſtus foliis inferioribus confertis, ſuperioribus oppoſitis. *Burm. zeyl.* 85. *t.* 36.

* *Stipulatæ*, *ſuffruticoſæ*.

21. CISTUS ſuffruticoſus procumbens ſtipulatus, foliis ovato-oblongis ſubpiloſis, petalis lanceolatis. *ſurrejanus.*
Helianthemum vulgare, petalis florum perangustis. *Dill elth.* 177. *t.* 145. *f.* 174.
Habitat in Angliæ *comitatu* Surrejano *prope* Croydon. ♄

22. CISTUS ſuffruticoſus ſtipulatus, foliis inferioribus orbiculatis, ſuperioribus ovatis. *nummularius.*
Ciſtus humilis ſ. ChamæCiſtus nummulariæ folio. *Magn. monſp.* 293.
Helianthemum ad nummulariam accedens. *Bauh. hiſt.* 2. *p.* 20.
Habitat Monſpelii. ♄

23. CISTUS ſuffruticoſus ſtipulatus, foliis oblongis, calycibus lævibus. *Sauv. monſp.* 148. *ſerpillifolius.*
ChamæCiſtus repens ſerpillifolia lutea. *Bauh. pin.* 466.
ChamæCiſtus ſerpylli folio nigricante & hirſuto, flore aureo odorato. *Bauh. hiſt.* 2. *p.* 17.

Cha-

ChamæCiſtus 2. *Cluſ. hiſt.* 1. *p.* 73.
Habitat in Alpibus Auſtriæ, Stiriæ. ♄

thymifolius. 24. CISTUS ſuffruticuloſus ſtipulatus procumbens, foliis ovali-linearibus oppoſitis congeſtis. *Sauv. monſp.* 148. †
Helianthemum folio thymi incano. *Bauh. hiſt.* 2. *p.* 19.
ChamæCiſtus incanus, tragorigani folio, hiſpanicus. *Barr. rar.* 512. *t.* 415.
Habitat in G. Narbonenſi, Hiſpania. ♄

piloſus. 25. CISTUS ſuffruticoſus ſtipulatus, foliis linearibus ſuptus biſulcatis incanis, calycibus lævibus. *Sauv. monſp.* 147.
ChamæCiſtus foliis thymi incanis. *Bauh. pin.* 466
ChamæCiſtus 4. *Cluſ. hiſt.* 1. *p.* 74.
β. Ciſtus ſtipulis quaternis, foliis lineari-ovalibus incanis, calycibus tomentoſis. *Sauv. monſp.* 148.
Helianthemum flore albo, folio anguſto hirſuto *Bauh. hiſt.* 2. *p.* 17.
γ. Ciſtus foliis villoſis lanceolatis, axillis folioſis, ſtipulis ſubulatis. *Sauv. monſp.* 148.
Helianthemum ſ. Ciſtus humilis, folio ſampſuci, capitulis valde hirſutis. *Bauh. hiſt.* 2. *p.* 20.
Habitat Monſpelii. ♄
Hae tres α. β. γ. vel varietates vel valde affines: certiora determinent autoptæ.

Helianthemum. 26. CISTUS ſuffruticoſus procumbens, ſtipulis lanceolatis, foliis oblongis revolutis ſubpiloſis.
Ciſtus ſtipulis quaternis, foliis oblongis utrinque nudis caule procumbente. *Hort. cliff.* 206. *Roy. lugdb.* 476. *Fl. ſuec.* 433.
ChamæCiſtus vulgaris, flore luteo. *Bauh. pin.* 465. *Loeſ. pruſſ.* 43. *t.* 8.
Flos ſolis, Panax chironium. *Cam. epit.* 501.
Habitat in Europæ *paſcuis ſiccis* ♄
Petala ſuborbiculata, integerrima, flava, annulo receptaculum ambiente ſæpius fulvo. Racemus *ante floreſcentiam nutans.* Folia *pilis raris adſperſa.*

hirtus. 27. CISTUS ſuffruticoſus ſtipulatus foliis ovatis, calycibus hiſpidis.
Ciſtus foliis oblongo-linearibus margine revolutis. *Le monier. Sauv. monſp.* 148.
Helianthemum roriſmarini folio ſubtus incano. *Bauh. pin.* 467.

Heli

Helianthemum, anguſto ſerpilli folio, villoſum, flore aureo, italicum. *Barr. rar.* 511. *t.* 488.
Ledon 8. *Cluſ. hiſt.* 1. *p.* 8.
Habitat in Hiſpania, Narbona. ♄

18. CISTUS ſuffruticoſus ſtipulatus erectus, foliis lanceolatis hirtis. *apenninus.*
Helianthemum album germanicum. *Tabern. icon.* 1062.
Helianthemum ſaxatile, foliis & caulibus incanis oblongis, floribus albis. *Mentz. pug.* 8. *f.* 3. *Dill. elth.* 170.
Habitat in Apenninis, Italiæ *montibus.* ♄
Ciſtorum hiſtoria maxime omnium obſcura ob varietatum copiam, illuſtrabitur ſi determinent autoptæ in ſingulis
1. *Caudicem arboreſcentem, fruticuloſum, annuum ſ. perennem.*
2. *Caulem erectum ſ. decumbentem.*
3. *Folia oppoſita ſ. alterna: cum figura eorundem.*
4. *Stipulas ſ. nullas.*
5. *Pedunculum uniflorum, multiflorum: nudum ſ. bracteatum.*
6. *Petalorum figuram.*
7. *Capſulas 5loculares ſ. 3valves.*
8. *Calycem æqualem ſ. inæqualem.*

CORCHORUS.

1. CORCHORUS capſulis linearibus compreſſis bivalvibus. *Hort. upſ.* 147. *ſiliquoſus.*
Corchoro affinis chamædryos folio, flore ſtamineo, ſeminibus atris quadrangulis duplici ſerie diſpoſitis. *Sloan. jam.* 50. *hiſt.* 1. *p.* 145. *t.* 94. *f.* 1. *Raj. ſuppl.* 516.
Habitat in Jamaica. ⊙

2. CORCHORUS capſulis oblongis ventricoſis, foliorum infimis ſerraturis ſetaceis reflexis. *Fl. zeyl.* 213. *Hort. upſ.* 147. *olitorius.*
Corchorus foliorum infimis ſerraturis maximis reflexis. *Hort. cliff.* 209. *Roy. lugdb.* 478.
Corchorus plinii. *Bauh. pin.* 317.
Corchorus. *Cam. hort.* 47. *t.* 12.
β. Alcea cibaria ſ. Corchorus americana. *Pluk. alm.* 17. *t.* 127. *f.* 3.
γ. Alcea olitoria ſ. Corchorus americana. *Pluk. alm.* 17. *t.* 127. *f.* 4.
Habitat in Aſia, Africa, America. ⊙

3. CORCHORUS capſulis ſubrotundis depreſſis rugoſis. *Fl. zeyl.* 214. * *capſularis.*

Corchorus foliorum infimis ſerraturis minoribus. *Hort. cliff.* 210. *Roy. lugdb.* 478.

Alcea olitoria ſ. Corchorus americanus, prælongis foliis, capſula ſtriata ſubrotunda brevi. *Pluk. alm.* 18. *t.* 255. *f.* 4.

Habitat in India. ☉

hirſutus. 4. CORCHORUS capſulis ſubrotundis lanatis, foliis ovatis obtuſis tomentoſis.

Corchorus americanus lanuginoſus, folio chamædryos, ſiliqua tricapſulari lanuginoſa & ſubaſpera. *Breyn. prodr.* 3. *p.* 56.

Guazuma frutex chamædryfolia, fructu lanuginoſo, major & minor. *Plum. gen.* 36.

Habitat in America *meridionali.*

DIGYNIA.

PÆONIA.

officinalis. 1. PÆONIA. *Hort. cliff.* 212. *Hort. upſ.* 149. *Mat. med.* 267. *Sauv. monſp.* 307.

feminea. α. Pæonia foliis difformiter lobatis. *Hall. helv.* 311.

Pæonia communis ſ. femina. *Bauh. pin.* 323.

Pæonia femina. *Fuchſ. hiſt.* 202. *Lob. ic.* 602.

maſcula. β. Pæonia foliis lobatis ex ovato-lanceolatis. *Hall. helv.* 311.

Pæonia folio nigricante ſplendido, quæ mas. *Bauh. pin.* 323.

Pæonia mas. *Lob. ic.* 684.

Habitat in Nemoribus montium Idæ, Helvetiæ. ♃

Limites *inter ſpecies non reperi, hinc conjunxi.*

CALLIGONUM.

Polygonoides 1. CALLIGONUN. *Hort. cliff.* 212.

Polygonoides orientale, ephedræ facie. *Tournef. cor.* 47. *itin.* 3. *p.* 214. *t.* 214.

Habitat in monte Ararat. ♄

TRIGYNIA.

DELPHINIUM.

* *Unicapſulares.*

Conſolida. 1. DELPHINIUM nectariis monophyllis, caule ſubdiviſo. *Hort. cliff.* 217. *Fl. ſuec.* 440. *Mat. med.* 268. *Roy. lugdb.* 482. *Dalib. pariſ.* 158. Con-

Conſolida regalis arvenſis. *Bauh. pin.* 142.
Conſolida regalis. *Cam. epit.* 521.
Habitat in agris Europæ *reſtibilibus.* ☉

2. DELPHINIUM nectariis monophyllis, caule ſimplici. *Hort. cliff.* 213. *Hort. upſ.* 150. *Roy. lugdb.* 482. *Ajacis.*
Conſolida regalis hortenſis, flore majore & ſimplici. *Bauh. pin.* 142.
Conſolida regalis hortenſis, flore minore. *Bauh. pin.* 142.
Conſolida regalis flore majore & multiplici. *Bauh. pin.* 142.
Flos regius. *Dod. pempt.* 252.
Habitat - - - - ☉

3. DELPHINIUM nectariis diphyllis, capſulis ſolitariis, foliis multipartitis obtuſis. *Hort. cliff.* 213. *peregrinum.*
Conſolida regalis latifolia, parvo flore. *Bauh. pin.* 142. *prodr.* 74. *t.* 74. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 466. *ſ.* 12. *t.* 4. *f.* 3.
Habitat in Italia, Sicilia, Melita.

* *Tricapſulares*

4. DELPHINIUM nectariis diphyllis labellis integris, floribus ſubſolitariis, foliis compoſitis lineari-multipartitis. *Hort. upſ.* 150. * *grandiflorum.*
Delphinium luſitanicum glabrum, aconiti folio. *Roloſ. hort.* 61. *t.* 3.
Delphinium elatius ſubincanum perenne, floribus amplis azureis. *Amm. ruth.* 175.
Habitat in Sibiria. ♃

5. DELPHINIUM nectariis diphyllis: labellis bifidis apice barbatis, foliis inciſis, caule erecto. *Hort. upſ.* 151. * *elatum.*
Delphinium nectariis diphyllis, foliis peltatis multipartitis acutis. *Hort. cliff.* 213.
Aconitum cæruleum hirſutum, flore conſolidæ regalis. *Bauh. pin.* 131.
Aconitum lycoctonum, flore delphinii ſileſiaci. *Cluſ. hiſt.* 2. *p.* 94.
Habitat in Sibiria. ♃

6. DELPHINIUM nectariis diphyllis, foliis palmatis: lobis integris. *Hort. cliff.* 213. *Hort. upſ.* 150. *Mat. med.* 269. *Roy. lugdb.* 482. *Sauv. monſp.* 214. *Staphiſagria*
Staphiſagria. *Bauh. pin.* 324. *Dod. pempt.* 366.
Habitat in Iſtria, Dalmatia, Calabria, Apulia, Creta. Galloprovincia. ♂

ACONITUM.

lycoctonum. 1. ACONITUM foliis palmatis multifidis villoſis.
Aconitum foliis peltatis multifidis, petalo ſupremo cylindraceo. *Fl. lapp.* 211. *Hort. cliff.* 213. *Fl. ſuec.* 441. *Roy. lugdb.* 482. *Hall. helv.* 312.
Aconitum lycoctonum luteum. *Bauh. pin.* 183.
Aconitum lycoctonum, flore luteo. *Beſl. eyſt. æſt* 25. *f.* 2.
Aconitum II. *Cam. epit.* 827.
Habitat in Alpibus Lapponiæ, Helvetiæ, Auſtriæ, Italiæ. ♃

variegatum. 2. ACONITUM foliis mutifidis: laciniis ſemipartitis: ſuperne latis. *Hort. cliff.* 214. *Hort. upſ.* 151. *Roy lugdb.* 482.
Aconitum cæruleum minus. ſ. Napellus minor. *Bauh pin.* 183.
Aconitum cæruleum parvum. *Dod. pempt.* 441. *Dalech hiſt.* 1743.
Habitat in Italiæ, Bohemiæ *montibus.* ♃

Napellus. 3. ACONITUM foliorum laciniis linearibus ſuperne latioribus linea exaratis. *Hort. cliff.* 214. *Fl. ſuec.* 442. *Gron. virg.* 165. *Hall. helv.* 312. *Roy. lugdb.* 483. *Act. ſtockh.* 1739. *p.* 41. *t.* 2.
Aconitum cæruleum ſ. Napellus 1. *Bauh. pin.* 183.
Napellus verus. *Lob. hiſt.* 387.
Habitat in Helvetia, Bavaria, Gallia. ♃

pyrenaicum. 4. ACONITUM foliis multipartitis: laciniis linearibus incumbentibus ſquarroſis. *Hort. upſ.* 152. *
Aconitum pyrenaicum luteum, foliorum ſegmentis ſibi invicem incumbentibus. *Raj. europ.* 367.
Habitat in Sibiria, Tataria, Pyrenæis. ♃

Anthora. 5. ACONITUM floribus pentagynis.
Aconitum foliorum laciniis linearibus diſtinctis ubique ejusdem latitudinis. *Hort. cliff.* 214. *Hort. upſ.* 152. *Mat. med.* 270. *Hall. helv.* 313. *Roy. lugdb.* 483.
Aconitum ſalutiferum ſ. Anthora. *Bauh. pin.* 184.
Anthora ſ. Antithora. *Cam. epit.* 837.
Habitat in Alpibus Pyrenæis, Helveticis, Taurinis, Allobrogicis. ♃

TETRAGYNIA.

TETRACERA.

TETRACERA. *Hort. cliff.* 214. * *volubilis.*
Petræa floribus ſpicatis, ſcabris lauri foliis. *Amm. herb.* 581.
Fagus americanus, ulmi ampliſſimis foliis, capſulis bigemellis. *Pluk. amalt.* 87.
Arbor americana convolvulacea platyphyllos barbadenſibus dicta, foliis ſerratis. *Pluk. alm.* 48. *t.* 146. *f.* 1.
Habitat in Barbados, Vera Cruce, Marilandia. ♄

PENTAGYNIA

AQUILEGIA.

AQUILEGIA nectariis incurvis. *Hort. upſ.* 152. *Matth. med.* 272. *vulgaris.*
Aquilegia. *Hort. cliff.* 215. *Roy. lugdb.* 482. *Dalib. pariſ.* 160.
Aquilegia ſylveſtris. *Baub. pin.* 144.
Aquilegia hortenſis ſimplex. *Baub. pin.* 144.
Aquilegia hortenſis multiplex, flore magno *C. B.* 144.
Aquilegia hortenſis multiplex, flore inverſo. *C. B.* 144.
Aquilegia flore roſeo multiplici. *C. B.* 144.
Aquilegia degener vireſcens. *Baub. pin.* 144.
Habitat in Europæ *nemoribus ſaxoſis.* ♃

AQUILEGIA nectariis rectis petalo lanceolato brevioribus. *alpina.*
Aquilegia montata, magno flore. *Baub. pin.* 144. *prodr.* 75. *Burſ. VII*: 108. *Baub. hiſt.* 3. *p.* 484. *Raj. hiſt.* 707.
Habitat in Helvetia. ♂
Folia *duplicato-ternata, parva: foliolis multifidis: lobis ſublinearibus, obtuſis, facie & teneritudine ſequentis; Nectarii cornicula erectiuſcula, brevia, petalis dimidio breviora. Petala lanceolata, longiſſima.*

AQUILEGIA nectariis rectis, ſtaminibus corolla longioribus. *Hort. upſ.* 153. *canadenſis.*
Aquilegia corolla ſimplici, nectariis ſere rectis. *Gron. virg.* 59.
Aquilegia pumila præcox canadenſis. *Corn. canad.* 60. *t.* 60. *Lob. ic.* 26.

Aquilegia præcox canadenſis, flore externe rubicundo: medio luteo. *Moriſ. hiſt. 3. p. 457. ſ. 12. t. 2. f. 4.*
Habitat in Virginia, Canada. ♃

NIGELLA.

* *Pentagynæ.*

damaſcena. 1. NIGELLA floribus involucro folioſo cinctis. *Hort. cliff. 215. Hort. upſ. 153. Roy. lugdb. 481.*
Nigella anguſtifolia, flore majore ſimplici cæruleo. *Bauh. pin. 145.*
Melanthium ſylveſtre. *Matth. dioſc. 529.*
β. Nigella flore majore pleno cæruleo. *Bauh. pin. 145.*
Habitat inter ſegetes Europæ *auſtralis.* ☉

ſativa. 2. NIGELLA petalis ſubtricuſpidatis foliis ſubpiloſis. *Hort. upſ. 154. Mat. med. 271. Bœhm. lipſ. 173.*
Nigella flore minore ſimplici candido. *Bauh. pin. 145.*
Melanthium ſativum. *Cam. epit. 551.*
Nigella flore minore pleno & albo. *Bauh. pin. 146.*
Habitat in Ægypto, Creta. ☉

arvenſis. 3. NIGELLA piſtillis quinis, petalis integris, capſulis turbinatis.
Nigella flore foliis nudo, piſtillis corollam æquantibus. *Hort. cliff. 215. Roy. lugdb. 481. Hall. helv. 316. Dalib. pariſ. 160. Bœhm. lipſ. 174.*
Nigella arvenſis cornuta. *Bauh. pin. 145.*
Melanthium ſylveſtre alterum. *Cam. epit. 553.*
Habitat in Germaniæ, Galliæ, Italiæ *agris.* ☉
Hujus Capſula inferne anguſtior, præcedentis inferne ventricoſior; ſuperne utraque contra.

* *Decagynæ.*

hiſpanica. 4. NIGELLA piſtillis denis corollam æquantibus. *Hort. upſ. 154. Sauv. monſp. 253.*
Nigella latifolia, flore majore ſimplici cæruleo. *Bauh. pin. 145. prodr. 75. Moriſ. hiſt. 3. p. 516. ſ. 12. t. 18. f. 8.*
Habitat in Hiſpania, Monſpelii. ☉

orientalis. 5. NIGELLA piſtillis denis corolla longioribus. *Hort. cliff. 215.* * *Hort. upſ. 153. Roy. lugdb. 481.*
Nigella chalepenſis lutea, corniculis longioribus. *Moriſ. hiſt. 3. p. 516. ſ. 12. t. 18. f. 10. Raj. app. 525.*
Habitat circum Alepum. ☉

HE-

HEXAGYNIA.

STRATIOTES.

1. STRATIOTES foliis enſiformi-triangulis ciliato-aculeatis. *Aloides.*
   Stratiotes. *Fl. lapp.* 222. *Fl. ſuec.* 444. *Hort. cliff.* 221. *Roy. lugdb.* 10. *Gort. gelr.* 313.
   Stratiotes militaris aizoides. *Lob. hiſt.* 904.
   Aloë paluſtris. *Bauh. pin.* 286.
   Habitat in Europæ *ſeptentrionalis aquis pigris.* ♃

2. STRATIOTES foliis cordatis. *Fl. zeyl* 223. *Aliſmoides.*
   Oel-ambel. *Rheed. mal.* 11. *p.* 95. *t.* 46.
   Habitat in India. ♃

POLYGYNIA.

DILLENIA.

1. DILLENIA. *Hort. cliff.* 221. *Indica.*
   Syalita. *Rheed. mal.* 3. *p.* 39. *t.* 38. 39.
   Habitat in Malabaria. ♄

LIRIODENDRON.

1. LIRIODENDRON. *Hort. cliff.* 223. *Hort. upſ.* 154. *Gron. virg.* 60. *Roy. lugdb.* 494. *Tulipifera.*
   Tulipifera arbor virginiana. *Herm. lugdb.* 612. *t.* 613.
   Tulipifera virginiana, tripartito aceris folio: media lacinia velut abſciſſa. *Pluk. alm.* 379. *t.* 117. *f.* 5. & *t.* 248. *f.* 7. *Catesb. car.* 1. *p.* 48. *t.* 48.
   β. Tulipifera caroliniana, foliis productioribus magis angulosis. *Pluk. alm.* 379. *t.* 68. *f.* 3.
   Habitat in America *ſeptentrionali.* ♄

MAGNOLIA.

1. MAGNOLIA. *virginiana.*
   Magnolia foliis ovato-lanceolatis. *Hort. cliff.* 222. *Gron. virg.* 61. *Roy. lugdb.* 493.
   α. Magnolia foliis ovato-lanceolatis ſubtus glaucis. *Anon.* *glauca.*
   Magnolia lauri folio ſubtus albicante. *Catesb. car.* 1. *p.* 39. *t.* 39. *Dill. elth.* 20?. *t.* 168. *f.* 205.
   Tulipifera virginiana, laurinis foliis averſa parte rors cæruleo cinctis, coni-baccifera. *Pluk. alm.* 379. *t.* 68. *f.* 4.

Laurus tulipifera, baccis calyculatis. *Raj. hiſt.* 1690.

fœtida. β. Magnolia foliis ovato-oblongis ſubtus viridibus. *Anon.*
Magnolia altiſſima, flore ingenti candido. *Cateſb. car.* 2. *p.* 61. *t.* 61. *Ehret. pict.*
Magnolia ampliſſimo folio, fructu cæruleo. *Plum. gen.* 38.
Magnolia flore maximo albo fœtido, foliis deciduis amplis, florum ad ramulorum ſeriem ſphærice cingentibus, fructu majori. *Gron. virg.* 61.

griſea. γ. Magnolia foliis ovato-oblongis ſubtus griſeis. *Anon.*
Laurus tulipifera, foliis ſubtus ex cinereo aut argenteo purpuraſcentibus. *Raj. hiſt.* 1718.

tripetala. δ. Magnolia ampliſſimo flore albo, fructu coccineo. *Cateſb. car.* 2. *p.* 80. *t.* 80.

acuminata. ε. Magnolia flore albo, folio majore acumniato haud albicante. *Cateſb. car.* 2. *p.* 15. *t.* 15. *Gron. virg.* 61.
Habitat in Virginia, Carolina. ♄
Utrum hæ: α. β. γ. δ. ε. ſint diſtinctæ, determinent autoptæ in ſolo naturali? harum.
δ. Petalis tribus exterioribus reflexis.
ε. Foliis ovatis acuminatis.
β. Flore maximo & longiore in diametro quam foliorum longitudo & Foliis ſubtus griſeis.

MICHELIA.

Champaca. 1. MICHELIA. *Fl. zeyl.* 144.
Champacam. *Rheed. mal.* 1. *p.* 31. *t.* 19. *Raj. hiſt.* 1641.
Habitat in India. ♄

UVARIA.

zeylanica. 1. UVARIA foliis integerrimis.
Uvaria. *Fl. zeyl.* 224. *
Narum-panel. *Rheed. mal.* 2. *p.* 11. *t.* 9. *Raj. hiſt.* 1636.
Habitat in India. ♄

japonica. 2. UVARIA foliis ſerratis.
Frutex viſcoſus procumbens, folio telephii vulgaris æmulo, fructu racemoſo. *Kæmpf. amœn.* 476. *t.* 477.
Habitat in Japonia. ♄

ANNONA.

muricata. 1. ANNONA foliis ovali-lanceolatis glabris nitidis planis, pomis muricatis. *Hort. cliff.* 222. * *Gron. virg.* 61. *Roy. lugab.* 494.

Anno

Anona indica latifolia, fructu ſquamoſo aſpero. *Pluk. alm.* 31. *t.* 134. *f.* 2.
Anona indica fructu conoide viridi ſquamis veluti aculeato. *Pluk. alm.* 32. *t.* 135. *f.* 2.
Anona maxima, foliis latis ſplendentibus, fructu maximo viridi conoide: tuberculis ſ. ſpinnulis innocentibus aſpero. *Sloan. jam.* 203. *hiſt.* 2. *p.* 196. *t.* 225.
Anona. *Comm. hort.* 1. *p.* 133. *t.* 69.
Guanabanus fructu e viridi luteſcente molliter aculeato. *Plum. gen.* 43
Habitat in America *calidiore.* ♄

2. ANNONA foliis oblongis, fructibus obtuſe ſubſquamatis. *ſquamoſa.*
Anona foliis odoratis minoribus, fructu conoide ſquamoſo parvo dulci. *Sloan. jam.* 205. *hiſt.* 2. *p.* 168. *t.* 227. *Raj. dendr.* 77.
Habitat in America *meridionali.* ♄

3. ANNONA foliis lanceolatis, fructibus ovatis reticulato-areolatis. *reticulata.*
Anona maxima foliis oblongis anguſtis, fructu maximo luteo conoide: cortice glabro in areolas angulares diſtincto. *Sloan. jam.* 264. *hiſt.* 2. *p.* 167. *t.* 226. *Catesb. car.* 2. *p.* 62. *t.* 62. *Raj. dendr.* 77.
Habitat in America *meridionali.* ♄

4. ANNONA foliis lanceolato-ovatis, fructibus conoidibus glabris. *glabra.*
Anona maxima, foliis latis, fructu maximo luteo conoide: cortice glabro. *Catesb. car.* 2. *p.* 64. *t.* 64.
Habitat in Carolina. ♄

5. ANNONA foliis lanceolatis, fructibus trifidis. *triloba.*
Anona fructu luteſcente levi ſcrotum arietis referente. *Catesb. car.* 2. *p.* 85. *t.* 85.
Habitat in Carolina. ♄

6. ANNONA foliis lanceolatis glabris nitidis ſecundum nervos ſulcatis. *Hort. cliff.* 222. * *Fl. zeyl.* 225. * *Roy. lugdb.* 494. *aſiatica.*
Annona ſylveſtris. *Burm. zeyl.* 25.
Habitat in Zeylona. ♄

7. ANNONA foliis lanceolatis pubeſcentibus. *Hort. cliff.* 222. *Roy. lugdb.* 494. *africana.*
Habitat in Æthiopia. ♄

ANEMONE.

* Hepaticæ *flore calycato.*

1. ANEMONE foliis trilobis integerrimis.
Hepatica. *Hort. cliff.* 223. *Fl. ſuec.* 445. *Hort. upſ.* 155. *Mat. med.* 277. *Gron. virg.* 61. *Roy. lugdb.* 487.
Trifolium hepaticum, flore ſimplici & pleno. *Bauh. pin.* 339.
Habitat in Europæ *nemoribus lapidoſis.* ♃

palmata. 2. ANEMONE calyce hexaphyllo colorato.
Pulſatilla foliis palmatis. *Hort. cliff.* 224. *Roy. lugdb.* 487.
Anemone, cyclaminis ſ. malvæ folio, lutea. *Bauh. pin* 173. *Moriſ. hiſt.* 2. *p.* 425. *ſ.* 4. *t.* 25. *f.* 3.
Anemone hortenſis latifolia 1. *Cluſ. hiſt.* 1. *p.* 248.
Habitat in Luſitania *ad* Tagum. ♃
Calyx *ſexpartitus, integerrimus, villoſus, coloratus, nec a flore remotus, conjungit Anemones T. & Hepaticas. D.*

* Pulſatillæ *pedunculo involucrato, ſeminibus lanatis.*

patens. 3. ANEMONE pedunculo involucrato, foliis digitatis multifidis.
Pulſatilla folio anemones ſecundæ ſ. ſubrotundo. *Bauh. pin.* 94. *prodr.* 94.
Pulſatilla polyanthos violacea, anemones folio, *Breyn. cent.* 132. *Helw. pulſ.* 52. *t.* 2. 3.
Pulſatilla, anemones folio diſſecto, lanuginoſa, flore majore dilute luteo patente. *Amm. ruth.* 104.
Habitat in Toboſko Sibiriæ, Luſatia *inferiore.* ♃
Folia *radicalia ternato-digitata: Foliolis ſeſſilibus, laciniatis, acuminatis: Foliolo intermedio tripartito; lateralibus bipartitis.* Scapus *uniflorus, foliis brevior.* Involucrum *remotum, villoſum.* Corolla *alba, ſubtus villoſa.* Stamina *lutea.*

vernalis. 4. ANEMONE pedunculo involucrato; foliis pinnatis, flore erecto.
Pulſatilla foliis ſimpliciter pinnatis: foliolis lobatis, flore erecto. *Fl. ſuec.* 448.
Pulſatilla involucro piloſo nitido. *Fl. lapp.* 223.
Pulſatilla, apii folio, vernalis, flore majore. *Bauh. pin.* 177. *prodr.* 94. *Helw. pulſ.* 63. *t.* 9.
β. Pulſatilla, apii folio, vernalis, flore minore. *Bauh. pin.* 177. *prodr.* 94. *Helw. pulſ.* 64. *t.* 10.

Pul-

γ. Pulſatilla lutea, apii hortenſis folio. *Bauh. pin.* 177. *Hall. helv.* - - *t.* 6.
Habitat in Sueciæ, Helvetiæ *ſylvis ſteriliſſimis.* ♃

5. ANEMONE pedunculo involucrato, petalis rectis, foliis bipinnatis. *Pulſatilla.*
Pulſatilla foliis decompoſitis pinnatis, flore nutante: limbo erecto. *Hort. cliff.* 223. *Fl. ſuec.* 446. *Mat. med.* 276. *Roy. lugdb.* 487. *Dalib. pariſ.* 160. *Sauv. monſp.* 254.
Pulſatilla folio craſſiore & majore flore. *Bauh. pin.* 177. *Helw. pulſ.* 62. *t.* 8.
Pulſatilla. *Cam. epit.* 398.
Habitat in campis ſylveſtribus exaridis collibusque apricis Europæ *borealis.* ♃

6. ANEMONE pedunculo involucrato, petalis apice reflexis, foliis bipinnatis. *pratenſis.*
Pulſatilla foliis decompoſitis pinnatis, flore pendulo: limbo reflexo. *Hort. cliff.* 223.* *Fl. ſuec.* 447. *Roy. lugdb.* 487. *Sauv. monſp.* 254.
Pulſatilla flore minore nigricante. *Bauh. pin.* 177. *Helw. pulſ.* 66. *t.* 12.
Pulſatilla vulgaris, ſaturatiore flore. *Cluſ. hiſt.* 1. *p.* 246.
Pulſatilla flore clauſo obſoleto: petalis reflexis. *Helw. pulſ.* 65. *t.* 11.
Habitat in Scaniæ, Germaniæ *campis pratenſibus apricis aridis.* ♃

* Anemones *caule folioſo, ſeminibus caudatis.*

7. ANEMONE foliis radicalibus ternato-decompoſitis, involucro folioſo. *coronaria.*
Pulſatilla foliis decompoſitis ternatis. *Hort. cliff.* 223. *Hort. upſ.* 155. *Roy. lugdb.* 487.
Anemone tenuifolia, ſimplici flore. *Bauh. pin.* 174. *n.* 2. 3. 4 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
β. Anemone tenuifolia multiplex rubra. *Bauh. pin.* 176.
Anemone. *Cam. epit.* 386.
Habitat in Oriente, Conſtantinopoli *allata.* ♃

8. ANEMONE foliis caulinis ternis connatis ſupradecompoſitis multifidis, ſeminibus hirſutis caudatis. *alpina.*
Anemone nubis caudatis, foliis omnibus duplicato-pinnatis: pinnulis remotis. *Hall. helv.* 331.
Anemone ſylveſtris 2. *Cluſ. hiſt.* 1. *p.* 245.
Pulſatilla flore albo. *Bauh. pin.* 177. *Lob. ic.* 282.
β. Anemone alpina alba major. *Bauh. pin.* 176. *prodr.* 94. *Burſ. IX.* 80.

γ. A-

γ. Anemone alpina alba minor. *Bauh. pin.* 176. *prodr.* 194. *Burſ. IX:* 81.
Habitat in Alpibus Styriacis, Helveticis. ♃
Confer: Pulſatilla lutea, paſtinacæ ſylveſtris folio. C. B. 177. *quæ vix videtur ab hac diverſa.*

hortenſis. 9. ANEMONE foliis digitatis.
Pulſatilla foliis digitatis. *Hort. cliff.* 224.
Anemone, geranii rotundo folio, purpuraſcens. *Bauh. pin.* 173.
Anemone hortenſis latifolia 3. *Cluſ. hiſt.* 1. *p.* 249.
Anemone 1. *Dod. pempt.* 434.
Habitat ad Rhenum & *in* Italia. ♃

* Anemonoide *flore nudo, ſeminibus ecaudatis.*

ſylveſtris. 10. ANEMONE pedunculo nudo, ſeminibus ſubrotundis hirſutis.
Anemone ſeminibus hirſutis. *It. oel.* 112. *Fl. ſuec.* 449.
Anemone ſeminibus ſeta plumoſa terminatis. *Hort. cliff.* 224. *Roy. lugdb.* 224.
Anemone ſylveſtris alba major. *Bauh. pin.* 176.
Anemone ſylveſtris 1. *Cluſ. hiſt.* 1. *p.* 244.
β. Anemone ſylveſtris alba minor. *Bauh. pin.* 176. *prodr.* 93.
Habitat in Germania. ♃

virginiana. 11. ANEMONE pedunculis alternis longiſſimis, fructibus cylindricis, ſeminibus hirſutis muticis.
Anemone caule ramoſo, petalis lanceolatis. *Roy. lugdb.* 488. *Gron. virg.* 165.
Anemone virginiana tertiæ ſimilis, flore parvo. *Herm. lugdb.* 645. *parad.* 18. *t.* 18.
Habitat in Virginia. ♃
Caulis *nudus, terminatus* Foliis *ternis, ternatis: medio trilobo, acuto, ſerrato, lateralibus bipartitis, lobato-ſerratis.* Pedunculus *exit e centro petiolorum, longus, nudus.* Flos *parvus petalis ovatis, viridibus, inſtar calycis cujusdam.* Piſtillorum *capitulum elongatum, cylindricum, reſolvitur in Semina hirſuta. Juxta pedunculi baſin exit caulis ulterius, terminatus pedunculo florifero & foliis duobus oppoſitis & ſic ulterius*

dichotoma. 12. ANEMONE caule dichotomo, foliis ſeſſilibus amplexicaulibus palmatis. *Amœn. acad.* 1. *p.* 155. *
Habitat in Canada, Sibiria. ♃

trifolia. 13. ANEMONE foliis ternatis ovatis integris ſerratis. caule

caule unifloro. *Hort. upſ.* 155. *Hort. cliff.* 224. *Roy. lugdb.* 488. *Dalib. pariſ.* 161.
Anemone trifolia, flore albo. *Bauh. hiſt.* 3. *p.* 412.
Anemone trifolia. *Dod. pempt.* 436.
Habitat in Gallia. ♃

14. ANEMONE foliis quinatis ovalibus ſerratis, caule unifloro. *quinquefolia*
Ranunculus nemorum, fragariæ foliis, virginianus. *Pluk. alm.* 310. *t.* 166. *f.* 3.
Habitat in Virginia, Canada. *Kalm.* ♃

15. ANEMONE ſeminibus acutis, foliolis inciſis, caule unifloro. *Hort. cliff.* 224. *Fl. ſuec.* 450. *Roy. lugdb.* 488. *Mat. med.* 275. *Dalib. pariſ.* 161. *nemoroſa.*
Anemone nemoroſa, flore majore. *Bauh. pin.* 176.
Ranunculus ſylvarum. *Cluſ. hiſt.* 247.
Habitat in Europæ *aſperis, duris, nemoribus.* ♃

16. ANEMONE ſeminibus acutis, foliolis inciſis, petalis lanceolatis numeroſis. *apennina.*
Ranunculus nemoroſus, flore cæruleo, apennini montis. *Mentz. pug. t.* 8. *f.* 2.
Ranunculus nemoroſus, flore purpuro-cæruleo. *Park. theatr.* 325. *Raj. angl.* 3. *p.* 259.
Anemone, geranii robertiani folio, cærulea. *Bauh. pin.* 174?
Habitat in Apenninis, Anglia. ♃

17. ANEMONE ſeminibus acutis, foliolis inciſis, petalis ſubrotundis, caule ſub-bifloro. *Hort. cliff.* 125. *Fl. ſuec.* 451. *Roy. lugdb.* 488. *Dalib. pariſ.* 161. *ranunculoides.*
Ranunculus nemoroſus luteus. *Bauh. pin.* 178.
Ranunculus phragmites luteus nemoroſus. *Bauh. hiſt.* 3. *p.* 413.
Habitat in Europæ *borealis pratis nemoroſis.* ♃

18. ANEMONE caule unifloro, involucro folioſo obtuſo. *Sibirica.*
Habitat in Sibiria. *D. Gmelin.* ♃
Folia *radicalia digitata, multifida, marginibus præſertim hirſuta: petiolis piloſis baſi vaginantibus.* Scapus *nudus, piloſus.* Involucrum *ſub flore tripartitum, lobatum: laciniis lanceolatis.* Flos *patens: petalis* 6, *ſubrotundis, fulvis.* Staminibus *flavis.* Piſtillorum *capitula ſubrotunda, muricata.*

19. A-

narciſſifolia. 19. ANEMONE floribus umbellatis, ſeminibus depreſſo-ovalibus nudis.
Anemone multiflora, ſemine lævi latiſſimo, petalis ſenis ex rotundo-acutis. *Hall. helv.* 330.
Ranunculus montanus hirſutus humilior, narciſſi flore. *Bauh. pin.* 182.
Ranunculus montani 2 ſpecies altera. *Cluſ. hiſt.* 1. *p.* 235.
Habitat in Alpibus Auſtriæ, Helvetiæ, Sibiriæ. ♃

faſciculata. 20. ANEMONE floribus umbellatis congeſtis, foliis multifidis. †
Ranunculus orientalis, aconiti lycoctoni folio, flore magno albo. *Tournef. cor.* 20. *itin.* 3. *p.* 92. *t.* 92.
Habitat in Oriente.
Obſcure adhuc diſtincta a præcedente, (cui ſimillima) quamdiu hujus ſemina non deſcripta ſunt.

Thalictroides. 21. ANEMONE foliis caulinis ſimplicibus verticillatis, radicalibus duplicato ternatis.
Ranunculus nemoroſus, aquilegiæ foliis, virginianus, aſphodeli radice. *Pluk. alm.* 310. *t.* 106. *f.* 4.
β. Thalictrum caule unifloro, ex eodem puncto foliis quatuor ſimplicibus inſtructo. *Gron. virg.* 62.
Habitat in Virginia, Canada.
Canadenſis plantæ o, a D. Kalmio lectæ. Radix *tuberoſa.* Folia *radicalia petiolis longis, duplicato-ternata: foliolis ſubcordatis, angulatis.* Scapus *foliis paulo altior, terminatus foliis quatuor ſimplicibus, foliolis radicalibus ſimilibus, petiolis longis inſidentibus.* Pedunculi *terminales, conferti ſ. faſciculati* 1, 2, 3. *ſ.* 5, *ſimplices, uniflori, æquales.* Corollæ *albæ: petalis ovatis, obtuſis, patentibus.* Stamina *flaveſcentia.* Piſtilli *capitulum ovatum, muricatum.*

ATRAGENE.

zeylanica. 1. ATRAGENE cirrhis diphyllis. *Fl. zeyl.* 226.
Atragene. *Amœn. acad.* 1. *p.* 405.
Clematis zeylanica, floribus obſoletis parvis. *Herm. zeyl.* 35.
Habitat in Zeylona. ♄

alpina. 2. ATRAGENE foliis duplicato-ternatis ſerratis.
Clematis foliis cordatis crenatis indiviſis trilobis ternatisque. *Roy. lugdb.* 487.

Cle-

Clematis alpina geranifolia. *Bauh. pin.* 300. *prodr.* 135. *Pluk. alm.* 109. *t.* 84. *f.* 7.
Clematis cruciata alpina. *Pon. bald.* 335.
Anemone, tubis caudatis, tetrapetala, pinnis latiſſimis. *Hall. helv.* 332.
Habitat in Helvetia, Baldo, Sibiria. ♄

3. ATRAGENE foliis ternatis: foliolis tripartitis ſubſerratis. *ſibirica.*
Habitat in Sibiriæ *ſubhumidis ubique.*
Caulis *ſarmentoſus.* Folia *oppoſita, ternata, ſubſerrata; foliolis trifidis: lobo exteriore profundiore.* Flores *paniculati, rubri, pleni. Facies Aquilegiæ ſtellatæ.*

4. ATRAGENE foliis ternatis: foliolis inciſis laceris. *capenſis.*
Pulſatilla foliis trifidis dentatis, flore incarnato pleno. *Burm. afric.* 148.
Pulſatilla apii folio rigido, flore magno. *Herm. afr.* 18.
Habitat ad Cap. b. Spei. ♃

CLEMATIS.

* *ſcandentes.*

1. CLEMATIS foliis compoſitis decompoſitisque: foliolis ovatis integerrimis. *Hort. cliff.* 225. *Roy. lugdb.* 486. *Viticella.*
Clematitis cærulea vel purpurea repens. *Bauh. pin.* 300.
Clematis altera. *Cluſ. hiſt.* 1. *p.* 122.
Clematitis cærulea, flore pleno. *Bauh. pin.* 300.
Habitat in Italiæ, Hiſpaniæ *ſepibus.*

2. CLEMATIS foliis compoſitis decompoſitisque: foliolis quibusdam trifidis. *Gron. virg.* 62. *Viorna.*
Flammula ſcandens, flore violaceo clauſo. *Dill. elth.* 144. *t.* 118. *f.* 144.
Clematis purpurea repens, petalis florum coriaceis. *Raj. hiſt.* 1928.
Scandens caroliniana planta, viornæ folio. *Pet. ſicc.* 27.
Habitat in Virginia, Carolina.

3. CLEMATIS foliis ſimplicibus ternatisque: foliolis integris trilobisve. *criſpa.*
Clematis flore criſpo. *Dill. elth.* 86. *t.* 73. *f.* 84.
Habitat in Carolina.

4. CLEMATIS foliis compoſitis: foliolis inciſis angulatis lobatis cuneiformibus. *orientalis.*

Cle-

Clematis orientalis, apii folio, flore e viridi-flaveſcente poſterius reflexo. *Tournef. cor.* 20.
Flammula ſcandens, apii folio glauco. *Dill. elth.* 144 *t.* 119. *f.* 145.
Habitat in Oriente.

Vitalba. 5. CLEMATIS foliis pinnatis, foliolis cordatis ſcandentibus. *Hort. cliff.* 225. *Roy. lugdb.* 486. *Hall. helv.* 334. *Gron. virg.* 62. *Sauv. monſp.* 249. *Gort. gelr.* 315.
Clematitis latifolia integra. *Bauh. hiſt.* 2. *p.* 125.
Clematis tertia. *Cam. epit.* 697.
β. Clematis latifolia dentata. *Bauh. hiſt.* 2. *p.* 125.
Vitalba. *Dod. pempt.* 404.
γ. Clematis ſylveſtris latifolia. *Bauh. pin.* 300. *Sloan. jam.* 84.
Habitat in ſepibus Europæ *auſtralis*, Virginiæ, Jamaicæ.

cirrhoſa. 6. CLEMATIS cirrhis ſcandens. *Hort. cliff.* 226. *Roy. lugdb.* 487.
Clematitis peregrina, foliis pyri inciſis. *Bauh. pin.* 300.
Clematis altera bætica. *Cluſ. hiſt.* 1. *p.* 123.
Clematis peregrina, foliis pyri inciſis: nunc ſingularibus, nunc ternis. *Tournef. cor.* 20.
Habitat in Bætica, *arbores operiens & deprimens.*

Flammula. 7. CLEMATIS foliis inferioribus pinnatis laciniatis: ſummis ſimplicibus integerrimis lanceolatis. *Hort. cliff.* 225. *Roy. lugdb.* 486. *Hall. helv.* 334. *Sauv. monſp.* 249.
Clematitis ſ. Flammula repens. *Bauh. pin.* 300. *Raj. hiſt.* 621.
Flammula. *Dod. pempt.* 404. *Dalech. hiſt.* 1171.
β Clematitis maritima repens. *Bauh. pin.* 300. *prodr.* 135.
Habitat Monſpelii, Jenæ, *inque* Rhetiæ *ſepibus*.

* *erectæ*

8. CLEMATIS foliis pinnatis: foliolis ovato-lanceolatis integerrimis, caule erecto. *Hort. cliff.* 225. *Hort. upſ.* 155. *Roy. lugdb.* 486. *Sauv. monſp.* 249.
Flammula recta. *Bauh. pin.* 300.
Flammula. *Cam. epit.* 698. *Cluſ. hiſt.* 1. *p.* 124.
Habitat in collibus Auſtriæ, Pannoniæ, Tatariæ, Monſpelii. ♃

integrifolia. 9. CLEMATIS foliis ſimplicibus ovato-lanceolatis. *Hort. cliff.* 225. *Hort. upſ.* 156. *Roy. lugdb.* 486.
Clematitis cærulea erecta. *Bauh. pin.* 300.

Cle-

Clematis cærulea pannonica. *Cluſ. hiſt.* 1. *p.* 123.
Habitat in Hungaria, Tataria. ♃

THALICTRUM.

1. THALICTRUM caule ſimpliciſſimo ſubnudo, racemo ſimplici terminali. *Hort. cliff* 227. *Fl. ſuec.* 455. *Roy. lugdb.* 485. *alpinum.*

Thalictrum caule ſubnudo ſimplici, foliolis obtuſis. *Fl. lapp.* 225. *

Thalictrum montanum minimum præcox, foliis ſplendentibus. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 325. *ſ.* 9. *t.* 20. *f.* 14.

Habitat in Alpibus Lapponiæ, Arvoniæ. ♃

Petala 4, *Stamina* 12, *Piſtilla* 8, *Racemus ſimplex floribus cernuis.*

2. THALICTRUM caule paniculato ramoſiſſimo folioſo. *fœtidum.*

Thalictrum caule filiformi ramoſiſſimo in paniculam diſperſo ſubjectis foliolis. *Hort. cliff.* 227. * *Roy lugdb.* 485. *Sauv. monſp.* 251.

Thalictrum minimum fœtidiſſimum. *Baub. pin.* 337. *prodr.* 147. *Baub. hiſt.* 3. *p.* 488. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 325. *ſ.* 9. *t.* 20. *f.* 13. *Plук. alm.* 367. *t.* 65. *f.* 4.

Habitat Monſpelii, *inque* Valleſia, Helvetia. ♃

3. THALICTRUM floribus pentapetalis, radice tuberoſa. *Hort. cliff.* 227. *Roy. lugdb.* 486. *tuberoſum.*

Thalictrum minus, aſphodeli radice, magno flore. *Tour. nef. inſt.* 271.

Ranunculus thalictri folio, aſphodeli radice. *Moriſ. hiſt* 2. *p.* 438. *ſ.* 4. *t.* 28. *f.* 13.

Oenanthe folio hederæ. *Baub. pin.* 163.

Habitat in Hiſpania. ♃

4. THALICTRUM floribus pentapetalis, radice fibroſa. *Roy. lugdb.* 486. *cornuti.*

Thalictrum canadenſe. *Corn. canad.* 186.

Thalictrum americanum. *Park. theatr.* 265.

Thalictrum majus, foliis aquilegiæ, flore albo. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 325.

Habitat in Canada. ♃

5. THALICTRUM floribus dioicis. *dioicum.*

Habitat in Canada. *Kalm.*

Altitudo vix pedalis. Caulis rectus. Flores *tetrapetali, corollis & ſtaminibus* 40 *albis.* Antheræ *flaveſcentes.*

Foliola *cernua ſunt, qua nota diſtinctiſſima evadit planta ex* [illegible].

minus. 6. THALICTRUM foliis ſexpartitis, floribus cernuis.
Thalictrum caule folioſo, foliolis caulinis acutis, panicula divaricata, floribus nutantibus. *Fl. ſuec.* 454. *It. oel.* 180. * *Dalib. pariſ.* 454.
Thalictrum minus. *Bauh. pin.* 337. *Dod. pempt.* 58.
Ruta pratenſis minor. *Tabern. ic.* 55.
Habitat in Europæ *pratis.* ♃

ſibiricum. 7. THALICTRUM foliis tripartitis divaricatis, floribus cernuis.
Habitat in Sibiria *D. Gmelin.*
Habitus, Semina & omnia antecedentis, at Folia baſi tantum tripartita, & foliola tenella, glauca, parva, uti in Fumaria.

purpuraſcens 8. THALICTRUM foliis tripartitis, caule foliis duplo altiore, floribus cernuis.
Habitat in Canada.? ♃
Habitus Thalictri minoris, at vix pedalis evadit, ubi illa tripedalis. Calyces *purpuraſcentes, ſtaminibus luteis.* Caulis *etjam purpuraſcens.*

anguſtifolium. 9. THALICTRUM foliolis lanceolato-linearibus integerrimis. *Hort. cliff.* 226. *Fl. hybrid.* 28. *Roy. lugdb.* 487. *Hall. helv.* 308. *Sauv. monſp.* 250.
Thalictrum pratenſe, anguſtiſſimo folio. *Bauh. pin* 337. *prodr.* 146. *t.* 146. *Pluk. alm.* 364. *t.* 65. *f.* 6.
Habitat in Germania *rarius.* ♃
Petala 4, *ſtamina* 16. *Piſtilla* 7.

* *flavum.* 10. THALICTRUM caule folioſo ſulcato, panicula multiplici erecta. *Hort. cliff.* 226. *Fl. ſuec.* 453. *Roy. lugdb.* 485. *Hall. helv.* 308. *Dalib. pariſ.* 162.
Thalictrum pratenſe. *Fl. lapp.* 224.
Thalictrum majus, ſiliqua anguloſa ſ. ſtriata. *Bauh. pin* 336.
Thalictrum magnum. *Dod. pempt.* 58.

ſpecioſum β. Thalictrum majus flavum, floribus luteis ſ. glauco folio. *Bauh. pin.* 336. *ſtaminibus fulvis.*
Habitat in Europæ *ſeptentrionalioris ſubhumidis,* β. *in* Hiſpania. ♃
Petala 4, *Stamina* 24, *Piſtilla* 10--16.

lucidum. 11. THALICTRUM caule folioſo ſulcato, foliis linearibus carnoſis. *Dalib. pariſ.* 162. †

Thali

Thalictrum minus lucidum, libanotidis coronariæ foliis. *Pluk. alm.* 363. *t.* 65. *f.* 5.

Thalictrum minus alterum pariſienſium, foliis craſſioribus & lucidis. *Tournef. inſt.* 271.

Thalictrum 1, vel pratenſe 1. *Cluſ. hiſt.* 1. *p.* 234.

Habitat Pariſiis *&* *in* Hiſpania.

Planta, an ſatis diſtincta, a T. flavo? videtur temporis filia.

12. THALICTRUM fructibus pendulis triangularibus rectis, caule tereti. *aquilegifolium.*

Thalictrum ſeminibus triangularibus pendulis, ſtipulis caulinis. *Hort. cliff.* 226. *Fl. ſuec.* 452. *Roy. lugdb.* 285. *Hall. helv.* 309

Thalictrum majus, florum ſtaminibus purpuraſcentibus. *Bauh. pin.* 337.

Thalictrum majus, folliculis anguloſis, caule lævi. *Bauh. hiſt.* 3. *p.* 487

Habitat in Scania. Helvetia ♃

Petala 4, *Stamina* 60, *Piſtilla* 16.

13. THALICTRUM fructibus pendulis triangularibus contortis, caule ſubancipiti. *contortum.*

Thalictrum hybridum ſeminibus contortis. *Fl. hybrid.* 27. *

Habitat in Sibiria. *G. Demidoff.* ♃

Petala 4, *Stamina* 60, *Piſtilla* 8. *antecedenti ſimilis, ſed humilior floribus albis.*

ADONIS.

1. ADONIS floribus octopetalis, fructibus ſubcylindricis. *Hort. upſ.* 156. *annua.*

Adonis radice annua. *Hort. cliff.* 321. *Roy. lugdb.* 488. *Dalib. pariſ.* 162. *Sauv. monſp.* 253.

α. Adonis ſylveſtris, flore phœniceo ejusque foliis longioribus. *Bauh. pin.* 178 *phœnicea.*

Adonis flore pallido. *Cam. epit.* 648.

β. Adonis hortenſis flore minore atro-rubente. *Bauh. pin.* 178. *atrorubens.*

Flos adonis. *Cluſ. hiſt.* 1. *p.* 336.

Habitat inter ſegetes Europæ *auſtralis.* ☉

Hæ α, β. diſtinctæ perſiſtunt, ſtructura tamen eadem.

2. ADONIS flore dodecapetalo, fructu ovato. *vernalis.*

Adonis radice perenni. *Hort. cliff.* 231. *Fl. ſuec.* 456. *It. œl.* 73. *Roy. lugdb.* 488. *Sauv. monſp.* 253.

Helleborus niger tenuifolius, buphthalmi flore. *Bauh. pin.* 186.
Buphthalmum. *Dod. pempt.* 261.
Habitat in Oelandiæ, Boruſſiæ, Bohemiæ *collibus apricis.* ♃

apennina. 3. ADONIS floribus pentdecapetalis, fructu ovato.
Helleborus niger ferulaceus, caule geniculato, flore magno tulipæ minoris inſtar. *Mentz. pug. t.* 3. *f.* 1.
Habitat in Sibiria, Apenninis. ♃
Difficillime diſtinguuntur plantæ 2. 3. *ſimillimæ.* Caulis 2 *adſperſus pilis*; 3 *punctis farinoſis pellucidis.* Rami 2 *ex caulis parte inferiore*; 3 *ex alis ſuperioribus* Pedunculus 2 *breviſſimus*; 3 *longior.* Folia *in* 2 *minus pinnata*; 3 *magis diviſa, latiora, nitidiora.* Calyx *in* 2 *griſeus ſtriatus villoſus concavus*; 3 *luteo virescens, glaber, avenius, planus.* Petala *in* 2 *lanceolata, ſæpius duodecim*; 3 *ovata, imbricata, ſæpius quindecim.* Flos *in* 2 *unicus*; *in* 3 *plures.* Stamina *in* 3 *valde reflexa.* Planta 3. *diutius æſtate durat*: *vero vernalis eſt.*

capenſis. 4. ADONIS fructibus depreſſis, foliis duplicato-ternatis ovatis ſerratis.
Actæa trifoliata hirſuta, foliis ſcabris, flore ſulphureo rariore *Burm. afr.* 147. *t.* 51.
Chriſtophoriana africana ranunculoides, foliis rigidis. *Boerh. lugdb.* 2. *p.* 62.
Ranunculus æthiopicus, foliis rigidis, floribus ex luteo-vireſcentibus. *Comm. hort.* 1. *p.* 1. *t.* 1.
Imperatoria ranunculoides africana enneaphyllos, laſerpitii lobatis foliis rigidis margine ſpinoſis. *Pluk. alm.* 198. *t.* 95. *f.* 2.
Habitat ad Cap. b. Spei. ♃

RANUNCULUS.

* *Foliis ſimplicibus.*

Flammula. 1. RANUNCULUS foliis ovato-lanceolatis petiolatis, caule declinato. *Hort. cliff.* 228. *Fl. ſuec.* 458. *Roy. lugdb.* 489. *Hall. helv.* 322. *Dalib. pariſ.* 163.
Ranunculus foliis ovato-oblongis integerrimis, caule procumbente. *Fl. lapp.* 325.
Rannnculus longifolius paluſtris minor. *Bauh. pin.* 180
Flammula Ranunculus. *Dod. pempt.* 432.
β. Ranunculus paluſtris, foliis ſerratis. *Bauh. pin.* 180.
Habitat in Europæ *paſcuis udis.* ♃

2. RA

2. RANUNCULUS foliis linearibus, caule repente. *reptans*
Fl. lapp. 236. *t.* 3. *f.* 5. *Fl. ſuec.* 459

Ranunculus flammeus minimus, ſpergulæ folio. *Buxb. cent* 5. *app.* 41

Ranunculus repens, gramineis foliis, e ſingulis geniculis radices agens. *Amm. ruth.* 80. *t.* 13. *f.* 1.

Habitat in Suecia, Ruſſia *ad ripas lacuum antecedenti valde affinis & forte varietas.*

3. RANUNCULUS foliis lanceolatis, caule erecto. *Lingua.*
Hort. cliff. 228. *Fl. ſuec.* 457 *Roy. lugdb.* 489. *Dalib. pariſ.* 163.

Ranunculus longifolius paluſtris major. *Bauh. pin.* 34.

Ranunculus lanceolatus major. *Tabern. ic.* 48.

Habitat in Europæ *borealioris foſſis, aquis limoſis.* ♃

4. RANUNCULUS foliis ovatis petiolatis, floribus ſeſ- *nodiflorus.*
ſilibus. *Hort. cliff.* 229. *Dalib. pariſ.* 164.

Ranunculus pariſienſis pumilus, plantaginellæ folio. *Pet. gaz.* 40. *t.* 25. *f.* 4. *Vaill. act.* 1719. *p.* 52. *t.* 4. *f.* 4.

β Ranunculus ſiculus, folio rotundo vix ſerrato. *Pet. gaz.* 39. *t.* 24. *f.* 9.

Habitat Pariſiis & *in* Siciliæ *locis paludoſis.*

5. RANUNCULUS foliis lanceolato-linearibus ſeſſili- *gramineus*
bus, caule erecto, radice bulboſa. *Hort. cliff.* 288. *Roy. lugdb.* 489. *Dalib. pariſ.* 163. *Sauv. monſp.* 75.

Ranunculus, gramineo folio, bulboſus. *Bauh. pin.* 180.

Ranunculus pumilus, gramineis foliis. *Bauh. hiſt.* 3. *p* 866.

Hydropiper lanceolatum. *Daelch. hiſt.* 1038.

Habitat in Pyrenæis & Galliæ *pratis aridis.* ♃

6. RANUNCULUS foliis ſubovatis nervoſis integer- *parnaſſifolius*
rimis petiolatis.

Ranunculus montanus, graminis parnaſſi-folio. *Tournef. inſt.* 286.

Habitat in Europa *auſtrali.*

7. RANUNCULUS foliis ovatis acuminatis amplexi- *amplexicaulis.*
caulibus, caule ſubunifloro, radice faſciculata. *Hort. cliff.* 229. *Roy. lugdb.* 484. *Sauv. monſp.* 76.

Ranunculus montanus, folio plantaginis. *Bauh. pin.* 180. *Moriſ. hiſt.* 2. *p.* 444. *ſ.* 4. *t.* 30 *f.* 36.

Ranunculus dulcis, foliis latis rapiſtri perfoliatis, floribus albis. *Menz. pug. t.* 8. *f.* 6.

 β. Ra-











IMAGE EVALUATION TEST TARGET (MT-3)




6″





Photographic Sciences Corporation

23 WEST MAIN STREET
WEBSTER, N.Y. 14580
(716) 872-4503





β. Ranunculus montanus, folio gramineo. *Bauh. pin.* 181. *Moriſ. hiſt.* 2. *p.* 441. *ſ.* 4. *t.* 30. *f.* 38.
Habitat in Pyrenæis, Apenninis. ♃

bullatus. 8. RANUNCULUS foliis ovatis ſerratis, ſcapo nudo unifloro. *Hort. cliff.* 229.
Ranunculus latifolius bullatus, aſphodeli radice. *Bauh. pin.* 181.
Ranunculus luſitanicus. *Dod. pempt.* 429.
Ranunculus grumoſa radice 1. *Cluſ. hiſt.* 1. *p.* 238.
β. Ranunculus latifolius bulbatus autumnalis, flore pleno & prolifero. *Moriſ. hiſt.* 2. *p.* 447. *ſ.* 4. *t.* 31. *f.* 49. 50. 51.
Habitat in Luſitania, Creta. ♃

Ficaria. 9. RANUNCULUS foliis cordatis angulatis petiolatis. *Fl. ſuec.* 460. *Hort. cliff.* 228. *Mat. med.* 274. *Roy. lugdb.* 490. *Dalib. pariſ.* 167.
Chelidonia rotundifolia minor. *Bauh. pin.* 167.
Chelidonium minus. *Fuchſ. hiſt.* 866.
Chelidonia rotundifolia major. *Bauh. pin.* 167. *prodr.* 137.
Habitat in Europæ *ruderatis, umbroſis, ſpongioſis.* ♃

Thora. 10. RANUNCULUS foliis reniformibus ſubtrilobis crenatis, caulino ſeſſili, floralibus lanceolatis, caule ſub-bifloro.
Aconitum pardalianches 1. ſ. Thora major. *Bauh. pin.* 184.
Thora major. *Cam. epit.* 825.
Ptora valdenſium. *Lob. ic.* 604. *Cluſ. hiſt.* 1. *p.* 239.
β. Aconitum pardalianches alterum, ſ. Thora minor. *Bauh. pin.* 184.
Thora minor. *Cam. epit.* 826.
Limeum pardalianches genus, uno tantum folio. *Daleck. hiſt.* 1738.
Ranunculus foliis radicalibus cordato ſubrotundis, caulinis ſeſſilibus lanceolatis integerrimis. *Hall. helv.* 327. *
Habitat in Alpibus Helveticis, Pyrenaicis. ♃

* *Foliis diſſectis & diviſis.*

creticus. 11. RANUNCULUS foliis radicalibus reniformibus crenatis ſublobatis, caulinis tripartitis lanceolatis integerrimis, caule multifloro.
Ranunculus foliis radicalibus cordato-ſubrotundis, caulinis

linis tripartitis ſeſſilibus lanceolatis integerrimis. *Roy. lugdb.* 490.
Ranunculus, aſphodeli radice, creticus. *Bauh. pin.* 181.
Ranunculus creticus latifolius. *Cluſ. hiſt.* 1. *p.* 239.
Habitat in Creta. ♃

12. RANUNCULUS foliis radicalibus ſubrotundo-cordatis crenatis; caulinis digitatis dentatis, caule multifloro. *caſſubicus.*
Ranunculus rotundifolius vernus ſylvaticus major vel caſſubicus, folio thoræ calthæ. *Breyn. prodr.* 1. *p.* 45
Habitat in Caſſubia, Sibiria. ♃

13. RANUNCULUS foliis radicalibus reniformibus crenatis inciſis; caulinis digitatis linearibus, caule multifloro. *Hort. cliff.* 229. *Fl. ſuec.* 462. *Roy. lugdb.* 490. *Hall. helv.* 327. *Dalib. pariſ.* 167. *auricomus.*
Ranunculus nemoroſus ſ. ſylvaticus, folio ſubrotundo. *Bauh. pin.* 178.
Ranunculus 1. ſylveſtris. *Dalech. hiſt.* 1028.
Habitat in Europæ *paſcuis humidiuſculis.* ♃

14. RANUNCULUS foliis radicalibus cordatis crenatis; caulinis ternatis angulatis, caule ſubtrifloro. *abortivus.*
Ranunculus foliis radicalibus crenatis, caulinis digitatis petiolatis. *Roy. lugdb.* 490.
Ranunculus foliis radicalibus reniformibus crenatis petiolatis; caulinis paucis digitatis ſeſſilibus. *Gron. virg.* 166.
Ranunculus virginianus, flore parvo, molliori folio. *Herm. lugdb.* 514.
Habitat in Virginia, Canada.

15. RANUNCULUS foliis inferioribus palmatis; ſummis digitatis, fructibus oblongis. *Hort. cliff.* 230. *Fl. ſuec.* 463. *Roy. lugdb.* 490. *Hall. helv.* 323. *Gron. virg.* 63. *Dalib. pariſ.* 167. *ſceleratus.*
Ranunculus paluſtris, apii folio, lævis. *Bauh. pin.* 180.
Ranunculus ſylveſtris 1. *Dod. pempt.* 426.
Habitat ad Europæ *foſſas & paludes.* ⊙

16. RANUNCULUS foliis omnibus quinatis lanceolatis inciſo-ſerratis. *Hort. cliff.* 229. *Hort. upſ.* 156. *Roy. lugdb.* 490. *Hall. helv.* 325. *aconitifolius*
Ranunculus montanus, aconiti folio, albus: flore majore. *Bauh. pin.* 182.

β. Ranunculus montanus, aconiti folio, albus flore minore. *Bauh. pin.* 182

Ranunculus montanus 4. *Cluſ. hiſt.* 1. *p.* 236.

γ. Ranunculus folio aconiti, flore albo multiplici. *Bauh. pin.* 179.

Ranunculus pleno flore albo. *Cluſ. hiſt.* 1. *p.* 236.

Habitat in Alpibus Helveticis, Auſtriacis. ♃

illyricus. 17. RANUNCULUS foliis ternatis integerrimis lanceolatis. *It. œl.* 71. *Fl. ſuec* 471.

Ranunculus foliis tripartitis: laciniis linearibus, caule multifloro, radice tuberoſa. *Hort. cliff.* 230. *Roy. lugdb.* 491. *Sauv. monſp.* 181.

Ranunculus lanuginoſus anguſtifolius, grumoſa radice, major & minor. *Bauh. pin.* 181.

Ranunculus grumoſa radice 4. *Cluſ. hiſt.* 1. *p.* 240.

Habitat in Oelandia, Hungaria, Narbona, Italia. ♃

aſiaticus. 18. RANUNCULUS foliis ternatis biternatisque, foliolis trifidis inciſis, caule inferne ramoſo.

Ranunculus foliis tripartitis laciniatis, caule inferne ramoſo, radice tuberoſa. *Hort. cliff.* 230. *Hort. upſ.* 156. *Roy. lugdb.* 490.

Ranunculus, grumoſa radice, ramoſus. *Bauh. pin.* 181.

Ranunculus aſiaticus polyclonos ſ. grumoſa radice. 2. *Cluſ. hiſt.* 1. *p.* 241.

β. Ranunculus grumoſa radice, flore flavo vario. *Bauh. pin.* 181.

γ. Ranunculus grumoſa radice, flore albo. *Bauh. pin.* 181.

δ. Ranunculus grumoſa radice, flore albo leniter crenato. *Bauh. pin.* 181.

ε. Ranunculus grumoſa radice, flore niveo. *Bauh. pin.* 181.

ζ. Ranunculus grumoſa radice, flore phœniceo minimo ſimplici. *Bauh. pin.* 181.

η. Ranunculus aſphodeli radice, flore ſangvineo. *Bauh. pin.* 181.

θ. Ranunculus aſphodeli radice, flore ſubphœniceo rubente. *Bauh. pin.* 181.

ι. Ranunculus, aſphodeli radice, prolifer miniatus. *Bauh pin.* 181.

Habitat in Aſia *vel* Mauritania. ♃

rutæfolius. 19. RANUNCULUS foliis ſupradecompoſitis, caule ſimpliciſſimo unifolio, radice tuberoſa. *Hort. cliff.* 230. *Roy. lugdb.* 491.

Ranunculus rutaceo folio, flore ſuave rubente. *Bauh. pin.* 181. *Moriſ. hiſt.* 2. *p.* 448. *ſ.* 4. *t.* 31. *f.* 54.
Ranunculus præcox 1, rutæ folio. *Cluſ. hiſt.* 1. *p.* 232.
Habitat in Alpibus Auſtriæ, Delphinatus. ♃

20. RANUNCULUS calycibus hirſutis, caule bifloro, foliis multifidis. *Fl. ſuec.* 464. *glacialis.*
Ranunculus caule bifloro, calyce hirſuto. *Fl. lapp.* 233. *t.* 3. *f.* 1.
Ranunculus montanus purpureus, calyce villoſo. *Bauh. hiſt.* 3. *p.* 868. *Scheuch. alp.* 339. *t.* 20. *f.* 1.
Habitat in Alpibus Lapponiæ, Helvetiæ. ♃

21. RANUNCULUS calyce hirſuto, caule unifloro, foliis radicalibus palmatis; caulinis multipartitis ſeſſilibus. *Fl. lapp.* 232. *t.* 3. *f.* 2. *Fl. ſuec.* 465. *Hall. helv.* 326. *nivalis.*
Ranunculus minimus alpinus luteus. *Bauh. hiſt.* 3. *p.* 861. *f. inferior.*
β. Ranunculus idem pygmæus. *Fl. lapp.* 232. *t.* 3. *f.* 3.
Habitat in Alpibus Lapponiæ, Helvetiæ. ♃

22. RANUNCULUS foliis radicalibus ſubcordatis obtuſis tripartitis: lobis trilobatis; caulino lanceolato integerrimo, caule unifloro. *alpeſtris.*
Ranunculus caule aphyllo unifloro, foliis ſubrotundis ſemitrifidis. *Hall. helv.* 326. *Sauv. monſp.* 205.
Ranunculus alpinus humilis rotundifolius, flore majore & minore. *Bauh. pin.* 181.
Ranunculus alpinus humilis albus, folio ſubrotundo, *Segu. ver.* 1. *p.* 489. *t.* 12. *f.* 1.
Ranunculi montani 1. ſpecies 1. & 2. *Cluſ. hiſt.* 1. *p.* 234.
Habitat in Alpibus Auſtriacis, Helveticis. ♃

23. RANUNCULUS foliis tripartitis lobatis obtuſis, caule ſubnudo unifloro. *Fl. ſuec.* 461. * *Lapponicus.*
Ranunculus caule unifolio unifloro, foliis tripartitis. *Fl. lapp.* 231. *t.* 3. *f.* 4. *
Habitat in Alpibus Lapponicis.

24. RANUNCULUS foliis tripartitis crenatis, caule ſimplici villoſo ſubnudo unifloro. *Sauv. monſp.* 181. † *monſpeliacus.*
Ranunculus ſaxatilis, magno flore. *Bauh. pin.* 182. *prodr.* 96.
Habitat Monſpelii.

bulboſus. 25. RANUNCULUS calycibus retroflexis, pedunculis ſulcatis, caule erecto, foliis compoſitis *Fl. ſuec.* 469. *Dalib. pariſ.* 165.
Ranunculus radice ſimplici globoſa. *Hort. cliff.* 230 *Roy. lugdb.* 491. *Hall. helv.* 323.
Ranunculus bulboſus. *Lob. ic.* 666. *Fl. lapp.* 229.
Ranunculus pratenſis, radice verticilli modo rotunda. *Bauh. pin.* 179.
Habitat in Europæ *pratis, paſcuis.* ♃

repens. 26. RANUNCULUS calycibus patulis, pedunculis ſulcatis, ſtolonibus repentibus, foliis compoſitis. *Fl. ſuec.* 468.
Ranunculus foliis ternatis, foliolis petiolatis trifidis: medio productiore, caule multifloro. *Hort. cliff* 230 *Gron. virg.* 166. *Roy. lugdb.* 491.
Ranunculus pratenſis repens hirſutus *Bauh. pin.* 179. *Fl. lapp.* 230.
Ranunculus hortenſis 1. *Dod. pempt.* 425.
Habitat in Europæ *cultis.* ♃

polyanthemos. 27. RANUNCULUS calycibus patulis, pedunculis ſulcatis, caule erecto, foliis multipartitis. *Fl. ſuec.* 467.
Ranunculus polyanthemos ſimplex. *Lob. ic.* 666.
Ranunculus ſylveſtris. *Tabern. ic* 42. *hiſt.* 117.
Habitat in Europæ *borealis graminoſis.* ♃

acris. 28. RANUNCULUS calycibus patulis, pedunculis teretibus, foliis tripartito-multifidis: ſummis linearibus. *Fl. ſuec* 466. *Dalib. pariſ* 164.
Ranunculus foliis peltatis quiquangularibus multipartitis: laciniis linearibus, caule multifloro. *Hort. cliff.* 231. *Roy. lugdb.* 492.
Ranunculus pratenſis erectus acris. *Bauh. pin.* 178. *Fl. lapp.* 228.
Ranunculus hortenſis. *Dod. pempt.* 426.
β. Ranunculus hortenſis erectus, flore pleno. *Bauh. pin.* 179.
Habitat in Europæ *pratis, paſcuis.* ♃

lanuginoſus. 29. RANUNCULUS foliis tripartitis acute ſinuatis tomentoſis.
Ranunculus foliis radicalibus pinnatis. *Sauv. monſp.* 227.
Ranunculus montanus lanuginoſus, foliis ranunculi pratenſis repentis. *Bauh. pin.* 182. *prodr.* 96.

Ra-

Ranunculus magnus valde hirſutus, flore luteo *Bauh. hiſt.* 3. *p.* 417.
Habitat Monſpelii. ♃
Caulis *altus, erectus.* Folia *Aconiti ſ. Ran. acris, ſed magis inciſa.* Semina *acuta, compreſſa.*

30. RANUNCULUS calycibus retroflexis, pedunculis ſulcatis, caule erecto, foliis compoſitis, radice granuloſa. *Guett. ſtamp.* 175. *Dalib. pariſ.* 166. *chærophyllos*
Ranunculus chærophyllos, aſphodeli radice *Bauh. pin.* 181. *Barr. ic.* 581.
Ranunculus montanus leptophyllos, aſphodeli radice. *Col. ecphr.* 1. *p.* 312. *t.* 311.
Habitat in Gallia, Italia.

31. RANUNCULUS ſeminibus aculeatis, foliis ſuperioribus decompoſitis linearibus. *Hort. cliff.* 229. *Fl. ſuec.* 470. *It. œl.* 104. *. *Roy. lugdb.* 491. *Dalib. pariſ.* 166. *arvenſis.*
Ranunculus arvenſis echinatus. *Bauh. pin.* 179.
Ranunculus ſylveſtris 3. *Dod. pempt.* 427.
Habitat in Europæ *auſtralioris agris.* ☉

32. RANUNCULUS ſeminibus aculeatis, foliis ſimplicibus palmatis inciſis. *Hort. cliff.* 229. *Hort. upſ.* 157. *Roy. lugdb.* 491. *Sauv. monſp.* 204. *muricatus*
Ranunculus paluſtris echinatus. *Bauh. pin.* 180. *prodr.* 95.
β. Ranunculus rotundifolius repens echinatus. *Bauh. pin.* 180. *prodr.* 95.
γ. Ranunculus ſtellatus echinatus creticus. *Bauh. pin.* 180.
δ. Ranunculus hirſutus annuus, flore minimo. *Raj. angl.* 3. *p.* 248. *t.* 12. *f.* 1. *Pluk. alm.* 311. *t.* 55. *f.* 1.
Ranunculus arvenſis annuus hirſutus, flore omnium minimo. *Moriſ. hiſt.* 2. *p.* 440. *ſ.* 4. *t.* 28. *f.* 21.
Habitat in Europæ *auſtralis foſſis & humentibus.* ☉

33. RANUNCULUS ſeminibus ſpinoſo-ſubulatis recurvis, calycibus reflexis, foliis multifidis. *orientalis*
Habitat in Oriente.

34. RANUNCULUS caule erecto bifolio, foliis multifidis; caulinis alternis ſeſſilibus. *Roy. lugdb.* 492. *grandiflorus*
Ranunculus orientalis, aconiti folio, flore maximo. *Tournef. cor.* 22.
Habitat in Oriente. ♃

falcatus. 35. RANUNCULUS foliis filiformi-ramoſis, calycibus appendiculatis. *Hort. upſ.* 157. *Sauv. monſp.* 205.
Myoſuros foliis ramoſis. *Hort. cliff.* 117. *Roy. lugdb.* 492.
Melampyrum luteum minimum. *Bauh. pin.* 234.
Ranunculus ceratocephalus, ſeminibus falcatis in ſpicam adactis. *Moriſ. hiſt.* 2. *p.* 440. *ſ.* 4. *t.* 28. *f.* 22.
Habitat inter ſegetes Europæ *auſtralis.* ☉

hederaceus. 36. RANUNCULUS foliis ſubrotundis trilobis integerrimis, caule repente. *Hort. cliff.* 231. *Roy. lugdb.* 492. *Dalib. pariſ.* 167. *Gort. gelr.* 325.
Ranunculus aquaticus hederaceus luteus. *Bauh. pin.* 180. *Moriſ. hiſt.* 2. *p.* 441. *ſ.* 4. *t.* 29. *f.* 29.
Habitat in aquis vadoſis Angliæ, Belgii.

aquatilis. 37. RANUNCULUS foliis ſubmerſis capillaceis, emerſis peltatis.
Ranunculus foliis inferioribus capillaceis, ſuperioribus peltatis. *Fl. lapp.* 234. *Roy. lugdb.* 492. *Hall. helv.* 328.
Ranunculus aquaticus, folio rotundo & capillaceo. *Bauh. pin.* 180.
Ranunculus aquatilis. *Dod. pempt.* 387.
β. Ranunculus foliis ſubmerſis capillaceis. *Fl. ſuec.* 472. *Dalib. pariſ.* 168.
Ranunculus foliis omnibus capillaceis circumſcriptione rotundis. *Hort. cliff.* 231. *Roy. lugdb.* 492. *Hall. helv.* 328.
Ranunculus aquaticus albus, circinnatis tenuiſſime diviſis foliis. *Pluk. alm.* 311. *t.* 52. *f.* 2.
Millefolium aquaticum cornutum majus. *Bauh. pin.* 141.
γ. Ranunculus foliis capillaceis circumſcriptione vaga brevioribus. *Hall. helv.* 328.
Ranunculus aquaticus capillaceus. *Bauh. pin.* 180.
Ranunculus trichophyllos aquaticus medio luteus. *Col. ecphr.* 1. *p.* 315. *t.* 316.
δ. Ranunculus foliis omnibus capillaceis circumſcriptione oblongis. *Roy. lugdb.* 492.
Ranunculus albus fluitans, peucedani foliis. *Herm. lugdb.* 517.
Habitat in Europæ *aquis undoſis, foſſis, rivulis.*

TROLLIUS.

europeus. 1. TROLLIUS corollis conniventibus, nectariis longitudine ſtaminum.
Helleborus flore clauſo erecto petiolato, caule ſimpliciſſimo. *Fl. ſuec.* 474.

Hal-

Helleborus foliis angulatis multifidis, flore globoſo. *Hort. cliff.* 227. *Roy. lugdb.* 484.
Helleborus caule ſimplici, flore pedunculato. *Fl. lapp.* 226.
Ranunculus flore globoſo. *Dod. pempt.* 430.
Habitat in Alpibus & ſubalpinis Sueciæ, Germaniæ, Angliæ. ♃

2. TROLLIUS corollis patentibus, nectariis longitudine petalorum. *aſiaticus.*
Trollius humilis, flore patulo. *Buxb. cent.* 1. *p.* 15. *t.* 22.
Helleborus niger orientalis, ranunculi folio, flore nequaquam globoſo. *Tournef. cor.* 20.
Helleborus aconiti folio, flore globoſo croceo. *Amm. ruth.* 101.
Habitat in Sibiria, Cappadocia. ♃

ISOPYRUM.

1. ISOPYRUM ſtipulis ſubulatis, petalis acutis. *Hort. upſ.* 157. *fumarioides*
Helleborus fumariæ foliis. *Amm. ruth.* 74. *t.* 12.
Habitat in nemoribus Sibiriæ. ☉

2. ISOPYRUM ſtipulis ovatis, petalis obtuſis. *thalictroides*
Thalictrum batrachioides, flore albo, italicum. *Bocc. muſ.* 84. *t.* 79. *f.* 1. *
Ranunculus nemoroſus, thalictri folio. *Bauh. pin.* 178. *Raj. hiſt.* 584. *Moriſ. hiſt.* 2. *p.* 437. *ſ.* 4. *t.* 28. *f.* 12.
Ranunculus præcox 11, thalictri folio. *Cluſ. hiſt.* 1. *p.* 233.
Habitat in Alpibus Italicis, Grationopoli, *inque agro Viennenſi.*

3. ISOPYRUM ſtipulis obſoletis.
Aquilegia montana, flore parvo, thalictri folio. *Bauh. pin.* 144. *prodr.* 75. *Bauh. hiſt.* 3. *p.* 484. *Raj. hiſt.* 707. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 458. *ſ.* 12. *t.* 11. *f.* 5. *Hall. helv.* 310. *aquilegioides*
Habitat in Alpibus Helveticis, Tridentinis, Apenninis.

HELLEBORUS.

1. HELLEBORUS flore folio inſidente. *Hort. cliff.* 227. *Hort. upſ.* 158. *Roy. lugdb.* 484. *hyemalis.*
Helleborus ranunculoides præcox tuberoſus, flore luteo. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 459. *ſ.* 12. *t.* 2. *f.* 4.
Aconitum unifolium bulboſum. *Bauh. pin.* 183.
Habitat in Lombardia, Italia, Apenninis. ♃

2. HEL-

2. HELLEBORUS ſcapo ſub-unifloro ſubnudo, foliis pedatis. *Hort. upſ.* 157. *Roy. lugdb.* 484. *Mat. med.* 273.
Helleborus ſcapo florifero ſubnudo, petiolo communi bipartito. *Hort. cliff.* 227.
Helleborus niger, flore roſeo. *Bauh. pin.* 186.
Elleborus niger legitimus. *Cluſ. hiſt.* 1. *p.* 275.
Habitat in Auſtria, Hetruria, Apenninis. ♃

viridis. 3. HELLEBORUS caule multifloro folioſo, foliis digitatis.
Helleborus caule æquali folioſo, foliis radicalibus caulem tandem ſuperantibus. *Hort. cliff.* 227. *Hort. upſ.* 158. *Roy. lugdb.* 484.
Helleborus niger hortenſis, flore viridi. *Bauh. pin.* 185.
Elleborum nigrum alterum. *Cam. epit.* 941.
Habitat in montibus Viennenſibus, Euganeis. ♃

fœtidus. 4. HELLEBORUS caule multifloro folioſo, foliis pedatis.
Helleborus caule inferne anguſtato multifolio multifloro, foliis caule brevioribus. *Hort. cliff.* 227. *Roy. lugdb.* 484. *Dalib. pariſ.* 169. *Sauv. monſ.* 180.
Helleborus niger fœtidus. *Bauh. pin.* 185.
Helleboraſter maximus. *Lob. ic.* 679
Helleborus femina. *Sterb. fung.* 372. *t.* 36. *f. C.*
β Helleborus niger trifoliatus. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 460. *ſ.* 12. *t.* 4. *f.* 7.
Habitat in Germania, Helvetia Gallia.

trifolius. 5. HELLEBORUS foliis ternatis, ſcapo unifloro. *Amœn. acad.* 2. *p.* 356 *t.* 4. *f.* 18.
Habitat in Canada, Sibiria. ♃

CALTHA.

paluſtris. 1 CALTHA. *Fl. lapp.* 227. *Fl. ſuec.* 473. *Hort. cliff.* 228. *Roy. lugdb.* 484. *Gron. virg.* 166. *Dalib. pariſ.* 169.
Caltha paluſtris, flore ſimplici. *Bauh. pin.* 276.
Populago major. *Tabern. ic.* 750.
β. Populago minor *Tabern. ic.* 750.
Caltha paluſtris, flore pleno. *Bauh. pin.* 276.
Habitat in humidiuſculis Europæ. ♃

AD-

ADDENDA.

Pag. 158. *poſt Gnidiam.*

STELLERA.

1. STELLERA foliis linearibus, floribus quadrifidis. *Paſſerina.*
Amœn. acad. 1. *p.* 400. *Sauv. monſp.* 60.
Paſſerina. *Bauh. hiſt.* 3. *p.* 456.
Lithoſpermum, linariæ folio, germanicum. *Bauh. pin.* 259
Linaria altera botryoides montana. *Col. ecphr.* 1. *p.* 82. *t.* 80.
Habitat in Europæ *arvis, campis, apricis, aridis.* ♄

2. STELLERA foliis lanceolatis, corollis quinquefidis. *Chamæjaſme.*
Amœn. acad. 1. *p.* 400.
Chamæjaſme radice mandragoræ *Amm. ruth.* 16. *t.* 2.
Habitat in Sibiria. *D. Gmelin.* ♃

PASSERINA.

1. PASSERINA foliis linearibus convexis quadrifariam imbricatis, ramis tomentoſis. *filiformis.*
Paſſerina foliis linearibus. *Hort. cliff.* 246. *t.* 11. *Roy. lugdb.* 208,
Thymelæa æthiopica fruticoſa, foliis in longum ſtriatis, ſurculis valde tomentoſis. *Pluk. mant.* 180.
Thymelæa æthiopica, paſſerinæ foliis. *Breyn. cent.* 10. *t.* 6.
Thymelæa foliis oppoſitis cruciatis anguſtis, floribus tubuloſis in ſpicæ modum e foliorum alis erectis. *Burm. afr.* 127. *t.* 47. *f.* 1.
Habitat in Æthiopia. ♄

2. PASSERINA foliis carnoſis extus glabris, caulibus tomentoſis. *hirſuta.*
Thymelæa tomentoſa, foliis ſedi minoris. *Bauh. pin.* 463.
Sanamunda 3. *Cluſ. hiſt.* 1. *p.* 89.
Seſamoides parvum dalechampii. *Bauh. hiſt.* 1. *p.* 595.
Habitat in Hiſpania. ♄

3. PASSERINA foliis lanceolatis ſubciliatis erectis, ramis nudis. *ciliata.*
Paſſerina foliis lanceolatis. *Hort. cliff.* 146. *Roy lugdb.* 208.
Thymelæa foliis chamelææ minoribus hirſutis. *Bauh. pin.* 463
Thymelæa foliis oblongo-acutis ad oras fimbriatis. *Burm. afr.* 129. *t.* 47. *f.* 2.
Sanamunda 1 *Cluſ. hiſt.* 1. *p.* 88.

Eri-

Erica africana, ruſci folio. *Seb. theſ.* 2. *p.* 15. *t.* 12. *f.* 9
Habitat in Æthiopia, Hiſpania. ♄

uniflora. 4. PASSERINA foliis linearibus oppoſitis, floribus terminalibus ſolitariis, ramis glabris.
Thymelæa foliis triquetris cruciatim oppoſitis, flore ſericeo. *Burm. afr.* 132. *t.* 48. *f.* 2.
Thymelæa ramoſa, linearibus foliis anguſtis, flore ſolitario. *Burm. afr.* 131. *t.* 48. *f.* 1.
Habitat in Æthiopia. ♄

LACHNÆA.

eriocephala. 1. LACHNÆA capitulis ſolitariis lanatis, foliis quadrifariam imbricatis.
Habitat in Æthiopia. ♄
Folia *trigona, gibba.* Capitula *terminalia, ſolitaria, tomentoſa, cincta lana candida.*

conglomerata. LACHNÆA capitulis confertis, foliis laxis.
Thymelæa africana, polii anguſtioribus foliis, floribus in capitulis ſummo caule glomeratis. *Pluk. mant.* 179. *Raj. dendr.* 54.
Sanamunda 3. cluſii affinis, polii folio. *Breyn. cent.* 18. *t.* 7.
Habitat ad Cap. b. Spei. ♄

Pag. 35. *inter Melothriam & Lœflingiam.*

ORTEGA.

hiſpanica. 1. ORTEGA. *Lœfl. epiſt. VIII:* 43.
Rubia linifolia aſpera. *Bauh. pin.* 333.
Juncaria ſalmatica. *Cluſ. hiſt.* 1. *p.* 174.
Habitat in Caſtilia *Minuart*, Bætica *Velez*, Salmantica. ☉

Pag. 79.

membranaced 4. STIPA pedicellis dilatatis membranaceis.
Habitat in Hiſpania. *Lœfling.*
Gr. *vix pedale, habitu Avenæ.* Panicula *ſimplex, vix ſubdiviſa, laxa, debilis.* Pedicelli *membranacei, ancipites, obtuſiuſculi.* Calycis *ariſta longitudinæ ariſtæ corollinæ.*

Pag. 84.

Hyſtrix. 6. ELYMUS ſpiculis involucro deſtitutis.
Gramen avenaceum, locuſtis ariſtatis, paniculis echinum referentibus. *Gronov.*
Habitat in - - - -
Spica *compoſita ex Spiculis duabus ad ſingulum dentem.* Spiculæ *quadrifloræ; ariſtis longis.* Involucra *nulla ſed horum loco Calli duo.*

2. *p.* 15. *t.* 12. *f.* 9

poſitis, floribus ter-

oppoſitis, flore ſe-

s anguſtis, flore ſo-
1.

natis, foliis quadri-

nalia, ſolitaria, *to-*

oliis laxis.
bus foliis, floribus
is. *Pluk. mant.* 179.

Breyn. cent. 18. *t.* 7.

Læflingiam.

33.
174.
lex, Salmantica. ☉

naceis.

icula *ſimplex*, *vix*
mbranacei, *ancipi-*
itudine ariſtæ co-

utis.
, paniculis echi-

ſingulum dentem.
Involucra *nulla.*